

হোমিওপ্যাথিক ঔষজ্য-বিজ্ঞান ।

পঞ্চম খণ্ড ।

(পরিশিষ্ট)

শ্রীজগদ্বন্দ্র রায়, এন্, এম্, এস্,
প্রফেসর অফ মেট্রিয়ার মেডিকা, হানিমান মেডিকেল
কলেজ ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, এম. এ.

পাবনা ।

১৩৩৭

All rights reserved

Price Rs 4/-

কলিকাতা

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড স্বর্ণপ্রসে

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কঙ্কন মুদ্রিত।

নিবেদন

চৌম্বিক ও প্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হইল, পুস্তকও সমাপ্ত হইল। কল্পনায় পঞ্চম খণ্ডের কলেবরের যে সীমা নির্দেশ করিয়াছিলাম কার্যতঃ গ্রন্থ-কলেবর তাহার দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় ও স্থানসংক্ষেপের অনুরোধে গ্রন্থের কার্যকারিতার হানী করা সম্ভবত বোধ না হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। অত্যাশ্রিত খণ্ডের তুলনায় পঞ্চম খণ্ডের আকার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। পুস্তক সমাপ্ত করিতে বিলম্ব হওয়ার ইহা অত্যন্ত কারণ। পুস্তকের শেষে যে ভৈষ্যের ও চিকিৎসার নির্ঘণ্ট (Index) সংযোজিত হইয়াছে তাহার সহন যে কিরূপ শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ তাহা উক্ত নির্ঘণ্টগুলি একবার নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিলম্বের জন্ত মুদ্রাকরও বিশেষরূপে দায়ী। যে কারণেই হউক যখন বিলম্ব হইয়াছে তখন গ্রন্থকৃৎগণের নিকট তজ্জগৎ ক্ষমা প্রার্থী।

পঞ্চম খণ্ডের মূল্য সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যিক। সম্বল ছিল, পূর্ব খণ্ডের মূল্য ২।০ স্থির করিব; এ খণ্ডের কলেবর বেকরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে মুদ্রাকরব্যয় ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ লাগিয়াছে। এরূপ হওয়ায় পূর্ব সংকল্পের কিছু ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনটি বিস্তৃত নির্ঘণ্টের (Index) সংযোজনাই এর কারণ। সংক্ষেপে একটি নির্ঘণ্ট দিলে মূল্য না বাড়াইলেও সম্ভব। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থপাঠে বিশেষ অসুবিধা হইবে জানিয়া এইরূপ বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সংযোজিত হইল। ইহা বহু ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে বাধাই এবং পঞ্চম খণ্ডের সহিত নির্ঘণ্ট সংযোজনায় কিঞ্চিৎ ব্যয়সংক্ষেপ

হইয়াছে এবং তজ্জন্যই নির্ঘণ্ট সহ পঞ্চম খণ্ডের মূল্য মাত্র ১০ আনা বাড়াইয়া ৩ টাকা ধাৰ্য্য করা সম্ভব হইয়াছে। ভরসা করি ইহাতে গ্রাহকগণের অভিযোগের সম্ভব কারণ থাকিবে না।

গ্রন্থসঙ্কলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে ভেদজগুণি বহুল প্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোন কথাই পরিত্যক্ত হইয়া নাই; বরং পরস্পর তুলনাসৌকর্য্যার্থে একই বিষয় কোন কোন স্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। তাহাও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ কোন ঔষধের বিষয় লিখিতে যদি স্থানান্তরে তাহার আংশিক বর্ণনায় নির্দেশ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় তাহা হইলে পাঠকের অবকাশের অভাব বা প্রকৃতির শৈথিল্য বশতঃ তাহা হয়ত অপঠিত থাকিয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য ঔষধটির সম্যক পরিচয়ের বিঘ্ন হওয়ার সম্ভব; ঔষধবর্ণনারও পূর্ণাঙ্গত্বের হানী হয়। পাঠকালে স্থানান্তরে দৃষ্টব্য বিষয় খুঁজিয়া গইতে জ্ঞানের ধারাবাহিকতার যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির হানিকর। এই বিবেচনায় গ্রন্থবাহুল্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কোন কোন স্থলে বিষয়-বিশেষের পুনর্ভাষণও স্বীকার করিয়াছি। বহুল প্রযুক্ত ঔষধগুলি যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা ইংরাজিতে একটি মাত্র ঔষধ অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তিকা (Monograph) আছে তদ্রূপ বিস্তারিত বস্তুতঃ তত্তৎ ঔষধ সম্বন্ধে ভিবকপ্রবরণ যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সমস্তই বথাসম্ভব সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিজের অভিজ্ঞতার ফলও বথাস্থানে সংযোজিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সাকল্যের নিদান স্বরূপ ভেদজসমূহের সাদৃশ্য ও প্রবেশিকার অতি বিস্তৃত ও বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় লিখিত হোমিওপ্যাথিক ভেদজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে ইহাই গণ্য একটী প্রধান বিশেষত্ব।

বহুল প্রযুক্ত ঔষধ ব্যতীত অন্য যে সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেগুলিও প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একরূপভাবে লিখিত যে কোন একটি ভৈষজ্যবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলে উক্ত ঔষধের একটি সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি মানস-চক্ষুর সন্মুখে উপস্থিত হইবে; অন্য ঔষধের প্রতিকৃতির সহিত তুলনায় ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইংরাজিতে বাহ্যকে ইণ্ডিভিডুয়েলিজেসন (Individualisation) বলে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, কোন রোগ চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলে তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ ঔষধটি চিনিয়া লইতে ভ্রম না হয়। তবে যদি ভ্রম হয় তাহা প্রায়শঃ রোগীর কৃতান্ত সংগ্রহ করিতে আমাদিগের ক্রটি বশতঃ।

অবশ্য স্মীকার করি যে ভৈষজ্যবিজ্ঞান অায়ত্ত করা অতীব শ্রমসাধ্য; কিন্তু বিনা আয়াসে কোন বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ সম্ভব নহে। হোমিওপ্যাথির ত কথাই নাই; ইহা চন্ডুর সাগরবিশেষ। হোমিওপ্যাথিকে সুখগ্রাহ্য শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করা নিজের অজ্ঞতারই পরিচয়। বিলাতের ডাক্তার বর্নেট্ (Barnett) বলিয়াছেন ইহা "disgustingly difficult"। স্তথাপি এই হোমিওপ্যাথিগণনে প্রবেশের নিদ্বিষ্ট, দ্রাষ্টিহীন, ও বিজ্ঞানসম্মত পথ আছে। ইহাতে নৈপুণ্যলাভ করিতে হইলে দৈর্ঘ্য, ঐকান্তিকতা, শ্রমশীলতা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও অকপট শ্রদ্ধাদি গুণ থাকা আবশ্যিক। বিশেষতঃ যিনি ভৈষজ্যবিজ্ঞান (Materia Medica) নিরন্তর আলোচনায় কাতর তাঁহার পক্ষে হোমিওপ্যাথির প্রকৃত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যজ্ঞান বাহ্যতে যথাসম্ভব সুলভ হয় তাহাই এই গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে গ্রন্থসন্নিবেশিত সুবিহৃত নির্ঘণ্টটির (Index) বিষয়ে ছই এক কথা বলা প্রয়োজন। এই নির্ঘণ্ট তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১ম ঔষধের সংজ্ঞানুসারে, ২য় রোগের নামানুযায়ী, ৩য় রোগের নির্ঘণ্টের পরিচায়করূপে। এই নির্ঘণ্টত্রয় এরূপ বিস্তৃত ও বিশদভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে যে ইহা দ্বারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Therapeutics) কার্য ও বহুল পরিমাণে সাধিত হইবে।

১ম ভাগ। কোন একটি ঔষধ কোন কোন রোগে প্রযুক্ত হয় ও তাহার গুণ এবং ক্রিয়াদি পুস্তকের কোন স্থলে বিবৃত আছে তাহা এই ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২য় ভাগ। কোন একটি রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে তাহার প্রয়োজনীয় ঔষধ কোন কোন পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে দেখান হইয়াছে।

৩য় ভাগ। রোগের নাম দ্বিতীয় ভাগে স্বজাতীয়তা অনুসারে পুঞ্জক্রমে উল্লিখিত থাকায় স্থলবিশেষে কোন কোন জাতীয়ের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, তজ্জন্য রোগনিচয় তৃতীয় ভাগে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করিয়া তাহা দ্বিতীয় ভাগের কোন জাতীয়বর্গের অন্তর্গত তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যিক যে নির্ঘণ্টমধ্যে স্বল্পপ্রয়োজনীয়, বোধে কোন কোন রোগের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলেও ঐ রোগগুলি যে সকল বস্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে তাহাদিগের রোগের সাধারণ নির্ঘণ্ট মধ্যে ঐ রোগের ঔষধগুলিও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল ঔষধের বিবয় পাঠ করিলেই ঐ বিবয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি জানা যাইবে।

এই গ্রন্থের পূর্ক পূর্ক খণ্ডসকল মুদ্রণকালে সুহৃদপ্রবর পরম শ্রদ্ধাভাজন ও অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা বিষয়ে আমার প্রধান সহায় থাকিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান খণ্ড প্রণয়নের প্রারম্ভে তিনি অকস্মাৎ আমাদের

মায়ামতা ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করায় তাঁহার হৃদয় সাহায্যে বঞ্চিত হই। ইহাও বর্তমান খণ্ড প্রকাশের বিলম্বের অন্যতম কারণ। আমার পরম হিতৈষী বন্ধু প্রবর শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গুঁই ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৈত্র মহাশয়দ্বয়ও আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট সে জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য, পূর্কপ্রকাশিত খণ্ডগুলির দ্বায় এই খণ্ড প্রণয়নেও বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি; তজ্জন্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

গ্রন্থখানি সন্স্কৃতসম্পন্ন ও কার্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহু-চেষ্টার ক্রটি করি নাই। এক্ষণে, তাঁহাদিগের জন্ত ইহা লিখিত হইল তাঁহারা এতদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র উপকার লাভ করিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থে বহু ভ্রম-প্রমাদ থাকারই সম্ভব। অতএব সুধীজন-সমীপে সালুনিয় প্রার্থনা যে ভ্রমাদি দৃষ্ট হইলে তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে তৎসংশোধনে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব। অলমতি বিস্তরণে।” ইতি

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
১৯শে জুলাই ১৯১৫ সাল।

} নিবেদক
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

দ্বিতীয় বারের নিবেদন ।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও অত্রাখ্য খণ্ডের ত্রায় ইহাও প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রন মাত্র, তবে প্রয়োজনানুসারে প্রথম সংস্করণের বর্ণনাদির ভাষা সংশোধিত করিয়া বিষয়াদি সুখবোধ্য করিবার যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অপিচ প্রথম সংস্করণের মুদ্রাকর প্রমাদ এবং অন্যান্য দোষও সংশোধনের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি সশঙ্কে অধিক কিছু বলিবার নাই, কারণ পাঠক মহোদয়গণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন অধুনা পুস্তক মুদ্রনের ব্যয় চতুর্গুণাশেষাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্যের চারি টাকা মাত্র বৃদ্ধি বোধ হয় অসঙ্গত হয় নাই। এজন্য আশা করা যায় সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ পূর্ববৎ রূপা বিতরণে বিমুখ হইবেন না।

৪ নং বিডন রো, ফলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১৩২৯ সাল।

} নিবেদক,
শ্রীজগদ্বন্দ্র রায়।

লেকচার ৫১ (LECTURE LI).

- ১। এক্টিয়া রেসিমোসা।
- ২। এক্টিয়া স্পাইকেটা।
- ৩। ক্লিমেটিস্ ইরেক্টা।
- ৪। এডনিস্ ভার্ণেলিস্।
- ৫। রেণাঙ্কুলাস্ বাল্লোসাস্।
- ৬। ফ্যাফিসেগ্রিয়া।
- ৭। রেণাঙ্কুলাস্ স্ক্লিৱেটাস্।
- ৮। হাইড্র্যাণ্টিস্।
- ৯। হেলিবোরাস্।

একনাইট ও পাল্‌সেটলা প্রভৃতি *রেণাঙ্কুলেসিস* জাতিভুক্ত প্রধান প্রধান ঔষধের বিষয় স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরি উক্ত জাতীয় অল্প কতিপয় ঔষধের বিবরণ আমরা বর্তমান লেকচারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মনুষ্য শরীরে ইহাদিগের ক্রিয়াগত বিশেষত্ব অপেক্ষা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কার্যক্ষেত্রের সংকীর্ণতাই ইহাদিগকে এক লেকচারে সন্নিবেশিত করিবার বিশেষ কারণ। তথাপি ঔষধ পরস্পরামধ্যে ক্রিয়াগত বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিলেও এরূপ বর্ণনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা অত্রাণ্ড ঔষধ সম্বন্ধেও এই প্রথা অবলম্বন করিব।

১। এক্টিয়া রেসিমোসা (Actæa Racemosa)।

সাধারণ নাম।—সিমিসিকিউগা, ব্ল্যাক কোহশ।

প্রস্রোগরূপ।—টাট্‌কা মূলের টিংচার বা অরিষ্ট।

তুলনীয় ঔষধ।—পাল্‌স্, সিপিয়া, নেট্ মিউ, লিলি টাই, ইথে।

সাধারণ ক্রিয়া।—সিমিসিফিউগা মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার উর্দ্ধাংশের স্নায়ুতে কার্য প্রকাশ করায় মেরুমজ্জাবেষ্ট ও স্নায়ুবেষ্টের উত্তেজনা ও প্রদাহ, স্নায়ুশূল এবং পেশীর আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কার্যক্ষেত্রে জরায়ু ও অণ্ডাধারের নানাবিধ রোগ, স্নায়ুশূল এবং প্রদাহ নিবারণ দ্বারা ইহার কার্যের কথঞ্চিৎ ব্যাপকতা প্রকটিত হয়।

লক্ষণ ।

মন। প্রলাপ, পঠিত বিষয় রোগীর পুনঃপুনঃ পাঠ করিবার প্রবৃত্তি। মদাত্যয়বৎ প্রলাপ। রোগী বিলাপ করে, কষ্ট প্রকাশ করে এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। পর দিবস আনন্দে শরীর শিহরিয়া উঠে, ক্রীড়াশীলতা জন্মে এবং নানাসক অবস্থা পরিষ্কার হইয়া যায়। অপরাহ্নে দুঃখিত, অবসাদিত এবং উৎকণ্ঠায়ুক্ত হয়।

মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে অবিশ্রান্ত অবসাদভাব। মস্তক গুরু ও বৃহত্তর বোধ; নত হইলে এবং প্রাতঃকালে উত্থান করিলে শিরোগূর্ণন; উপাধান হইতে মস্তকোত্তোলনে বিবমিষা; মস্তকে চেউ খেলার ভাব। চাপে ললাটের মূর্ছবেদনার উপশম। মস্তক এবং চক্ষুগোলকে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য চালনায় তাহার বৃদ্ধি। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ও চক্ষুগোলকের পশ্চাতে তীক্ষ্ণ বেদনা। মূর্দ্ধা, অক্লিপাট, ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে, চক্ষু এবং কর্ণে কনকনানি ও তীরবেধবৎ বেদনার শয়নে বৃদ্ধি ও গুন্মবায়ুগ্রস্ত রোগীর স্থায় ক্রন্দন। মূর্দ্ধা ফাটিয়া যাওয়ার অশুভূতি।

নিদ্রা।—অটৈতত্ত্বের ভাব। মস্তকের উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা-হীনতা। নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা, অস্থিরতা। সর্কশরীরের অসাড়তা বোধ জন্ম নিদ্রা হয় না। নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয় না।

আন্ধু।—জজ্বার কম্প, আকুঞ্চক পেশীর আনর্ভন। অঙ্গের অনিয়মিত গতি,—বামদিকে অধিক ; জজ্বার অর্থেহ্যা। পর্যায়ক্রমিক প্রবল ও ক্ষণিক আক্ষেপ। সম্পূর্ণ শরীরে বেঁধা বোধ। স্থানে স্থানে বৈচিত্রিক আঘাতবৎ অনুভূতি। নানাস্থানে তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা। সর্কশরীরে ক্ষত হওয়ার ছায় ঘুটবোধ। সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ হস্তের অসাড়া।

চক্ষু।—চক্ষুপোলকে তীর বেদনা, মস্তক কিম্বা চক্ষু নাড়িলে ও সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি। চক্ষুপোলকের কেন্দ্রস্থানে ভয়ানক বেদনা, প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া সকল দিন থাকে এবং উপর তলায় উঠিতে তাহার বৃদ্ধি হয়।

শ্বাসশ্বস্ন।—বামবক্ষের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থির নিম্নে ভয়ানক বেদনা। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা হওয়ায় রোগী চিতভাবে শুইতে ও বক্ষ চাপিতে বাধ্য হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্বতা ও অন্ন কাসি জন্মে।

আমাশয়।—তৃণহীনতা, অন্ন ক্ষুধা। মধ্যাহ্ন ভোজনের স্পৃহা থাকে না। আমাশয়ে প্রবল বেদনা, বিবমিষা ও বমন। শিরঃশূল হইলে উদগার উঠে। সবুজ বস্তুর বমন, রোগী গৌঁ গৌঁ করে, উন্নতের ছায়া চাঁৎকার করে এবং উপশমের জন্ত দুই হস্তদ্বারা মস্তক চাপিয়া ধরে। আমাশয় স্থান দমিয়া যাওয়ার ছায় অথবা তথায় “কিছুই নাই নাই ভাবের” অনুভূতি।

উদর।—সাময়িক উদরশূল, সম্মুখে বক্র হইলে, শরীর ঘির্ভাঁজ করিলে ও মলত্যাগান্তে উপশম। উদরের ক্ষীতি নিবন্ধন পূর্ণতাবোধ। অঙ্গে, কটিতে এবং নিম্নাঙ্গ বাহিয়া প্রবল বেদনা। অঙ্গে ভয়ানক যন্ত্রণাকর বেদনা; ডাক ; বায়ু জন্মে। নিম্নোদরে পাশাপাশিভাবে তীক্ষ্ণ বেদনা। উদরপেশীর টাটানি।

জননেদ্রিশ্ব।—অণুকোষ বেদনাবুক্ত ও স্পর্শসাহক্ষু। দক্ষিণ

অণুকোষরজ্জুতে বেদনা এবং সঙ্কোচন । দক্ষিণ অণুকোষরজ্জু বাহিয়া আকৃষ্টবৎ বেদনা ।

যোনিপথে ঘৃষ্টবৎ বেদনা । ঋতুকালে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা বেদনা । রজ্জোবাহুল্য ; রজ্জোরোধ ।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ হইতে সমস্ত বক্ষোপরি বিস্তৃত বেদনা, বাম বাহু বাহিয়া ধাবিত, হৃৎকম্প, অচৈতন্য, মস্তিষ্কে রক্তাদিক্য, শ্বাসকৃচ্ছ ; কাল্চে মুখ, হস্তোপরি শীতল ঘর্ম ও শরীরের অসাড়তা ; বামবাহু অসাড় এবং তাহা শরীর পার্শ্বে আবদ্ধ থাকার অল্পভূতি । হৃৎপিণ্ডক্রিমার হঠাৎ রোধ, শ্বাসরোধের উপক্রম ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মস্তকচালনায় গ্রীবা পেশীতে খন্নি । মেরুমজ্জাবেষ্টের পশ্চাদংশের ঘনস্থ জন্মিলে বিদ্রাবাত্যতবৎ প্রচণ্ড বেদনা । শীতল বায়ুসংস্পর্শ বশতঃ গ্রীবার কাঠিগ্রে হস্তচালনায় বেদনা । মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশের স্পর্শসহিষ্ণুতা ; তাহাতে চাপ দিলে বমনবেগ ও বিবমিষা, সমুদয় পেশীর ক্ষতভাব । আক্ষেপকালে মস্তকপশ্চাতের তাপ পৃষ্ঠের নিম্নপর্যন্ত যায়, পরে গ্রীবা ও পৃষ্ঠের পেশীতে ক্ষতবৎ বেদনা হয় । অংশফলকাঙ্ক্ষির অভ্যন্তর প্রদেশে বেদনা । মস্তক ও গ্রীবার সঙ্কোচন । পৃষ্ঠে, উরু বাহিয়া নিম্নে এবং হিপসন্ধিভেদ করিয়া গুরুচাপসহ কঠিন বেদনা ; কটিদেশে প্রচণ্ড কনকনানি ।

উর্দ্ধাঙ্গ।—পেশীবাদনা, চালনায় বৃদ্ধি । বোধ যেন বাম বাহু শরীরের কাণ্ডভাগে সংবদ্ধ আছে । বাম বাহুর অবিপ্রান্ত অনিয়মিত চালনা ; হস্ত অব্যবহার্য্য । হস্তোপরি শীতল ঘর্ম । লিখিবার সময় অঙ্গুল্যাতির কম্প ।

নিম্নাঙ্গ।—সন্ধিনিচয় ক্ষীণ ও তাপযুক্ত । নিম্নাঙ্গ ভেদ করিয়া ভয়াবহ বেদনা, যেন ক্রমবর্দ্ধিগু ।

• **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**।—অঙ্গনিচয়ের কনকনানি, পেশীর অত্যধিক

টাটানি। পেশীর স্থূল অংশে রসবাতবৎ খল্লী ও স্থচিবেধবৎ বেদনা।
অঙ্গনিচয়ে অস্থস্তি নিবন্ধন অস্থিরতা।

সর্কগাজে চুলকনা, তাপ এবং কাঁটাবোধার ছায় বোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ।—সিমিসিফিউগার অনেক রোগ, বিশেষতঃ
স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগসহ পেশীঅনর্ভন, আক্ষেপ, সর্কাস্ট্রীন আক্ষেপ প্রভৃতি
এবং বহুভাষিতা ও দুঃখপ্রভৃতি গুল্মবান্ধু সদৃশ স্নায়বিক
ও মানসিক লক্ষণের বর্তমানতা প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া
গণ্য। ইহার রোগাদি অধিকাংশস্থলে জন্মান্ধু-রোগের সহানু-
ভূতি প্রযুক্ত জন্মে বলিয়া তাহাও প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—গুল্মবায়ু প্রকৃতির স্নায়বিক শিরঃ-
শূলের পক্ষে একটিয়া রেসি অত্যন্ত প্রধান ঔষধ। ইহার
অনেক বেদনা মস্তক পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়া তীরবেগে মেরুদণ্ডের
নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং কোন কোন বেদনা জরায়ুরোগসহ
সম্বন্ধযুক্ত থাকে। পূর্বকথিত বেদনায় মস্তক সম্মুখদিকে নত হইবার,
উপক্রম হয় এবং তাহাতে রোগী বেদনার উপশম পায়। অধিকাংশ
দময়ে পরিশ্রমক্রান্ত ব্যক্তি ও ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার শিরঃশূল দেখিতে
পাওয়া যায়। রোগী প্রথমে বোধ করে যেন তাহার মাথার চাঁদী
উড়িয়া যাইবে। চক্ষুর উর্দ্ধে তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা হইলে তীরবেগে
তাহা মস্তকের শীর্ষদেশে যায়। বোধ হয় যেন মস্তক চেউর ছায় চালিত
হইতেছে। মস্তক পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা উঠিয়া ললাটদেশেও
যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যেন মস্তক মধ্যে পেরেক ঠুকিয়া
বসান হইতেছে। শিরঃশূলে রোগীর ব্যতুল হইবে
বলিয়া আশঙ্কা জন্মে, ইহা একটা প্রধানতম প্রদর্শক।

সিপিহা—যে সকল স্ত্রীলোকের প্রচুর শ্বেতপ্রদর থাকে তাহা-
দিগের বহু দিনের পুরাতন **আশকপালি মাথাব্যথা** বাম
চক্ষু ও বাম ললাটপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎ দিকে বিস্তার করিলে ইহা
দ্বারা আরোগ্য হয় ।

**মানসিক বিকার—বিষাদোন্মত্ততা ; স্মৃতি-
কোন্মাদ ; মদাত্যস্ব**—মানসিক অবসাদগ্রস্ত রোগিদিগের
রোগে **সিমিসিফিউগা** বিশেষ উপদ্রোগী ঔষধ । রোগী চর্কল এবং
বিষলচিত্ত ; তাহার মানসক্ষেত্র অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভ্রংশভা-
ক্ৰান্ত, রোগী বড়ই সন্দেহযুক্ত ; রোগী বাহ্য দেখে, অপরিচিত ও
অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বোধ করে যেন মস্তিষ্ক বৃহত্তর
হইয়াছে । অহরহঃ উপরি উক্ত রূপ গভীর বিষাদগ্রস্ত ও ভ্রংশ-
ভারাক্রান্ত থাকার অনুভূতি ঘটে । অনেক সময় রোগী মনে করে কোন
ভূর্ঘটনা ঘটবে, সে ক্ষিপ্ত হইবে বা মরিবে । ফলতঃ ক্রমে ক্রমে মানসিক
অশান্তির অসহনীয় আতিশয়া বোধ করায় তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি
জন্মে । নানাধিক উপরি উক্ত দক্ষণযুক্ত **আত্মহত্যার প্রবৃত্তি-
বিশিষ্ট বিষাদোন্মত্ততা ও স্মৃতিকোন্মাদ**
এবং **ইন্দুরাদির ভ্রমদৃষ্টিবিশিষ্ট মদাত্যস্ব-
রোগের** ইহাদ্বারা উপশম হয় । **মদ্যপান** অথবা **জন্মানু-
রোগ নিবন্ধন প্রলাপ** ইহা উপশম করিয়া থাকে ।

কাক্সে কা—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই রোগী নানাবিধ দৃশ্য দেখে
এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলেই তাহা অন্তর্দান করে ; **সিমিসিফি** ঠায়
ইহাতেও মন আশঙ্কান্বিত থাকায় রোগী মনে করে সে উন্মাদ হইবে ও
লোকে তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবে ।

এলুমিনা—অবসাদগ্রস্ত এবং আশঙ্কান্বিত রোগী বাতুল হইবে
বলিয়া ভীত ।

আস্ফিডিন্—উন্মাদ হইবে বলিয়া ভীতি, রোগী চিকিৎসকের নিকটে যায় না, মনুষ্য দেখিলে ভীত হয়, প্রত্যেক ঘটনাতেই বিপদাশঙ্কা করে।

ক্যাঙ্ক্রে ফস্—অল্পবয়স্কদিগের হস্তমৈথুন নিবন্ধন এবং বৃদ্ধদিগের একবিষম্বাভ্যক উন্মাদরোগাগ্নোপ্যে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা মেরুদণ্ডজ্বার উত্তেজনা।—জরায়ু রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ মেরুদণ্ডজ্বার উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশনে **এক্টিভা রেসি** কার্যকারী ঔষধ। ইহাতে কটিদেশের মেরুদণ্ডাংশ আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা ও কটিদেশে বেদনা জন্মে। গ্রীবামেরুদণ্ডাংশের বিশেষ আক্রমণে গ্রীবাস্থ উর্দ্ধ ও অধঃ কশেককাদি স্পর্শসঙ্কীর্ণ থাকে এবং রোগী চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিতে পারে না; বেদনা স্থান-পরিবর্তনশীল। রুগ্ন মেরুদণ্ডে চাপ দিলে অনেক সময় বমনোদ্বেক হয়। উপরি উক্ত রোগসহ আর্ন্তবাতাব বর্তমান থাকিতে পারে।

সাল্ফার—ঋতুরোধ নিবন্ধন স্পাইন্যাল ইরিটেশনরোগ জন্মে, ঝাঁকি লাগিলে মেরুদণ্ড বেদনা করে। মেরুদণ্ডে ঘর্ষহীন তাপ।

বেলাডনা—মেরুদণ্ডে জ্বালাযুক্ত তাপ। অগাধারের স্ফি-বেধবৎ বেদনা ও নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা, এবং অবিশ্রান্ত পৃষ্ঠবেদনা।

জেল্ন্স—গ্রীবা এবং গ্রীবাপশ্চাতে স্ফিচিবেধবৎ বেদনা, ক্লাস্তির ভাব, এবং মানসিক অবসাদ। গভীর দেশের পেশীশূল এবং অসাড়তা জন্মে, বোধ হয় যেন পায়ে ঝিন্ঝিনি লাগিবে।

তাণ্ডব বা নৃত্যরোগ (Chorea)।—তাণ্ডবরোগে শরীরের বাম পার্শ্বে চালনা থাকিলে এবং পেশীবাত অথবা রসবাত সংশ্রবে রোগ জন্মিলে, কিম্বা জরায়ু বিকারের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ রোগ হইলে

সিনিমিসিফিউগা উপকারী। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ঋতুবিকার ঘটিত রোগে ইহা বিশিষ্ট ফলপ্রদ। **মানসিক অবসাদের বর্তমানতা**ও ইহার প্রদর্শক। মেরুদণ্ড স্পর্শাসহিষ্ণু এবং সম্পূর্ণ পেশীমণ্ডলী বেদনায়ুক্ত। তীতি বশতঃ রোগে এবং যে রোগে গলাধঃকরণ ক্রিয়ার অভাব ঘটে তাহাতেও ইহা উপকারী।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্জিয়া।—জরায়ু এবং অণ্ডাধার-রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ যে কোন শরীরংশের স্নায়ুশূলরোগে **এক্টিভা** উপকারী। **মূত্রিকার কথঞ্চিৎ পশ্চাতে তাপানুভূতি** ইহার প্রধান সহকারী লক্ষণরূপে গণ্য। জরায়ু ও অণ্ডাধারের রোগ বশতঃ বাম চক্ষুর অধঃদেশের স্নায়ুশূল অধিকাংশ সময়ে ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

বক্ষরোগ—কাসি, মক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস্।—**এক্টিভা** বংশানুক্রমিক মক্ষ্মাকাশের ঔষধ নহে। শৈত্যসংক্রম প্রভৃতি আগন্তুক কারণ ঘটিত রোগের প্রথমাবস্থার শুষ্ক ও বিরক্তিকর এবং রজনীতে বৃদ্ধিপাওয়ার প্রকৃতিযুক্ত কাসিতে ইহা প্রযোজ্য। ইহার সহিত সাধারণতঃ বক্ষশূল বর্তমান থাকে।

বক্ষশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া।—শূলবায়ু অথবা জরায়ুরোগগ্রস্ত রোগিনীর বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকতর আক্রান্ত হইলে **এক্টিভা** ফলপ্রদ। রোগিনী প্রায়শঃ আমাশয়-স্থলে মুচ্চার ভাব বোধ করে।

ওস্ট্রাইসাকাম্—টুবাকুলার থাইসিস্ রোগের (গুটিকা-জনিত মক্ষ্মা) পার্শ্ববেদনায় ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—কন্ডরজঃ, বাধকবেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া; জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌প্লেসমেন্ট অব ইউটারাস্; শ্বেতপ্রদর বা লিউকিরিয়া; অণ্ডাধার-প্রদাহ

ও অণুধারের স্নায়ুশূল।—একটিয়া রেসিমোসা মূলতঃ রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগদিগের পক্ষে উপযোগী। ইহার প্রায় অধিকাংশ রোগের মূলেই রসবাতসংশ্রব বর্তমান থাকে এবং ইহার সর্কপ্রকার রোগেই প্রগাঢ় মানসিক বিষন্নতা ও নৈরাশ্র্য অতি পরিস্ফুট লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব ইহার রোগার্চিকংসায় এই সকল বিষয় স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। ফলতঃ ইহার জ্ঞাননেত্রিয় রোগে মানসিক লক্ষণনিচয় অসাদারণরূপে পরিস্ফুট হয়। চর্কলতাসহ রোগী অসহিষ্ণুতাবাপন্ন থাকে এবং মনে করে সে পাগল হইবে। শিরঃশূল জন্মে। সিমিসিল্ল ঋতুস্রাব শীঘ্রাগত ও স্থানপরিবর্তনশীল পৃষ্ঠবেদনায়ুক্ত। ফলতঃ উপরি উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট রক্তঃকৃচ্ছ, বিশেষতঃ রসবাতিকরক্তঃকৃচ্ছরোগে উত্তেজনা প্রবণ ও স্পর্শসহিষ্ণু জরায়ুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা থাকিলে এবং তাহা দ্রুতবেগে নিয়োধরের পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে ধাবিত হইলে ইহা উপকার করিয়া থাকে। বস্তিদেশের এক পার্শ্ব হইতে অত্র পার্শ্ব পর্য্যন্ত কর্তনবৎ বেদনা থাকিলে ইহা জলান্দুর স্থানচ্যুতি দোষ সংশোধন করিতে সক্ষম। উপরি উক্ত মানসিক লক্ষণ এবং স্নায়ুশূল, উত্তেজনা প্রবণতা ও স্পর্শসহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্নায়বিক লক্ষণ এবং সিমিসিল্ল ধাতুগত বিশিষ্টতা বর্তমান থাকিলে ইহা শ্বেতপ্রদর রোগও আরোগ্য করিতে পারে। জরায়ুতে শোণিতাধিক্য জন্মে এবং তাহা ও অত্যাশ্র বস্তিবন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু বেদনায়ুক্ত ও গুরুভারাক্রান্ত বোধ হয়।

স্থানান্তরিত রসবাত নিবন্ধন অণুধারপ্রদাহ এবং অণুধারস্নায়ুশূল রোগে তীক্ষ্ণ বেদনা তীরবেগে বস্তিপার্শ্ব ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিলে এবং তাহাতে ঠেলমার্মা ভাব থাকিলে সিমিসিল্লিউগা উপযোগী।

কলফাইলোম—অনেকাংশেই ইহা সিমিসিফিউগার তুলা, কিন্তু ইহাতে সিমিসিফি শিরঃশুলের অভাব ও রসবাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকা, ইহার প্রভেদক । সিমিসিফি রসবাত, পেশীর স্থূলাংশ আক্রমণ করে । **আভ্যন্তরীণ কম্পভাবে** **বর্তমানতা** কলফার একটি বিশেষ লক্ষণ ।

গর্ভপাত বা এবর্ষণ—রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের অভ্যাসগত গর্ভপাত নিবারণে সিমিসিফিউগা অতি ক্ষমতাশালী ঔষধ । তীরবেগে বেদনা উদরের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যায় এবং রোগী দ্বিভাঁজ হইতে থাকে ।

একনাইট্ ও ক্যামমিলা—ক্রোপ বশতঃ আশঙ্কিত গর্ভপাত নিবারণে সমর্থ । ইহারা পরস্পরের মানসিক লক্ষণ দ্বারা প্রভেদিত । বেদনাকালে অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা জন্মে ।

কলফাইলোম—প্রসব বেদনার দ্রাব্টি উৎপাদক জরায়ু বেদনা এবং আশঙ্কিত গর্ভপাত নিবারণে ইহা উপকারী । পৃষ্ঠ এবং উদরের উভয় পার্শ্বে কঠিন বেদনা, জরায়ুর মৃদু সংকোচন ও অত্যন্ত শ্রাব । একরূপ স্থলে ডাং ম্যাডেন ইহাকে ফলপ্রদ ঔষধ বলেন ।

প্রসববেদনা বা লেবর ; প্রসবান্তিক বেদনা বা আফ্টার পেনস্—আশঙ্কিত গর্ভপাত অথবা প্রসবসংক্রমণ বেদনা যখন তীরবেগে উদরের এক পার্শ্ব হইতে আড়াআড়ি ভাবে অগ্র পার্শ্বে যায়, রোগী যাহাতে দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং বেদনা এতাদৃশ প্রবল হয় যে রোগী তাহাতে মুচ্ছা যায়, তদবস্থায় অপর কোন ঔষধে ফল না হইলে সিমিসিফি দ্বারা উপকার পাওয়া যায় । জরায়ুস্থ সম্যক বিস্তৃত হয় না । গর্ভের প্রাথমিক অবস্থায় উদরপ্রাচীরে বেদনা হইলে ইহা তাহা নিবারণ করে । জরায়ুর রসবাতিক ও অলৌক প্রসব বেদনায় ইহা উপকারী । ইহা এবং **কলফা** পূর্বে হইতে **সেবন**

করাইলে প্রসবের সাহায্য হয়। প্রসবান্তিক বেদনা ইহা দ্বারা উপশম হইয়া থাকে।

লাইকো এবং ইপিকা—প্রথমের বেদনা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম এবং দ্বিতীয়ের বেদনা বাম হইতে দক্ষিণে যায় ও তাহাতে বিবমিষা থাকে।

হেমামেলিস্—উপরি উক্ত অবস্থায় ইহার স্থানিক প্রয়োগ উপকারী। উদর পেশীতে টাটানি থাকে।

একনাইট্—বেদনা অতি প্রবল, শীঘ্র শীঘ্র ও অসহনীয় এবং তাহার সহিত অস্থিরতা, উৎকর্ষা ও মৃত্যুভীতি বর্তমান থাকে। প্রসব-পথ শুষ্ক, স্পর্শসংকীর্ণ এবং প্রসারিত হওয়ার অনুপযুক্ত।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম; পেশীবাত বা মাস্কেলজিয়া।—একটিয়া রেসিমোসা রেণাক্সুলাস শ্রেণির ঔষধ নিচয়ের জাতিগত ধর্ম্যানুসারে রসবাত রোগের অল্পতম প্রধান ঔষধ মধো গণ্য। ইহাতে আক্রান্ত পেশীর মাংসল বা স্থূল অংশে কনকনানি বেদনা হয়, ইহা পেশীর সীমাংশ আক্রমণ করে না। **নাক্স ভানিকার** ঠায় ইহা অঙ্গনিচয়ের ক্ষুদ্র পেশী অপেক্ষা শরীরের কাণ্ডভাগের বৃহৎ পেশীই অধিকতর আক্রমণ করিয়া থাকে। **পালসেল** ঠায় ইহা তান্তব উপাদান আক্রমণ না করায় তাহা হইতে প্রভেদিত হয়; ইহা পেশীবাতের বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। যে পেশী-বাত হঠাৎ হয় ও অতি প্রবল বেদনায়ুক্ত থাকে **সিমিসি** তাহার ঔষধ। ইহাতে অত্যন্ত অস্থিরতা জন্মিলেও অঙ্গচালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়।

একনাইট, পালসেটিলা, রেণাক্সুলাস বাস্কো-সাস্ এবং একটিয়া স্পাইকেটা—রসবাত রোগে ইহারাও **সিমিসিসহ** তুলনীয়,—**একন** তরুণ রসবাতজ প্রাথমিক জরের ঔষধ। রসবাত রোগে **পালসেল** উপকারিতার

বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। **রেনাঙ্কু বাস্ত্রো** বিশেষরূপে শরীরের কাণ্ডভাগ ও বক্ষের পেশীর রসবাত রোগে উপকারী, ইহার রোগ স্থানপরিবর্তনশীল। আক্রান্ত পেশীতে অত্যন্ত টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনার সৈঁতা বায়ুতে বৃদ্ধি। **এক্টিফা স্পাই** হস্ত এবং পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে; সন্ধিনিচয় কন্ কন্ করে ও ভ্রমণ-কালে স্ফীত হয়।

কলফাইলাম—অনেক বিষয়ে **সিমিসির** তুল্য। প্রভেদ এই যে ইহা করের এবং হস্তাঙ্গুলির সন্ধি আক্রমণ করে।

২। এক্টিয়া স্পাইকেটা (Actœa Spicata)।

ভুসনীস্ব ত্রিশ্র।—একন, কলফা, সিমিসি, লিডাম্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার ক্রিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাতবৎ রোগোৎপন্ন হওয়ায় ইহা তাহার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আহার করিলে, মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ করিলে অথবা অধিক কথা বলিলে রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অলস হইয়া পড়ে। ইহাতে আকৃষ্টতামহ ছিন্নবৎ বেদনা হয়।

লক্ষণ।—রোগী ভয়াবহ প্রলাপ দক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। মুখমণ্ডলে রসবাতবৎ বেদনা। অল্প বমন। সামান্য ক্লাপ্তিতেই সন্ধির স্ফীতি। হস্তে পক্ষাধাতিক দুর্বলতাবৎ বেদনা। ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। মণিবন্ধ বা অঙ্গুলিসন্ধিতে ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ ও স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। নিম্নাঙ্গে স্ফীতি, বেদনা ও দুর্বলতা। উরু উত্তোলন করিলে তাহার কম্প। জানুসন্ধিতে অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ।

চিকিৎসা।

এক্টিফা স্পাইকেটা হস্ত-পদ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত অথবা **গাউট** বা **ক্ষুদ্র বাতরোগ**

জন্মিতে দেখা যায়। আমাশয়ে অল্প জন্মে। রোগী প্রায় স্বেদনহীন হইতেই ভ্রমণ করিতে যায়, কিন্তু ভ্রমণ-আরম্ভেই সন্ধি-বেদনা হয়।

৩। ক্লিমেটিস ইরেক্টা (Clematis Erecta)।

সম্বন্ধ।—ইহা ব্রাহ্মনিশ্চাল দন্তশুলের ও ক্যান্সরের কার্যের প্রতিবেধক।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, একন, বার্কেরিস, ব্রায়, ক্যালকো, সিমিসি, কনায়াম, গ্র্যাফা, মার্ক, পেট্রেল, পালস, রেণাক্স, রড, রাস, সিলিক ও সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার সমজাতীয় অত্যন্ত ঔষধের স্থায় ইহাও নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ক্লিমেটিস্ লাসিকা বা লিম্ফাটিক গ্রন্থি মণ্ডলীতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রদাহ, ও ক্ষীতি প্রভৃতি উৎপন্ন করে। জননেন্দ্রিয় ও মূত্রবহুর ক্রিয়াই ইহার বিশেষ পরিচয়ের বিষয়, তাহাতে ইহা অতি যত্নপ্রদ লক্ষণ উৎপন্ন করে। স্বকো ও ইহার রোগজনক ক্ষমতা আছে।

লক্ষণ।

মন।—একা থাকিতে ভীতি, কিন্তু ভাল লোকের সহবাসে ভালবাসে না। মানসিক অবসাদ, অমঙ্গল নিকটস্থ বলিয়া ভীতি। উত্তেজনা-প্রবণ, মৌন, গৃহের বাহিরে যাইতে অনিচ্ছা।

চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ, চনচনিযুক্ত জ্বালা এবং অবদারণভাব। চক্ষু লোহিত, চাকচিকায়ুক্ত, তপ্ত এবং শুষ্ক। চক্ষুর শুভ্রাংশের প্রদাহ ও অশ্রুস্রাব। চক্ষু হইতে অগ্নিশ্রোত নির্গত হওয়ার স্থায় কামড় ও জ্বালা-যুক্ত বেদনা। চক্ষুর তাপ ও শুষ্কতা নিবন্ধন রোগী চক্ষুপত্র মুদ্রিত করিতে বাধ্য। কনীণিকা সঙ্কুচিত। চক্ষুর সম্মুখে ঝিল্লি থাকার অসু-

ভূতি । বাম চক্ষুগোলকের মধ্যভাগে বেদনা । চক্ষুচালনার চক্ষুকোটরে চাপ ।

মূত্রশস্ত্র ।—মূত্রত্যাগে বাধা ও জ্বালা এবং তাহার আরম্ভে অথবা শ্রোতের বাধা জন্মিলেই বিশেষ জ্বালা হয় । মূত্রনালীতে অধিককাল স্থায়ী সঙ্কোচন ও সঙ্কুচিত অবস্থা । এক উত্তমে সম্পূর্ণ মূত্রত্যাগ হয় না ।

পুং জননেন্দ্রিয় । অণ্ডকোষবেষ্টের দক্ষিণার্দ্ধের স্ফীতি । অণ্ডকোষ শিথিলবন্ধন হয় ও ঝুলিয়া পড়ে । অণ্ডকোষ বেদনায়ুক্ত, প্রদাহিত এবং স্ফীত । অণ্ডকোষের বেদনায় অণ্ডকোষরজ্জুর আকৃষ্টতা । দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জু স্পর্শাসহিষ্ণু এবং অণ্ডকোষ উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট ।

স্রব ।—গ্রাণিনিচয়ের বেদনায়ুক্ত স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব । শীতল জলে দৌত করিলে, শব্যার তাপে এবং আর্দ্র পোলটস প্রয়োগে আর্দ্র ও চুলকনায়ুক্ত কাউর বা এক্জিমার বৃদ্ধি ।

চিকিৎসা ।

গৃহবিরহাতুরতা বা হোম সিক্‌নেস্ ।—গৃহে প্রত্যাবর্তন জন্ত রোগীর বাতুলের ছায় অস্বাভাবিক ব্যস্ততা জন্মিলে অস্থিরতা, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা এবং শরীরাত্যন্তরে কম্পভার প্রভৃতি যে সকল অস্বস্থতা উপস্থিত হয় তন্নিবারণে **ক্লিমেটিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

আইলাইটিস্ বা **উপতারা** প্রদাহ । এই রোগে **মার্ককরের** পর **ক্লিমেটিস্** উপকারী । উপদংশজ রোগে ডাং হিউজ ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । শৈত্যসংস্পর্শজনিত উপ-তারা প্রদাহে চক্ষুতে চাপ লাগার ছায় বেদনা, অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক, চক্ষুর তাপ এবং জলস্রাব ও শৈত্য সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয় । ফলতঃ **শৈত্যসংস্পর্শের** অসহিষ্ণু-

তাই ইহার অন্যতম প্রধান প্রদর্শক। উত্তেজনা-
হীন, জড়ভাবাপন্ন চক্ষু-প্রদাহ আলোকাতঙ্কহীন থাকিলে এবং প্রদাহিত
স্থানের লোহিত বর্ণাদি অতি অকিঞ্চৎকর হইলে ইহা ফলপ্রদ।
ইহাতে প্রতিশ্যায়িক এবং গগুনালীয় চক্ষু-প্রদাহ, অবস্থা বিশেষে,
আরোগ্য হইয়া থাকে। দানার বা গ্র্যানুলের উৎপত্তিপ্রবণতাবিশিষ্ট
চক্ষুপত্রপ্রদাহে ক্ষীত চক্ষুপত্র প্রাতঃকালে জুড়িয়া থাকে।

অর্কাইটিস্ বা একশিরা।—পূয়ধাতুর আবরোধ অথবা
শৈত্য সংস্পর্শ জনিত একশিরা রোগে অণুকোষ প্রস্ফুটন ও ক্ষীত
এবং অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত হইলে ক্লিমেটিস্ উপকার করে। ইহা
বিশেষরূপে দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই অধিকতর ফলপ্রদ। অণুকোষের
উল্লেখ আকৃষ্টতা এবং অণুকোষের জুতে স্পর্শসংস্কৃতা ও চাপবৎ বেদনা।
মূত্রনাণীর অত্যন্ত উত্তেজনা হয় এবং বেদনা রজনীতে শয্যাভাঙ্গে বৃদ্ধি
পায়। অণুকোষের স্পর্শসংস্কৃতা ও ক্ষীতি হ্রাস করিতে ইহার
বিশেষ কাব্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একশিরার উপসর্গ স্বরূপে
অথবা তাহা বসিয়া যাইয়া কর্ণমূলে গ্রন্থি প্রদাহ বা “মাঙ্গস্” জন্মিলে
ক্লিমেটিস্ ও অরাম উপকারী।

কাউল, পাম্মা বা একজিমা।—রসবাত প্রভৃতি ও
সোরাদোষযুক্ত রোগের মস্তক পশ্চাতে রসাবধিকা জন্মিলে, চুলকায় এবং
তাহাতে হৃৎবেধবৎ বেদনা ও কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকে। শরীরের
অগ্রাগ্র স্থানের রোগও ঐরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট। উদ্ভেদ, বিশেষতঃ অক্লিপাট
প্রদেশের উদ্ভেদ কখন কখন পূয়গুটিকায় পরিণত হয়। জলধৌত করিলে
রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় কথঞ্চিত প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪। এডনিস ভার্ণেলিস্ (Adonis Vernalis) ।

তুলনীষ্য ত্রিষধ।—ডিজিট; ক্র্যাটিগাস, কনত্যালো।

লক্ষণ।—হৃৎপিণ্ডের দ্বি-পত্র কপাট (Mitral Valve) ও হৃৎকমনীর কপাটের অসম্পূর্ণতা বশতঃ শোণিতের পশ্চাৎগতি । হৃৎপ্রদেশে বেদনা, হৃৎকম্প এবং শ্বাসক্লম্ব । স্পষ্টতর শিরাশোণিতাধিক্য । হৃৎরোগজ শ্বাসক্লম্ব । অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন ।

চিকিৎসা।—অতীব ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড এবং ধীর ও দুর্বল নাড়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনীশক্তির অতি নিস্তেজাবস্থায়, বিশেষতঃ তাহাদিগের রক্তকের বিকার বশতঃ অত্যন্ত মূত্রত্যাগ হইলে **হৃৎকপাট রোগে** ও হৃৎরোগ জনিত **জলশোথে এডনিস** বিশেষ উপকারী ঔষধ । হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বশতঃ তাহা শোণিত গতির বাধা অতিক্রম করিয়া শোণিত সঞ্চালনের সম্পূর্ণতা রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে যদি **ডিজিট্যালিসেস** ক্রিয়া না হয়, কিম্বা তাহা প্রয়োগের বাধা থাকে, তাহাতে আমরা ইচ্ছা দ্বারা ফলাশা করিতে পারি । ডাং ব্ল্যাকউড ইহার প্রয়োগে হৃৎকমনীর সঙ্কোচন ও দ্বি-পত্র হৃৎকপাটের দোষে শোণিতের পশ্চাৎ গমন জঘ্ন শোণিত সঞ্চালনের অসম্পূর্ণতা শোধনের সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । ইহাতে নিম্নাঙ্গে জলশোথ, অত্যন্ত শ্বাসক্লম্ব, অত্যন্ত মূত্রস্রাব এবং অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল । আত্মস্বতীর্ণ হৃৎবেষ্টপ্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিসরোগে হৃৎপিণ্ডের প্রসার বা ডাইলেটেবণ আরম্ভ হওয়ার লক্ষণস্বরূপ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াদৌৰ্বল্য বশতঃ কিডনিতে রক্তাধিক্য, মূত্রাশ্রতা ও জলশোথ উৎপন্ন হইলেও তিনি ইহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন । উপাদানগত-রোগহীন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৈকারিক দুর্বলতা, অনিয়মিত গতি এবং শ্বাসক্লম্ব উপশমিত করিয়া হৃৎপিণ্ডের শক্তি পুনঃস্থাপন দ্বারা তাহার সঙ্কোচনের ও নাড়ীস্পন্দনের সুবিধান করিতে **এডনিস** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । **কিডনির ক্রিয়াবিকার জনিত মূত্রাশ্রতা** ইহার প্রদর্শক ।

৫ । রেণাক্কুলাস্ বাবোসাস্ (Ranunculus Balbosus) ।

উপচয়।—বায়ুর তাপপরিবর্তনে ; প্রাতঃকালে ; সন্ধ্যাকালে ; স্পর্শে ; শরীরচালনায় ; অবস্থানের পরিবর্তনে ; উগ্র সুরাপানে ।

সম্বন্ধ।—ইহার কার্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর, পাল্‌স ও রাসটক্‌স্ ।

প্রতিযোগী ঔষধ—এল্‌কহল, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ, ভিনিগার, ওয়াইন মন্ত্ৰ ।

সামান্য প্রিন্সিপাল।—অনুভূতিদ স্নায়ু, পেশীউপাদান এবং ত্বকে রেণাক্কুলাস্ বাবোসাসের ক্রিয়ার ফলে বক্ষপ্রাচীরেই বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। বক্ষে ইহা যে বেদনা উৎপন্ন করে তাহাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ মধ্যে গণ্য এবং তাহার প্রকৃতি বক্ষশূল বা প্লুরোডাইনিয়া-রোগের প্রায় তুল্য ।

লক্ষণ ।

মন।—চিন্তা করিতে চিন্তার বিষয় ভুলিয়া যায়। বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব। রৌগী উত্তেজনাপ্রবণ এবং কলহপ্রিয় ।

মস্তক।—মস্তকের রক্তাধিক্য। মস্তকে এবং চক্ষুতে বেদনা। সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধের শিরঃশুলের, শয়নে বৃদ্ধি এবং দণ্ডায়মান বা ভ্রমণে হ্রাস। ললাট ও মূর্দ্ধাদেশের স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ যেন তাহা বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। সন্ধ্যাকালে অথবা উষ্ণ গৃহ প্রবেশে তাহার বৃদ্ধি। ললাটের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ বেদনা। উষ্ণস্থান হইতে শীতল স্থানে যাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহারে শিরঃশূল জন্মে অথবা বৃদ্ধিত হয়।

স্নানু।—পেশীর আনর্জন। মৃগীবৎ আক্ষেপ। হঠাৎ দুর্বলতা নিবন্ধন মুচ্ছার ভাব। হঠাৎ ভীতি অথবা ক্রোধ জন্মিলে অঙ্গনিচয়ের কম্প

ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, সন্ধ্যাকালে, বায়ুর পরিবর্তনে এবং বিশেষতঃ উষ্ণবায়ু শীতল হইলে বৃদ্ধিত হয়।

শ্বাসশল্ল ও বক্ষ।—বক্ষে জ্বালা ও হৃদয় স্থচিবেধবৎ বেদনা বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস খর্ব্বতর ও কষ্টজনক। রোগী অনেক ক্রন্দন করে ও দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতে চাহে। নিম্ন বক্ষের পাশাপাশি ভাবে চাপ ও কমাভাব হইলে বক্ষের স্থচিবেধবৎ বেদনার চালনায়, নত হইলে, শ্বাসগ্রহণে এবং স্পর্শে বৃদ্ধি। বক্ষে রস্বাতবৎ বেদনা হওয়ায় বোধ যেন ত্বগধঃদেশে ক্ষত হইয়াছে। জ্বালাযুক্ত বেদনা। বক্ষের টাটানি ও ঘৃষ্টবৎবেদনা, স্পর্শে ও চালনায় বৃদ্ধি।

ত্রক।—ত্রক দগ্ধ হওয়ার ছায় বোধ, তাহাতে রসবিশ্বিকাৎ উদ্ভেদ জন্মে। দলে দলে কৃষ্ণ-নীল, স্বচ্ছ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকা জ্বালা করে ও চুলকায় এবং শৃঙ্গবৎ কঠিন মামড়িতে পরিণত হয়। সম্পূর্ণ শরীরে দ্রুৎবৎ উদ্ভেদ।

চিকিৎসা।

মদাত্যস বা ডিলিভিয়াম্ ট্রিমেনস।—অবস্থানু-সারে **লেণাকুলাস** প্রায় সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্যেরই কুফল দূর করণে সক্ষম।

শিল্লশূল।—যুক্তদেশে **লেণাকুলাস**-চিকিৎসিতব্য স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ হয় যেন চাঁদি বেগে বিদৌৰ্ণ হইতেছে। সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণ বায়ুর মধ্য হইতে শীতল বায়ুতে বাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহার করিলেও তাহা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর তাপ পরিবর্তন নিবন্ধন শিরঃশূলেও ইহা উপকারী। ললাটদেশের বিসর্পিকায় চক্ষুর উর্দ্ধে প্রচণ্ড বেদনা।

স্নানুশুল বা নিউরেল্জিয়া।—**লেণাকুলাস**

পশ্চাদ্ভাগমধ্য ঝায়ুশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। এই ঝায়ু-
শূলের বেদনা কথিত ঝায়ুর পথ বাহিয়া যায় এবং ঝায়ুর পরিবর্তন
হইলেই বক্ষে সূচিবোধবৎ বেদনা জন্মে ; বক্ষের স্থানে স্থানে ক্ষতবৎ
বেদনা থাকে ।

গল্‌থেরিস্‌সার বেদনা বক্ষগহ্বরের সন্মুখে ও মধ্যস্থলে থাকে ;
আণিকাতে বক্ষে ক্ষত ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয় ; রাস্
রেডিক্যানসের বেদনা তীরবেগে অংশফলকাস্থিতে যায় ;
সেনেগাস্ বক্ষে বেদনা ও টাটানি হয় ।

হেফিবার বা ওষধিগন্ধজ জ্বর।—এরোগে
রেণাঙ্গুলাসের বহুল প্রয়োগ না থাকিলেও স্থলবিশেষে ইহা
দ্বারা ফল পাওয়া যায়। চক্ষুতে চনচনিযুক্ত জ্বালা, চক্ষুপত্রের জ্বালা ও
টাটানি, সন্ধ্যাকালে নাসিকার রোধ এবং তাহার মূলে চাপ ও গহ্বরে
চনচনি এবং কীট বিচরণবৎ অল্পভূতি থাকিলে ইহা ফলদ। পেশীর
ঘৃষ্টবৎবেদনা ও স্রবভঙ্গ ইহার অত্যাগ লক্ষণ ।

সিলিসিয়া।—নাসারক্কে এবং পশ্চাৎ নাসাপথের সন্নিহিত
ইউষ্টেকিয়াননালীমুখে চুলকনা ও চনচনিতে ভয়ানক হাঁচি এবং
বিদাহী জল শ্রাব ।

এরাম ট্রাই—জ্বর ও নাসামূলে ভয়াবহ বেদনা এবং নাসা ও
গলমধ্যে কাঁচা ভাব ও হাঁচি ।

মার্ক-প্রাটো-আই—হে-ফিবারের পূর্বগামী লক্ষণ
প্রশমনে ।

সোরিগাম—ডাং ক্রার্কের নতে শৈত্যে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা
থাকায় ইহার ৩০ ক্রম বহুতর রোগ আরোগ্য করিয়াছে ।

বক্ষশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া।—
বক্ষে রেণাঙ্গুলাসের বিশেষ ক্রিয়া থাকায় ইহা বক্ষশূল, বা

পুরোডাইনিয়ারোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। আবহাওয়ার পরিবর্তনে ইহার রোগ বৃদ্ধি পায়। ডাং হিউজের মতে বেদনার অত্যধিক তীব্রতা বশতঃ রোগী শরীর চালনায় সাহসী না হইলে ইহা আশ্চর্য ফল প্রদান করে ; অনেকানেক চিকিৎসক ইহার সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ পাইয়াছেন। বাম অংশফলকাস্থির সম্পূর্ণ অভ্যন্তর পার্শ্বে বিস্তৃত বেদনা, যাহা কখন কখন তাহার নিম্ন কোণ আক্রমণ করিয়া বাম বক্ষ মধ্যে যায় তাহা, এবং বামবক্ষের স্তননিম্নপ্রদেশের বেদনা ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে। শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন বেদনা একনাইটেই ক্রিয়াশূল।

নিউমনিয়া।—রোগ আরোগ্যান্তে বক্ষের নানাস্থানে টাটানি ও ভ্রুগধদেশে ক্ষতবৎ বেদনা থাকিলে **রেনাঙ্কু-বাস্চো** দ্বারা উপকার হয়। **পাল্‌সেটিলা**ও ইহার ঔষধ।

প্লুরিসি বা **বক্ষের অন্তবেষ্টবিাল্লি** প্রদাহ।—রসকিল্লীতে **রেনাঙ্কুলাসের** ক্রিয়া থাকায় প্লুরিসি ও **পেরিটো-নাইটিস্** রোগে, বিশেষতঃ প্লুরিসিরোগে আক্রান্ত বক্ষের অন্তর্বেষ্ট-বিাল্লি গহ্বরে বা প্লুরেল ক্যাভিটিতে রসদক্ষয় হইলে ইহা তাহা শোষণের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা অধিকতররূপে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতবৎ ও তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা হয়। বক্ষে সঞ্চিত রসের চাপ এবং বেদনার তীব্রতা নিবন্ধন রোগীর উৎকর্ষা, শ্বাসকৃচ্ছ এবং যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এস্থলে ইহা **এপিস্**, **ব্রায়** এবং **সাল্‌ফারস্** হইতে তুলনীয়। বেদনায় পূর্বে কথিত বিশেষতা বর্তমান থাকিলে ইহা সর্কাপেক্সা অধিকতর ফল প্রদান করে। প্লুরিসিরোগান্তে **রসবিাল্লি যুস্‌ফুস্‌স্‌স্‌হ সংলগ্না-বস্চাস্** থাকিলে যে বেদনা থাকিয়া যায় তাহাতেও **রেনাঙ্কু** উপকারী।

ডায়াক্র্যা আইটিস্ (বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ)।—
 তীক্ষ্ণ, তীব্রবেধবৎ বেদনা উভয় কুক্ষি এবং আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশ
 হইতে ছুটিয়া পৃষ্ঠাভিমুখে ধাবিত হইলে **রোগাঙ্কুলাস** তাহা
 আরোগ্য করে। ডায়াক্র্যায়ে তীব্র বেদনা এবং কটি বেড়িয়া ফিতা
 বাধা থাকার অনুরূতি বর্তমান থাকিলে **ক্যাক্টাস** গ্র্যাণ্ডি
 উপকারী।

ত্রক্লোগ-হাপিস জষ্টার বা বর্তুলাকার
বিসপিকা এবং **পেন্ফিগাস্** বা **পোড়া নারাজা**
প্রভৃতি।—**রোগাঙ্কুলাস** হাপিস জষ্টার বা জোনার পক্ষে বিশেষ
 উপকারী ঔষধ। রসবিধিকানিচয় জ্বালা করে, এবং কখন কখন
 বর্ণ নীল-কৃষ্ণ হইয়া যায়। চক্ষুর উর্দ্ধের ও পশ্চকামধ্য স্নায়ুপথবাহী তীব্র
 স্ফুটবেধবৎ বেদনায় ইহা বিশেষ ফল প্রদান করে। ইহা **রাস**,
আর্সেনিক ও **মেজিরিসাম্** সহ তুলনীয়।

রোগাঙ্কুলাস বাষোসাস্ পেন্ফিগাস্ বা পোড়া নারাজা,
 বিশেষতঃ শিশুদিগের পোড়ানারাজা আরোগ্য করিয়া থাকে। বড়
 বড় ফোকা বিদীর্ণ হইলে ছাল উঠিয়া যাওয়ার কাঁচা ত্বকস্থান অবশিষ্ট
 থাকে। ইহার **কাউল** বা **একজিমা** রোগে আক্রান্ত ত্বকস্থান
 ঘনীভূত ও স্থূল হয় এবং তাহাতে কঠিন, শৃঙ্গবৎ মামড়ি জন্মে।
এন্টিম্ ব্রুড পদতলে কঠিন, শৃঙ্গবৎ ত্বকপ্রবর্দ্ধন উৎপন্ন করে।
 ইহার ক্ষত সমতল এবং তাহাতে ছলবেধবৎ বেদনা ও কল্তানির শ্রায়
 নিঃসরণ থাকে।

৬। স্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria)।

উপচয়।—রজনীতে এবং প্রাতঃকাল ; রসাপচয়ে ; কামবিষয়ক
 অমিতাচারে ; হস্তমৈথুনে ; স্পর্শে ও শরীর চালনায়।

সঙ্গ্রহে।—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—মার্ক ও থুজা ।
ইহার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর ।

তুলনীকৃত ঔষধ।—একন, এন্ট্রা, ক্যাক্সে কা, কষ্টি, সিমিসি, সিক, ক্লিমে, ককু, কফিয়া, কনাসি, ক্রিয়াজোট, লাইক, মার্ক, ফস এসি, থুজা, সাল্ফ । কলোসির পূর্বে বা পরে ষ্ট্যাফি স্ফলপ্রদ ।

সাধারণ প্রিন্সিপাল।—জননেক্রিয় ও মূত্রবয়ে, বিশেষতঃ তাহা-
দিগের প্রাচৈতিক অংশের মৈথ্রিকবিক্লিতে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার কার্য্য । ইহা
উপরি উক্ত যন্ত্রাংশে উত্তেজনা ও পুরাতন প্রদাহিক লক্ষণ উৎপন্ন করিলে
কখন কখন তাহা রেতঃপ্রণালী বা সেমিগ্রাল ডাক্ট এবং মূত্রপথ পর্য্যন্ত
বিস্তৃত হয় । ইহাতে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা শুক্রমেষ রোগের
প্রতিকৃতি স্বরূপ এবং কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা এই রোগের পক্ষে বিশেষ উপ-
কারী ঔষধ । ইহার ঔষধ গুণপরীক্ষায় মস্তিষ্কে বা সেরিব্রাগে, পরিপাক-
যন্ত্রপথে এবং ত্বকে যে লক্ষণাদি উপস্থিত হয় তাহা উপদংশ, গণ্ডমালা ও
পৃথমেহ বা সাইকোসিস্ বিঘবাম্পোৎপন্ন লক্ষণের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনীয়
বলিয়া অনুমান করা যায় । ইহাতে অস্থির, বিশেষতঃ হস্তাস্থির অস্থির
পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে ; অস্থি এবং অস্থিবেষ্ট-বিক্লি ক্ষীণিত হয় ও পাকে ।

লক্ষণ ।

মন।—প্রাতঃকালে রোগী বড় খিটখিট করে, জিনিস পত্র
ছুড়িয়া অথবা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলে । মানসিক পরিশ্রমে প্রবৃত্তিহীন,
ঔদাস্য ও বিষন্নতা । সামান্য উত্তেজনাতেই অসহিষ্ণু ; সামান্য
কথো অযৌক্তিক বোধ হইলেই রোগী কষ্ট বোধ করে । স্মরণ-
শক্তির দুর্বলতা জন্মে, বিশেষতঃ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন
জন্ত ঔরূপ হইয়া থাকে ।

নিদ্রা।—রোগী সকল দিনই নিদ্রালু থাকে এবং পুনঃ পুনঃ

হাই তোলে ; রজনীতে নিদ্রা হয় না, সম্পূর্ণ শরীর কনকন করে ।

স্নানু।—স্বাভাবিক দুর্বলতা । ক্রোধ বশতঃ অত্যন্ত শরীরপার্শ্বের পক্ষাঘাত । রজনীতে পেশী আনর্জন । সর্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে বাহুজ্ঞান শূন্য থাকে, বৃদ্ধাঙ্গুলি আকৃষ্ট হয় এবং মুখে ফেন উঠে ।

মুখমণ্ডল।—মুখাকৃতি বসী, নাসিকা হৃক্ষাগ্র এবং চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও নীলবর্ণপার্শ্বযুক্ত । মুখের অস্থি নিচয়ে প্রদাহ ও গর্ত করার ছায় বেদনা । ক্রোধ জন্মিলে মুখের বর্ণ কটা ও নীলাভ । মুখের গুরু উদ্ভেদ চুলকায় এবং বেদনা করে, ত্বক্ কর্কশ ।

চক্ষু।—চক্ষু বসিয়া যায় এবং তাহার চতুর্দিকে নীলবর্ণ ও উন্নত রেখা থাকে । চক্ষুগোলক এবং চক্ষুপত্র গুরু ও চাপাভূতীযুক্ত । উর্দ্ধ চক্ষুপটে বেদনা, চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার বৃদ্ধি । বেদনায় বোধ যেন বান চক্ষুর উর্দ্ধপুটের অভ্যন্তরে কোন কঠিন বস্তু আছে । চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে (Inner canthus) কামড়ানি ও জালাযুক্ত চনচনি । চক্ষুপত্র-কিনারার চুলকানি । চক্ষুপত্রপার্শ্বের প্রদাহজন্ম রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে ; চক্ষুপুটের প্রদাহ । কনীণিকার বিস্তৃতি ।

হৃৎপিণ্ড।—সামান্য শরীরচালনায়, মানসিক শ্রমে এবং গীতবাজে ও আহাৰান্তে নিদ্রা যাইলে হৃৎকম্প । হৃৎপিণ্ডের কম্পযুক্ত স্পন্দন ।

নাড়ীস্পন্দন দ্রুত ও ক্ষুদ্র ; অনেক সময়ে তাহা কম্পারিত ।

মুখাগ্ৰহর।—হ্রস্বঅধঃপ্রস্থিতে বেদনা ; ক্ষীতি থাকে নী দস্ত কাল হইয়া যায়, ধ্বংস হয় ও গুঁড়া হইতে থাকে । তাহাতে পাশাপাশি ভাবে কাল রেখা পড়ে । কোন শীতল বস্তু পান করিলে, মুক্ত বায়ু মধ্যে, আহাৰান্তে এবং চর্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত দস্তের ছিন্নবৎ

বেদনার বৃদ্ধি; দস্তের স্পর্শসহিষ্ণুতা, বিশেষতঃ রজনীতে ও প্রাতঃ-কালে উপস্থিত হয়। কঠিন চাপ দিলে অধিকাংশ সময়ে দস্তশূলের উপশম। মুখে অবিশ্রান্ত ভাবে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। দস্তমাড়ি স্ফীত, ক্ষতযুক্ত ও স্পঞ্জের স্থায়, এবং স্পর্শ মাত্রই রক্তস্রাবযুক্ত। নিম্নের ছেদনদস্তের মাড়িতে ছিন্নবৎ বেদনা থাকে এবং আহার কালে তাহার মূলও ঐরূপ বেদনা করে। দস্তমাড়ির মাংস বৃদ্ধি হয় ও তাহাতে গুটিকা জন্মে।

উদর।—উদরে দুর্বলতা বোধ হওয়ায় তাহা স্থলিত হইবে বলিয়া অনুভূতি। তপ্ত বাতকর্ম। কুচকির গ্রন্থিতে বেদনায়ুক্ত স্ফীতি। উদরের স্থানে স্থানে বায়ু আটকাইয়া থাকায় তাহার সর্বত্রই কামড়ানি ও মোচড়ানি বেদনা। নাভির নিম্নে ও দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন চাপ বোধ। বাম উদরবন্ধে চিম্টি কাটার স্থায় ও স্থচিবেধবৎ বেদনা। শিশুদিগের স্ফীত উদরে বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—মলত্যাগান্তে সরলাস্ত্রে জালাযুক্ত চনচনি ও টাটানি। উপবেশনাবস্থায় মলদ্বার চুলকায়। অত্যন্ত ও কঠিন বিষ্ঠায় কোষ্ঠবদ্ধ। তরল মল হইলে প্রভূত বায়ুর নিঃসরণ।

মূত্রশক্তি।—পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগে সরু ধারে অত্যন্ত মূত্রস্রাব অথবা ফোঁটায় ফোঁটায় কৃষ্ণবর্ণ মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে জালা, মূত্রত্যাগান্তে যেন মূত্রস্থালী শূন্য না হওয়ায় মূত্রবেগ আসে ও বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরণ হয়। প্রচুর জলবৎ ফেকাসে মূত্রত্যাগ।

পুং-জননেদ্রিয়।—কামেচ্ছার বৃদ্ধি। হস্তমৈথুনের ফলস্বরূপ মুখমণ্ডলের বসাপদার্থের অভাব ও লজ্জাব্যঞ্জকদৃশ্য, বিষন্নতা, রজনীতে রক্তক্ষরণ, পৃষ্ঠের কনকনানি, পদের দুর্বলতা এবং জননেদ্রিয়ের শিথিলতা। অস্বাভাবিক বীর্ঘাশ্বলনে অত্যন্ত দুর্বলতা। ভ্রমণকালে ও ঘর্ষণে বাম অণ্ডকোষে চাপবৎ বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি। কসিয়া

রাখার ত্রায় দক্ষিণ অণ্ডকোবে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা। দক্ষিণ কুচ-
কির গোল ছিদ্র (Inguinal ring) হইতে আকৃষ্টবৎ ও জালাযুক্ত
বেদনা দক্ষিণ অণ্ডকোবে বিস্তৃত হয়, কিন্তু বোধ হয় যেন তাহা অণ্ড-
রজ্জুতে হইয়াছে। লিঙ্গমূণ্ডের উপরে ও অধঃদেশে কোমল ও আর্দ্র
মাংসবিবৃদ্ধি জন্মে। স্ত্রীসঙ্গনের শেবভাগে ষাসকৃচ্ছ।

স্রীজনেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু অণ্ডাধারে তীর
তীর-বেধবৎ বেদনা। অনিয়মিত, বিলম্বাগত ও প্রচুর ঋতুশ্রাব, কখন
বা আর্দ্রবাতাব, ঋতুশোণিত প্রথমে ফেকাসে, পরে কখন বা কৃষ্ণবর্ণ ও
চাপ চাপ; কখন বা জরায়ুর আক্ষেপিক সংহোচন। যোনির দানাময়
মাংসবিবৃদ্ধি। জনেন্দ্রিয়ের বেদনায়ুক্তস্পর্শসহিষ্ণুতা উপবেশনাবস্থাতেই
অধিকতর। যোনিকপাট এবং যোনিতে আক্ষেপিক বেদনা। যোনি-
কপাটে হ্রসবেধভাবযুক্ত চুলকনা।

গ্রীবা ও প্রষ্ঠ।—গদমধোর, গ্রীবাবহির্দেশের এবং বগোলের
গ্রন্থির বেদনায়ুক্ত স্ফীতি। নিম্নগৃষ্ঠে ভগ্ন হওয়ার ত্রায় বা মোচড় লাগার
ত্রায় বেদনা, বিশেষতঃ রজনীতে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতে
ও শরীর ফিরাইতে বৃদ্ধি। বৃক্কদেশে চুলকনায়ুক্ত স্ফিবেধবৎ
বেদনা।

উল্কাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিতে স্ফিবেধবৎ বেদনার স্পর্শে ও চালনায়
বৃদ্ধি। বাহুর পক্ষাঘাতিক বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি; হস্তাঙ্গুলির
ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পেশীতে ঝাঁকি এবং ছিন্নবৎ বেদনা, অঙ্গুলির অগ্রভাগে
অধিকতর। বামবৃদ্ধাঙ্গুলিতে জালাযুক্ত চুলকানি। করভাস্থিসন্ধিতে
(Metacarpal joints) পক্ষাঘাতিক আকৃষ্টতার চালনায় বৃদ্ধি।
হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগে অসাড়তা। অঙ্গুলির উপরিভাগে রসবাতজ গুটিকা।
অঙ্গুলির পংক্তি-গ্রন্থির প্রদাহ।

নিম্নাঙ্গ।—উরুর অভ্যন্তর পার্শ্বোপরি চুলকনা, ভ্রমণ করিতে

উরু বেদনা করে। জানুসন্ধিতে স্থচিবেধবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। বিশ্রামকালে দক্ষিণ টিবিয়াস্থিতে গর্ভ করা ও স্থচিবেধের হ্রায় বেদনা। উপবেশন ও দণ্ডায়মানাবস্থায় জজ্বা-পেশীতে ছিন্নবৎ বেদনা। দক্ষিণ পায়ের ডিমে স্থচিবেধবৎ অনুভূতি। উপবেশনাবস্থায় নিতম্ব কনকন করে।

অক্ষ প্রত্যক্ষ।—অঙ্গনিচয়ে আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার হ্রায় ও স্থচিবেধের হ্রায় বেদনা। অধিক ভ্রংণ করিলে স্বক্কের ও হিঁপসন্ধির অধঃভাগে বেরূপ বেদনা হয় অঙ্গনিচয় সেইরূপ আঘাতপ্রাপ্ত ও বেদনা-যুক্ত বোধ।

অক্ষ।—দক্ষ। সন্ধ্যাকালে ত্বক্ চুলকায় ও চুলকাইলে জ্বালা করে। দানাবৎ পুরাতন ত্বগুদ্বেদ। গ্রন্থির বেদনামূলক ক্ষীতি।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ারোগীর মানসিক লক্ষণের, বিশেষতঃ ইহার শিশুরোগীর মানসিক লক্ষণের বিশেষতা দেখা যায়; কিন্তু ক্যামিলা ও নাক্স ভ সহ ইহার তুলনা দ্বারা পরিদূরণ ব্যতীত তাহার কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রোধোৎপন্ন রোগে ইহা ক্যাম ও কলসি সহ তুলনীয়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ারোগী বড়ই খিটখিটে ও উত্তেজনা প্রবণ, যেন “কিস্তুত-কিমাকার” স্বভাবের। এই লক্ষণ বিষয়ে ইহাকে ক্যাম, কলসি, সিনা ও নাক্স সহ তুলনা না করিলে ইহার প্রয়োগস্থল নির্দ্বন্দ্বিতা করা সুকঠিন। ইহার অগ্ৰান্ত বিশিষ্টতা রোগবর্ণনাকালে উল্লিখিত হইবে।

চিকিৎসা।

চিস্তোন্নততা বা হাইপকণ্ডিসিাসিস্।—হস্ত-মৈথুন, অপরিমিত ইঞ্জিয়মেবা এবং সর্কদা ইঞ্জিয়পরিতৃষ্টিবিষয়কচিন্তা এই রোগের সাধারণ কারণ বলিয়া বিবেচিত। অতিরিক্ত হস্তমৈথুনে

বালক উদাসীন ও বিষণ্ণচিত্ত হয়, তাহার মুখ ও চক্ষু বসিয়া যায়, নাসিকা স্ফুমাগ্র হয় এবং চক্ষুর চতুর্দিকে কালিমা পড়ে। শিশুর মানসিক অবস্থা ক্যান্সন গ্রায় ক্রোধপ্রবণতা ও অসহিষ্ণুতা দ্বারা প্রকটিত। শিশু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার শরীরের পাণ্ডুরতা ও মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার ঢকলতা জন্মে।

চক্ষুরোগ।—বাতজ চক্ষুপ্রদাহ বা আর্থ্রাইটিক অফথ্যালমিয়া; অঞ্জলিকা বা ষ্টাই।—সন্ধি-বাতজ ধাতুর ব্যক্তিদেগের বাতজ চক্ষুপ্রদাহে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী ঔষধ। চক্ষু জ্বালা করে এবং শুষ্ক বোধ হইলেও অত্যন্ত জলস্রাব হয় ও জ্বালাসহ চন চন করে। বেদনা চক্ষু হইতে দস্তে যায়। এস্থলে ইহা কলসিস সহ তুণনীয়। শিশুদিগের চক্ষুর, বিশেষতঃ চক্ষুপত্রের প্রদাহে কঠিন অঞ্জলিকা ও গুটিকা জন্মিলেও ইহা দ্বারা ফল হয়। তাহা পাকে না, কঠিন হইয়া যায় ও চক্ষুপুটপার্শ্ব চুলকাইয়।

দস্তুরোগ।—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াতে উপদংশ ও সাইকসিস ধাতুর শিশুদিগের চক্ষুদস্ত অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে কাল কাল দাগ জন্মে ও আক্রান্ত দস্তাংশ শুঁড়া হইয়া স্থানিত হয়। বৃদ্ধদিগের ধ্বংসপ্রাপ্ত দস্তপত্রের মূলে চর্কণৎ বেদনা জন্মে।

ত্রিশাজোতি।—ইহাও অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত চক্ষুদস্তের কনকনানি নিবারণে সক্ষম। দস্ত প্রথমে চরিত্রাত এবং পরে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং পরিশেষে ধ্বংস হইয়া যায়। এস্থলে ষ্ট্যাফিস সহ এন্টিফু, বিশেষতঃ ক্যান্সন ও কফিস্তা তুণনীয়।

উদরশূল।—ক্রোধজনিত অথবা উদরের অস্ত্র চিকিৎসার পর উদরশূল জন্মিলে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপকারী।

উদরাময়।—অবস্থাবিশেষে শিশুর উদরাময়রোগে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ফলদ। এই উদরাময় সহ বিশেষ প্রকারের মুখক্ষত

বর্তমান থাকে এবং শিশুর জিহ্বা ও দন্তমাড়ি শুভ্র এবং স্পঞ্জের স্থায় হয় । মলত্যাগের আগে ও পরে উদরে কর্তনবৎ বেদনা জন্মে । মলত্যাগকালে সরলাস্ত্রে কুস্থন হইলে বিষ্ঠাসহ যে বায়ু নির্গত হয় তাহা সাধারণতঃ **ক্যান্সিলাস** স্থায় গরম ও পচা ডিম্বের গন্ধযুক্ত থাকে । কিছু আহারের বা পানের চেষ্টা করিলেই মলত্যাগ হয় ।

শুক্রমেহ।—হস্তমৈথুন নিবন্ধন রোগে **ষ্ট্র্যাফিসেগ্রিয়া** উপকারী । ইহার শীর্ণ চক্ষুর অধঃদেশে কালিমা পড়ে, মুখমণ্ডল মলিন হয় এবং রোগী খিটখিটে ও অত্যন্ত লজ্জাশীল থাকে । স্ত্রী, পুরুষ কেহই কাহারও সঙ্গ ইচ্ছা করে না । বিষন্ন রোগী অধিকাংশ সময় কাম বিষয়ক চিন্তারত থাকে । বালক রোগী উদাস ও বিষন্ন ভাব ধারণ করে, তাহার মুখ বসিয়া যায় এবং সে সর্বদা তাহার স্বাস্থ্যের ছরবস্থা সম্বন্ধীয় চিন্তাগ্রস্ত থাকে । কখন কখন মূত্রনাণীর প্রথমংশ উত্তেজনা প্রবণ হয় । স্ত্রীজননেক্রিয়ের অতি পুরাতন ও বদ্ধিত উত্তেজনা জ্ঞাত যে ভয়ানক অশান্তি জন্মে তাহা দূর করিতে **ষ্ট্র্যাফিস** সক্ষম । উৎকর্ষযুক্ত এবং ভাবপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাস্থ্যের ছরবস্থা নিবন্ধন শান্তিহীন থাকিলে ইহা উপকারী ।

প্ল্যাটিনা—ডাঃ গ্রভলের মতে যৌবনারম্ভের পূর্বকালীন জননেক্রিয়ের অযথা ব্যবহারপ্রযুক্ত আক্ষেপ, সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ, শীর্ণতা এবং মানসিক দৌর্বল্য প্রভৃতি নিবারণে ইহা উপকারী ।

ক্যালাদিশাস—হস্তমৈথুনের কুফল স্বরূপ লিঙ্গমুণ্ড নেকড়ার স্থায় শিথিল ; এবং লিঙ্গমুণ্ড বেষ্টত্বক্ লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত করিয়া তাহার গ্রীবাঘ্ন আনিলে, স্থিতিস্থাপকতাবিহীন ত্বক্ শিথিলভাবে নিশ্চেষ্ট থাকে । স্বপ্ন না হইয়া অথবা কামবিষয়ক স্বপ্ন ব্যতীত অন্তপ্রকার স্বপ্ন হইয়া রজনীতে রেতঃপাত ।

স্ট্রীজননেক্রিয়রোগ—**জন্নাঙ্কুপ্রংশ**, শ্বেত-

প্রদর।—প্রেমনৈরাশ্য পীড়িত ও অধিকাংশ সময় কামবিশয়ক চিন্তারত দুর্বল স্ত্রীলোকদিগের শিথিল আমাশয়, উদর ও বস্তিস্বল্পনিচয়ের শিথিলতর অবস্থা উৎপন্ন হইলে জরায়ুদংশ ঘটে। ইহার সহিত যে শ্বেতপ্রদর উপস্থিত হয় তাহার শ্রাব হরিদ্রাবর্ণ ও বিদাহী। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপরিনিখিত উদর ও অন্ত্রাদির বলাধান সাধন করিয়া রোগারোগে সক্ষম।

গাউট বা ক্ষুদ্রবাত।—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া তরুণ অপেক্ষা পুরাতন ধাতুগত গাউটের পক্ষে বিশেষ উপকারী। রোগের উক্ত অবস্থায় ইউরেট অব্ সোডা (লবণ) মূল্যবান দ্বারা নিঃসারিত না হওয়ায় তাহা শরীর মধ্যে থাকিয়া যায় এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন সন্ধি ও যন্ত্রে নোড় বা বর্ত্ত্বুলাকারে সঞ্চিত হয়। এমন ক্ষেত্রেও পুরাতন গাউটরোগে সন্ধিতে ইউরেট অব্ সোডা বর্ত্ত্বুলাকারে সঞ্চিত হয় এবং হস্ত বাঁকা চুরা হইয়া কদাকার ধারণ করে। এরোগে মূত্রের দুর্গন্ধ এবং তাহার লোহিতবর্ণ বালুকাবৎ তলানি যথাক্রমে **বেন্ জোইক এসিড ও লাইক** নির্ধারিত করে।

অস্থিরোগ, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেল্লি-অষ্টাই-টিস্ প্রভৃতি।—উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহারবশিত অস্থিরোগে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া কার্যকারী। রুগ্ন অস্থির উপরিভাগের ত্বকে যে ক্ষত জন্মে তাহার শ্রাব পাতলা ও তীব্র।

স্টিলিঞ্জিফ্রিয়া—ইহা ফিমার, টিবিয়া ও হিউমারাস্ প্রভৃতি দীর্ঘাস্থির এবং অস্থিবেষ্টের উপদংশজ প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। ইহার বেদনা রজনীতে ও সোঁতা বাতাসে বৃদ্ধি পায়। রোগ মন উপদংশজ পিনসের ক্ষতকর শ্রাব থাকে।

মার্কুল্লিয়াস—ইহাও অস্থিরোগের, অল্পতম ঔষধ। উপদংশ বিষ ও পারদ মিশ্রণে যে রোগোৎপন্ন হয় তাহাতে **ক্যালি হাই**

উপকারী। গণ্ডমালা জনিত অস্থিরোগে ষ্ট্রনসিল্লানা কার্ভ ফলপ্রদ। অস্থিরোগে, বিশেষতঃ ফিমার অস্থিরোগে ন্যূনাধিক বিগলিত অস্থিক্ষত হইতে শ্রাব নিগত হইলে ইহা প্রযোজ্য। ক্লেফারাইড্ অব্ গোল্ড্ এবং প্ল্যাটিনাম্ মৃত অস্থি রোগে বা অস্থিতে ক্ষত হইলে উপযোগী।

অকরোগ—উৎকুণ বা পেডিকুলাস; দুগ্ধ-পীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্টিফ্লা; কাউর বা এক জিন্মা।—মস্তকের কিম্বা শরীরের কোন স্থানের উৎকুণ ষ্ট্র্যাফি-সেগ্রিয়ার ধাবন ব্যবহারে দূরীকৃত হয়। ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে শরীরের, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের ও মুখের কাউর বা একজিন্মা আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার উদ্ভেদ গুলু থাকে এবং স্থূল মামড়ি উৎপন্ন করে। এই সকল উদ্ভেদ চুলকায় কিন্তু তাহার বিশেষত্ব এই যে চুলকাইলে তৎস্থানের চুলকানি নিব্বত্তি পায় কিন্তু অন্য স্থান চুলকাইয়া উঠে। মামড়ি হরিদ্রাবর্ণ। শিশুদিগের গুলু পীড়কার ইহা ঔষধ। ইহা নৃগুণ্ড চন্দ্রকীল ও শ্লেমা গুটিকা আরোগ্য করায় ইহার সাইকোটিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়; ফলতঃ পারদের অপব্যবহারহুই শিশুদিগের 'অকরোগের পক্ষে ইহা বিশিষ্ট উপকারী।

৭। রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্ ।

(Ranunculus Sceleratus)

সাধারণ ক্রিয়া।—স্নায়ুগুণ এবং শৈল্পিক ঝিল্লিতেই ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা মুখমণ্ডলপেশীর আনর্জন উৎপন্ন করে এবং উপরিউক্ত পেশীসংকোচনে মুখের অলীক হাস্যভাব (Risus sardonicus) প্রকাশিত হয়। ইহাতে মুখপেশীর, উদরের পার্শ্বের

এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। নাসিকা ও অন্ননালীর উত্তেজনা নিবন্ধন রোগীর শ্লেষ্মা ও জলবৎ স্রাবের বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্ম হইলে অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে এবং রোগী মুচ্ছার ভাব বোধ করে। ইহা স্বকে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কোষ্ঠা উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে পাতলা হরিদ্রাত ও তীব্র ক্ষতকর স্রাব হয়।

চিকিৎসা।

রেনাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাসের সচরাচর ব্যবহারস্থল অতি সঙ্গর্গ বহিনে অত্যাঁজি হয় না। তথাপি কোন কোন স্থলে রেনাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাসের ক্রিয়া তাহার নিকটতম সম্বন্ধযুক্ত ও সমজাতীয় রেনাঙ্কুলাস্ বাষ্মো হইতে প্রবলতা-বিশিষ্ট হওয়ায় যে যে স্থলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হই-তেছে। মুখগহ্বরে রেনাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্ উগ্রতর ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া জিহ্বার সাধারণ ক্ষতে এবং ডিম্ফ্ থিরিস্শা ও টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের দোষযুক্ত জিহ্বার স্থানেস্থানে দুধিত ক্ষত (diphthetia) থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। অনেক রোগে ইহার মানচিত্রবৎ কলঙ্কশূন্য জিহ্বা প্রদর্শক স্থানীয়। নেট মিউ, আর্স, রাস্ ও ট্যারাকসে-কামেও উপরি উক্ত জিহ্বা-লক্ষণ আছে, কিন্তু কোন ঔষধেই রেনাঙ্কু স্কিলির ঠায় ক্ষতের তীব্র জালা ও স্রাবদারণ ভাব দেখা যায় না। ইহার তীব্রতা ও ক্ষতকারিতা ইহাকে অত্যাঁজি ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

স্রাবযুক্ত সাধারণ সপ্দিরোগে হাঁচি, সন্ধিবেদনা এবং জালাযুক্ত মুত্রস্রাব থাকিলে রেনাঙ্কু স্কিলি রেনাঙ্কু বাষ্মোর ঠায় কার্য্য করে।

ইহা ত্বকে এককভাবে রসবিশ্বিকোদভেদ উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে প্রায় **লেণাঙ্কু বাস্বোর** ছায়ই পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ এবং ক্ষতকর শ্রাব নির্গত হয়। ত্বকের ব্রহদাঙ্গতন **ফোফা** বা **পেপ্সিফগাস** রোগে ইহা প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। উদ্ভেদ বিদীর্ণ হওয়ায় তীব্র শ্রাব নিঃসৃত হইলে ক্ষতপার্শ্বস্থ স্থানে ক্ষত ও টাটানি জন্মে।

শক্বে রোগে বেদনা ও ক্ষত হওয়ার ছায় অন্তত্বিত্তি জন্মিলে যদি রোগীর উদরাময় হইবে বলিয়া বোধ হয় তাহাতে **লেণা ফ্লিন** উপকারী।

বক্ষে স্রষ্টবৎ বেদনা ও দুর্বলতা—প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা কালে বৃদ্ধি হইলে যদি বক্ষের বহিঃপ্রদেশে স্পর্শসহিষ্ণুতায়ুক্ত বেদনা হয় তাহাতে ইহা উপকার করে।

পদাঙ্গুলির কড়া রোগ—জ্বালা ও টাটানি থাকিলে, বিশেষতঃ পদ ঝুলাইয়া রাখিলে যদি তাহার বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

৮। হাইড্রাস্টিস্ (Hydrastis canadensis)

সম্বন্ধ।—সাল্ফার ইহার কার্য্যপ্রতিবেদক। ইহা মার্ক এবং কেলি ক্লরিকামের কার্য্যপ্রতিবেদক।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এমন মিউ, এন্টি ক্রু, বোরাক্স, চেলি, কোনাই, কেলি বাই, মার্ক কর, ফাইটল, পাল্‌স্, সিপি, থ্র্যাম, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা শ্লেষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ চক্ষু, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, সরলাত্র, যোনি, জরায়ুপ্রাীবা এবং মূত্রবন্ত্র প্রভৃতি শ্রাবনির্গমন পথের শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষ কার্য্য প্রকাশ করে।

প্রথমেই শৈল্পিক ঝিল্লির উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক স্রাবের বৃদ্ধি করিলে ইহা প্যাল্‌স্‌ সহ তুলনীয় হইতে পারে। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া প্যাল্‌স্‌ অপেক্ষা গভীরতর ; ইহার স্রাব শীঘ্রই বিকৃতি-প্রাপ্ত হয় ও পরিমাণে বাড়িয়া যায়। প্রথমাবস্থায় স্রাব পরিষ্কার, শুভ্র-স্বচ্ছ এবং আটাল থাকে, কিন্তু ক্রমে তাহা পীতবর্ণ, ঘন, সবুজ এবং শোণিত-মিশ্রিত হইতে পারে এবং টানিলে সুদীর্ঘ সূত্রাকার ধারণ করায় কেবলি বাই সহ তুলনীয় হয়। ইহার প্রাথমিক স্রাব ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া পূর্ণমিশ্রিত হইলে ঝিল্লির উপস্থিত উষ্ণতা যায় অথবা তাহাতে ক্ষুণ্ণ জন্মিতেও পারে। ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় শৈল্পিক ঝিল্লির রক্তাধিক্য ও উত্তেজনা প্রকাশিত করিলেও অবশেষে তাহার দুর্বলতা বশতঃ জড়তা উপস্থিত হওয়ায় স্রাবের অভাব ঘটে ও ঝিল্লি শুষ্ক, চকচকে, ক্ষতবৃদ্ধ এবং ক্রিয়াহীন হইয়া যায়। গ্রহ্মিণ্ডল ও ত্বকেও ইহা প্রায় উপরি উক্ত রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রথমে তাহাদিগের রক্তাধিক্য এবং ক্রিয়োত্তেজনা দটিলে পরে তাহাদিগের জড়তা ও অবসাদ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত অবস্থায় পুনরুৎপাদিকাশক্তি বিকৃতিপ্রাপ্ত হওয়ায় দুর্বিত পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। হাইড্রাষ্টিসেস্‌ ক্রিয়ার তাদৃশ ব্যাপকতা না থাকিলেও কক্কট বা ক্যান্সারাদি রোগে ইহার ক্রিয়া দেখিলে ইহা যে একটি গভীর ক্রিয়াশীল এটিসোরিক ঔষধ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বৃদ্ধদিগের পক্ষে এবং বহিঃপ্রয়োগে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ।

লক্ষণ ।

কর্ণ।—কর্ণের প্রতিষ্ঠায় ; ঘন স্লেম্মাস্রাব ; মধ্যকর্ণের প্রাতিষ্ঠায়িক প্রদাহ এবং আরক্ত অরাস্তে বধিরতা ।

নাসিকা।—ললাট দেশে শিরঃশূল এবং নাসিকা হইতে অবি-
শ্রান্ত ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ স্লেম্মার স্রাব। পশ্চাৎনাসাপথ হইতে ঘন এবং

আটা স্রাবের স্রোত বহে। নাসিকার শৈল্পিক ঝিল্লির বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) বশতঃ সর্দিতে পীত বা সবুজ বর্ণ এবং দুর্গন্ধ স্রাব। নাসিকা সর্দির স্রাব জলবৎ ও হাজাকর; নাসিকায় জালা, চনচনি এবং অবদারণ; স্রাব গৃহমধ্যে স্বল্পতর, বহির্দেশে প্রচুর; কণ্ঠা এবং বক্ষে অবদারণ ভাব জন্মে। চক্ষুর উর্দ্ধে পূর্ণতা নিবন্ধন ললাটদেশে মৃত শিরঃশূল। পিনসরোগে নাসিকায় ক্ষত জন্মে এবং রক্তমুক্ত পুয়াকার স্রাব নির্গত। নাসিকারক্লে বাতাস শীতল বোধ হয়।

হৃৎপিণ্ড।—প্রাতঃকালে হৃৎকম্প।

মুখগহ্বর।—প্রস্থতি ও তুর্কল শিশুদিগের, বিশেষতঃ পারদ অথবা ক্লরেট অব পটাস সেবনান্তর মুখের ক্ষত। অত্যধিক পরিমাণ, ঘন ও আটাল শ্লেষ্মা স্রাব।

গলাভ্যন্তর।—গলা খাঁকর দিলে নাসিকাপশ্চাৎ ও গলগহ্বর হইতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে ও গলগহ্বরে অবদারণ ভাব থাকে; পারদসেবনান্তর প্রায়শঃ গলায় ক্ষত জন্মে। প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে গলায় কর্কশভাব, গলাধঃকরণক্রিয়ায় তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় টাটানি।

আমাশয়।—মৃত কনকনানি বেদনা হওয়ার পর আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়ার অন্তর্ভূতি, মুচ্ছার ভাব, এবং কিছু নাই নাই বোধ ও হৃৎকম্প। আমাশয়ের দৌর্কল্যাণটিত অম্বাজীর্ণে।

উদর।—মলত্যাগের পর নিম্নোদরে কঠিন কর্তনবৎ বেদনা হইলে তাহা অণুকোষে যাওয়ায় মুচ্ছার ভাব জন্মে। যকৃৎপ্রদেশের সবিরাম ও তীব্র বেদনা অংশফলকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা এবং জালা। মলত্যাগে কামড়ানি বেদনা থাকে। আমাশয় ও ডুয়োডিনামের সর্দি। বাতজ উদরশূলে মুচ্ছার ভাব জন্মে।

মল।—প্রচুর, সাদাটে ও উগ্র মলত্যাগ। অস্ত্রের প্রতিশ্রায়িক ক্ষত এবং প্রচুর শ্লেষ্মায়ুক্ত মলত্যাগ। কোষ্ঠবন্ধে অর্শ।

মূত্রশল্প।—মূত্রে পচা গন্ধ। মূত্রস্থালীর প্রতিশ্রায় রোগে মূত্রনিম্নে ঘন ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার তলানি পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিহ।—পৃথ-মেহরোগের দ্বিতীয়াবস্থার ছায় ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ স্রাব। পুরাতন পুয়মেহবৎ স্রাব। শুক্রমেহের পর দৌর্কল্যা।

স্রীজননেন্দ্রিহ।—আটা, দড়ি দড়ি, ঘন এবং পীতবর্ণ শ্বেত-প্রদরের ছায় স্রাব। যোনি, জরাবৃদ্ধ ও তাহার গ্রীবাশ ক্ষত। যোনি-কপাটের চুলকনা হইলে প্রচুর শ্বেত প্রদর জন্মে; কামবিষয়ক উত্তেজনা।

স্রক।—মুখ, গ্রীবা, করতল, হস্তাঙ্গুলি এবং মণিবন্ধে বিসর্পবৎ পীড়কা জন্মিলে উন্মাদকর চুলকনা ও জ্বালাবৃদ্ধ তাপ এবং পরে স্রকের ছাল উঠিয়া যায়—রজনীতে রোগের বৃদ্ধি।

চিকিৎসা।

অজীর্ণ রোগ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।—প্রতিশ্রায়-বশতঃ হাইড্রাষ্টিসের অজীর্ণ রোগে আমাশয়ে প্রভূত শ্লেষ্মা জন্মে, গলাবাহিয়া স্নান জল উঠে এবং ক্ষুধার অভাব হয়। “জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্ব পরিষ্কার এবং মধ্য ভাগ পীতবর্ণ লেপবৃদ্ধ থাকা” ডাং ডাইস্‌ ব্রাউনের মতে, এই রোগে, হাইড্রাষ্টিসের নিশ্চয়াঙ্ক প্রদর্শক। আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়া ও শূণ্য বোধের সহিত মূর্ছার অনুভূতিও থাকিতে পারে। জরাযু রোগে সিপিহ্নাতে এবং গুলা বায়ু রোগে ইগ্নেসিহ্নাতে আমাশয় স্থানে উপরি উক্তরূপ অনুভূতি জন্মে।

আলস্ত, অন্তস্তি ও মানসিক অবসাদ; বিশেষ প্রকার জিহ্বা লক্ষণ; আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়ার ভাব প্রভূতি ক্রেশ; ক্ষুধা-হীনতা; এ রোগে যকৎ বিকাল সংশ্রব এবং কোষ্ঠবন্ধ হাইড্রাষ্টিসের উচ্চতম প্রদর্শক। এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে

ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ হয়। ইহার স্ফূটবিকারেণের পরিচায়ক লক্ষণস্বরূপ তিক্তস্বাদ এবং পুৰাতন কোষ্ঠবৎ বর্তমান থাকে। পিত্তশিলায় ইহা অত্তম ঔষধ। ইহার কোষ্ঠবন্ধে আমাশয়স্থানে দম্বিয়া ষাওয়ান ভাব ও শূন্যবোধ প্রদর্শক রূপে বর্তমান থাকে।

প্লিট বা পুরাতন পূস্মেহ।—কোন যথুণা না থাকিয়াও মূত্রনালীর জড়তা ও দুর্বলতা নিবন্ধন ঘন এবং আটা শ্রাব থাকিয়া যাইলে হাইড্রাষ্টিস দ্বারা উপকার হয়।

শ্বেতপ্রদর বা লিউকরিয়া।—হাইড্রাষ্টিসের রোগে জরায়ু গ্রীবার উপস্থিত উষ্ণিয়া যায় এবং তাহা হইতে আটা, ঘন ও দড়ি দড়ি শ্রাব হয়; প্রচুর শ্লেয়াগুক্ত ও দুর্বলকর শ্বেতপ্রদরেও ইহা উপকারী।

ক্যান্সার বা কৰ্কট রোগ।—এপিথিলিওমা এবং জন্মানুর কৰ্কট রোগারোগ্যে হাইড্রাষ্টিস্ বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইংলণ্ডের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকবৃন্দ, স্তন-গ্রন্থির অৰ্কুদ আরোগ্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন; ইহা বেদনা উপশম করিয়া ও রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করে। বিশেষ প্রকারের অজীর্ণ লক্ষণ ইহার প্রদর্শক। ক্যান্সারের চিকিৎসার পক্ষে হাইড্রাষ্টিস্ অত্তম উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী শীর্ণকায়, ভগ্নাবশেষ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়, এবং ত্বকের আতত ভাব জন্মে। ক্যান্সারে ক্ষত জন্মিলেও ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। আমাশয় ও পাইলোরাসের অৰ্কুদও ইহার ব্যবহারে অস্তর্দান করিয়াছে।

৯। হেলিবোরাস (Helleborus Niger)।

সম্ভ্রম।—হেলিবোরাসের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যান্ফর, সিক।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, এপসাই, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যান্ডা, কল্‌চি, কুগ্রাম, ডিজি, হায়সা, মার্ক, লাইক, নাক্‌স্‌ভ, ওপি, ফস্, পাল্‌স, রাস, স্ট্র্যামো, সাল্‌ফ ।

সাধারণক্রিয়া।—হেলিবোরাসের প্রধান কার্য বৃককে হৃৎ-স্রায় মূত্রের স্বল্পতা জন্মে, এবং রসবিহীন বা সিরাস্‌মেস্‌চের আক্রমণের ফলস্বরূপ মস্তিষ্কে, বক্ষগহবরে, অন্ত্রবেষ্টবিহ্নিতে ও কৌম্বিকবিধান বা সেলুলার টিস্যুতে জলশোধ বা ড্রপ্সি উৎপন্ন হয়। ইহা পরিপাকবহুপথের প্রভূত উত্তেজনা উপস্থিত করিলে তাহা প্রদাহে পরিণত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে আমাশয় ও অন্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন করে। ইহা নিউমোগষ্টিক দ্রাযু আক্রমণ করায় শ্বাসপ্রশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত জন্মে; মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার স্নায়ুগুণ্ডল আক্রমণ দ্বারা ইহা মস্তিষ্কায় ও সর্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় গভীর রক্তহীনতা এবং পেশীর শীর্ণতা জন্মে। গণ্ডমালাগ্রস্ত ঢকল শিশুর রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ ।

মন।—চৈতন্যভাব, রোগী ধীরে ধীরে প্রপ্তের উত্তর দেয়, স্পর্শজ্ঞান-রহিত হয়। অত্যন্ত উৎকর্ষা ও বহুগাবোধ। অপ্রকাশিত বিষন্নতা। গৃহবিবরহাতুরতা। অতিশয় মনঃসংযোগের সহিত কার্য না করিলে পেশীর সম্যক কার্য হয় না।

মস্তক।—মস্তকের গুরুত্ব ও জড়তা। বিশৃঙ্খলভাব। মস্তকের গভীরদেশে তাপ। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাৎ পার্শ্বে, ঘৃষ্ট হওয়ার ঞ্চায় টাটানিতে অচৈতন্যের ভাব জন্মে ও মস্তক নত করিলে তাহার বৃদ্ধি হয়। মস্তকপশ্চাতে বেদনা।

অর্চৈতল্যাবস্থা ; মস্তক তপ্ত ও গুরু ; উপাধানোপরি মস্তক আবর্তন বা শিরোলুষ্ঠন ; দিবা রজনী কেঁকানি এবং শিরোলুষ্ঠন ।

স্নায়ু।—পেশীর আক্ষেপিক আনর্তন । শয্যার পদপার্শ্বে নামিল্প পড়ে । সর্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে শরীরের অতিশয় শীতলতা । অত্যন্ত দৌর্বল্য । অঙ্গাদির উর্দ্ধাকৃষ্টাবস্থায় চিতভাবে অবস্থান ।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, শোথযুক্ত, কদাকার, বসা এবং লোহিতবর্ণ ।

চক্ষু।—প্রদাহ ব্যতীতই আলোকাতঙ্ক । কণীনিকার বিসৃতি এবং আলোকান্নভূতিহীনতা । চক্ষুগোলক উর্দ্ধে ঘূর্ণিত ; বক্রদৃষ্টি ।

নাসিকা।—নাসিকারন্ধ্রে দেখিতে পৃম্ববর্ণ, ঝুলযুক্তবৎ, শুষ্ক ও সমল । রোগী বারম্বার নাসিকা ঘর্ষণ করে ।

হৃৎকম্প ও নাড়ীস্পন্দন।—অনেক সময় নাড়ীস্পন্দন হৃৎস্পন্দনাপেক্ষা ধীরতর । নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র ও কম্পান্বিত এবং ক্ষণ-লোপযুক্ত ।

মন।—কেবল পরিষ্কার, আটা, বর্ণহীন স্লেষ্মার বিষ্ঠা । শুদ্ধ জিউলির আটা বা জিলাটিনবৎ বিষ্ঠা দেখিতে ভেঁকডিম্বের গায় ; তাগে কুস্থন । কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রস্রাব।—পুনঃ পুনঃ বেগ, কিন্তু অত্যন্ত মূত্রভাগ । মূত্র অত্যন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ; কাফির গুঁড়ার গায় ; প্রচুর । পেশীর দুর্বলতা বশতঃ মূত্রের রোধ ঘটলে মূত্রস্থালীর অত্যন্ত বিসৃতি জন্মে ।

চিকিৎসা ।

সম্বাসরোগ বা এপপ্লেক্সিস।—সম্বাসরোগান্তে বৃদ্ধির জড়তা জন্মিলে হেলিবোরাস উপযোগী ।

**মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ—সাধা-
রণ ও টুবাফুলান বা গুটিকা-সংশ্লেষ্ট।—হেলি-
বোরাস্** রোগ মানসিক জড়তা দ্বারা খ্যাতি লাভ করে; চৈতন্যের
অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব। ফলতঃ রোগের শেষাবস্থায়
মস্তিষ্কে রসসঞ্চয়বশতঃ ললাটের কুঞ্চিতভাব, কণীনিক'-বিস্তৃতি এবং
অগ্রতর হস্ত ও পদের স্বতঃই চালনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে
হেলিবোরাস প্রদর্শিত হয়। ইহার অত্যাচল লক্ষণ মধ্যে
মস্তকে তীরবেধবৎ বেদনা, চঠাৎ চীৎকার স্বরে ক্রন্দন ও শিরোলুষ্ঠন
প্রভৃতি প্রদান। রোগী অতি বিলাপের স্বরে ক্রন্দন করে।

ডাং ও'কনর এ রোগে **আইডফলস** ৬× ব্যবহারে
ফল পাইয়াছেন। মস্তকত্বকে ইহার মলমের মালিস ব্যবহার দ্বারা
কতিপয় রোগীর আরোগ্যের বিষয় নর্থ আমেরিকান জর্নাল অব হোমিও-
প্যাথিতে উল্লিখিত আছে।

ত্ৰিপিশাস—উচ্চ স্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা
ধ্বনি এবং মুখের ক্রবণতা অথবা কটাবর্ণ ইহাকে **হেলিবো** হইতে
প্রভেদিত করে। শেষোক্ত ঔষধে উপরি উক্তরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে না
এবং মুখ পাণ্ডুর ও শীতল হয়। প্রথমে নাদী পূর্ণ ও ধীরগতি, দ্বিতী-
য়ের তাহা ক্ষুদ্র, হ্রস্বল এবং প্রায় হ্রস্বোদা।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক—বাহ্যজ্ঞান-
শূন্য ও জড় ভাবাপন্ন রোগী মধ্যে মধ্যে অচেতন্যাবস্থায় চীৎকার করিয়া
উঠিলে **হেলিবোরাস** উপযোগী; মূত্র রোধ এবং চক্ষু আলোকে
প্রতিক্রিয়াহীন। স্বতঃই শরীরের অন্যতর পার্শ্ব চালিত হয়, ললাট,
পেশী কুঞ্চিত থাকে, মুখের অবিশ্রান্ত চর্কণবৎ চালনা হয় এবং
জল পান করিতে দিলে অতি আগ্রহের সহিত পান করে। ফলতঃ
মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়ের অবস্থায় ইহার কার্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; রোগী

অজ্ঞানবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত থাকে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে । ইন্দিয়জ্ঞান অবসাদিত থাকিলে অথবা পক্ষাঘাত আরম্ভ হইলে ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয় ।

ডিজিট্যালিস্—অভ্রাণ ও শ্বেতলালাযুক্ত মূত্র, নাড়ীর ধীরগতি এবং শীতল ঘন ইহা প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ ।

শক বা হঠাৎ স্নায়বিক অবসাদ—মস্তকে আঘাত লাগিলে পূর্বে **আনিকান** প্রয়োগ সম্বন্ধে স্নায়বিক অভিবৃতি বশতঃ গভীর নিদ্রা, একতর কণীনিকার বিস্তৃতি, বোধশক্তির অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ধীরে প্রথের উত্তর, একপদ টানিয়া চলা এবং নাড়ীর অতি ধীর গতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাং ফ্যারিংটন **হেলিবোরাস** দ্বারা তাহা আরোগ্য করিয়াছেন । রোগলক্ষণের উপচয় অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে হইয়াছিল ।

জলশোথ বা ড্রপসি—নানাপ্রকার ড্রপসিরোগে **হেলিবোরাসের** প্রভূত ক্ষমতা দেখা যায় । স্বকের জলশোথ, উদরী, আরক্ত জরাস্তিক শোথ এবং আচম্বিত ও তরুণ শোথের আক্রমণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার জলশোথরোগেই অবস্থানুসারে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায় । ইহার লক্ষণ মধ্যে **জিউনির আটা** বা **জেলির ন্যাস** আমযুক্ত **উদরাময়** এবং **কৃষ্ণবর্ণ অত্যন্ত মূত্রের বর্তমানতা** প্রধান । বলা বাহুল্য ঔষধ নিকাচনে তাহার সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সাফল্যের মূল । ইহার মস্তিষ্কশোথের বিষয় ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।

ল্যাকেসিস্—কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত-লালাযুক্ত মূত্র, কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলাভত্বক্, সাধারণ জলশোথ, এবং মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ প্রভৃতি, আরক্ত জরাস্তিক শোথে ও বক্ষঃশোথে ইহার প্রদর্শক ।

টেলিবিয়—কিউনির রক্তাধিক্য বশতঃ কিউনিদেশে মূত্র

কনকনানি এবং কৃষ্ণাভ ও ধূস্রের বর্ণ মুত্র প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য ।

কল্‌চিকাম—রসবাতরোগের উপসর্গ স্বরূপ শোথরোগে কৃষ্ণবর্ণ মুত্র থাকিলে ।

লাইক—যক্ষ্মরোগোৎপন্ন শোথ শরীরের নিম্নার্দ্ধ আক্রমণ করে, উদর বিবৃত হয় এবং নিম্নার্দ্ধে ক্ষত জন্মে ।

সবিরামজ্বর বা ইণ্টারমিটেন্ট ফিবার।—
পেশীমণ্ডলের শিথিলতা এবং শারীরিক শীতলতা, ললাটে শীতল ঘর্ম ও ধীর গতি নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত রোগী হঠাৎ ভূপতিত হইলে **হেলিবো** প্রযোজ্য । শরীরের চরম শীলতা সহ ভয়াবহ আক্ষেপ এবং জানুসন্ধিতে রসবাতিক বেদনা ।



লেকচার ৫২ (LECTURE LII).

হেলজেনস্ (Halogens)।

- ১। ব্রমিন্ (Bromine)।
- ২। ক্লোরিন্ (Chlorine)।
- ৩। ফ্লুরিকাম্ এসিডাম্ (Fluoricum Acidum)।
- ৪। আয়ডিন্ (Iodine)।

সাধারণ ক্রিয়া।—হেলজেন শ্রেণীর ঔষধমাত্রেয়ই শৈথিল্য বিহীন, বিশেষতঃ স্বরবয়স্ ও বায়ুনালী বা ব্রক্সিয়াল টিউবের শৈথিল্য বিহীন বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শৈথিল্য বিহীন উদ্ভেজনা ও প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করায় তাহার কাঁচা ও হাজাভাব জন্মে। সকল ঔষধেই খাসনলীদ্বারের বা গ্লটিসের আক্ষেপ উৎপন্ন হইলেও ক্লোরিনেই তাহা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত। শৈথিল্য বিহীন উপরিভাগে আগন্তুক বিহীন সংস্থাপিত করাও ইহাদিগের সাধারণ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ক্লোরিন বাতীত অল্প সকলেই ক্রুপ বা দুগ্লিকাসির আগন্তুক বিহীন নিৰ্ম্মাণ করে। ডিফ্টিরিয়াবৎ বিহীন নিৰ্ম্মাণপ্রবণতা ক্লোরিনেই অধিকতর। গ্রন্থিনিচয়ে ইহারা ক্ষীতি, দড়কচড়াভাব, কাঠিগ্র এবং পৃষশোণ পৃষান্তও উৎপন্ন করিতে পারে। এজগ্র ইহারা সকলেই সৌরিক ধাতুবিশিষ্ট রোগীর গণ্ডমালার ঔষধ শ্রেণীভুক্ত।

১। ব্রমিয়াম (Bromium)

উপচয়। সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্য রজনী পর্য্যন্ত; বাম পার্শ্ব অধিকতর আক্রান্ত হয়।

উপশম।—শরীর চালনায়; ভ্রমণে; অস্থারোহণে; আহারান্তে ও এমনিয়ার বাষ্পে।

সহস্রক্ৰ।—ব্রমিণের কার্য্যপ্রতিষেধক—বমন ও পরে খেতসার,

গোধূমচূর্ণ, আরাকুট প্রভৃতি স্নিগ্ধকর দ্রব্যের সেবন। এমনিয়ার বাস্পাচ্ছাণ ত্রিমিণবাস্পাচ্ছাণের কুফলের প্রতিষেধক।

শ্বাসঘন্ত্ররোগে ত্রিমিণের পরে আয়ডিন অথবা স্পঞ্জিয়ার প্রয়োগ সফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ।—আয়ডি, স্পঞ্জি, কেলি বাই।

লক্ষণ ।

মন।—রোগী মনে করে গৃহতল হইতে কোন দ্রব্য বা জন্তু লক্ষ্য প্রদান করিয়া উত্থান করিবে। গলাভাঙ্গা স্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ। অত্যন্ত মানসিক অবসাদ। মেজাজ ভাল থাকে না—বিমর্ষ।

মস্তক।—বামপার্শ্বে সাময়িক শিরঃশূল, মস্তক নত করিলে বৃদ্ধি এবং অনেক সময় গুরুপানে শিরঃশূল।

শ্রীশূল।—অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবসাদ। শীতকম্প, জ্বরণ ও গাত্রপ্রসারণ; পদ শীতল হইলে প্রতিদিন জরের শীতের স্থায় শীত প্রত্যাবর্তন করে। হস্ত শীতল ও আদ।

মুখ।—ধূসর ও নৃত্বর্ণ মুখ বৃদ্ধের স্থায় দেখায়। বোধ হয় বেন মুখমণ্ডলের উপরি ভাগে মাকড়সার জাল। শরীরে, বিশেষতঃ কণ্ঠা ও নিম্ন চুয়ালের উপর ঘন কঠিন ও স্ফীত গ্রন্থি।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর ল্যাক্রিম্যাল বা অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির স্ফীতি এবং জলস্রাব। বাম চক্ষু ভেদ করিয়া সূচিবেধবৎ বেদনা।

কর্ণ।—বাম পেরটিড গ্রন্থির দৃঢ় স্ফীতি, স্পর্শে উষ্ণ বোধ। বাম পেরটিড গ্রন্থি থাকিয়া যায়, পূর্বাণির্গমছিদ্রের চতুঃপার্শ্ব মসৃণ থাকে; স্রাব জলবৎ ও হাজাকর; স্ফীতি কঠিন ও অনমনীয় থাকিয়া যায়।

নাসিকা।—ভয়ানক সর্দির আক্রমণে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র রুদ্ধ ও

মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত ক্ষতযুক্ত, পরে বাম নাসারন্ধ্রে ও ত্রুপ । হাঁচি ও শ্রাবযুক্ত সর্দি, অনেক দিন অদমা থাকে ; নাসাপার্শ্ব ও নাসিকাধঃ-প্রদেশ হাজিরা যায় । নাসিকা ক্ষতযুক্ত ও স্ফীত, তাহাতে মামড়ি জন্মে, বেদনা হয় ও তাহা পুছিলে রক্ত পড়ে ।

শ্বাসশ্বাস।—স্বরযন্ত্রে শৈত্যের অনুভূতি ; শ্বাসগ্রহণে শীতল বোধ । স্বরযন্ত্রের সঙ্কোচন, তাহাতে শুড়শুড়ি বশতঃ কাসি । গিলিতে স্বরযন্ত্রের পশ্চাদ্দেশে সূচিবোধবৎ বেদনা নিবন্ধন সঙ্কোচনের অনুভূতি । স্বরযন্ত্রে টাঁছা ও অবদারণভাব, কাসি হইলে বোধ যেন কর্ণার কোটরবৎ স্থান চাপিয়া টুকিয়া বা শ্বাসনালী সহ সংযুক্ত করা হইয়াছে । স্বরভঙ্গ পরিষ্কার কথা বলা যায় না ; স্বরলোপ । গলাধঃকরণক্রিয়ায় হঠাৎ কাসির আক্রমণ বশতঃ শ্বাসরোধ ; শ্বাসপ্রশ্বাসের থর্কতা ; শ্বাসপ্রশ্বাসের চেষ্টা করিতে হয় । নিঃশ্বাস টানিলে শ্বাসনালীতে শুড়শুড়ি হওয়ায় কাসির উদ্বেক । স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপিক রোধ । বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচিবোধবৎ বেদনা । মধ্যে মধ্যে বলপ্রয়োগে গভীর শ্বাস টানিতে হয় । শ্বাসকৃচ্ছ ; উপযুক্ত পরিমাণ শ্বাস টানিতে অক্ষম, তাহাতে উৎকর্থা । বোধ হয় যেন শ্বাসযন্ত্রপথ ধূমপূর্ণ । দক্ষিণ কুস্কুস অধিকতর আক্রান্ত ।

গলাভ্যন্তর।—গলাভ্যন্তরে টাঁছা বোধ । গলাভ্যন্তরে ও তন্নিম্নের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্ফীতি ।

উদর।—উদরাদ্বাখান এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ ।

মল ও মলবার।—অস্রাবী এবং তীক্ষ্ণ বেদনায়ুক্ত অর্শ ও কাল বর্ণের মলত্যাগ ।

স্রীজননেদ্রিষ্ণ।—যোনি হইতে সশব্দে বায়ুনিঃসরণ । ঋতু অতি শীত্ৰাগত ও অতি প্রচুর, উজ্জল লোহিত শোণিতের মুচ্ শ্রাব নিবন্ধন অত্যন্ত বলক্ষয় ঘটে অথবা ঝিল্লির ছিবড়া বা মেম্ব্রেনাস্ স্রেড্‌স্ নির্গত হয় । ঋতুশ্রাবের সময়ে কিছা তাহার পূর্বে প্রচণ্ড সঙ্কোচনবৎ আক্ষেপ

হইলে তাহা বহুকাল স্থায়ী হয় এবং পরে উদরের টাটানি থাকিয়া যায় ।
রজঃকৃচ্ছ, বা বাধকবেদনায় বিল্লি নির্গত হয় ।

অক্ষু।—গ্রন্থির, বিশেষতঃ থাইরয়েড, অণ্ডকোষ, হৃদয় এবং
পেরটিড গ্রন্থির স্ফীতি দড়িকচড়াভাব । বাহু এবং মুখে স্ফোটক ।

প্রদর্শক লক্ষণ।—ত্রমিণ গণ্ডমালা রোগ প্রশমনকারী
অগতম ঔষধ । ইহা এবং এই পর্যায়ের অনেক ঔষধ বর্ণাদিও শরীর-
কৃতি দ্বারা পরিচিত । শরীরাকার দ্বারা ইহা হেলজেন শ্রেণীভুক্ত
আয়ডিন হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত । ত্রমিণ—ভাসা নীলচক্ষু,
শনমূত্রবৎ কেশ, পাতলা ক্র, সুন্দর গাত্রবর্ণ,
কোমল অক্ষু এবং লোহিতাভ গণ্ড । আইওডিন—
কাল কেশ ও কাল চক্ষু এবং কুৎসিত ঈষৎ
পীতাভ গাত্র । “মুখনগলে মাকড়সার জালের অহুভূতি” ও
কখন কখন ইহার প্রদর্শক হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ লক্ষণ দ্বারা
এ স্থলে ইহাকে ব্যালাইটা, গ্রাফা এবং বোরাক্স হইতে
প্রভেদিত করিতে হয় ।

চিকিৎসা ।

নাসিকা সর্দি।—কখন কখন ত্রমিণ দ্বারা গণ্ডমালীয়া
শিঙদিগের সর্দিরোগের উপকার হইয়া থাকে । নাসিকা হইতে প্রচুর
জলবৎ ও বিদাহী স্রাব । নাসিকারক্ষু পর্যায়ক্রমে সূক্ত ও রুদ্ধ বোধ ;
বিশেষ প্রকারের শিল্পশূলে ললাটপ্রদেশে গুরু
চাপ বশতঃ বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক নামামূল ভেদ করিয়া ঠেলিয়া বাহির
হইতেছে । নাসিকাভ্যন্তর ও নাসাপুটের চতুর্দিকে অবদারণ ভাব
জন্মিয়া ত্রমিণ বাষ্প সংস্পর্শবৎ চনচন করে । পরে নাসারন্ধ্রে
ক্ষত ও মামড়ি জন্মে এবং নাক ঝাড়িলেই রক্ত ও মামড়ি নির্গত হয় ।

ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্‌ স্ট্রাইডুলাস্‌ বা স্ক্রলশন্থারের
আক্ষেপ।—রোগ বড়ই ক্লান্তসাধ্য । অনেক সময় ইহা স্নায়ুকেন্দ্রের
উত্তেজনা বশতঃ জন্মে । দন্তোদ্যম, অর্জীর্ণ ও থাইমাস্‌ গ্রন্থির বৃদ্ধি
প্রভৃতি কারণোৎপন্ন উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াও ইহার কারণ হইতে
পারে । প্রথমে আক্ষেপ বশতঃ হঠাৎ স্বরযন্ত্রদ্বারের রোধ ঘটে, শিশুর মুখ
নীল হইয়া যায় ও শারীরিক আক্ষেপ হয় । এইরূপে ফিটের পর ফিট
হইতে থাকে । রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় আক্ষেপ সর্কাস্কে ব্যাপ্ত হইতে থাকে
এবং শিশু শীর্ণ হইয়া যায় । থাইমাস্‌গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, রোগের কারণ হইলে
আইওডিন, এবং দন্তোদ্যমের বাধা জন্ম রোগ জন্মিলে
ক্যাল্‌কে ফস্‌ প্রদর্শিত । এ রোগে **ত্রিমিনের** কোন
বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না থাকিলেও ইহা স্বরযন্ত্রদ্বারের ভয়াবহ
আক্ষেপ উৎপন্ন করে বলিয়া কোন ঔষধে ফললাভ না হইলে অনেক
স্থলে ইহা দ্বারা ফললাভ করা যায় । কিন্তু **ক্লরিনাই** এ রোগে
হেলজেন শ্রেণীর ঔষধমধ্যে শ্রেষ্ঠতম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় ।

ল্যাকেসিস্‌—নিদ্রাবস্থায় রোগ হওয়ায় শিশু জাগ্রত হইলে ।

ইম্পেসিস্‌—শিশুকে তিরস্কার বা শাসন করিগেই যদি রোগের
আক্রমণ হয় ।

কুপ্রাম—রোগে সর্কাস্কাণ আক্ষেপ কালে বৃদ্ধাস্থলি আকৃষ্ট
হইলে ।

কেহ কেহ **ইপিকা** ও **স্যান্ডুকাস্‌** প্রয়োগের উপদেশ দিয়া
থাকেন । **বেলাডনা** শোণিত প্রধান রোগীর ঔষধ ।

সুংরি কাসি বা ক্রুপ্‌।—ত্রমিন ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ-
মধ্যে গণ্য । ইহাতে শিশুর স্বর গতীর ও গলাভাঙ্গা থাকে এবং শ্বাস
টানিবার চেষ্টা করিলেই কাসি হয় ; শ্বাসপ্রশ্বাস কর্কশ এবং করাতের
শব্দের ও বাঁশীর স্বরের স্থায় থাকে এবং গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে ; শিশু

কামিলে স্বরযন্ত্র শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ত্রিমিণ রোগে বোধ হয় যেন শ্বাসরোধবশতঃ শিশু হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। এক ভোক জল পান করিলে আক্ষেপের নিস্বৃতি হয়। স্বরযন্ত্রমধ্যে ঝিল্লি অংশ বিশেষ আল্গা থাকায় ঘড়ঘড়ি হওয়ার অনুভূতি ত্রিমিণের প্রদর্শক। রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। এন্টিম্ টার্ভের ঘড়ঘড়ি ইহার নিম্নতর স্থানে হয়।

হিপার সংস্থাপিত ঝিল্লি দূরীকরণে অসমর্থ হইলে ত্রিমিণ প্রযোজ্য। অত্যন্ত শ্বাসরোধের ভাব হওয়ার শিশুকে কোলে করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে শাতাস্নাত করার আবশ্যিকতা এখানে ইহার প্রদর্শক। আঙ্গুড়িনের পর ত্রিমিণ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। ছয় আউন্স জলে এক ফোঁটা বিস্তৃত ত্রিমিণের টাটকা দ্রব প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, কেননা ইহার প্রয়োগরূপ কিয়ৎকাল থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়।

নিউমনিয়া।—দক্ষিণ কুস্কুসের নিম্ন উপখণ্ড আক্রান্ত হইলে যদি 'নামসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় তাহাতে ত্রিমিণ উপযোগী ঔষধ। “রোগী বোধ করে যেন সে কুস্কুসে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু লইতে পারিতেছে না” এ লক্ষণও ইহার প্রদর্শক।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সিম্বাল্লিক দূষিত গলম্ফত।—ইহার রোগ প্রধানতঃ স্বরযন্ত্র আক্রমণ করে এবং তথা হইতে উর্দ্ধগামীও হইতে পারে। ইহাকে “ক্রুপয়েড্, ফরম্” বা ঘুবিংকাসি জাতীয় ডিফ্‌থিরিয়া বলা যায়। পচন বা গ্যাংগ্রিণ আরম্ভ হইলে ত্রিমিণ দ্বারা ফল পাওয়া যায় না। স্বরযন্ত্রে অত্যন্ত শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি হয় এবং গলাভাঙ্গাস্বরে হুস্‌হুস্‌ করিয়া ও ক্রুপের শ্বাস কাসি হইতে থাকে; তাহাতে শ্বাসরোধ ঘটে।

গণ্ডমালারোগ বা ফ্লুফুলোসিস্—গ্রন্থিরোগ ; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ প্রভৃতি।—হেলজেন শ্রেণী-ভুক্ত ঔষধ মাত্রই লসীকাগ্রন্থিমণ্ডল আক্রমণ করায় তাহাদিগের ক্ষীতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মে ও অবস্থানুসারে তাহাতে পুণ্ড জন্মিতে পারে। একত্র ইহার গণ্ডমালারোগের ঔষধ বলিয়া খ্যাত। নীলচক্ষু, শবের ছায় কেশ, মন্থণ ও কোমলগাত্র এবং গোরবর্ণের গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তির, বিশেষতঃ শিশুদিগের গ্রন্থিরোগে ত্রমিন উপযোগী। ইহাদিগের পেরিটিড বা কর্ণমূল গ্রন্থি আক্রান্ত হইলে তাহাতে দড়কচড়াভাব ও পুণ্ডজনন প্রবণতা জন্মে। গ্রন্থিতে অত্যন্ত তাপ থাকে ও তাহা হইতে উগ্র ও হাজার পুণ্ডস্রাব হয়, এবং ছিদ্রমুখের চতুঃপার্শ্বীয় স্থানে অদমা কাঠিষ্ক দৃষ্ট হয়। ত্রমিনের গ্রন্থিরোগ মাত্রেরই উপরিউক্তরূপ অবস্থা ঘটে। স্তনের কর্কটরোগে ইহা দ্বারা উপকার হইয়াছে। কার্ক এনিমালিস সহ ইহার সাদৃশ্য আছে। উভয় ঔষধেই কক্ষতলের গ্রন্থির কাঠিষ্ক, দড়কচড়াভাব ও জ্বালাযুক্ত বেদনা হয়। প্রভেদ এই যে ত্রমিনে কর্কটন বা আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে ও তাহার বৃদ্ধি হইলে বোধ হয় যেন স্ত্রদ্বারা গ্রন্থি কক্ষনধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে। অণ্ডকোষ-রোগেও অবস্থা বিশেষে ত্রমিন উপকারী। গ্রন্থি ক্ষীত, কঠিন ও সম্পূর্ণ মন্থণ থাকে। ঝাঁকি লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি। গ্রন্থি অত্যন্ত গরম। ফলতঃ রোগীর গোরবর্ণ, কোমল ত্বক্ এবং ফেকাসে নীলচক্ষু ইহাকে অগ্রাণ্ড হেলজেন পর্যায়ের ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে। গলগণ্ড বা গলগণ্ডার রোগ এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ক্ষত বা আল্‌সার।—ত্রমিনক্ষতের চতুঃপার্শ্ব সব্জাত পীতবর্ণ। ইহার পচনোন্মুখ ক্ষতে গলিত মাংসের গন্ধ থাকে।

আস্বাভিনেত্র গণ্ডমালীয়া ক্ষতের কিনারা স্পঞ্জবৎ এবং শ্রাব রক্তসংযুক্ত, ক্ষতকর, এমন কি পূয়ের শ্রায়ও হইতে পারে।

২। ক্লোরিন (CHLORINE)।

ইহা প্রচলিত ঔষধমধ্যে গণ্য নহে। তথাপি কখন কখন রোগ-চিকিৎসায় **ক্লোরিনের বাষ্প** বরফের শ্রায় শীতল জলে শোষিত করাইয়া তাহার আত্মাণ ও পান দ্বারা কেহ কেহ কোন কোন স্থলে ফল পাইয়াছেন। তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

শৈল্পিক বিহ্নিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার বিষয় চিকিৎসক মণ্ডলীতে বিদিত। এজগৎ ইহা নিম্নলিখিত রোগে সফলপ্রদ বলিয়া খ্যাত।

ল্যারিঞ্জিটস্ প্রাইডুলাস্—পূর্ব লিখিতরূপে প্রস্তুত জলের সেবন ও আত্মাণ স্থলবিশেষে কার্য্য করিয়াছে।

নাসিকা সর্দি—সর্দিতে নাসিকা হইতে জলবৎ পাতলা ও হাজাকর শ্রাব নির্গত হইয়া নাসিকারন্ধ্র, নাসাপুট ও তনিকটস্থ স্থানের অবদারণ জন্মাইকে ইহা উপকারী।

মুখক্ষত—মুখগহ্বরে মৃৎ প্রকৃতির প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় পুতিগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “জাড়ি ঘায়ের” শ্রায় ক্ষত জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার সাধিত হয়।

সন্নিপাত বা টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরে রোগীর ভয়াবহ দুর্বলতা সহ সাল্ফাসাল্টাস্ টেণ্ডিনাম বা পেনীকম্প এবং জিহ্বার অত্যধিক শুষ্কতা থাকিলে **ক্লোরিনের** দ্রব প্রয়োগে উপকার হয়।

ক্লোরিন সাল্ফুরেটেড্ হাইড্রজেনের বিযাক্ততার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

৩। আয়ডিন (IODINE) ।

উপচয়।—তাপে ; মস্তক আবৃত করিলে ।

সম্বন্ধ।—আইওডিনের কার্যপ্রতিষেধক—এন্টি টার্ট, আর্স, বেল, ক্যান্ফর, সিকনা, সিক সাল্ফ, কফিয়া, হিপার সাল্ফ, ওপি, ফস্, স্পঞ্জ, সাল্ফ । বিষমাত্রায় স্বেতসার বা ময়দার দ্রব ।

আয়ডিন যাহার কার্যপ্রতিষেধক—আর্সের কুফলের ; এবং আর্জে নাই, ক্যাকে কার্ক এবং মার্ক্যারির ।

আয়ডিন যাহার পরে প্রযোজ্য—হিপার, মার্ক ।

আয়ডিনের পরে প্রযোজ্য—কুপরোগে কেলি বাই ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, ব্রিগি, কষ্টি, কনায়াম, ডিজি, হিপার সাল্ফ, কেলি বাই, মার্ক, নাই এসি, ফস্, স্পঞ্জ, সাল্ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া।—হেলজেনশ্রেণির ঔষধ মধ্যে ক্রিয়ার ব্যাপকতায় আয়ডিন সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে । ইহা প্রায় সম্পূর্ণ দেহোপাদান, বিশেষতঃ লসীকাগ্রস্থি এবং শ্লেষ্মিকঝিল্লি অতি প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে । ইহা তাহাদিগের অবসাদ ও সজীবতার হানি উৎপন্ন করার তাহারা পুনরুৎপাদিকাশক্তিহীন হইয়া যায় এবং তাহাদিগের বাধাপ্রাপ্ত ক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত শরীরাত্মের ক্ষয়, এমন কি, ধ্বংস ও সর্বাঙ্গীণ শীর্ণতা উৎপন্ন হয় । আয়ডিন গ্রন্থির পুনরুৎপাদিকা ক্রিয়ার হ্রাস করার ফল স্বরূপ স্বাভাবিক উপাদানের বিনিময়ে সৌত্রিকোপাদানের অতি বৃদ্ধি বশতঃ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি জন্মে, এবং থাইরয়েড্ গ্রন্থির একরূপ বর্ধন গলগণ্ড রোগোৎপন্ন করে । এবিধ কারণেই অবস্থানুসারে গ্রন্থির ক্ষয় জন্মিলে তাহা শুষ্ক ও প্রায় অদৃশ্য হইতে পারে । গ্রন্থিমণ্ডলের মধ্যে ইহা থাইরয়েড্ গ্রন্থি, অল্পবেষ্টঝিল্লিগ্রন্থি বা মেসেন্টারিক গ্রন্থি, স্তন, অণ্ডাধার এবং অণ্ডকোষ বিশেষ ও প্রধানরূপে আক্রমণ করে । শ্লেষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে চক্ষু, নাসিকা এবং সম্পূর্ণ শ্বাসযন্ত্রের

শৈল্পিকঝিল্লি ইহা বিশেষরূপে আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ উপস্থিত হয়। ইহা ফুস্ফুস এবং অণ্ডাণ্ড যন্ত্রের মূল উপাদানেরও প্রদাহ জন্মাইতে পারে। আয়ডিনক্রিয়ায় বিশেষতা এই যে, ইহার প্রায় সর্ববিধ রোগজ অবস্থাতেই আক্রান্ত শরীরাত্ংশের ও সর্বদ্বৈয়ের শীর্ণতা, প্রধান লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে।

লক্ষণ।

মন।—দুঃখিত ভাব; বিষণ্ণতাগ্রস্ত মানসিক বৃত্তি। অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা।

মস্তক।—শিরোধ্বনি; মস্তকে এবং সম্পূর্ণ শরীরে স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডস্থানে কম্প ও মূর্ছার ভাব; এই সকল লক্ষণ উপবিষ্ট বা শায়িতাবস্থা হইতে উত্থানের পরেই, অথবা সানাত্ত পরিশ্রমের পর উপবেশন বা শয়ন মাত্রই বৃদ্ধি পায়। মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব বশতঃ কার্যে মনঃসংযোগ করায় অনিচ্ছা জন্মে। মস্তক বেড়িয়া ফিতা বাঁধা থাকার ঞ্চায় শিরঃশূল। নাসিকামূলের উর্দ্ধে অল্প স্থান ব্যাপিয়া বেদনা। সন্ধ্যাকালে চক্ষুর উর্দ্ধে বেদনা, গোলমালে অথবা গলে বৃদ্ধি পায়। ললাটের বাম পার্শ্বের উর্দ্ধে তীব্র বেদনা। পূর্বাহ্ন ১১ টার পূর্বের মস্তকপশ্চাতের বেদনার বিশ্রামে হ্রাস ও শরীরচালনায় বৃদ্ধি এবং অপরাহ্ন ৪ টার সময় পরিবর্তিত হইয়া মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাবে পরিণত।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান। শ্রবণশক্তির হ্রাস।

স্নানু।—অত্যন্ত দুর্বলতা। পেশী-আনর্জন। প্রচুর নৈশশ্বাস। ক্ষত শরীরক্ষয়। সম্পূর্ণ শরীরে কম্প।

মুখমণ্ডল।—মুখ পাণ্ডুর, দ্বিষৎ পীতাত অথবা দ্বিষৎ সবুজ, সমল পীতবর্ণ ও ক্লেশব্যঞ্জক। ওষ্ঠ নীলাভ ও তত্হপরি শিরানিচয়ের স্পষ্টতা। হৃদয়গ্রন্থি ক্ষীণ।

চক্ষু।—সমল পীতবর্ণ শুভ্রাংশ। বহির্নিষ্ক্রান্ত চক্ষুগোলকে শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত প্রদাহ। চক্ষুতে অবদারণবৎ বেদনা। শোথ জন্তু চক্ষুপুটের ক্ষীতি।

শ্বাসসম্বন্ধ—নাসিকা।—শুক্ণ সর্দি সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত ও মুক্ত বায়ুতে স্রাবযুক্ত। সরল সর্দিতে অনেক হাঁচি এবং হঠাৎ প্রচণ্ড সর্দি হইলে চক্ষুতে বেদনা ও অশ্রুস্রাব; পরে প্রচণ্ড কাসি, বিবিধিয়া এবং কষ্টকর, প্রায় সাঁই সাঁই শব্দের শ্বাস প্রস্থানে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের বহির্দেশ সঙ্কুচিত। নাক ঝাড়িলে প্রচুর হল্‌দে শ্লেষ্মা পড়ে।

অন্যান্য শ্বাসসম্বন্ধ।—স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্র বেদনায় কাসির প্রবৃত্তি; স্বরযন্ত্রে ও জিহ্বানিম্নগ্রস্থিতে বারম্বার বেদনা ও স্থচিবোধ বোধ। শ্বাসনলী প্রদেশে চনচনি ও পুনঃ পুনঃ ছুরিকাবাতবৎ বেদনা। ঘূর্নিকাসিবৎ কাসি। শ্বাসপ্রশ্বাস, বিশেষতঃ, শ্বাস কমা ভাবের ও কষ্টকর। কাসির সহিত শৌ শৌ শব্দের ও করাৎ চালনাবৎ শ্বাস প্রশ্বাস। বক্ষের স্থচিবোধবৎ বেদনা এবং সঝিল্লিক ঘূর্নিকাসি। কাসিলে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠে ও তাহা অনেক সময় শোণিতরেথাযুক্ত থাকে। বক্ষের দুর্বলতা বোধ। বক্ষের সঙ্কুচিত ভাব। বিদ্ধ করার গায় তীক্ষ্ণ বেদনা। বায়ুনলী ও ফুসফুস রক্তাধিক্য-প্রবণ ও শোণিতস্রাবযুক্ত। নিরেটাবস্থা দক্ষিণ ফুসফুসের উর্দ্ধাংশে অধিকতর; কখন কখন অতি শীঘ্র একরূপ ঘটে; বক্ষের আড়া আড়ি ভাবে কমাভাব।

হৃৎপিণ্ড—প্রচণ্ড হৃৎকম্প; সামান্য পরিশ্রমে বর্দ্ধিত। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবিশ্রান্ত গুরু কষ্টপ্রদ বেদনাসহ তীক্ষ্ণ, দ্রুত, বিদ্ধ করার গায়, চলনশীল বেদনা। হৃৎপ্রদেশে উৎকর্ষা বশতঃ রোগী অবিরত অবস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য। দ্রুত, ক্ষুদ্র ও দুর্বল নাড়ীসহ শৃঙ্খলাশূন্য ও অনিয়মিত এবং সগয়ে সময়ে ক্ষণলোপবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডক্রিয়া।

মুখ-মণ্ডল। মুখপাণ্ডুর, ঈষৎ পীত, অথবা ঈষৎ হরিৎ। মুখমণ্ডল দৃশ্য মলিন ও কষ্টবাজক। ঈষৎ নীল ওষ্ঠসহ উপরি দেশের শিরাশ্ফীতি। চুয়াল নিয়গ্রহির শ্ফীতি।

মুখগহ্বর।—দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব। দন্তমাড়ির কোমলতা। প্রাতঃকালে দন্ত অনেক শ্লেষ্মাবৃত থাকে; পীতাভ দন্ত উদ্বিগ্নজ্ঞান সংশ্রবে সহজেই অসাড় হইয়া যায়। মুখে জাড়ি ঘা। মুখের দুর্গন্ধ। লালাস্রাব। পারদ সেবনান্তর লালাস্রাব। জিহ্বায় পুরু লেপ।

গলাভ্যন্তর।—কণ্ঠায় সঞ্চেচন বশতঃ গেলার ব্যাঘাত। গল-ক্ষতের সহিত গ্রীবাগ্রহির শ্ফীতি। অন্ননলীর প্রদাহ ও ক্ষত।

আমাশয়।—কাকের ক্ষুধার হ্রাস ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধার হ্রাস এবং অভাব; বিবিধা; আহারান্তে বমনের পুনরাবর্তন। ভূষণ। অপরিপাচ্য বস্তু আহারে বুকজালা।

উদর।—আমাশয়োপরিস্থ কোটরবৎ প্রদেশ ও নাভির মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা। বক্রতের প্রদাহ নিবন্ধন বেদনা, শ্ফীতি ও কাঠিত্ব। দক্ষিণ কুক্ষিদেশে চাপ ও স্পর্শ বেদনা। বাম কুক্ষি কঠিন ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত। উদরের শ্ফীতি ও বিস্তৃতি। অঙ্গে বায়ুর অবরোধ। কুচকির গ্রস্থি শ্ফীতি।

মল ও মলবার।—সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে জালা। পর্যায়-ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। বিষ্ঠা জলবৎ; সাদাটে আমের বিষ্ঠায় ফেন উঠে; পুনঃপুনঃ কোমল মলতাগ।

মূত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রতাগ। অটনচ্ছিক মূত্রস্রাব।

পুংজননেদ্রিস্র।—অণুকোষের শ্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব।

স্রীজননেদ্রিস্র।—জরায়ু এবং অণুধারের শ্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব। দক্ষিণ অণুধার হইতে জরায়ু পর্যন্ত একথও কাঠ আবদ্ধ থাকার হ্রাস বেদনা। স্তন ক্রমশঃ ক্ষয় শুষ্ক হইয়া যায় ও শিথিল হইয়া পড়ে;

ক্ষয়রোগ। প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর জরায়ুর রক্তস্রাবের পুনরাবর্তন।
শ্বেতপ্রদর তীব্র এবং অঙ্গাদির ক্ষতকর এবং ঋতুকালে বদ্ধিত।

গ্রীবা।—স্পষ্টতঃ কঠিন গলগণ্ড। গ্রীবাগ্রস্থির স্ফীতি ও
দড়কচড়া ভাব।

অক্ষ প্রত্যক্ষ।—হস্ত, পদ উভয়েরই পেশীকম্প বা সাব্‌স্ট্যান্টাস্
টেণ্ডিনাম। তক্ষ নিচয়ের কম্প। বাম-কল্পই-সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা।
জলসঞ্চয় বশতঃ পদের স্ফীতি। তীব্র, ক্ষয়কারী পদবন্দ্য।

স্রব্ধ।—স্রব্ধ সমল-পীতবর্ণ চট্‌চটে ও আর্দ্র, কখন কৰ্কশ ও শুষ্ক।

প্রদর্শক লক্ষণ।—প্রায় প্রত্যেক রোগেই আইওডিন
তাহার কোন না কোন বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রদর্শিত হয়। ইহার রোগবর্ণনা
কালে যথাস্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। তীব্র অস্বাভা-
বিক ক্ষুধাস্থ অত্যধিক আহার, আহারকালে
এবং পরে কিছুকালের জন্ম ভূপ্তিবোধ;
শরীরাস্ততন তুলনাস্থ অধিকতর ভক্ষণ এবং
ক্রমশঃ শরীর শীর্ণতা ইহার প্রায় সাধারণ
রোগেরই প্রথমস্থানীস্ব প্রদর্শক লক্ষণ বদিয়া পরিগণিত।

গণ্ডমালীয় রোগীর গ্রন্থি, বিশেষতঃ অল্পবেষ্ট-
ঝিল্লির গ্রন্থি বা মেসেন্টারিক গ্রন্থি এবং
থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব
এবং তাহার সহিত স্ত্রীরোগীদিগের স্তনের ক্ষয় প্রভৃতি
লক্ষণও আঙ্গুড়িনের প্রদর্শক।

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের শরীরাকারের বিভিন্নতা ও বিশেষতা-
হুসারে বিশেষ বিশেষ ঔষধের নির্বাচন হইয়া থাকে। আঙ্গুড়িন-
রোগীর ক্রমবর্ণ অথবা কাল কেশ এবং চক্ষু
এবং তাহার বিশেষ প্রকারের রোগ জীর্ণ,

অত্যধিক ক্ষয়প্রাপ্ত এবং **শীর্ণদেহ** প্রভৃতি আয়ডিনকে **অন্যান্য** গণ্ডমালীয় ঔষধ হইতে, বিশেষতঃ হেলজেন শ্রেণীভুক্ত ঔষধ হইতে প্রভেদ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ঘুংলিকাসি বা ক্রুপ।—আয়ডিনের ঔষধগুণ পরীক্ষায় স্বরভঙ্গ, শুষ্ক, কর্কশ ও গভীর কাসি, স্বরযন্ত্রের বেদনা, সাঁই সাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, স্বরযন্ত্রে বাধ বাধ বোধ প্রভৃতি লক্ষণ; অপিচ ইহার বিষাক্ত রোগীর স্বরযন্ত্রদ্বারে (স্বতন্ত্রী, vocal cords) এবং তদবস্থ স্বরযন্ত্রাংশে আগন্তুক বিল্লির সংস্থিতি প্রভৃতি অতি স্পষ্টতর ঘুংলিকাসিবৎ লক্ষণ দৃষ্ট হওয়ায় ইহা ঘুংলিকাসির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কাথ্যক্ষেত্রেও কঠিনতর সঝিল্লিক রোগে ইহার উপকারিতা ভূয়ঃ প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাতিষ্ঠায়িক রোগাপেক্ষা ঝিল্লিজনক রোগেই ইহা অধিকতর উপকারী। রোগের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হইলে ইহা তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ। ঝিল্লি সংস্থিতির পরে প্রয়োগ করিলে ইহা ঝিল্লির শোষণ বা দ্রবীকরণ দ্বারা রোগারোগ্য করে। ফলতঃ ইহা রোগের সর্বাবস্থাতেই সফলপ্রদ। রোগী শক্তিহীনতা বশতঃ শীঘ্র আরোগ্য চিহ্ন প্রকাশ না করিলে নিরাময়িক শক্তি উত্তেজিত করিয়া ইহা রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়া থাকে।

শুষ্ক, ক্ষুদ্র, খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি, শোঁ শোঁ ও খর খর শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ, এবং শ্বাসরোধের উপক্রম ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। কাসির ধাতুপাত্রবৎ খ্যান্‌থেনে স্বরের পরিবর্তে আচ্ছাদিত ধাতুপাত্র হইতে যেরূপ অস্পষ্ট শব্দ বাহির হয়, তক্রূপ শব্দ হইলেও ইহার কার্য্য-কারিতার অভাব হয় না। রোগী ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করিতে চাহে; এবং ইহা কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী।

ডাঃ ডিউই শতকরা এক অংশ ঔষধ দ্রবের ৩ ফোটা করিয়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে বলেন। অধিককাল ব্যাপিয়া সেন্টা আবহাওয়ার মধ্যে থাকায় রোগ জন্মিলে যদি **ব্রিমিণ** জরূপে ক্ষা জ্বর অধিকতর থাকে, তাহাতে ইহার ব্যবহার সফলপ্রদ। **হিপাল** প্রয়োগান্তেও যদি রোগনিঃসারণ ঝিল্লির আকার ধারণ করে, তাহাতেও **আস্কাডিন** সফল দেয়। রোগ কঠিন হইলে কোন কোন চিকিৎসক ১×ক্রমের ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

নিউমনিয়া।—রোগের প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় অবস্থাতেই **আস্কাডিন** প্রযুক্ত হইতে পারে; ক্রুপাস্ বা ফুরিকাসিৎ ঝিল্লি-উৎপাদক রোগেই ইহা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে **একনের** ত্রায় প্রবল জ্বর ও অস্থিরতা থাকে এবং রোগ সঞ্চারিত হইয়া ক্রত ফুসফুসের নিরেটাবস্থা (হিপ্যাটিজেশন) উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। নিউমনিয়ার পরিচায়ক সুস্পষ্ট কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ থাকায় বোধ হয় যেন বক্ষ প্রসারিত হইবে না; শোণিতরেখায়ুক্ত গয়ার যদি রোগের শেষাবস্থায় সহজে আরোগ্য (Resolution) না হয় এবং ফুসফুসের ধ্বংস, প্রলেপক বা হেষ্টিক জ্বর এবং পূয়সঞ্চারের লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেও **আস্কাডিন** উপকার করিতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ কাফকা নিউমোনিয়ার বহির্লক্ষণ উপস্থিত হইলেই প্রতি ঘণ্টায় ১×, ২× অথবা ৩× ক্রমের **আস্কাডিন** এক ফোটা মাত্রায় প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন এবং তিনি বলিতেন “২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুসফুসের নিরেটাবস্থা সংশোধনে ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে।” তিনি **একনাইট্** ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। ডাঃ টি, এফ, এলেন্ও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন।

হৃদ্রোগ বা হার্ট ডিজিজ—হৃদ্বিক্রম বা হাইপারট্রফি অব্দি হার্ট্।—হৃৎপিণ্ডকপাটরোগ বা

ভাল্ভুলার ডিজিজ্, থাকুক বা না থাকুক, হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধির অবস্থাহুসারে
আয়ুর্ডিন ফলপ্রদ । হস্তের পরিশ্রমসাধ্য কার্যে হৃৎকম্প জন্মে ।
স্ক্রাম্বল ব্যক্তিদিগের রোগে ইহা উপযোগী । বোধ হয় যেন
 হৃৎপিণ্ড হস্তদ্বারা সবলে চাপিত হইতেছে । কখন বা বক্ষের দুর্বলতা
 বশতঃ তথায় “কিছু নাই নাই” (Goneness) ভাব উপস্থিত হয়, এবং
 দুর্বলতা নিবন্ধন রোগী কষ্টে কথা কহিতে বা শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে পারে ।
 হৃৎকম্পটির যান্ত্রিক রোগে বক্ষোপরি কর স্থাপন করিলে রণৎকার বা
 পারিং (Purring tremor) অনুভূত হয় । **স্পাইজিলিস্বাতেও**
 বক্ষের হৃৎ প্রদেশে কর স্থাপনে রণৎকার বা মৃচকম্পভাব অনুভব করা যায় ।

উদরাময় বা ডায়ারিহা—**আয়ুর্ডিনের**
 উদরাময়ে বিষ্ঠা সাদাটে এবং কখন কখন খইলের ছায় । সাদাটে বিষ্ঠা
 থাকিলে কোন প্রকার যক্ষ্মরোগ এবং তাহা খইলবৎ হইলে কোন
 অপ্রকাশিত প্যানক্রিয়াগ্রন্থির রোগ সূচিত হয় । ইহাতে প্লাহা বিলক্ষণ
 কঠিন ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত হয় এবং **অতিক্ষুধা** প্রকৃতি **আয়ুর্-**
ডিনের প্রদর্শক লক্ষণ উপস্থিত থাকে ।

গণ্ডমালারোগ বা ক্ষুফুলা—**গ্রন্থিরোগ**—
আয়ুর্ডিনের গণ্ডমালাঘটিত গ্রন্থিরোগে গ্রন্থি বিবৃদ্ধ, কঠিন, জড়-
 ভাবাপন্ন এবং বেদনাহীন থাকে । ফলতঃ তাহাতে কোন প্রকার
 ক্রিয়োত্তেজনার চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হয় না । গ্রন্থিরোগের উপরি উক্ত প্রকৃতি,
 যে কোন গ্রন্থির রোগে সম্ভব্য হইলেও গ্রীবাগ্রন্থিতেই বিশেষ পরিস্ফুট ।

পল্লগণ্ডরোগে শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা জন্মিলে অনেক সময়ে
 ইহার দ্বারা উপকার হইয়া থাকে ; কিন্তু ডাং বেজ বলেন “অল্প ঔষধের
 সাহায্য ব্যতীত ইহা কচিৎ ফলপ্রদ ।” বায়ুনলীগ্রন্থি ও অন্তবেষ্টক্লি-
 গ্রন্থি বা মেসেণ্টারিক গ্রন্থি প্রভৃতির বিবৃদ্ধি-রোগে অনেক সময়ে ইহা দ্বারা
 উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । **আয়ুর্ডিনের** অত্যন্ত ঔষগিক

ঔষধ স্থলবিশেষে বিশেষ ফল প্রদান করে। টনসিলগ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ব্যাণ্ডা আয়ু এবং রক্তশূন্য রোগীর গ্রন্থিবিবৃদ্ধিতে আর্স আয়ু ও ফেরাস আয়ু মহত্বপূর্ণ করিয়াছে। গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি এবং রক্তাধিক্য জন্মিলে অনেক সময়ে ক্যাঙ্কর আয়ু অমোঘ ঔষধ বনিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ক্লম্বওবর্ণ শরীর ও চক্ষু বিশিষ্ট শীর্ণকায় এবং অতিক্ষুধাপীড়িত রোগীদের পক্ষে ইহা উপযোগী। রক্ত গ্রন্থির জড়ভাব ইহার বিশেষ প্রদর্শক।

শিশুক্ষয়রোগ বা মারেস্‌মাস্—এ রোগের চিকিৎসায় আয়ুডিন অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং তদনুরূপই আহার করে, তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়। নানাধিক জরযুক্ত তরুণ রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। গ্রন্থিমণ্ডলী জড় প্রকৃতি ধারণ করে ও ক্রিয়াহীন হয়, এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও সঙ্কুচিত থাকে। ইহা নেট মিউ সহ তুলনীয় হইলেও তাহার গ্রীবা দেশের অধিকতর শীর্ণতা অতি সুস্পষ্ট প্রভেদক বনিয়া বিদিত।

ক্যান্সার বা কর্কটরোগ—আয়ুডিন ধাতুর স্ত্রীরোগীর অতিক্ষুধা ও শীর্ণতা প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, উগ্র ও ক্ষয়কর স্বেদপ্রদর এবং অত্যন্ত শোণিতস্রাবযুক্ত জরায়ুর কর্কটরোগে আয়ুডিন দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

এডিসন্স্ ডিজিজ্—ইহা এক প্রকার অনির্গীত ও ক্লচ্ছসাধা বা অসাধা রোগ। এডিসন্স্ ইহার সহিত অনির্গীত লক্ষণ-বিশিষ্ট সুপ্রারিত্তাল্ ক্যাপ্‌হুলের বা গ্রন্থির ক্ষয় লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুস্পষ্ট রক্তহীনতা, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পেশীত্বহীনতা এবং স্বকের ঈষৎ কালিন্মা বা পীতবর্ণ ইহার প্রধান লক্ষণ। এই মূল রোগ সহ উপসর্গ

রূপে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকে তদ্বারা ঔষধের নির্বাচন করিলে মূল রোগ আরোগ্য না হইলেও তাহার উপসর্গের কথঞ্চিৎ প্রশমন দ্বারা রোগযন্ত্রণার শাস্তি বিধান করা যায় ।

অবসন্নতাব, পেশীহ্রস্বলতা, অজীর্ণ এবং বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ অনেক সময়ে **আস্কাডিন্স** রোগের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে । কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে উপরিউক্ত প্রাথমিক লক্ষণ সহ অতিক্ষুধা এবং যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শীর্ণতা উপস্থিত হইলে ইহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য । স্ব স্ব প্রদর্শক লক্ষণানুসারে একরূপ স্থলে ব্যবহারোপযুক্ত অত্রান্ত ঔষধ মধ্যে **থুজা**, **নেট্**, **মিউ**, **বেল**, **ক্যাক্সে**, **কার্ক** এবং **ফস্** প্রধান । স্নায়বিক অবসাদ, আশাশয়িক উত্তেজনা, সাধারণ দৌর্বলা, হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার ক্ষীণতা এবং বমন-প্রবণতা দি লক্ষণযুক্ত রোগে **আর্সেনিক** সহ ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় । ত্বকের জ্বালা ও বিবর্ণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্যা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে । এজন্য **আর্সেনিক** এ রোগের অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । কিন্তু **আর্স** অপেক্ষা **আর্স** **আস্কা** **ডাইড্কে** ঐস্থলে উৎকৃষ্টতর বলা যাইতে পারে । ডাং বনিংহসেন **এণ্টি ট্রু**, **নাই এসি**, **সিকেলি** এবং **স্পাইজিলিস্কার** বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । **আর্জ** **নাই**ও বিশেষ উপযোগী ঔষধ হওয়াই সম্ভব । তদ্বারা একটা রোগীর আরোগ্য হওয়ার বিষয়েরও উল্লেখ আছে ।

৪ । স্পঞ্জিয়া (Spongia) ।

প্রতিনাম ।—স্পঞ্জিয়া অফিসিথ্যালিস্ । স্পঞ্জিয়া টষ্টা ।

সাধারণ নাম ।—স্পঞ্জ ।

উপচক্ষু।—রজনীতে ; উপাধান নিম্নে মস্তক রাখিয়া শয়নে ; গৃহমধ্যে ; উর্দ্ধে উখিত হইবার সময়ে ।

উপশয়।—অবতরণকালে ; আহার ও পানাস্তে, বিশেষতঃ কাসির সময় সটানভাবে শয়ন করিলে ।

সম্বন্ধ।—স্পঞ্জিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যান্ধর ।

স্পঞ্জিয়া বাহার পরে প্রযোজ্য—কাসি এবং ক্রুপ রোগে স্পঞ্জিয়ার শুষ্কতা লক্ষণের প্রাধাত্য থাকিলে একন ও হিপারেল্ল ।

স্পঞ্জিয়ার পরে প্রযোজ্য ঔষধ—স্পঞ্জিয়ার ঘড়ঘাড়ির আরম্ভ হইলে হিপার ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, বেল, ব্রম, ব্রায়, ক্যান্ধে কা, কার্ক ভে, কনায়, ড্রসে, হিপার, ইগ্নে, আয়ডি, কেলি বাই, লাইক, মার্ক, নাক্ন্ ভ, ফন্, পাল্ন্, রাস্, সিপি, স্পাইজি, ষ্টেনাম্, সাল্ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্রধানতঃ স্বরবন্ত্র, শ্বাসনলী, থাইরয়েড-গ্রন্থি, হৃৎপাণ্ড এবং অণ্ডকোষে স্পঞ্জিয়ার ক্রিয়া হইয়া থাকে । ইহা তাহা-দিগের উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে কখন কখন তদুপরি তত্ত্বজ্ঞান পদার্থ ক্ষারিত হয় । গ্রন্থি উপাদানে ইহার ক্রিয়ার ফল স্বরূপ তাহাদিগের স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব প্রভৃতি, এবং স্বরবন্ত্র ও শ্বাসনলীতে ইহার ক্রিয়া প্রদাহিক পরিবর্তন আয়ডিনের ক্রিয়ার সহিত অতি নিকট সাদৃশ্য প্রকাশিত করে । ফলতঃ আয়ডিনই ইহার প্রধান নির্মাণোপাদান বলিয়া বিবেচিত !

লক্ষণ ।

মন।—অতিশয় আনন্দ হওয়ার গান করিবার অদম্য ইচ্ছা, পরে অগ্রমনস্কতা এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিহীনতা ।

মস্তক।—মুক্ত বায়ু হইতে উষ্ণগৃহে আসিলে মস্তিষ্কের দক্ষিণ-

পার্শ্বে যুহ শিরঃশূল । ললাটের বামপার্শ্বে তীক্ষ্ণ সূচিকাবেধবৎ বেদনা ললাট পর্যাস্ত বিস্তৃত । মস্তকের রক্তাধিক্য ।

স্নানু।—শরীরনিম্নার্দ্ধে অসাড়তার অনুভূতি । অত্যন্ত দুর্বলতা । সম্পূর্ণ শরীরের গুরুত্ববোধ ।

মুখমণ্ডল।—মুখ স্ফীত, লোহিত, অথবা স্ফীত নীল এবং তাহাতে উৎকর্ষাভাব । মুখের তাপ । নিম্নচুয়ালের বামপার্শ্বের নিম্নের স্ফীত গ্রন্থি চাপিলে বেদনা । পাশাপাশিভাবে বাম উর্দ্ধ চুয়ালে সূচিকাবেধবৎ ভেদকারী বেদনা । সন্ধ্যাকালে আহার করিতে খল্লীবৎ বেদনা বাম চুয়ালের সন্ধি হইতে গণ্ডদেশ পর্যাস্ত যায় ।

চক্ষু।—বাম ক্রদেশের পীতবর্ণ, মামড়িয়ুক্ত উস্তেদ স্পর্শে বেদনায়ুক্ত ।

নাসিকা।—শ্রাবযুক্ত-সর্দি হইলে অনেক হাঁচি হয় । শুষ্ক সর্দি হওয়ায় নাসিকার রোধ ।

শ্বাসপ্রশ্বাস।—স্বর কশ্ম ও ভঙ্গ । স্বরযন্ত্রের অত্যধিক শুষ্কতা, গলা গাঁকর দিলে বদ্ধিত । স্পর্শ করিলে, মস্তক ফিরাইলে এবং গান করিলে স্বরযন্ত্রের বেদনা । স্বরযন্ত্রে চাঁছাভাব হইলে তাহার জ্বালা ও সঙ্কুচিত্ত ভাব । শ্বাসপ্রশ্বাসকালে অনুভূতি জন্মে যেন থাই-রয়েড্‌গ্রন্থি এবং গ্রীবাগ্রন্থি বেগের সহিত একবার বাহিরে ও একবার ভিতরে যাইতেছে । অনুভূতি জন্মে যেন ছিপি দ্বারা স্বরযন্ত্রের রোধ ঘটাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা হইতেছে । বক্ষাভান্তরের নিম্নতম ও টাটানিবেদনায়ুক্ত প্রদেশ হইতে অবিশ্রান্ত কাসির উৎপত্তি । শুষ্ক, খৃৎখকে ও ফাঁপা শব্দের বা ঘুংরি কাসির শব্দের ত্রায় কাসি, অথবা জুস্‌জুস্ ও খর্‌খর্‌ শব্দযুক্ত এবং হাঁপের ত্রায় টানবিশিষ্ট কাসি । দিবা, রজনী শুষ্ক কাসি ও বন্ধের জ্বালা । ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে যে শুষ্ক কাসি হয় তাহা আহার বা পানে উপশম পায় । শৌ শৌ খর্‌ খর্‌ ও কুঁ কুঁ শব্দের উৎকর্ষাব্যঞ্জক

উপস্থিত হইলে ইহা উপযোগী হয়। কাসিতে যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। গভীর শ্বাসগ্রহণ ও মানসিক উত্তেজনাতেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাসিলে কিছু উঠে না।

স্যান্থু কাস—শিশুদিগের শ্বাসরোধকর হুস্‌হুস্‌ শব্দের কর্কশ কাসি ও শ্বাসরুদ্ধে ইহা উপকারী। শিশু মুখব্যাধান করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে থাকে।

সুংরিকাসি বা ক্রুপ্—একনাইটের পর স্পঞ্জিয়াই ক্রুপরোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাস কর্কশ এবং খর্‌ খর্‌ শব্দের ও অতি কঠিন হওয়ায় বোধ হয় যেন রোগী স্পঞ্জের মধ্য দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতেছে। রোগী থাক্ থাক্ ও থান্ থান্ করিয়া কাসিতে থাকে কিন্তু তাহাতে যৎসামান্য কিছু গয়ার উঠে। ফলতঃ মিনিটে মিনিটে শ্বাসরক্ত সঙ্কুচিত হওয়ায় শ্বাস রোধের উপক্রম হয়। মধ্য রজনীর পূর্বে রোগের বৃদ্ধি। পাতালের পাতলা রং ও নীলবর্ণ চক্ষু-বিশিষ্ট শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহা সর্বিদিক রোগাপেক্ষা আক্ষেপিক রোগের পক্ষেই অধিকতর উপকারী।

স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্—স্বরযন্ত্রের স্বক্ষ্মা রোগ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্‌ থাইসিস্‌। তরুণ স্বরযন্ত্রপ্রদাহে স্পঞ্জিয়া একনাইটের পরে প্রযোজ্য। কর্কশ, থাক্ থাক্ কাসিতে শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ায় শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। স্বরযন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু থাকে। মস্তক ফিরাইতে মস্তক চালনা হওয়ায় কাসির উদ্বেক হয়। ইহার তরুণ রোগ অচিরে পুরাতনে বা ল্যারিঞ্জাইটিস্‌ থাইসিস্‌ পরিণত হইলে উপরি উক্ত শুষ্ক কর্কশ কাসির সহিত

স্বরযন্ত্রের জ্বালা ও ছলবেঁধার স্থায় বেদনা উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে রোগী বোধ করে যেন স্বরযন্ত্র মধ্যে একটা ছিপি আঁটা রহিয়াছে; স্বরযন্ত্র চাপে বেদনামুক্ত। স্বরযন্ত্র প্রদাহে স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ হইলে স্প্র্যাম্বুকাস্, এবং তাহাতে শোথের বর্তমানতায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, এমন কি তাহা অচল হইয়া পড়িলে এপিসিস মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু স্বরযন্ত্র কপাটের শোথে সূত্র্য নিকট বলিয়া অনুমিত হইলে ক্লরিন তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমোঘ ঔষধ বলিয়া গণ্য।

টুবাকুলোসিস বা গুটিকোৎপত্তি রোগ—
থ্রাইসিস বা যক্ষ্মাকাক্ষা—রোগের প্রথমাবস্থায় ফুস্ফুসে গুটিকোৎপত্তি হওয়ায় তাহার নিরেটাবস্থার (Solidification) আরম্ভে স্পঞ্জিফিক্সা উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। এক বা উভয় ফুস্ফুস চূড়াতে (Apices) বিঘাতনে (Percussion) নিরেট শব্দ উৎপিত হইতে পারে। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে, কথা কহনে এবং শুষ্ক শীতলবায়ু সংস্পর্শে কক্কশ, ঘণ্টাধ্বনিবৎ ও থ্যান থ্যান শব্দবিশিষ্ট কাসি উদ্ভিক্ত হয়; সামান্য উত্তেজনায় বা সেন্টা বায়ুতেও কখন কখন ইহার কাসি হইয়া থাকে। আহার ও পানে ইহার কাসি কিয়ৎকাল উপশমিত থাকে। এনাকাউডিয়ারের কাসিও আহারে উপশম পায়। কিন্তু ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ ভ্রমণাদি শরীরচালনায় অধিকতর রক্তাধিক্য নিবন্ধন দুর্বলতা জন্মিলে রোগী পতনোন্মুখ হয়। রোগের অতি প্রথমাবস্থায় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্পঞ্জিফিক্সা দ্বারা তাহা আরোগ্য হইতে পারে।

উপরিউক্ত কাসিতে ক্রমে প্লেম্মার ঘড়ঘড়ি উপস্থিত হওয়ায় রক্তরেখাযুক্ত বা রক্তহীন গয়ারেয় পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে স্পঞ্জিফিক্সার

স্থলে হিসার সালফ প্রদর্শিত হয় । হিসাররোগে শেষ রজনীতে ও স্পঞ্জিফর্মার রোগে মধ্য রজনীর পূর্বে বৃদ্ধি পায় । মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ রোগী যখন রোগ বিষয়ক চিন্তা করে, তখন স্পঞ্জিফর্মারোগীর তাপোচ্চাস ঘটে । পৃষ্ঠ হইতে শীত উথিত হইলে অগ্নির তাপেও কম্পের নিবারণ হয় না । সম্পূর্ণ শরীর তপ্ত হয় কিন্তু উরুতে শীত ও আড়তা থাকে ।

যান্ত্রিক হৃদরোগ বা অর্গানিক হার্ট ডিজিজ্—স্পঞ্জিফর্মার বহুগত হৃৎপিণ্ড রোগে মস্তক উপাধাননিম্নে রাখিয়া রোগী সটান চিত হইয়া শয়ন করিলে শ্বাসরোধ ঘটে ; শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ার রোগীর পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয় ; রোগীর মুখ উৎকর্ষাবৃত্ত এবং রক্তিমাবিশিষ্ট এবং সে উপবেশন করিয়া কণ্ঠের সহিত ঘন ঘন হাঁপাইতে থাকে ।

জ্ববেষ্ট প্রদাহের প্রথমে বা রক্তাধিক্যের অবস্থায়, বক্ষে রক্তসঞ্চয় হইলে একনাইট্ প্রযুক্ত হয় । তাহার তরুণাবস্থায় যে কোন জ্বকপাটের যান্ত্রিক পরিবর্তন আরম্ভ হউক না কেন, ফুংকারবৎ শব্দ (Blowing Sound) শ্রুত হইলেই স্পঞ্জিফর্মার প্রয়োগ করা উচিত । কেননা ইহা প্রদাহিক রস দূরীকরণে অসমর্থ হইলেও রোগের গতি রোধ করিয়া উপকার করিয়া থাকে । শিক্ষার্থীদের বিদিত থাকা আবশ্যিক যে হৃদরোগের প্রথমাবস্থায় কোন নিশ্চিত লক্ষণের অভাবে অতি শীঘ্র একন, স্পঞ্জিফ, স্পাইজি, ব্রাল অথবা ফস্ প্রভৃতি ঔষধকে উপেক্ষা করিয়া ল্যাকসিস্, হাইড্রাসা গ্রিসি অথবা আস্ প্রভৃতি রোগের শেষাবস্থার ঔষধ প্রয়োগ আবিধেয়, কেননা, শেষোক্ত ঔষধাদি রোগীর দুর্বলতা দ্রুত আনয়ন করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মৃত্যুকে নিকটতর করিতে পারে ।

গ্রন্থিরোগ—গলগণ্ড বা গহেটার; অণ্ডকোষ বা মূক্ষপ্রদাহ, একশিরা বা আর্বাইতিস্ ;—গ্রন্থিমণ্ডলের বিবৃদ্ধি, দড়কচড়া অবস্থা এবং কাঠিগ্রন্থি হেলভেন পর্যায়ের ঔষধের দ্বায় স্পঞ্জিফ্রিয়াও ফলপ্রদ। ইহার গলগণ্ড রোগে উভয় বা একতর পার্শ্বের গ্রন্থির স্ফীতি, কাঠিগ্রন্থি ও অত্যন্ত বৃহদায়তন হয়। স্ফীতি অত্যন্ত বৃহদাকার হইয়া চিবুকের সমস্থলে আসিলে কখন কখন রক্তনীতে বারম্বার শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা উপস্থিত করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা কেবল ইহার বৃহৎ আয়তনের উপরেই নির্ভর করে না। কেননা কখন কখন অতি ক্ষুদ্র স্ফীতিও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। গলগণ্ডের স্ফীতি সর্বদা সমান থাকে না। সময়ে সময়ে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কথিত আছে, অমাবস্কার পর চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত গলগণ্ডের স্ফীতির বৃদ্ধি ও পূর্ণিমার পর হ্রাস হইতে থাকে। এ বিষয়ে আমাদিগের বহুদর্শিতা আছে। পূর্ণিমার পর রোগের ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্তি কালে স্পঞ্জিফ্রিয়া অথবা যে কোন নিকরীচিৎ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

হেলভেন পর্যায়ের ঔষধের দ্বায় ইহাও অণ্ডকোষে ক্রিয়া প্রকাশ করে। অণ্ডকোষের সহজ স্ফীতি ও বাঠিগ্রন্থি অপেক্ষা অপচিকিৎসিত গণ্ঠিয়রা অথবা প্রদাহ অন্তর্দাবিত হইলে যে রোগ জন্মে স্পঞ্জিফ্রিয়া তাহার বিশেষ ঔষধ। অণ্ডকোষ ও অণ্ডকোষজুতে চাপিত করার দ্বায় বিশেষ প্রকারের বেদনা, যাহা শরীরচালনা ও বস্ত্রসংস্পর্শে বর্ধিত হয়, স্পঞ্জিফ্রিয়ার পরে তাহাতে শালিস্ ও হেমনালিস্ প্রযোজ্য।

৫। ফ্লুয়োরিকাম্ এসিডাম (Fluoric Acidum)।

সাম্ভারণ নামঃ—হাইড্রফ্লুরিক এসিড।

উপচয় :—প্রাতঃকালে ; বিশ্রামাবস্থায় ; উত্থান করিতে ; দণ্ডায়মানাবস্থায় । উপবেশনাবস্থা অপেক্ষা দণ্ডায়মানাবস্থায় ভাল থাকে ।

উপশম :—শরীরচালনায় ; ভ্রমণাবস্থায় ।

সম্বন্ধ :—কার্যাপূরক—কোকা, সিলিক ।

যাহার পরে প্রযোজ্য—মতৃপায়ীদিগের উদরি রোগে আর্সের, হিপ-সস্থিরোগে কেলি কার, স্পর্শসহিস্কু দন্তরোগের চিকিৎসায় কফিয়া ও ষ্ট্র্যাফির ; অস্থিরোগে সিলিক ও সিম্ফাইটামের ; গলগণ্ডরোগে স্পঞ্জিয়ার ।

তুলনীয় ঔষধ :—এন্টি ক্রু. আর্স, বোরাক্‌স্, বরিক এসি, ক্যাঙ্কে কা, ক্যাঙ্কে ফস্, কেলি ফস্, মার্ক, সিলিক ও সাল্‌ফার ।

সাধারণ ক্রিয়া :—প্রধানতঃ পরিপোষণ যন্ত্রমণ্ডলই ক্রুয়রিন্ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে । গ্রন্থি ও অস্থি-উপাদানে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা পুষ্টিহানি জন্ত রোগসহ তুলনীয় ।

লক্ষণ ।

মন :—অসাধারণ মানসিক উৎফুল্লতা ; কিছুতেই ভীত হয় না এবং আপনাতে আপনি আনন্দিত থাকে । মানসিক উৎকর্ষ প্রবণতা ; আশঙ্কান্বিত ।

মস্তক :—ললাটপার্শ্বে, অভ্যন্তর হইতে বহিস্থ খীন প্রবল চাপবৎ বেদনা । মস্তকপশ্চাতে জড়ভাব এবং চাপ । কেশের স্থলন । মস্তকাস্থির, বিশেষতঃ ললাটপার্শ্বস্থ ক্ষত । মস্তকাস্থিনিচয়ের সংযোগ-রেখা বাহিয়া বেদনা ।

স্নায়ু :—কি গ্রীষ্ম কালের অত্যধিক তাপ, কি শীত ঋতুর অতিশয় শীত কিছুতেই রোগী পেশীশ্রমে ক্লান্ত হয় না । বলক্ষয় । রোগী যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে না তাহাতে বিন্‌বিনি ধরার অনুভূতি ।

মুখমণ্ডল ।—গুরু, শঙ্কাত এবং অত্যন্ত চুলকণায়ুক্ত
দুগ্ধপীড়কা । ললাট ও মুখের স্বকে পৃথককারীশীল গুটিকা ;
শৈশবোপদংশ ।

চক্ষু ।—অনুভূতি যেন সবলে চক্ষুপুট উন্মুক্ত রহিয়াছে
এবং তত্‌পরি পরিষ্কার বায়ু বহিতেছে । চক্ষুতে বালুকা থাকার
অনুভূতি ।

কর্ণ ।—উভয় কর্ণাভ্যন্তরে অসহনীয় চুলকণা ।

নাসিকা ।—সাবয়ুক্ত সর্দি । নাসিকা লোহিতবর্ণ, ক্ষীত এবং
প্রদাহযুক্ত ।

মুখপাক্ষর ।—দশে তাপের অনুভূতি । মুখলালার বৃদ্ধি ।
প্রাতঃকালে মুখ এবং দণ্ড শ্লেষ্মাজড়িত থাকে । দশে দ্রুত ক্ষত জন্মে ।
জিহ্বায় গভীর, প্রশস্ত ও তাহার চতুর্দিকে ব্যাপকতাবিশিষ্ট বিদারণ,
মধ্যস্থলে গভীর এবং পচাটে দৃশ্যের ক্ষত ।

গলাভ্যন্তর ।—শৈত্যে গলদেশ বিশেষরূপ অসহিষ্ণু সামান্য
শৈত্যসংস্পর্শেই তাহার প্রদাহ এবং বেদনার বৃদ্ধি, তজ্জন্ত গেলার
বাধা জন্মে । গলদেশে সঙ্কোচন হওয়ায় গিলিতে কষ্ট ; প্রাতঃকালে গলা
খাঁকর দিলে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে ।

আমাশয় ।—ক্ষুধার আতিশয্য থাকে কিন্তু অগ্নাহারেই তৃপ্তি
জন্মে । পিপাসায় স্নিগ্ধকর পানীয়ে লালসা । বারম্বার উদগার—
শারীরিক তাপ ও বিবমিষা এবং আহারের সামান্য দোষেই পিত্তবমন
এবং পেট কামড়াইয়া উদরাময় । আমাশয় দেশে পূর্ণতা ও চাপ ।
নিয়মিত আহারের ব্যবধান কালমধ্যে আমাশয়ে গুরুত্ব বোধ ।

উদর ।—পুনঃপুনঃ বাতকর্ম্ম ও উদগারে শান্তিবোধ । উদরের
অত্যন্ত আততাবস্থা ও জলশোথ জন্ত ক্ষতি ।

মন ।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় পুনঃপুনঃ কঠিন মলত্যাগ ।

মূত্রযন্ত্র :—পাতলা রঙ্গের মূত্রের নির্মাণ ত্যাগে শাস্তিবোধ ; মূত্রতাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রস্থলীতে অসহ জালা।

পুং জননেক্রিয়া :—রজনীতে কামেচ্ছার বৃদ্ধি হওয়ায় প্রচণ্ড লিঙ্গোপাধানে ঘটে। রমণকালে অত্যধিক উপভোগানন্দ ও স্খানু-ভূতি। বিলম্বে, কিন্তু অবাধ রেতঃস্রবণের পরে কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ হয় না।

স্ত্রীজননেক্রিয়া :—ঋতু অতি শীঘ্রাগত ; অতি প্রচুর ; আব ঘন এবং জমাট বাধা। স্বেতপ্রদর তীব্র ও কণ্ডুয়নকর ; স্তনাগ্র চুলকায়, টাটায় ও ফাটয়া যায়।

উদ্বাহ :—দক্ষিণ স্বক্ৰসন্ধিতে বেদনা হইলে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বোধ হয় যেন তথা হইতে নিম্নভিমুখে বায়ু বহিয়া ধাইতেছে। বাম তর্জ্জনীতে বেদনা ; সমুদয় অঙ্গুলিরই অভ্যন্তর পার্শ্ব বেদনায়ুক্ত থাকে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখের অধস্থ প্রদাহযুক্ত প্রদেশের কোষময় উপাদানে গোঁজ কুটিয়া থাকার অনুভূতি, স্পর্শ করিলে হস্তে দপদপানি বেদনা, এই বেদনা বৃদ্ধাঙ্গুলের অগ্রভাগে অধিকতর থাকে ; সম্পূর্ণ হস্ত ফুলিয়া যায়, তপ্ত হয় ও পাকে ; **আঙ্গুলহাঁড়া রোগ** ; নখাদি ভঙ্গপ্রবণ।

নিম্নাহ :—উদর পর্য্যন্ত শোথবৎ স্ফীতি। পদতলে জালাযুক্ত চুলকনা ; পদ উন্ন থাকে ও জালা করে। পদাঙ্গুলি মধ্য স্থানে ক্ষতভাব। পায়ের কড়া টাটায়। শিরা প্রসারিত।

জ্বর :—সমস্ত গাত্রে তাপ এবং বিবিধিয়া। অপরাহ্নে প্রচুর জ্বল ও হর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

প্রদর্শনিক লক্ষণ :—ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া ধর্তব্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তবে বৃদ্ধ এবং অকালবৃদ্ধদিগের রোগে এবং অস্থি-রোগের মধ্যে দীর্ঘাস্থির ক্ষত এবং ধ্বংস বা নিক্রোসিস রোগে অগ্নাঙ্গ

ঔষধের মধ্যে ফ্লুরিক এসিডের প্রতি আনাদিগের মনোযোগ বিশেষ-
রূপে আকৃষ্ট হয় ।

চিকিৎসা ।

দন্তের নালী ক্ষত বা ডেন্টাল ফ্রিশচুল্লা :—
ফ্লুরিক এসিডে দন্তের নালীক্ষত হইতে রক্তসংযুক্ত ও
লবণাক্ত পচাটে স্বাদের পুষ্ণ-স্রাবে মুখের অতি বিষাদ জন্মে এবং ক্রমে
ক্রমে শরীর জীর্ণ হইতে থাকে । এ রোগে ক্যালকেরিয়া ফ্লুর-
রিকা ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকারী বলিয়া বিবেচিত ।

অস্থিক্ষত বা কেরিজ্ অব্ বোনস্ :—অস্থি,
বিশেষতঃ দীর্ঘাস্থি হইতে তীব্র, ক্ষতকর, স্রাব হইলে ফ্লুরিক
এসিড প্রযোজ্য । ইহা ললাটপার্শ্বস্থ শঙ্খাস্থি বা টেম্পোরেল বোন
এবং শঙ্খাস্থির চূচক প্রবর্ধন বা ম্যাষ্টইড প্রসেসের ক্ষত রোগেও উপকার
করিয়া থাকে । ইহাতে পর্যায়ক্রমিক ভাবে জ্বালানুজ্ঞ বেদনা এবং
পাতলা ক্ষতকর তীব্র স্রাব হয় । উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার-
বটীত অস্থিক্ষত রোগের পক্ষেও ইহা অগ্ৰতম ফলপ্রদ ঔষধ । সিলি-
সিল্যান্ন পরে ইহা বিশেষ ফলদায়ক এবং শৈত্য প্রয়োগে ইহার
রোগের স্থান ও সিলিকের রোগের রুক্ষি উভয়ের প্রভেদ প্রতিপন্ন
করে । স্থূল বিশেষে, বিশেষতঃ অস্থির অর্ধুদ সূত্র ক্ষত থাকিলে
ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ । ফলতঃ ক্ষত
থাকুক বা না থাকুক ক্যালকে ফ্লুর অস্থিঅর্ধুদের বিশেষ
ঔষধ বলিয়া পরিগণিত । ফ্লুরিক এসিড সাইলি-
সিল্যান্ন অপব্যবহারের কুফল নষ্ট করে ।

শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকোজ্ ভেইনস্ ;
জটুল বা নিভাস :—ফ্লুরিক এসিডের পরী-

ক্ষয় শিরা-প্রসারণ জন্মিয়াছিল। অতএব ইহা ঐ রোগ আরোগ্য করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। জটুল প্রকৃত পক্ষে কোন রোগশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহা আজন্মসম্বৃত, স্বাভাবিক ও স্থলবিশেষে দৃশ্যতঃ শারীরিক চিহ্নমাত্র। শ্রুত হওয়া যায়, ইহাও ফ্লুইডিক এসিড প্রয়োগে আরোগ্য করা যায়।

স্ক্রোরোগ-কণ্ডু ; ক্ষতাক্ষ বা সিক্বেটিক্স প্রভৃতি :- ফ্লুইডিক এসিড স্বকে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এজ্ঞ নানা প্রকার স্ক্রোগে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা স্ক্রের কর্কশতা দূর হয়। সকল গাত্রে অবিশ্রান্ত ও অদমা চুলকনির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে উপশম ইহার রোগের বিশিষ্টতা। ইহা দ্বারা ক্ষতের কলঙ্ক দূর হইতে পারে। উপদংশ রোগঘটিত **টাকরোগ** বা **এলপেসিয়া** ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। নখরোগেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। কেননা ইহার ক্রিয়ার কর্কশতা, ভঙ্গপ্রবণতা, বিবর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার নখ-বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লেকচার ৫৩ (LECTURE LIII).

এলুমিনা (Alumina)।

প্রতিনামঃ—এলুমিনিয়াম ট্রাই-হাইড্রেট। আর্জিলা পিঘুরা।
পিঘোর ক্রে।

প্রয়োপাকরণঃ—ট্রিটুরেশন।

উপচয়ঃ—শীতল বায়ুতে; শীত ঋতুতে; উপবেশনাবস্থায়;
(Potato) আলু ভক্ষণে; কাথ ভক্ষণে; পর্যায়ক্রমিক দিবসে; অমাবস্তা
ও পূর্ণিমাতিথিতে।

উপশমঃ—অন্ন গ্রীষ্মে; উষ্ণ বস্ত্র পানে; আহারকালে
(সোরি); আর্দ্র দিবসে (কষ্টি)।

সম্বন্ধঃ—এলুমিনার কার্যপ্রতিবেধক—ব্রায়, ক্যান্ফর, ক্যাম,
ইপিকা।

এলুমিনা যাহার কার্যপ্রতিবেধক—লেড ক্রিয়াবর্জিত (মৌসকবিষ ঘটিত)
রোগের। . . .

কার্যপূরক—ব্রায়র।

যাহার পরে প্রযোজ্য—ব্রায়, ল্যাকেসি এবং সল্ফারের।

যে রোগের তরুণাবস্থায় ব্রায়, অবস্থা বিশেষে তাহার পুরাতন
অবস্থায় এলুমিনা প্রযোজ্য।

ভুলনীর ঔষধঃ—অরাম, ব্যারা কা, কষ্টি, ফেরাম, গ্র্যাফা,
কেলি কা, ম্যাগ্নে কা, মার্ক, নেট মি, নাক্স ভ, ফস্, প্লাস্লাম, রাস্,
সিলিক, সাল্ফ, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—এলুমিনা সাক্ষাৎভাবে গতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল
আক্রমণ করায় অঙ্গবিশেষের পক্ষাঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন হয়। ফলুতঃ

শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে ইহার নির্বাচিত ক্রিয়াসম্বন্ধ অধিকতর (specific action) থাকায় ইহা শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে, বিশেষতঃ তাহার আন্ত্রিক অংশে এবং যোনীপ্রদেশে গভীরতর ক্রিয়া প্রকাশ করে। শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে উপরি উক্ত ক্রিয়ার ফলে তাহার কথঞ্চিৎ উত্তেজনা, স্রাবাভাব এবং অত্যন্ত শুষ্কতা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ ।

মনঃ—মনোমধ্যে উৎকর্ষার ভাব; মানসিক অশান্তি জন্মিলে রোগী বোধ করে যেন কোন দুর্কার্য করিয়াছে। পরিবর্তনশীল মনোভাব, কখন সাহসিকতা কখন ভীর্ণতা। রোগী খিট খিট করে এবং নাকিস্বরে ক্রন্দন করে; একপ্রুয়ে ও বিষন্ন-চিত্ত; আশু অমঙ্গল বিষয়ক ভীতি।

শ্বাসঃ—অত্যধিক মুচ্ছার ভাব এবং ক্লাস্তি, রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। সহজেই সন্দি লাগে। কঠিন রোগের ভোগান্তে যেরূপ হয়, রোগী তদ্রূপ ধীরে ধীরে ও কাঁপিতে কাঁপিতে চলে। শরীরের ঈষৎ কম্পাদিত অলসভাব ও দুর্বলতা। মেরুমজ্জারোগে পক্ষাঘাত; রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিতে পারে না।

চক্ষুঃ—বক্রদৃষ্টি। চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুতে চাপ ও জ্বালা। দৃষ্টিমালিন্য; চক্ষুপটবয়ের কোন অংশ পরস্পর জুড়িয়া যাইবে বলিয়া রোগী বারম্বার চক্ষু মুছিতে বাধ্য। চক্ষু-কোণ বা ক্যান্থাই ও চক্ষুপুটে চুলকনা। প্রাতঃকালে আলোকাতঙ্ক। জাগরিত হইলে চক্ষু জুড়িয়া থাকে; উন্মীলিত করিলে আলোকাতঙ্ক জন্মে ও চক্ষু জ্বালা করে। চক্ষুপত্র স্থূলতা প্রাপ্ত; তাহা শুষ্ক থাকে এবং জ্বালা করে।

নাসিকাঃ—নাসারন্ধ্রের বিভাজক উপাস্থির স্ফীতি, রক্তিমতা এবং স্পর্শে বেদনা। বাম নাসাপুটের স্ফীতি এবং কাঠিন্য; নাসাগ্র বিদীর্ণ ও

নাসারক্ক, ক্ততযুক্ত এবং রুদ্ধ। পুরাতন সর্দি থাকায় নাসারক্ক, খুক্খিযুক্ত ও তাহাতে ক্ততভাব। ঘন ও হরিদ্রাভ শ্লেষ্মার শ্রাব।

শ্বাসরোধঃ—অবিশ্রান্ত খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দের শুষ্ক কাসি হওয়ার বমন ও শ্বাসরোধ। স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ কাসি। বোধ যেন স্বরযন্ত্রে অঁটা ভাবে শ্লেষ্মা লাগিয়া আছে, গলা খাঁড়র দিলেও স্থানিত হয় না। শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে। ভাগরিত হইলে স্বরযন্ত্রে কাঁচাভাব : হঠাৎ সম্পূর্ণ স্বরলোপ। সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। নাকি স্বর। স্বর কর্কশ এবং স্থূল। গলার শুষ্কতা বশতঃ রজনীতে শুষ্ক কাসি। কাসিলে অনেক শ্লেষ্মা উঠে রজনীতে বক্ষে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনার বৃদ্ধি।

মুখপাহবরঃ—দস্ত শিথিল ও প্রলম্বিত বোধ। মুখে ক্তত থাকে। দস্তমাড়ির ক্ষীত ও রক্তশ্রাব। মুখলালার বৃদ্ধি হইলেও মুখ শুষ্ক বোধ।

গলাভ্যন্তরঃ—গলদেশ লোহিতাভ। গলাভ্যন্তরে অত্যন্ত শুষ্কতা, সন্ধ্যাকালে বারম্বার গলা পরিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি। গলাভ্যন্তরে স্বপ্নাগ্র কাগ্ধও বৎকার অনুভূতি এবং খাণ্ড জব্য গলাধঃকরণ সময়ে গলনিম্নস্থ অগ্ননালী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ। গলাভ্যন্তরে কোন বস্তুখণ্ডের চাপের অনুভূতির সহিত ক্ততভাব, কর্কশতা, শুষ্কতা এবং অবদারণ ও চাঁছাভাব জন্মে।

আমাশয়ঃ—সম্পূর্ণ ক্ষুধাহানি ; স্বাদহীনতা ; মাংসে ঘৃণা ; স্বেতমারময় বস্তু, চা খড়ি, অন্ন্যর এবং অত্রাত্ত অপরিপাচ্য বস্তু আহাৰ করিবার ইচ্ছা। বিবিধিয়ায় মুচ্ছার ভাব এবং প্রাতঃকালে বিবিধিয়া হইলে শিরোঘূর্ণন। আমাশয় জ্বালা করে। অগ্নেদগার উঠে ও বুক জ্বালা করে। আমাশয়ে স্ফোচন এবং মোচড়ানি হইলে তাহা অগ্ননালী দ্বারা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

উদর ১—উদরাখান । উদরের গোল ছিদ্র প্রদেশে (Region of Abdominal ring) খোঁচাযুক্ত চাপ হওয়ায় অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের (Hernia) উপলক্ষি জন্মে ।

মল এবং মলদ্বার ১—বোধ যেন সরলাস্ত্রে পক্ষাঘাত হইয়াছে । অতঃপর, কঠিন মলত্যাগের পর সরলাস্ত্রে চাপ ও অবদারণ ভাবের অন্ত্রভূতি । তরল মলত্যাগকালে সরলাস্ত্রের কুহন । সরলাস্ত্রের ক্রিয়াবসাদ ঘটায় কোমল মলত্যাগেও অত্যন্ত বেগের আবশ্যিকতা জন্মে । অধিক বিষ্ঠার সঞ্চয় না হইলে মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না এবং তাহার ক্ষমতাও থাকে না । মলত্যাগান্তে মলদ্বারে হাজাভাব জন্মে, সরলাস্ত্র আকৃষ্ট এবং মলদ্বার সঙ্কুচিত । ছাগলের নাদির স্থায় কঠিন ও গিট গিট মলত্যাগ কালে সরলাস্ত্রে কঠিনবেদনা এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার হইতে রক্ত স্রাব । অতঃপর কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয় । স্তম্ভপায়ী শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রযন্ত্র ১—মলত্যাগের বেগ দেওয়া কালে প্রস্রাব হয়, অথবা অত্যন্ত বেগ না দিলে প্রস্রাব হয় না । মূত্রস্থানীতে এবং জননেন্দ্রিয়ে দুর্বলতার অন্ত্রভূতি ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ১—প্রচুর, স্বচ্ছ এবং তীব্র স্বেতপ্রদর দিবসে স্রোত বহিয়া পদ পর্য্যন্ত যায় । তীব্র ও হাজাকর স্বেতপ্রদরে জননেন্দ্রিয় জ্বালা করে ; জননেন্দ্রিয়দেশে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মিলে চলিতে কষ্ট এবং শীতল জলে ধোত করিলে উপশম বোধ । ঋতুস্রাবের পর শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ১—গ্রীবার বাম পার্শ্বের গ্রন্থি ক্ষীত । পৃষ্ঠ এবং কটিতে ষ্টম্বেদ বেদনা । পৃষ্ঠে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন নিম্ন কশেরুকানিচয় ভেদ করিয়া তপ্ত লৌহ খণ্ড প্রাণিত হইতেছে ।

অক্ষপ্রত্যক্ষ :—সন্ধিতে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন তাহা চাপিয়া তাহার পরিসর স্বল্পতর করা হইতেছে।

উদ্ধার :—স্বল্পদেশে, বিশেষতঃ হস্ত উত্তোলন করিলে, বেদনা হওয়ার বোধ হয় যেন তাহাতে মোচড় লাগিয়াছে। হস্তাঙ্গুলি ও নখের নিম্নে চর্কণবৎ বেদনার অনুভূতি।

নিম্না :—সন্ধ্যাকালে নিম্নাঙ্কে অত্যন্ত গুরুতর জ্বস্থিলে রোগী কষ্টে তাহা চালনা করিতে পারে, চলিবার সময় টলে ও বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; না দেখিয়া এবং দিবসে ভিন্ন, চলিতে পারে না; কশেরুকা মজ্জার ক্ষয়। উপবেশনাবস্থায় নিতম্বের ঝিন্ঝিনি এবং জজ্বার অত্যধিক ক্রান্তি। উরু এবং জজ্বায় অধিককালস্থায়ী থলীর ঞায় আততভাব নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত। জ্ঞানসন্ধিতে কম্প, জজ্বার পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ থলী অর্থাৎ খালধরা। পদ-নিষ্কোপ করিলে পদতলে বেদনায় বোধ হয় যেন তাহা অতীব কোমল ও স্ফীত হইয়াছে।

জ্ব :—শয্যার তাপে বিশেষতঃ শরীর গরম হইলে, সম্পূর্ণ শরীরে অসহনীয় চুলকনা। চুলকাইয়া রোগী রক্ত বাতির করে, পরে চুলকান স্থানে বেদনা। একুপাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ বিশেষ রূপে বর্তমান থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পাতলা একহারা, শীর্ণ ও শুষ্ককায় ব্যক্তির অথবা বৃদ্ধ বয়সের রোগ :—এলুমিনার রোগের সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণ অতীব বিরল। তথাপি উপরি উক্ত শরীরাকারবিশিষ্ট এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের রোগ হইলে ইহার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি

আকর্ষিত হয়। শরীরাকার বিষয়ে ইহাকে নাক্‌স্‌ ভ প্রভৃতি এবং বয়স বিষয়ে ইহাকে এম্ব্রা গ্রিসিয়া হইতে যত্নপূর্বক প্রভেদ করা আবশ্যিক।

মলৈম্বিক বিম্বিলির শুষ্কতা ও ন্যূনাত্মিক উত্তে-
জনার ভাব।—ইহা এলুমিনা রোগের সাধারণ প্রদর্শক মধ্যে
গণ্য। শুষ্ক কাসি, কোষ্ঠবদ্ধ ও অজীর্ণ প্রভৃতি এলুমিনাচিকিৎসে যে
কোন রোগে উপস্থিত থাকিয়া এলুমিনা প্রদর্শন করে। এস্থলে
অনেকাংশে ইহা ব্রায়নিয়া সহ তুলনীয়।

মলত্যাগের বেগ দেওয়া তিন্ন প্রস্রাব
ত্যাগ করার ক্ষমতাহীনতা।—ইহাও এলুমিনা রোগের
প্রদর্শক বর্ণিয়া গণ্য করা যায়; কেননা ইহার অধিকাংশ রোগে এ
লক্ষণ উপস্থিত থাকে। অথ কোন ঔষধে এরূপ লক্ষণ বিরল।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—বিবাদোন্মত্ততা; গুন্ডে-
বাসু রোগ।—এলুমিনা রোগী মাত্রই কথঞ্চিৎ বিষমচিত্ত।
উপরি উক্ত বিষমতার লক্ষণনিচয় অতি বর্ধিত হওয়ায় রোগী বাতুল
প্রায় হইয়া উঠিলে রোগীকে বিষমবায়ুগ্রস্ত বা বিবাদোন্মত্ত বলা
যায়। এলুমিনা রোগীর ক্রোধন ও খিটখিটে স্বভাবে ইহা
নাক্‌স্‌ ভ সহ, মানসিক অবসাদ ও ক্রন্দনপ্রবণতা থাকায় ইহা
সাল্লফ সহ, এবং নিদ্রাজঙ্গ উপরি উক্ত মানসিক অবসাদের বৃদ্ধি
হওয়ায় ইহা ল্যাকেসিস, শাল্‌স, এবং সিপিহা প্রভৃতি
সহ তুলনীয়। কখন কখন ক্যাক্সে কা ও আয়ডিন
প্রভৃতি ঔষধের দ্বায় রোগী বাতুল হইবে বলিয়া ভীত হওয়ায় মানসিক
অশান্তি ভোগ করিতে থাকে। রক্ত অথবা ছুরিকা কিম্বা সেইরূপ

কোন বস্তু দেখিলে ইহার গুল্মবাস্তু রোগগ্রস্ত রোগীর আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি জন্মে।

লোকোমটর এটাক্সিস বা কশেরুক।
মজ্জার ক্ষয়।—লোকোমটর এটাক্সিরোগ চিকিৎসার প্রধান-
 তম ঔষধ **আজেক্সটোম নাই**। সিন্কেলি হইতে **এলুমিনিয়া** প্রায় কোন অংশেই নূন নহে। বিদ্যাক্ষমকবৎ বেদনা তাঁরবেগে পৃষ্ঠ ও উদর ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ যাওয়া, জজ্বায় কীটবিচরণবৎ অস্থিত্ব, অঙ্গের বিন্ বিনি, মুখ বেন মাকড়সার জালে আবৃত থাকার অস্থিত্ব অথবা তাহার উপরে ডিম্বের সূত্রাংশের প্রলেপ শুষ্ক হইয়া লাগিয়া থাকা বোধ এবং পৃষ্ঠ ও নিম্নাঙ্গ লক্ষণ বর্ণনে বর্ণিত অশ্রান্ত লক্ষণ দ্বারা ইহাকে অশ্রান্ত ঔষধ হইতে প্রভেদ করা যায়। এ রোগে ডাং বনিং হসেন প্রথমে ইহাই প্রয়োগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন এবং তদবধি ইহা ইহার সূনাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

নাসিকার বা নেভাল সর্দি বা ক্যাটার।—
 শিশুদিগের নাসিকার সর্দিরোগে **এলুমিনিয়া** উপকারী। নাসিকা শুষ্ক থাকে এবং তাহার শ্লেষ্মিক ঝিল্লির উপরে মামড়ি জন্মে। কখন বা নাসিকামধ্যে শ্বন, আটাল ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় কণ্ঠে তাহা বিদূরিত করা যায়।

কাসিস বা কাফ।—শুষ্ক ও আক্ষেপযুক্ত কাসিতে **এলুমিনিয়া** উপকারী। প্রাতঃকালে কাসি উপস্থিত হয়। রোগী কাসিয়া কাসিয়া যে পর্য্যাপ্ত শ্লেষ্মিক ঝিল্লি সহ কঠিন ভাবে সংলগ্ন, অল্প পরিমাণ গয়ার স্থলিত করিয়া নিষ্ঠূত করিতে না পারে, সে পর্য্যাপ্ত কাসির নিবৃত্তি হয় না। **কাসি** উঠিলে কিয়ৎকালের জন্ত উপশম থাকে।

গলক্ষত বা সোর থ্রোট।—**এলুমিনিয়ার** গলক্ষত রোগে গলাভ্যন্তরের শ্লেষ্মিক ঝিল্লি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। গলদেশ ঘোর

লোহিত থাকে এবং উপজিহ্বা বা আলাজিব ঝুলিয়া পড়ে । প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় এবং গলাধঃকরণ চেষ্টায় বোধ হয় যে গলদেশে কাঁঠাখণ্ড রহিয়াছে । হ্রিয়ার, আর্জেন্টাম নাই এবং নাই এসিডে ও গলায় কাঁটা বোধ অনুভূতি থাকে । গলদেশের শুষ্কতা ইহার একটি পরিস্ফুট লক্ষণ ; গলদেশ চক চক করে ; ক্লার্জিম্যান্স্ সোর থ্রোউ বা পাদড়িদিগের গলক্ষত রোগে এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

নাক্স ভ—বক্তা এবং ধূম্র ও মজাপায়ীদিগের পুরাতন গলক্ষত রোগে ইহা উপকারী । গলদেশের শ্লেষ্মিক বিল্লির কোষগ্রন্থি নিচয়ের (mucous follicles) কাঁচা বা অবদারণভাব ও গলার টাঁচাবৎ অনুভূতি জন্মে । কোষগ্রন্থির ক্ষয় বশতঃ গলার স্থানে স্থানে শুষ্ক কলক । ষ্টার্গাম বুক্কাহির উর্দ্ধস্থ কোটরস্থানে স্পর্শাসহিষ্ণুবেদনা থাকে ও শুষ্ক কাসি হয় ।

ফেরান্ ফস্—গলমধ্য শুষ্ক, লোহিত ও প্রদাহযুক্ত থাকে এবং বেদনা করে । ইহা গায়ক ও বক্তাদিগের রোগে উপকারী ।

ভেলসিমিলিয়ান্—গলগহ্বর (Fauces) শুষ্ক, উত্তেজিত এবং জ্বালাযুক্ত থাকে ; টন্সিলগ্রন্থির প্রদাহ ।

অজীর্ণরোগ বা ডিসপেপ্‌সিয়া ।—আমাশয় হইতে পরিপাক রসাদির স্রাব না হইলে আমাশয়ের শুষ্কতা হওয়ায় এক্সুমিনার অজীর্ণ রোগ জন্মে । এস্থলে ইহা ব্রাহ্মনিহার তুল্য । প্রভেদ এই যে এক্সুমিনার আহার কালে অগ্ননালী বাহিয়া সঙ্কোচনের অনুভূতি, আলু (Potatoes) আহায়ে রোগের বৃদ্ধি, মাংসাহারে ঘৃণা এবং চা খড়ি প্রভৃতি অপরিপাচ্য বস্তুতে প্রবল লিপ্‌সার ব্রাহ্মনিহাতে অভাব থাকে । যক্ষুৎ স্পর্শাসহিষ্ণু এবং জ্বরের ঠায় তাহাতে সূচাবেধবৎ বেদনা । কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শ ।

উদররোগ—লেড কলিক বা সীসকশূল ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শ ;—অল্পপথের শুষ্কতানিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ-মধ্যে এলুমিনা সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। সরলাস্ত্রের শক্তি-হীনতা বশতঃ তাহার অনুলোম (Peristaltic) ক্রিয়া দুর্বল থাকায় এলুমিনা রোগী কোমল বিষ্ঠা ও কষ্টে ভাগ করে। মলত্যাগের বেগ-মাত্রাও হয় না। বিষ্ঠা কখন শক্ত, ছাগলের নাদির তায়, কখন কোমল থাকে। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে সারনার শুষ্ক ও প্রদাহযুক্ত থাকিলে এবং মলদ্বারসন্নিহিত স্থান হইতে রক্ত পড়িলে ইহা আমাদিগের প্রধান সম্বল ! লাস্থ এবং এলুমিনা উভয়েই সরলান্ন শুষ্ক ও ক্রিয়াহীন থাকিলেও শেথোক্তের নিষ্ক্রিয়তার এতই আধিক্য যে কোমল বিষ্ঠা ও কষ্টে ভাগ হয়, মুখের শুষ্কতা ও জিহ্বার উত্তেজিত ভাব থাকে, এবং অনেক কোথানিতে খণ্ডাকারে মলত্যাগ হইয়া ইহাকে লাস্থ এবং অগাছ তুল্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

উপরিউক্তরূপ কোষ্ঠবদ্ধের রোগীর অর্শ জ্বালা করিলে ও দিক্ত থাকিলে এলুমিনা দ্বারা উপকার হয়।

লেডকলিক অর্থাৎ সীসক দ্বারা বিষাক্ত হওয়ায় উদরশূল জন্মিলে এলুমিনা তাহার অগতম ঔষধ।

প্রস্থিরোগ—বাঘী বা বিস্মবে।—প্রস্থিরোগমধ্যে বাঘীর চিকৎসায় কখন কখন এলুমিনা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পীতবর্ণ পূয়স্রাব এবং মূত্রনালী বহিয়া, বিশেষতঃ মূত্রদ্বার পশ্চাতের বিস্তৃত নালী স্থানে (Meatus urinarius), জ্বালা ও চুলকনা থাকিলে যদি পূয়মেহ-জনিত বাঘী হয়, তাহাতে এলুমিনা উপকারী।

রক্তহীনতা ; ক্লরসিস্ বা স্বেপাণ্ডুরোগ ; শ্বেত প্রদর ;—এলুমিনা শোণিতের বিশেষ প্রকারের অপকর্ষ সাধন করিলে যুবতী জীলোকদিগের রক্তহীনতা ও মৃতপাণ্ডুরোগ

জন্মে। তাহাদিগের ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যন্ত 'ও ফেকাসে থাকে এবং শ্লেট পেন্সিল, চা খড়ি ও গৃহের দেয়ালের আস্তর প্রভৃতি অপাচ্য বস্তুতে অত্যন্ত লালসা জন্মে। মৃৎপাণ্ডুরোগগ্রস্ত যুবতীগণ শ্বেতপ্রদর-রোগপ্রবণ হয়। ইহার স্রাব স্বচ্ছ অথবা পীত বর্ণ ও দড়ি দড়ি থাকে। প্রভূত পরিমাণ এম্বুগেন্ বা শ্বেতলালাপূর্ণ স্রাব, এতই প্রচুর যে রোগী দণ্ডায়মান থাকিলে কখন কখন তাহা উরু প্রভৃতি অঙ্গ বাহিরা পদ পর্য্যন্ত যায়। রোগ দিবসে বৃদ্ধি পায়; এবং তাহার স্রাবের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য এলুমিনিয়ার প্রদর্শক।

স্রবক্রোপ।—এলুমিনিয়ার ক্রিয়ায় শৈথিল্যবিশিষ্ট হাম স্বকৃৎ ও শুষ্কতা ও কর্কশতা প্রাপ্ত হয়। এই ক্রিয়ার ফলে ত্বকে শুষ্ক ও কর্কশ উদ্ভেদ জাগলে তাহা ফাটে এবং তাহা হইতে কখন কখন রক্তস্রাবও হইতে পারে। শব্যায় দেহ গরম হইলে এই সকল উদ্ভেদের অসহনীয় চুলকনা ও ছালা বৃদ্ধি পায়।

লেকচার ৫৪ (LECTURE LIV.)

- ১। এমনিয়াম্ কার্বনিকাম্ । ২। এমনিয়াম্ কস্টিকাম্ ।
- ৩। এমনিয়াম্ সিউরিয়োটিকাম্ ।
- ৪। এমনিয়াম্ ফস্ফরিকাম্ । ৫। এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্ ।

মস্তকশরীরে এমনিয়াম্ সল্টগুলির মূত্রাক্রম্যবিষয়ে বিলম্বন একত্ব আছে। এমনিয়াম্-বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীরাকারাদিও প্রায় সমপ্রকার। ইহারা স্থূলকায়, শিথিলশরীর, আলস্তপরতন্ত্র এবং পরিশ্রমকাতর। পরিশ্রমহীনতা নাক্‌স্‌ভ ও মাল্‌ফারেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের আকার ও গঠনে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। স্থূলকায় ও আলস্ত পরতন্ত্র এমন কার্বনোপীক শরীরের কাণ্ডভাগ আতিরিক্ত বসাপূর্ণ ও স্থূল, পদ সামঞ্জস্যহীন বা শীর্ণ এবং জড়বৎ; এমন সিউরোটিক শরীরাকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে পন্ন।

ইহারা সকলেই শোণিতের বিশ্লেষণাদি প্রভূত পরিবর্তন সাধিত কবে এবং শরীরে শীতাদ বা স্ফাতির গ্রন্থ লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাতে মুখ, নাসিকা এবং অন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব ঘটে। পেশীমণ্ডলী কোমল ও ধস্বসে এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়।

এমন সল্টাদি শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে অতি প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করে। প্রথমে অতি মৃদুভাবে তাহার সূত্রপাত হইলে ক্রমে শ্লেষ্মিক ঝিল্লির উপত্বকের স্থলন ও তাহাতে জ্বালা আরম্ভ হয়। প্রদাহ অত্যধিক তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হইলে প্রভূত উপত্বক স্থলিত হওয়ায় শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে জ্বালাযুক্ত কাঁচাভাবের ক্ষত থাকিয়া যায়। শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে এমন-সন্দের এবস্থিধ কার্য্য থাকায় ইহারা নাসিকা, গলমধ্য, ধরন্থ

এবং কথঞ্চিৎরূপে ফুসফুস প্রভৃতি শৈল্পিক বিল্লিহারা আবৃত শরীরস্থানের রোগ চিকিৎসায় বিলক্ষণ প্রশংসা লাভ করিয়াছে ।

এমনিয়াম্-সন্টগাত্রই স্বক্বে মুহু প্রদাহ, লোহিত বর্ণ ও কথঞ্চিৎ ক্ষীতি উৎপন্ন করে । কিন্তু শীঘ্রই তাহাতে উদ্ভেদ দেখা দেয় ; এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সন্টের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও প্রথমে পুষ্ণহীন ফুসফুড় জন্মিলে ক্রমে তাহা রসবিষিকায় ও অবশেষে ক্ষতে পরিণত হওয়া সকলেরই সাধারণ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে ।

এমনিয়াম্ কার্বি গ্রন্থিল স্নায়ুগুণে ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনীমণ্ডলের ক্ষণিক উত্তেজনা এবং প্রায় সম্পূর্ণ শরীরবস্তুরই কথঞ্চিৎ ক্রিয়োত্তেজনা বৃদ্ধি করে । ইহা মস্তিষ্ক আক্রমণ করে না ।

১। এমনিয়াম কার্বনিকাম্ ।

প্রতিনাম—সেকুই কার্বনেট অব্ এমনিয়া ।

সাধারণ নাম ঃ—স্মেলিং সন্ট । স্থাল ভলাটাইল ।

উপচয় ঃ—আর্দ্র-শীতল বাতাসে ; সিক্ত পোন্টিসে ; শরীর ধৌত করিতে ; ঋতুপ্রাবকালে ।

উপশমন ঃ—উদর চাপিয়া শয়নে (এসেটিক এসি) ; বেদনায়ুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (পাল্‌স্) ; শুষ্ক দিবসে ।

সম্বন্ধ ঃ—এমন কার্বের কার্যপ্রতিষেধক—আর্ণিকা, ক্যাম্ফর, হিপার, উদ্ভিজ্জাঙ্গল, সাধারণ তৈল, (যেমন তিলের, বাদামের, জলপাইয়ের তৈল) এবং ক্যাপ্টর অইল । ইহা বাহার কার্য প্রতিষেধক—রাস বিষের এবং কীটদংশনের । ইহা ল্যাকেসিসের প্রতিযোগী ঔষধ । ইহা প্রধানতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে ।

ভুলনীয় ঔষধ ঃ—এপিস, এমনি মিউ, বেল. ক্যাম্ফর, কেলি কার্ব, ল্যাকেসিস, হিপার সালফ, ফস্ ।

লক্ষণ ।

অন্যঃ—উদাশ্র এবং জড়ভাব ; সম্পূর্ণ নৈরাশ্র ; বিস্মৃতিশীল ।
লিখিতে এবং কথা বলিতে ভুল হয় ।

নাসিকা—প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন করিতে নাসিকা হইতে
রক্তস্রাব । নাসিকা হইতে স্রোত বহিয়া তীব্র স্রাব নির্গত হয় ।
নাসিকা হইতে জ্বালাযুক্ত স্রাব স্রোত বহিয়া পড়ে । নাসিকার সর্দি ;
ঋতুশ্রাবকালীন নাসিকা সর্দি কখন শুষ্ক থাকিয়া নাসিকা রুদ্ধ করে ও
রক্তনীতে বর্দ্ধিত হয়, কখন বা তাহা তরল থাকে এবং ঝরে । সর্দি
বাতীতই অধিকাংশ সময়ে রক্তনীতে নাসিকার রোধ ঘটে এবং রোগী
মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস টানিতে বাধ্য হয় । মস্তক নত করিলে নাসাগ্রে
রক্ত ধাবিত হয় ।

শ্বাসনাশ্রঃ—স্বরযন্ত্রমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় এবং কর্কশ স্বর ।
স্বরভঙ্গ । সামান্য কতিপয় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও অভ্যস্ত
শ্বাসরুদ্ধ । রোগের ভোগকালমধ্যে শ্বাসরোধের আশঙ্কা । ধূলার
কণিকা গলদেশে থাকার ছায় শুষ্ক কাসি, বিশেষতঃ রক্তনীতে ।
প্রত্যহ রক্তনী ৩টা অথবা ৪টার সময় প্রচণ্ড কাসি । বক্ষের আক্ষেপিক
সঙ্কেচন বশতঃ বেদনার অনুভূতি জন্মিলে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কাসি । নত হইলে দক্ষিণ বক্ষে স্থচিবেধবৎ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীস্পন্দনঃ—অতিশয় উৎকর্ষার
আবেশ এবং শ্রবণযোগ্য হৃৎকম্প হওয়ায় বোধ যেন রোগীর মৃত্যু-
কাল উপস্থিত ; শীতল ঘর্ম্ম, উচ্চ শব্দযুক্ত ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস ; হস্তের
কম্প ; রোগী কথা কহিতে পারে না । নাড়ীস্পন্দন দ্রুত আঘাতিক ।

মূত্রস্রাবঃ—মূত্রস্থালীর ভয়ানক বেগ । নিদ্রাকালে অনৈচ্ছিক
মূত্রনিঃসরণ ।

স্ট্রীজেননেড্রিস্‌স্‌ ।—বহিস্থ স্ত্রী অঙ্গের ক্ষীতি, চুলকনা এবং জ্বালা । ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর । উপবেশন এবং গাড়ীতে চলার অবস্থায়, বিশেষতঃ রজনীতে, অতি প্রচুর ঋতুস্রাব । ঋতুস্রাবের আরম্ভে কলেরার দ্বায় লক্ষণ উপস্থিত হয় । ঋতুশোণিত কাল্‌চে ও চাপ চাপ । কখন বা তীর থাকায় উরুদেশ হাজিয়া যায় । ঋতুস্রাবকালে সমস্ত শরীরের, বিশেষতঃ উরুর ক্লাপ্তি জন্মে ও হাই উঠে ; দস্তশূল, কটিতে বেদনা ও শীতভাব । বিদাহী ও ক্ষতকর শ্বেতপ্রদর ।

• **স্‌ক্‌** ।—ভয়ানক চুলকনা, চুলকাইলে জ্বালাযুক্ত ফোঁকা উৎপন্ন হয় । শরীরের উর্দ্ধাংশ লাল থাকে । উপভুক্ত স্থানিত হয় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

মাংসল এবং বলিষ্ঠা স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রমহীনতা বশতঃ নানাবিধ রোগঃ এবং কোমলাঙ্গী ও কোমল হৃদয়ের স্ত্রীলোকদিগের রোগঃ প্রাণ লইবার জন্য স্লেপিং সপোর্টের (কার্বনেট অব এমনিয়া) বোতল, অথবা ক্যাস্কর ও মাস্ক প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ বাহাদিগের সর্বক্ষণ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন ।—এমন কার্‌সের সাধারণ রোগের কোন নির্দিষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না । তবে উপরে যাহা লিখিত হইল স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ রোগে তাহা এমন কার্‌সের প্রদর্শক বসিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । কিন্তু রোগবিশেষে ইহার লক্ষণ বিশেষ স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইলে প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, যেমন মুখমুখোত করণ-কালে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাবঃ ; নাসিকাদি, ‘স্নাফলস্‌’ বা শিশুদিগের নাসিকারোধকর সর্দি এবং ডিফ্‌থেরিয়া রোগে

বিশেষতঃ রজনীতে, নাসিকার রোগবশতঃ মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস করিবার আবশ্যিকতা, ঋতুস্রাবের আরম্ভে কলেরার ত্রাণ লক্ষণের উপস্থিতি ইত্যাদি ।

চিকিৎসা ।

সেরিব্রো-স্পাইনেল মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্ক-মেরুসমজ্জাবেষ্ট প্রদাহঃ—এই রোগের প্রথম-বস্থায়, রোগবিষের প্রবল আক্রমণে কখন কখন রোগী জড়বৎ অভিভূত ও পরিক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে । তাহার শরীর শীতল ও নীল হইয়া যায় । নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও তর্কল হয় । এমনিয়াম্ কার্বন্ প্রয়োগে এই সকল রোগীর প্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগত হওয়ায় অত্র উপযোগী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার আরোগ্য সাধন করা যায় ।

নাসিকা সর্দি ও কাস বা কাফ্ ; ক্রণিক ব্রঙ্কাইটিস্ বা পুরাতন নলৌম ও এম্ফিসিমা বা ফুস্ফুসের কোষময় বিল্লির বায়ুক্ষীতি ।—এমনিয়াম্ কার্বন্ের নাসিকাসর্দিরোগে রজনীতে নাসিকা ক্রুদ্ধ হইয়া যায় এবং রজনী ৩টা অথবা ৪টার সময় রোগের বৃদ্ধি হয় । নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত ও অবদারণভাব জন্মে এবং কখন কখন শিশুদিগের নাসিকা হইতে কেলি বাই ও এম্ফি-প্রিসিন্হাল ত্রায় নীলাভ স্লেথ্মা নির্গত হয় । সময়ে সময়ে স্রাব বিদাহাঁ প্রকৃতির হওয়ায় উল্লেখ্য হাজিয়া যায় এবং কণ্ঠনলী ও বায়ুনলী বহিয়া জ্বালা করে । অচুভূতি জন্মে যেন গলনধ্যে কোন বস্তু আছে । স্ফুড়স্ফুড়যুক্ত শুষ্ক কাস, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষে শ্লেথ্মাসঞ্চয় হওয়ায় রোগীর অত্যন্ত কষ্ট থাকে । অবশেষে রজনীতে শ্বাসরোধকর শুষ্ক কাসি এবং গুণ্ হইতে প্রচুর লালায় নিঃসরণ হইতে থাকে । বক্ষে নাড়ীস্পন্দনের

আঘাত হয়। ইহা শীতকালের কাসির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্রোধবৎ গয়ারে শোণিত অক্ষ থাকে। ৩টা রজনীতে রোগের বৃদ্ধিতে ইহা কেল্লি সপ্ট নিচয় সহ তুলনীয়।

নাসিকা সন্ধিতে নাসারন্ধ্রের বোধ, বিদারীশ্রাব ও ঠাণ্ডাম বা বৃদ্ধান্তি বাহিয়া অবদারণ বা কাঁচাভাব থাকিলে **এমন কার্ব** সহ তুলনীয় ঔষধ, যথা—

(১) **এমন কপ্তি**—গলমধ্যে জালাযুক্ত কাঁচাভাবের অন্তর্ভূতি সহ স্বরবন্ধ থাকিলে ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(২) **কার্বো ভেজ**—ঠাণ্ডামের উর্দ্ধ হইতে নিম্নগামী কাঁচাভাবের অন্তর্ভূতি ও জালায় ইহা উপরিউক্ত দুই ঔষধের তুল্য।

(৩) **লরসিরেসাস**—ইহার গয়ারেও রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলক থাকে।

পুরাতন ডক্কাইতিস্ রোগে বায়ুদ্বী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবের পঞ্জিহীনতা নিবন্ধন ফুসফুস-কোষনিচয়ের **বাস্থস্বকীতি** বা **এস্ক্রিসিয়া** রোগ জন্মে। ফুসফুসে প্রভূত শ্লেষাসঞ্চয় হয় এবং **বাস্থনলীর বিস্তৃতি ও ইতিমা পাল্মোনার** বা **ফুসফুসের শোথ জন্মে**। এই সকল রোগে রোগী অত্যন্ত দৌর্বল্য ও জড়তা প্রাপ্ত হয়, অবিরত কাসিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র গয়ার উঠে না অথবা কষ্টে সামান্য কিছু উঠে। নিদ্রালুতা, বিড়বিড় করিয়া অল্প প্রলাপও থাকিতে পারে। ইহাতে **এমন কার্ব** প্রয়োজ্য।

নিউমনিয়া বা **ফুসফুসপ্রদাহ**—নিউমনিয়া-রোগে রোগীর অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ হৃৎপিণ্ডগহ্বরে রক্তচাপ জন্মিলে **এমন কার্ব** উপকারী।

মুরিমিয়া বা **মূত্রক্ষয়বিকার**—মূত্রস্রাবের বোধ

হইলে তাহার বিষাক্ত বস্তু শোণিত দ্রবিত করায় মস্তিস্কীয়
বিকারাদি নিম্নলিখিত নানাবিধ লক্ষণে এমনিয়াম্
কার্ব উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ স্ক্যালের্‌টিনা
বা আনকুজ্জর, হুদ্রোপ, নিউমনিয়া, ব্রঙ্কাই-
টিস, ব্রঙ্কসিসমা ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত
প্রভৃতি যে কোন রোগের চরমাবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ বশতঃ
অক্সিজেন বা অম্লজানাভাব হওয়ায় কার্বনিক এসিড প্রভৃতি কর্তৃক
বিষাক্ত শোণিতের পচনাবস্থা ঘটিলে যে সকল বৈকারিক লক্ষণ উৎপন্ন
হইয়া থাকে তৎপ্রতিকারের পক্ষে এমনিয়াম্ কার্ব অত্যন্ত প্রধান
ঔষধ বলিয়া গণ্য। লক্ষণ—রোগীর নিদ্রালু অবস্থায় বক্ষে সঞ্চিত
শ্লেষ্মায় বহুৎ বহুৎ বৃদ্ধ ভন্মিলে শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে,
প্রলাপে রোগী পতঙ্গ ধরার (Grasping at flocks) চেষ্টায় ছায় শূন্যে
হস্ত প্রসারণ করে ও তাহার ওষ্ঠ নীল অথবা নীললোহিত এবং জিহ্বা
কটাসে বর্ণ হয়। এস্থলে এন্টিম টার্ট ইহার অতি নিকটসম্বন্ধীয়
ঔষধ। অবস্থা বিশেষে ভাস্‌স এবং কার্ব ভেজ ও তুলনীয়।

আণিকা—টাইফয়েড অবস্থায়িত আণিকা রোগীতে নূনাদিক
উপরিউক্ত প্রকৃতির লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। রোগী নিদ্রালু ও জড়বৎ
অবস্থায় থাকে এবং প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগ্রস্ত হয়।

এমনিয়াম্ কার্বের ধূম অক্ষারবাষ্পের বিষ-
ক্রিয়ার কুফল নষ্ট করিতে সক্ষম। আণিকা এবং
বতিষ্ঠাও কখন কখন ইহাতে সুফল প্রদান করিয়াছে।

স্প্রেন্ বা মচকান ;—আঘাতপ্রাপ্ত সন্ধি তপ্ত ও বেদনা-
যুক্ত হইলে এমনিয়াম্ কার্ব ব্যবহার করা যায়। এরোগে ইহা
আণিকা, সালফুরিক এসিড এবং এমনিয়াম্ মিউ
সহ তুলনীয়।

আরক্তজ্বর বা স্ফাল্লেট ফিবার। এমনি-
হাম্ কার্বনিকাম্ এরোগের অত্যন্ত উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য
হইয়াছে। গলদেশের বহিরাভ্যন্তর স্ফীত, তাহার গ্রন্থিনিচয় বিবৃদ্ধ এবং
উভয় টনসিল গ্রন্থি স্ফীত ও ঈষৎ নীলাভ হয় এবং শিশু নিদ্রালু থাকে।
এই নিদ্রালুতা, তৃণবীজবৎ উদ্ভেদ, এবং ক্রমবর্ণ গলমধ্য ইহাকে বেলে
হইতে প্রভেদ করে।

২। এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্ ।

প্রতিশ্রাম্।—এমনিয়াম্ ক্লোরাইড্ ।

সম্প্রস্ক্।—উষ্ণ জলে স্নান এমনি মিউ সেবনের কুফল নষ্ট
করে। এমনি মিউহোর কার্যাপতিষেধক—ক্যান্সর, কফিয়া,
চিপার সাল্ফ, নাক্ স্ফ এবং বিটার এমণ্ড্। বিষমাত্রার পক্ষে ভ্রিনগার
অথবা উদ্ভিজ্জায়। এমনি মিউহোর পরে প্রযোজ্য ঔষধ—এটি
ক্লে, ফস্, পাল্ স্ফ আনিক ।

ভুলনীহা ঔষধ।—এলুমি, এমনি কার্ব, এমনি কষ্টি, আর্স,
আর্জে নাই, কষ্টি, কোর্গ কার্ব, মিউ এসি, নেট্ মিউ, ফস্, সিলিক্, সাল্ফ ।

সাম্প্রাণ ক্রিয়া।—এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্ শোণিতের
সংগামকশক্তির হ্রাস ও গ্রন্থিব্রাবের এবং সূত্রজন পদার্থ বা ফাইব্রিণ
নিঃসরণের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহা ঘুরিয়া পরিত্যাগেরও সাহায্য
করে। শ্লেষ্মিক ঝিলিতে, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের শ্লেষ্মিক ঝিলিতে, ইহার
বিশিষ্ট ক্রিয়া বশতঃ তাহার সাব বৃদ্ধি পায়। শোণিত সহ মিশ্রিত হইলে
ইহা অংপিণ্ডের উত্তেজক রূপে কার্য্য করে।

লক্ষণ ।

স্বাস্থ্।—বোধ যেন তাপে শোণিত অবিশ্রান্ত ভাবে স্ফীত
হইতেছে। প্রাতঃকালে গাত্রোথানের পরে সম্পূর্ণ শরীরে ঘৃষ্টবৎ

বেদনা। শরীরভাঙ্গুর তাপে বৃদ্ধ উঠার ছায় বোধ হওয়ায় চর্কলতা বশতঃ পক্ষাঘাতবৎ অত্রভূতি জন্মে। মধ্যাহ্নভোজনের পর মুক্তনায়ুসম্বন্ধে ভ্রমকালে হঠাৎ অতিশয় চর্কলতা ঘটে। প্রাতঃকালে অত্যধিক চর্কলতা।

নাসিকা ১—সদি হইলে নাসিকার রোধ ঘটে ও ঘ্রাণশক্তির অভাব হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত টাটানি ও স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা থাকে। জলবৎ, তীব্র সন্ধিস্রাবে উল্লেখ্য ক্ষত জন্মে। গলনম্যে বিড় বিড় করায় হাঁচি হইতে থাকে।

শ্বাসপ্রশ্বাস ১—স্ববনে জ্বালা ও স্বরভঙ্গ। কণ্ঠাতে গুড় গুড় করিলে গুড় কাসি। রজনীতে চীৎভাবে শয়ন করিলে কাসি হওয়ায় নিদ্রার বাধাত। বক্ষে বড় বড়ি। বক্ষে চাপ এবং সূচিবোধবৎ বেদনা হওয়ায় বোধ যেন তাহাতে এক গ্যাস থাও আটকাইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালে বক্ষে কষ্টবোধ।

মূত্রপাত ১—জিহ্বাগ্রে জ্বালাবন্ত রসগন্ধিকা।

পল্লমশ্রয় ১—গলক্ষত হইলে গলমপোর আঠাবৎ শ্লেষ্মা এত কঠিন হয় যে তাহা এক খাঁকর দিয়া উঠান যায় না। টনসিল গ্রন্থিতে দপদপানি। শৈত্যসংস্পর্শে জগ্ন টনসিল গ্রন্থি স্ফীত হওয়ায় গিলিতে কষ্ট।

আমাশয় ১—আনাশয়ে চর্কলবৎ বেদনা; হিক্কা; উদ্বাগর; বিবমিষা; মুখ হইতে জল উঠা।

কৃষ্ণিপ্রদেশ ১—উভয় কৃষ্ণদেশেই সবিরাম বেদনা। অপরাহ্নে ও ভ্রমকালে দক্ষিণ কৃষ্ণিতে সূচিবোধবৎ বেদনা এবং জ্বালা। উপবেশনাবস্থায় প্লীহায় সূচিবোধবোধ।

উদর ১—নাভির চতুর্দিকে কামড়ানি বেদনা।

মল এবং মলপ্রস্রাব ১—মলত্যাগকালে এবং তাহার পরেও

কতিপয় ঘণ্টা পর্যন্ত সরলাঙ্গে ও মলদ্বারে অভ্যস্ত জ্বালা । সরলাঙ্গের চুলকনাবুক্ত টাটানি ; ইহার পার্শ্বে অনেকগুলি পুষ্পটিকা জন্মে । সন্ধ্যাকালে অথবা ভ্রমণের সময় মলদ্বার হইতে শিশ্নমূল পর্যন্ত প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা । কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন ও বুৰবুরে থাকে এবং তাহা অনেক চেষ্টা দ্বারা নিঃসারিত করিতে হয় । উদরাময়ের বিষ্ঠা সবুজ ক্লেদযুক্ত, এবং আম চকচকে ও চিমসে থাকে । কঠিন বিষ্ঠা আমজড়িত ।

স্ট্রীজনেক্রিয়া :—অতি শীঘ্রাগত পাতুস্রাবকালে উদরে ও মাছায় বেদনা হয় এবং রজনীতে স্রাব অধিকতর হইলেও বেদনা থাকে । ঋতুস্রাবকালে অল্প হইতে রক্তযুক্ত স্রাব । নাভির চতুর্দিকে চিনটি কাটার স্থায় বোধ হইলে অণুলালার স্থায় এবং মূত্রত্যাগান্তে কটা ক্লেদনয় ও বেদনায়ুক্ত শ্বেতপ্রদর ।

উদ্ধ্বাস :—দক্ষিণপ্রকোষ্ঠ অবশ হওয়ার স্থায় ভারি বোধ ।

নিহাস :—বাম বক্ষণ বা হিপসন্ধিতে বেদনা হওয়ার বোধ যেন কণ্ডুরানিচয় অতীব খর্ব হইয়াছে, রোগী চলিতে ও লম্ব দিতে বাধা এবং উপবিষ্টাবস্থায় অস্থিতে চর্কণবৎ বেদনা । উপবেশনাবস্থায় উরুর সম্মুখাংশে ছিন্নবৎ বেদনা । উপবেশন বা শয়নাবস্থায় জঙ্ঘাদেশে আক্লষ্টতা সহ আততভাব । ভ্রমণকালে জঙ্ঘাপেশীর (Hamstring) বেদনা হওয়ার বোধ যেন তাহা অতীব খর্ব । পেশীর খর্বতা হওয়ার স্থায় সন্ধির আততভাব বশতঃ রোগী বক্র হইয়া ভ্রমণ করিতে বাধা । কঁচকিতে মোচড় লাগার স্থায় বেদনা হওয়ার রোগী ঋজু হইয়া ভ্রমণ করিতে পারে না । দক্ষিণ গুল্ফে ক্ষতবৎ বেদনা ।

জ্বর :—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে শীতভাব এবং যত বার জাগরিত হয় ততবারই শীতের অনুভূতি ।

অক্ষ ১—সম্পূর্ণ শরীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভেদ । হাম ও বমন্তের ত্রায় উদ্ভেদ ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

পৃষ্ঠে উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে শৈত্য-
নৃত্ত্বতি ১—ইহা সাধারণতঃ কাসি অথবা কাসিহীন বেদনাদিতে ও
বক্ষরোগে উপস্থিত হয় এবং এই সকল রোগ অথবা বক্ষরোগ উপসর্গরূপে
বর্তমান থাকিলে অগ্রাণু রোগেও গ্রমন মিউ প্রদর্শন করে ।
লাইক অথবা ফসের উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানের জ্বালার ত্রায়-
ইহাও অতি নির্ভরযোগ্য প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য ।

চিকিৎসা ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্জিফ্রিয়া ১—মস্তক, ললাট এবং
মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল অথবা “ক্রেভাস মাইগ্রেণ” এবং প্রসপ্যাল্জিয়া
প্রভৃতি স্নায়ুশূল এমনিয়াম মিউরিয়েটিকাম্ আরোগ্য
করিয়াছে বলিয়া ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে ।

ইহার হিপ্ বা-বন্ধন সন্ধির বেদনায় রোগী বোধ করে যেন তৎসংসৃষ্ট
কণ্ডরানিচয় সঙ্কচিত হইয়াছে, রোগী খোঁড়াইয়া চলে ও উপবেশনাবস্থায়
অস্থিতে চর্কণবৎ বেদনা অনুভব করে ।

সাইক্কাটিকা বা গ্লুপসী ১—এ রোগের বেদনার উপবেশ-
নাবস্থায় বৃদ্ধি, ভ্রমণকালে কখন কখন উপশম এবং শয়ন করিলে সম্পূর্ণ
উপশম হইলে গ্রমন মিউদ্বারা উপকার পাওয়া যায় । জন্ম
সঙ্কচিত বোধ । পদের ঝাঁকি হওয়ায় রোগী বেদনা পায় এবং পদে
ঝিন্ঝিনি ধরে ।

শস্ত্রছিন্ন অঙ্গের অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূলেও এমনিয়াম মিউ দ্বারা
উপকার পাওয়া যায় ।

নাসিকাসর্দি ; গলক্ষত বা সোর থ্রোটি এবং টনসিলাইটিস বা টনসিলপ্রস্টিপ্রদাহ ;—নাসিকা-সর্দিতে দিবস অপেক্ষা রজনীতে অধিকতর নাসিকারোধ ঘটে । এক এক সময়ে অশ্রুতর নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং নাসিকা হইতে হাজা-কর জলবৎ স্রাব হওয়ায় নাসারন্ধু ও উজ্জ্বলের ক্ষতভাব জন্মে । গলমধ্য ক্ষত হওয়ায় রোগী মুখ খুলিতে পারে না । মুখ এবং গলমধ্য আটা শ্লেষ্মাপূর্ণ হইলে তাহা অতি কঠে নিষ্ঠূত হয় । টনসিল প্রস্টি দপ দপ করে ; ইহাই এমন মিউক্লের বিশেষ লক্ষণ । এই লক্ষণ টনসিলপ্রস্টিপ্রদাহে এবং আরক্ত জ্বরের অতীব কঠিন গলগহ্বররোগনিবন্ধন নূনাধিক স্বাসরোধে এমন মিউকে আমাদিগের স্মরণপথে আনয়ন করে ।

কাসি ; ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ এবং সক্ষাকাস বা থাইসিস ;—উপরিউক্ত সর্দিতে বা স্বতন্ত্রভাবে এমন মিউক্লের কাসি উপস্থিত হইতে পারে । প্রচণ্ড কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের লালাগ্রস্থি উদ্বেজিত হওয়ায় মুখ লাল্পাৰ্ণ হইয়া উঠে । স্বরভঙ্গ হয় এবং অতি তীব্র স্রাব হওয়ায় স্বরযন্ত্রে অবদারণ জন্মে ও তাহা জালা করে । থাইসিস, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি সৰ্ব্বপ্রকার বক্ষরোগেই অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্তীস্থানে শৈত্য-নুভূতি জন্মে । বক্ষের গুরুত্বানুভূতি জন্ম রোগী কষ্টবোধ করে । এমন কার্ভের এই গুরুত্ব সহ জালা থাকে । কখন কখন রোগী বক্ষের কষ্টানুভূতির সময়ে তাহাতে একখণ্ড আগস্থক বস্তু থাকা অনুভব করে । অনেক সময় রোগী বলে বক্ষের কোন ক্ষুদ্র স্থানবিশেষ নাড়ী স্পন্দনের সমসাময়িকরূপে জালা, দপ দপ ও বেদনা করে ।

যক্ষরোপ—পুরাতন শোণিতাধিক্য ;—অতি-মিক্র গণ্ডপান, কুইনাইন্ সেবন প্রভৃতি বশতঃ যক্ষতের পুরাতন শোণিতা-

দিক্য এবং বিবৃদ্ধি জন্মিলে এমনি মিউ অত্যন্ত উপকারী ঔষধ ।
রোগী বিষন্ন হয় এবং তাহার বিষ্ঠা আমজড়িত থাকে ।

কোষ্ঠবন্ধ :—এমনি মিউহের কোষ্ঠবন্ধে শিষ্টা কঠিন
শুষ্ক ও ঝুর ঝুরে থাকে এবং তাহা অতি কষ্টের
সহিত ত্যাপ করিতে হয় । কখন কখন বিষ্ঠা শ্লেষ্মাবৃত থাকে ;
কষ্টিকামের বিষ্ঠাও আগমাখা থাকে এবং চৰ্কি মাখার স্থায়চক চক করে ।

স্ট্রীজননেন্দ্রিহারোগ—জ্বরায়ুর স্থানচ্যুতি ;
অণ্ডাধারোগ ; শ্বেতপ্রদর বা লিউকরিয়া :—
স্ট্রীজননেন্দ্রিয় রোগে এমনি কার্য অপেক্ষা এমনি মিউ লক্ষণ
অধিকতর পরিস্ফুট হওয়ায় ইহা অধিকতর কার্যকারী । কুচকি-
দেশে প্রবল আকৃষ্ট ভাবের অনুভূতিতে
রোগীর সম্মুখে বক্র হইয়া চলিতে বাধ্য
হওয়াই ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ । রোগী অত্যন্ত কুচকিতে
আকৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে । কখন কখন রোগী বোধ করে যেন
তাহার কুচকিতে প্রবল টান লাগিতেছে । কুচকিদেশে সূচিবোধ ও
কর্তনবৎ এবং টাটানিবেদনা হয় । এই সকল লক্ষণ জ্বরায়ুর স্থানচ্যুতি
ও অণ্ডাধারের রোগপ্রকাশক এবং এমনি মিউহের নির্দেশক ।
এমনি মিউসদৃশ কোষ্ঠবন্ধ ইহার সঙ্গাত্বর্জী লক্ষণ । কটা,
চাপ চাপ অথবা পরিষ্কার ও অণ্ডলালা বা এম্বু-
মেনবৎ শ্বেতপ্রদর উপরিউক্ত রোগের অত্যন্ত লক্ষণরূপে
বর্তমান থাকে ।

আণিকা—ইহারও স্ট্রীরোগে কুচকিতে টান লাগার স্থায়
আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে ।

এপিস্—ইহাতে তলপেটের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত
আকৃষ্টতা এবং স্বকের টান টান বা আততভাব থাকে ।

রক্তোবাহুল্য বা মেনেরেজিয়া ।—এমন মিউ
হেল্লের রক্তোবাহুল্য রোগে রক্তনীতে ঋতু অথবা রক্তস্রাব
হয়। বভিষ্টার ঋতুস্রাবাধিক্যেও রক্তনীতে বা রক্ত-
নীতে শঙ্কনাবস্থায় রক্ত স্রাব হয়।

ক্রিনাজেটাট—শয়নাবস্থায় ঋতুস্রাব হয়, উষ্ণতা বসিলে অথবা
ভ্রমণকালে তাহা বন্ধ থাকে।

লিলিফ্লান্স টাই—চলাফেরা করিলে ঋতুস্রাব হয়, স্থির হইলে
বন্ধ থাকে।

ম্যাগ্নে কার্ব—কেবল রক্তনৌ অথবা শয়নাবস্থায় রক্তস্রাব
হয়, ভ্রমণ কালে বন্ধ থাকে।

পুরাতন রসবাত বা রিউম্যাটিজম্ ;
অঙ্গাদি মচকান বা স্পেণের পুরাতন ফল ।—
এমন মিউহেল্লের ক্রিয়ার সন্ধিদেশ সঙ্কচিত বোধ হয়। ইহা
তাস্তব উপাদান আক্রমণ করিলে উরুপশ্চাতের পেশীকণ্ডার সঙ্কোচন
উৎপন্ন হওয়ায় ভ্রমণকালে রোগী তাহা কঠিনরূপে আকৃষ্ট বোধ করে।
কালব্যাপী অঙ্গচালনায় এই লক্ষণের উপশম। অঙ্গাদিতে মোচড় লাগার
পুরাতন কুফলসংশোধনের ইহা অগ্রতম ঔষধ।

গুল্ফ বা পাদমূলের ক্ষত ।—পাদমূলে ক্ষত হওয়ায়
তাহাই ছিন্ন ও সূচিবোধে বেদনা রক্তনীতে বৃদ্ধি ও ঘর্ষণে উপশম হইলে
এমন মিউ উপকারী।

ম্যাগ্‌ফ্যানান্—রসবাতিকধাতুর রোগীদিগের গুল্ফ রসবাতা-
ক্রান্ত হইলে ইহা উপকারী। রোগী পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারে না।
ইহার বাতজ লক্ষণ গুল্ফের কৃষ্ণ বর্ণ প্রায় নীলাভ স্থান প্রকাশ পায়।

স্কাবাইনা—শোণিত সম্পন্ন স্ত্রীলোকদিগের গুল্ফের যে
রোগকে বাতজ প্রদাহ বলা যায় ইহা তৎপক্ষে উপযোগী।

এন্টিমফ্রু—গুল্ফদেশের টাটানি বেদনায় উপকারী ।

লিডাম সা, প্র্যাফা এবং নেট কার্ব—পাদমূলের ফোঁকা আরোগ্য করে ।

এলিফান্টিসিমা—পাছকা অথবা ষ্টিকিনের ঘর্ষণে পাদমূলে ক্ষত জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার হয় ।

পাল্‌স এবং কষ্টিকাম্ গুল্ফ রোগের অন্ততম ঔষধ ।

৩। এমনিয়াম কষ্টিকাম ।

ভুলনীহ্ন ঔষধ ;—এমনিয়া-সল্টনিচয়, এরাম টি, কেলি কষ্টিকাম্ ।

সাম্প্রান্ন ক্রিয়া ;—এমনিয়াম্ কষ্টিকামের অধিকাংশ লক্ষণই ইহার বিধাক্রিয়া হইতে স-গৃহীত হইয়াছে । বাষ্পাকারে ইহার শ্বাস গ্রহণেই হটক আর সেবন করাতেই হটক ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজক-রূপে কার্য্য করিয়া থাকে । ইহা শৈল্পিক ঝিল্লির প্রগাঢ় উদ্দীপনা উপস্থিত করায় নাসিকা হইতে বিন্দাহী, জালাযুক্ত ও ক্ষতকর শ্রাব হয় এবং ঠাণ্ডাম্ বা বুদ্ধাস্থির পশ্চাদ্দেশে গ্রাহিয়া জালাযুক্ত অবদারণ ভাব জন্মে । শৈল্পিক-ঝিল্লিতে ইহা-শোথ ও ক্ষত উৎপন্ন করে । ইহার ক্রিয়ায় রোগী অতীব দুর্বল হইয়া পড়ে । ইহা বায়ুনালী আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ বা ব্রকাইটিস্ জন্মিলে প্রচুর গয়ার নিষ্ঠূত হয় এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ার প্রায় শ্বাস রোধের উপক্রম দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।

ডিফথিরিয়া বা **মারাত্মক পলক্ষত** ;—নাসিকা-গহবরের ডিফথিরিয়া রোগে নাসিকা হইতে জ্বালানুস্কৃত ও হাজ্জাকর শ্রাব জন্মিলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে এমনিয়াম কষ্টিকাম উপকারী ।

এফনিয়া বা স্বরলোপ :- স্বরযন্ত্র ও ষ্টার্ণামের পশ্চাদ্দেশ বাহিন্যা জ্বালা ও অবদারণাভাব থাকিলে এফনিয়ারোগে এমন কষ্টি উপকারী। স্বরলোপের চিকিৎসায় ডাঃ ফারিংটন ইহাকে প্রথম স্থানীয় ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

মেমেনাস্ ব্রুপ বা সনিাল্লিক যুং রিকাসি :- কোন কোন কৃতবিধ চিকিৎসক এ রোগে এমন কষ্টিকে অমোঘ ফলদায়ক ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ :- এন্টিম টার্টের জ্বায় বক্ষে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইলে, এবং স্কার্ভেটিনারোগে পূর্বকথিতরূপ নাসিকাশ্রাব থাকিলে, এবং অবস্থাবিশেষে স্বরযন্ত্র-দ্বারের আক্ষেপে ও স্বক-পেশীর রসবাতরোগে এমন কষ্টি দ্বারা উপকার হইয়াছে।

৪। এমনিয়াম্ ফস্ফরিকাম্।

চিকিৎসা।

রসবাত রোগে হস্তাঙ্গুলির সন্ধিস্থানে ও হস্তপৃষ্ঠে গুটিকা জন্মিলে স্থলবিশেষে এমনিয়াম্ ফস্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন রসবাতিক বা রিউম্যাটিক গাউটরোগপ্রস্তু রোগীদের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে ইহা কখন কখন কার্যকারী। ইহা মুখমণ্ডলের শঙ্কাবাত আরোগ্য করিয়াছে।

৫। এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্।

সাধারণ ক্রিয়া :- অধিক মাত্রায় ব্রমাইড্ অব এমনিয়াম্ সেবন করিলে মানসিক জড়তা এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে। ইহার বহিঃ প্রয়োগে শরীরস্থানের অসাড়তা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ব্রমাইড্

সল্ট মাত্রেরই প্রায় এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে । গলমধ্য-রোগেও ইহার কাসির লক্ষণ অতীব আবশ্যকীয় বলিয়া জানিতে হইবে ।

চিকিৎসা ।

স্বরযন্ত্ররোগ—প্রতিশ্চায় ।—বক্তাদিগের স্বরযন্ত্রের সর্দি রোগের পক্ষে এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহার আনুষঙ্গিকরূপে আক্ষোপক কাস থাকিতে পারে ; স্বরযন্ত্র মধ্যে শুড় শুড়ি, তাপ এবং জ্বালা থাকায় কাসি দিবারজনী, বিশেষতঃ রজনীতে, অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে ।



লেক্চার ৫৫ (LECTURE. LV.)

কম্পজিটি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয় ।

১। আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস্ । ২। এব্রটেনাম্ ।
৩। এব্‌সিঙ্ঘিয়াম্ । ৪। কার্ডুয়াস মেরিয়নাস্ । ৫। স্যাফা-
লিয়াম্ । ৬। ল্যাক্টুকা ভিরসা । ৭। মিলিফলিয়াম্ ।
৮। সিনিসিয় অরাস । ৯। ইরিজিরণ । ১০। যুপে-
টরিয়াম্ পার্ফলিয়েটাম্ । ১১। যুপেটরিয়াম্ পার্শ্ব
রিয়াম্ । ১২। ট্যারাকসেকাম ।

১। আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস্ ।—(*Artemesia vulgaris*) ।

সাম্ভারণ ক্রিয়া—স্নায়ুগুণেই ইহার প্রাথমিক ও প্রায় একমাত্র
ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, অথবা স্নায়বিক ক্রিয়া জন্মই ইহা রোগচিকিৎসায়
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনরূপ ক্রিয়ার ফলে মৃগীবৎ
আক্ষেপ এবং চক্ষুর ইন্টার্ণাল রেক্তাম্ ও সিলিয়ারিপেশীর স্নায়বিক
উত্তেজনর প্রতিক্রিয়াঘটিত দুর্বলতায় ইহা বিশেষ প্রকারের ক্রিয়াগত
দৃষ্টিবিভ্রাট উৎপন্ন করে । কম্পজিটি জাতিভুক্ত প্রায় সকল ঔষধই, বিশেষতঃ
সিনা, চক্ষুতে নানাধিক ক্রিয়া প্রকাশিত করিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

মৃগী বা এপিলেপ্সিসি।—কোন প্রকার মানসিক ভাব-
বিপর্যায়, বিশেষতঃ ভীতিপ্রযুক্ত মৃগীর আক্রমণ নিবারণে আর্টি-
মিসিয়া উপকারী । ইহার রোগাক্রমণের কতিপয় আবেশ অতি
শীঘ্র শীঘ্র হইলে, পরে অনেক সময় পর্য্যন্ত বিশ্রাম থাকে এবং

সাধারণতঃ রোগী নিদ্রাভিত্ত হইয়। ইহাকে “বৃহৎ-মৃগী” বা “গ্র্যাণ্ড মল” (ফ্রেঞ্চ) বলে। ইহাতে অত্র যে এক প্রকার মৃগীর আক্রমণ হয় তাহাকে “ক্ষুদ্র মৃগী” বা “পেটিট মল” (ফ্রেঞ্চ) বলিয়া থাকে। শেষোক্ত প্রকারের আক্রমণে “অরা”দি কোন সতর্ককারী পূর্বলক্ষণ উপস্থিত হয় না ; সম্ভবতঃ রোগী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হয়, লক্ষহীনভাবে তাকায়, দুইচারিটা অস্পষ্ট কথা বলিতেও পারে, পরেই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনরাবৃত্ত হওয়ায় পূর্ববৎ পথ চলিতে আরম্ভ করে। পূর্বঘটনা স্মরণ থাকে না।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিদৌর্বল্য বা এস্‌হেনপাইয়া :—
আর্জ্জিভিসিসিয়া-চক্ষুরোগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে “রঙ্গিন আলোকের দিকে তাকাইলে রোগীর মাথা ঘুরিয়া উঠে”। রোগী যদি কোন রঙ্গিন কাচযুক্ত বাতায়ানের নিকটে উপবেশন করিয়া থাকে তাহাতে তাহার শিরোবর্ণন হয়। **চক্ষুদৌর্বল্য বা এস্‌হেনপাইয়া** রোগেও ইহা উপকারী। চক্ষু কার্যালিপ্ত করিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে বেদনা হয় এবং দৃষ্টিমালিন্ত ঘটে। চক্ষু রগড়াইলে এই দৃষ্টিমালিন্ত ক্ষণকালের জন্ত উপশম পায়। চক্ষুপেশীর দুর্বলতা নিবন্ধন চক্ষুঘয়ের পরস্পরের সামঞ্জস্যভূত ক্রিয়া না হওয়ায় (Defective accommodation) এইরূপ দৃষ্টিদোষ ঘটে।

২। এব্রটেনাম্ (Abrotanum.) ।

তুলনীয় ঔষধ :—এগারি, ব্যারাইটা, ব্রায়, কনা, সিমিসি, জেল্‌স্, ফস্, রাস্, জিঙ্ক ।

সাধারণ ত্রিস্থা :—মূলতঃ ইহা স্নায়ুকেদ্র আক্রমণ করিয়া তাহাতে অনতিপ্রবল শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করে এবং ফলস্বরূপ শরীররাংশে স্নায়ুশূলযুক্ত অসাড়তা এবং পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

স্নায়ুশূল বশতঃ রোগী অত্যন্ত অস্থির থাকে এবং শরীরচালনায় তাহার উপশম হয়। ইহার গৌণ ক্রিয়াফলে পুনরুৎপাদিকাশক্তি প্রভূতরূপে বিকস্তু হওয়ায় পুষ্টিক্রিয়ার প্রগাঢ় অবসাদ বশতঃ পরিপাকবিকার জন্মিলে অত্যধিক শারীরিক শীর্ণতা এবং শিশুক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়। শিশুদিগের ক্ষয়রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তান্তুবোপাদান ও রসঝিল্লিতেও ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চিকিৎসা।—হঠাৎ উদরাময়ের রোধ বশতঃ যদি প্রবল জ্বর ও রসবাতরোগে জ্বপিণ্ডের উত্তেজনা প্রযুক্ত বক্ষের আড়াআড়ি ভাবে জ্বপিণ্ডপ্রদেশে তাঁক্ষ ও কঠিন বেদনা হয় তাহাতে **এরটেনাম্** উপকারী। একরূপ **উদরাময়ে** শিশুদিগের **নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (এম্টিয়াক্সিস)**, মূত্রে শোণিত মিশ্রিত থাকে এবং রোগী উৎকর্ষায়ুক্ত ও কম্পভাববিশিষ্ট হয়। সন্ধির **রসবাতরোগ** হঠাৎ বসিয়া যাওয়ায় ভয়াবহ জ্বলক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা **লিডাম, অরাম,** এবং **ক্যালুমিনিয়া** সহ তুলনীয়। ফলতঃ **রোগ স্থানান্তরিত হওয়া** অথবা একস্থান হইতে অতৃষ্ণিত হইয়া স্থানান্তর বা যন্ত্রান্তর আক্রমণ করা **এরটেনামের** একটি বিশেষ প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। হঠাৎ কর্ণমূলগ্রন্থির প্রদাহ স্থানচ্যুত হইয়া অণুকোষ বা সন্ধিতে যাউলে **কার্ল ভেজ** কিম্বা **শালুসে** তাহা আরোগ্য না হইলে **এরটে** আরোগ্য হইয়াছে। উদরাময়ের হঠাৎ **অস্বক্ৰান** বশতঃ রসবাত ও রক্তস্রাব উৎপন্ন হওয়ার বিষয় ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে; ইহা কখন কখন **অর্শরোগের** কারণ হইয়া থাকে।

প্লুরিসি বা ফুস্ফুস্বেষ্টনির্মিলিপ্রদাহ।—**ব্রাহ্ম-নির্মিল** প্রকৃত প্রদর্শক লক্ষণ উপস্থিত থাকিলেও যদি তাহা দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় এবং বক্ষপার্শ্বে চাপবৎ অনুভূতি

বর্তমান থাকে ও খাসপ্রস্থাসের বাধা জন্মে, তদবস্থায় এব্রটে ফলপ্রদ । ডাঃ কেণ্ট কোন মুম্বুরোগীকে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। খাসকৃচ্ছ, উৎকর্ষা, শীতল ঘর্ম এবং হৃৎশূল প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণযুক্ত শয্যাগত রোগিণীর আত্মীয়স্বজনগণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রোগিণীর রসবাত রোগ কোন উগ্র প্রলেপ দ্বারা চর্চাৎ আরোগ্য হওয়ার পর ব্যাধির আক্রমণ হয়, ডাঃ কেণ্ট ইহা শ্রবণ করিয়া এব্রটে প্রয়োগ করায় রোগিণী স্থিরত প্রকৃতিস্থ হইলেন ।

এব্রটেনাম্ রোগী শৈত্য এবং আর্দ্রশীতল বায়ু সহ্য করিতে পারে না। তাহাতে পৃষ্ঠবেদনা জন্মে এবং লক্ষণাদির রজনীতে বৃদ্ধি হয় ।

আমাশয় শূল বা গ্যাস্ট্র্যাল্জিহা :- রোগের অবস্থা-বিশেষে এব্রটেনাম্ দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায় । আমাশয়ে জ্বালাযুক্ত ও টাটানি বেদনা হয়, এবং আমাশয় যেন জলনধো কুলিয়া কিম্বা জলোপরি ভাসমান থাকার ছায় শীতল বোধ হয় । বমনের পদ্ধতিতে ক্যান্সারাদি কঠিন রোগের সন্দেহ জন্মে । ইহার উদরদক্ষণস্বরূপ কখন উদরাময় ও কখন কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন হয়, অথবা পর্য্যাহক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে । নেট্রাম সালফ ও জিঙ্কাম্ রোগীর ছায় ইহার রোগীও উদরাময়ের উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে রসবাত, রক্তস্রাব ও অর্শ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মে ।

শিশুদিগের ন্যভি হইতে রক্তস্রাব এবং বালকদিগের হাইড্রসিল বা জলদোষরোগ এব্রট আরোগ্য করিয়াছে ।

শিশুক্ষয় বা ম্যারেস্‌মাসরোগের এব্রটেনাম্ অত্যন্ত প্রধান ঔষধমধ্যে গণ্য । ইহাতে শরীরের ক্ষয় বা শীর্ণতা অধঃ অঙ্গে

আরম্ভ হইয়া শরীরোর্ধ্বে বিস্তৃত হয়, অথবা শরীরোর্ধ্বাংশ সর্বশেষে শুষ্কতা পায় ; লাইক, নেট মি এবং সোরির শীর্ণতা শরীরোর্ধ্বে আরম্ভ হইয়া ক্রমে অধঃ অঙ্গে যায় এবং অনেক সময়ে উদরাময়ের হঠাৎ রোধ ঘটয়া পীড়া জন্মে এবং রোগীর পর্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় থাকে, এবং অতি ক্ষুধায় উদরের কামড়ানি হয়, রোগী যাহা পায় হাম হাম করিয়া খায় এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্ত্র মলসহ নির্গত হওয়ায় শীর্ণ হইয়া যায়। শিশু বড় অবসাদগ্রস্ত। অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং খায় কিন্তু শীর্ণ হইয়া যায়—এসেটিক এসি, এল্রটে, আয়ডিন, স্যানিক এবং টুবাকু । এল্রটে, এমন মি এবং আর্জেজ নাইতে জস্যার অধিকতর এবং নেট মি ও সার্জ্জাপ্যারিলান্ন গ্রীবার অধিকতর শীর্ণতা জন্মে।

৩। এব্‌সিন্থিয়াম্ (Absinthium)।

তুলনীল ঔষধ ।—আরটি মল্‌গভা, এল্রটে, এল্কহল, বেল, ক্যাম, হায়সা, ট্র্যাম ।

সাধারণ প্রিন্সিপাল্‌স্‌—ইহার মাদক ও সাধারণ ঔষধিক এবং যান্ত্রিক ক্রিয়োত্তেজক গুণের বশবর্তী হইয়া বুরপথগের অনেকে ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সেবনের প্রাথমিক ফল স্বরূপ মানসিক ক্ষুধা উপস্থিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রা অতিক্রম করিলে শীঘ্রই অতি ভয়াবহ প্রলাপবন্ধন দেখা দেয়। প্রলাপকালে অনবরতঃ ভ্রমণ করা এই পর্যায়ভুক্ত সকল ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায়। এব্‌সিন্থিয়াম্‌রোগী নানাপ্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করে, এবং যন্ত্রণা বশতঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। ক্যান্সিনা ও সিনা যন্ত্রণার উপশম হয় বলিয়া শরীর চালনা করে ; আন্তঃশিখা

ইচ্ছা করিয়া চলিয়া বেড়ায়। ফলতঃ ইহা মূলতঃ মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ মেডুলা অবলম্ব্বেটা প্রদেশে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার শৈবোক্ত ক্রিয়াফলে পেশীকম্প, প্রবল ও ক্ষণিক (Tonic and Clonic) আক্ষেপ, মুখে ফেণোচ্ছলন, অনৈচ্ছিক মলত্যাগ ও রক্ত-স্বলন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ও প্রলাপকথন প্রভৃতি মৃগীবৎ লক্ষণ উপস্থিত হয়। গোণভাবে ইহা পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করায় প্রথমে ক্ষুধার বৃদ্ধি, পরিপাক শক্তির উন্নতি, শোণিতগতির বৃদ্ধি এবং স্রাবাদির ক্রিয়াক্রম আধিক্য উপস্থিত করে। কিন্তু ন্যূনাধিক কাল পরেই ইহার অবশুস্তাবী প্রতিক্রিয়াবশতঃ পরিপাকবিকার এবং তদানুযুক্ত লক্ষণপরম্পরা উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ার মতের ক্রিয়াসহ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তদপেক্ষা ইহা গুরুতর ফল উৎপাদন করে। যুবা ব্যক্তিদিগের রোগে ইহার অধিকতর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের শোণিতাদিকা বশতঃ ভয়াবহ প্রলাপ ও অস্থিরতা সহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং মস্তিষ্কের অধদেশে রক্তাধিক্য হওয়ায় অনিদ্রা লক্ষণে এব্‌সিহ্ন ফলপ্রদ হইয়াছে। ইহা মেরুমজ্জার শোণিতাধিক্য ও উত্তেজনা উৎপন্ন করিলে মৃগীবৎ সর্বাস্থান আক্ষেপ হওয়ায় বৃদ্ধদিগের স্নগীত্রোপা-বেশের অন্তে বৃদ্ধির জড়তা ঘটিলে এবং শিশুদিগের সর্বাস্থান আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন অধিককাল স্থায়ী হইলে প্রযুক্ত হইয়া উপকার করিয়াছে।

৪। কার্ডুয়াস্ মেরিয়নাস্ (Carduus Marianus)।

ভুলনীর ঔষধ।—চেলি, সিঙ্ক, আয়ডি, মার্কু', পড।

সাধারণ ক্রিয়া।—কার্ডুয়াস্ মেরিয়নাস্ যক্ষুৎ এবং পোর্টাল বা যকৃৎদ্বার শিরা আক্রমণ করায় গ্রাভা বা জণ্ডিস্ এবং অগ্রাগ্র পিত্ত-

বিকার উৎপন্ন হয় । এবং এই সকল লক্ষণ দূরীকরণ জন্ত প্রযুক্ত হইলে ইহা অতি স্পষ্ট সুফল প্রদান করে ।

লক্ষণ ।

মনঃ—মস্তকের অবসাদভাব । মানসিক বিশৃঙ্খলভাবযুক্ত শিরো-
ঘূর্ণন ।

আমাশহ্রাদিঃ—তিক্তাস্বাদ এবং ক্ষুধাহীনতা । বিবমিষা ;
উদগার ; লালাস্রাবের বৃদ্ধি এবং আমাশয়ের স্ফীতি ।

উদরঃ—যকৃতের স্ফীতি ও বেদনা ; যকৃতদেশে পূর্ণতার অনুভূতি
এবং চাৰা । দক্ষিণপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে যকৃতের আততভাব এবং
চাপ ।

মনঃ—পর্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় । বিষ্ঠায় পিত্তের
স্বল্পতা ।

মূত্রঃ—মত্রে পিত্তের রঞ্জকপদার্থের বর্তমানতা । মূত্র অত্যন্ন,
ঈষৎ কটা এবং ঘোলাটে ।

চিকিৎসা ।

যকৃত রোগ—যকৃতের প্রবল রক্তাধিক্য বা
হাইপারিমিয়া ; চাৰা বা জন্টিস্মঃ—শ্যাবালক্ষণযুক্ত যকৃত-
রোগে মূত্র শিরঃশূল, তিক্তাস্বাদ, লোহিত পার্শ্ব ও অগ্নয়ুক্ত শুভ্র জিহ্বা এবং
ঈষৎ সবুজ ও তরল পদার্থের বমন থাকিলে কান্ন ডুহ্লাস প্রযোজ্য ।
যকৃতদেশ অস্বস্তিকর পূর্ণতা বিশিষ্ট, বিষ্ঠা পিত্তসংযুক্ত এবং মূত্র স্বর্ণাভ ;
দক্ষিণ কৃষ্ণি ও আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশ স্পর্শে বেদনা । ডাঃ বার্ণেটের
মতে “ষ্টার্ণাম বা সম্মুখ ও মধ্য বক্ষের নিম্নাংশের উপরিভাগে ঘোর
কটাসে ত্বকস্থানের বর্তমানতা” কান্ন ডুহ্লাস মেরিফিল্ডসের
উৎকৃষ্ট নির্দেশক বলিয়া গণ্য ; তিনি বলেন “ইহা যকৃত এবং হৃৎপিণ্ড

উভয়ের বিকার প্রদর্শন করে।” শরীররোগের পিত্তকলঙ্ক ইহার একটি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া অনুমিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাস্তিক পিত্তবিকার ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। হাইড্র্যাপ্টিসে তিক্তাস্বাদ, অস্ত্রের পুরাতন জড়ত্ব নিবন্ধন কোষ্ঠবন্ধ, লেপযুক্ত জিহ্বা এবং হরিদ্রাবর্ণ মূত্র দৃষ্ট হয়। কার্‌ডুয়াস, এলো সহ তুলনীয়। ডাঃ হেল বলেন “শিরাবিকারে ইহা এলো ও হেমার মধ্যস্থান অধিকার করে। পিত্তশীলা রোগেও ইহা উপকারী।

সবিরাম জ্বর :- উপরি উক্ত গ্রাবালক্ষণাদি বর্তমান থাকিলে শীতকম্পাদির অবস্থায়ুক্ত সবিরাম জ্বর ইহা যে আরোগ্য করিতে পারে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

৫। গ্ৰাফ্যালিয়াম্ (Gnaphalium)।

তুলনীয় ঔষধ :- কাম, কলগি, জ্যাথক্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া :- ইহার আদি ক্রিয়া মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডের স্নায়ু-মণ্ডলে হওয়ায় মুগ এবং অধঃঅঙ্গে ইহা স্নায়ুশূল উৎপন্ন করে। গোণভাবে ইহার ক্রিয়ায় ঋতুপিকার উপস্থিত হয়। পুনরুৎপাদিকাশক্তির বিকার লক্ষণস্বরূপ ইহাতে তৃগধঃ গুটিকা এবং মুখে বিশেষ প্রকারের ব্যোত্রণ ও চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা :- অবস্থা বিশেষে সাংস্ফাটিকা বা অধঃঅঙ্গের স্নায়ু-শূলরোগে গ্ৰাফ্যালিয়াম্ দ্বারা ফল পাওয়া যায়। তাঁহা স্নায়ু-শূল সায়্যাটিক স্নায়ুর শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়। বেদনায় আক্রান্ত শরীর্যাংশের অসাড়তা জন্মে অথবা অসাড়তা ও বেদনা পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। ইহা কলসিন্দু সহ তুলনীয়। বেদনা পদাস্থলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহা পদাঙ্গুলির রসবাতবৎ বেদনা আরোগ্য করিয়াছে। উপরিউক্ত সায়্যাটিকা বর্তমান থাকিলে ইহা জ্বর

ও লালচে কটাবর্ণের আবয়ুক্ত রক্তোচ্ছরোপ আরোগ্য করিতে সক্ষম। বস্তিকোটরে অত্যন্ত কষ্ট থাকে। রক্তোচ্ছরোগে সহিদ্র বয়োত্রণ, তৃগধঃ গুটিকা এবং মুখে চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

৬। ল্যাক্টুকা ভিরসা (Lactuca Virosa) ।

তুলনীয় তমস্রঃ—কফিয়া, ড্রসিরা, ওপিয়াম।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুদণ্ডে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া নারীস্পন্দনের শক্তি ও সংখ্যার হ্রাস করে এবং রোগীর নিদ্রায় প্রবৃত্তি জন্মে। ক্রিয়ার কোন অবস্থাতেই ইহা অহিফেনের ত্রায় মস্তিষ্ক ও শোণিতসঞ্চলনের উত্তেজনা আনয়ন করে না। ইহার পরোক্ষ ক্রিয়ায় পুনরুৎপাদিকাশক্তি ও স্বাস্থ্যের শৈল্পিক ঝিল্লি আক্রান্ত হয়। শরীরের অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্বলতা জন্মে; শরীরে অনত্যন্ত আততভাব উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসাঃ—“স্বরবস্ত্রের উত্তেজনাবশতঃ শ্বাসরোধের অনুভূতি ও গলাধঃ গহ্বরে শুড়শুড়ি হইলে যে প্রচণ্ড আক্ষিপিক কাসিতে বক্ষক বিদীর্ণ হওয়ার ত্রায় আশঙ্কা জন্মে” তাহাতে ল্যাক্টুকা উপকারী। প্রচুর শ্লেমা নিষ্ঠূত হইলে কাসির নিবৃত্তি হয়। এস্থলে ইহা ড্রসিরা সহ তুলনীয়।

মস্তিষ্কলক্ষণস্বরূপ “বিরক্তি ও খিটখিটে ভাব এবং চিন্তাশক্তির বিশৃঙ্খলা ও দৌর্জল্যা; মস্তকে মূহ বেদনা এবং দক্ষিণ কুক্ষির পূর্ণতা” প্রভৃতি ঔষধ-পরীক্ষাংগন লক্ষণপরম্পরামধ্যে নিকট সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ডাঃ হিউজ অনুমান করেন যে, ইহা দ্বারা গুণ্যবায়ুঘটিত শিরশ্চক্ষুশূল, মস্তিষ্কায় দৌর্জল্যাঘটিত নিদ্রালুতা এবং কোন বিশেষ প্রকারের শোণিতসঞ্চলিক যক্কতরোপ আরোগ্য হইতে পারে।

৭। মিলিফলিয়াম্ (Millefolium)।

উপচয়ঃ—অস্থি এবং সন্ধিসন্নিহিত প্রদেশে ধীরগতির সৃষ্টি-বেধবৎ অথবা দপদপানি বেদনা, শরীরের বামপার্শ্বে এবং হস্ত ও পদে অধিকতর থাকে। সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে।

উপশাসনঃ—ওয়াইন মণ্ড পানে। দিবসে।

সম্বন্ধঃ—মিলিফলিয়াম্ যাহার কার্য্যপ্রতিবেধক—অরাম মিউ। মিলিফলিয়াম্ মস্তকে রক্তাধিক্য জন্মাইলে কাফিপানে তাহার উপশম।

ইহা যাহার পরে প্রযোজ্য—রক্তশ্রাবে একন ও আণিকার।

ভুলনীহ্নঃ—আণিকা, কার্ক ভেজ, ইরিজি, হেমা, ইপিকা, সিনিসি অরি, ট্রিলি।

সাম্প্রারণ ত্রিহ্নাঃ—মেরুমজ্জয় ন্নায়ুর প্রাথমিক আক্রমণদ্বারা ইহা কৈশিক শিরানগুলী, বিশেষতঃ বস্তিকোটরস্থ কৈশিক শিরানগুলী বিকারগ্রস্ত করিলে বস্তিকোটরস্থ, নাসিকা ও কুস্কুস্ হইতে শোণিতশ্রাব হয়। ইহার শোণিতশ্রাব হেমামেলিসের শ্রাব হইতে প্রবলতর।

লক্ষণ।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতশ্রাব; মস্তক এবং বক্ষে রক্তাধিক্য হইলেও ঐরূপ।

শ্বাসযন্ত্র।—অর্শের শোণিতের ও ঋতুশ্রাবের রোধ নিবন্ধন কাসি হইলে পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল শোণিত নির্গত হয়, বক্ষে কষ্ট জন্মে এবং যক্ষ্মাকাশের রোগীর হৃৎকম্প হয়। বায়ুনলীতে অত্যধিক শ্লেষ্মার সঞ্চয়। কুস্কুস্ বিদ্ধ করার ত্রায় বেদনা এবং ছল্বেধ ও ঘৃষ্টবৎ অস্থভূতি।

স্ত্রীজননেদ্রিয়।—ঋতুর রোধ অথবা অতি প্রচুরতা। অত্যধিক পরিশ্রম প্রযুক্ত জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব ও মস্তকে রক্তাধিক্য। শ্বেতপ্রদর।

সাধারণ লক্ষণ।—অঙ্গাদিতে বিদ্ধ, আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা ও রক্তাধিক্য। রক্তস্রাব; শৈল্পিকঝিল্লির নির্জীবতাবশতঃ শ্লেষ্মাস্রাব। ক্ষত হইতে, বিশেষতঃ রোগী পতিত হইলে প্রচুর রক্তস্রাব। অঙ্গাদির অত্যাচে উত্তোলনের অথবা অতি পরিশ্রমের কুফল।

চিকিৎসা।—অধিকাংশ সময়ে যাদ্বিক নির্জীবতা অথবা অত্যধিক শ্রম নিবন্ধন নাসিকা, কুস্কুম, অন্ন এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে উজ্জ্বল শোণিতস্রাবে মিলিফলিফ্যাম দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোণিতস্রাবে ইহা একনাইট সহ তুলনীয় হইলেও তাহার ঞায় ইহাতে রোগী উৎকর্ষযুক্ত হয় না। অগ্নাণ্ড রোগমধ্যে রক্তস্রাব, অর্শ, সক্ষমান্কাশ, শৈল্পিকঝিল্লির নির্জীবতা বশতঃ প্রতিশ্যাল এবং গর্ভাবস্থার ভেব্রিকজ ভেইনস্ বা শিরাবিস্তৃতির চিকিৎসায় ইহা ফলপ্রদ।

৮। সিনিসিয় অরিয়াম্ (Senecio Aureus)।

উপচয়।—সাধারণতঃ অপরাধে।

তুলনীয় ঔষধ।—ক্যাক্বে কা, হেলনি, ফস্, পাল্, গ্ৰাস্, ই, সিপি।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা দ্বারা শৈল্পিক ঝিল্লি অতি প্রবলরূপে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা জন্মে এবং তাহা হইতে অধিকতর শ্লেষ্মাস্রাব হয়। জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্র সহ ইহার বিশেষ এবং বায়ুনালী ও অন্ত্রপথ সহ স্বল্পতর ক্রিয়াসম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। গুল্মবায়ু এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অগ্নাণ্ড রোগের প্রক্ষিপ্তক্রিয়া নিবন্ধন স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতার ঞায় স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতাও ইহা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

লক্ষণ ১—হাঁচি এবং নাসিকার পূর্ণতা ও জ্বালা। সর্দিরোগ। সরল প্রতিগাঢ়িক কাসি, বিশেষতঃ আনুষ্ঙ্গিকরূপে যদি ঋতুস্রাবের অনিয়ম বা রোধ ঘটে। বায়ুনলীর শ্লেমাশ্রাবের বৃদ্ধি হইলে বায়ুনলী এবং ফুস্ফুস্ শ্লেমাপূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু কিছু উঠে না।

মূত্রবহ্ন বিকারবশতঃ মূত্রস্থানার তাপ ও বেগ হওয়ায় কৃষ্ণন হইতে থাকে ; কিড্‌নিপ্রদেশে বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। শীতভাবে পর মূত্রবেগ এবং শোণিতরঞ্জিত মূত্র ত্যাগ। মূত্র অত্যন্ন ও অতিশয় রঞ্জিত থাকে। বারম্বার প্রচুর মূত্রের স্রোত বহিয়া নির্গমন। কিড্‌নিপ্রদেশে অল্প বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঋতুরোধ। বাধক বেদনায় মূত্রদম্বক্ষীয় কষ্ট। পুষ্টির বেদনা হইলে অতি শীঘ্র প্রচুর ঋতুস্রাব। বাধাপ্রাপ্ত অত্যন্ন ঋতুস্রাব। অনিয়মিত ঋতুস্রাব ; সময়ে অতি শীঘ্র, সময়ে বিলম্বাগত। ঋতুস্রাবের পরিবর্তে শ্বেতপ্রদর অথবা শ্বেত-প্রদরকালে মূত্রদম্বক্ষীয় কষ্ট।

সাধারণতঃ রোগী বাতপ্রকৃতি ও অসহিষ্ণু। নিদ্রাহীনতা ও গুল্মবায়ুবৎ মানসিক ভাব। গভীর অনিদ্রায় জাজ্জল্যমান ও অসহৃষ্টিকর স্বপ্নদর্শন।

প্রদর্শক লক্ষণ ১—অধিকাংশ রোগসহ স্ত্রীজননে-
ন্দ্রিয়বিকাৰের বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক।

চিকিৎসা ১—জরায়ুর উত্তেজনাবশতঃ অনিদ্রা ঘটিলে সিনিসি জরায়ুর শান্তি বিধান করিয়া নিদ্রানয়ন করে।

যুবতী স্ত্রীলোকদিগের নাসিকাসর্দিতে অবস্থা বিশেষে ইহা-
দ্বারা কার্য্য হয়।

যুবতী স্ত্রীলোকদিগের অনেকদিন পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকিলে ক্রমশঃ তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও রক্তহীনতা জন্মে। তাহারা থ্যাক্ থ্যাক্ করিয়া

কাসে এবং অনুকুল রক্তশ্রাব স্বরূপ রক্ত নিষ্ঠূত হয়। তাহারা প্রথমে প্রতিশ্യാস্ট্রিক হস্কমাকাস বা ক্যাটারেল থাইসিস্ রোগগ্রস্ত হইলে অবশেষে ফুস্ফুসে গুতিকোৎপত্তি (Tubercle in lungs) হয়। রোগী সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ সহ করিতে পারে না, তাহাতে কাসির বৃদ্ধি হয় ও ক্রমেই অধিক পরিমাণে গম্মার উঠিতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় সিনিসিস্ প্রযুক্ত হইলে ঋতুশ্রাব পুনরানয়ন করিয়া ইহা রোগারোগা করিতে পারে।

মূত্রযন্ত্ররোগে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু বিকার সংস-
বীয় মূত্রযন্ত্ররোগে সিনিসিস্ দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়। মূত্রত্যাগে
অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। মূত্রস্থালীগ্রীবায় অশাস্তিকর তাপানুভূতি জন্মে। কিড্‌নি,
বিশেষতঃ দক্ষিণ কিডনি প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় বিবমিষার উদ্বেক
হয়। এই সকল লক্ষণ থাকায় সিনিসিস্ কিড্‌নির পাথরি,
মূত্রশিলা বা অশ্মরি রোগের উদ্ভবশূল উপশম
করিয়াছে। সম্পূর্ণ মূত্রশ্রাব হইতে রক্তশ্রাব, বিশেষতঃ তাহা
ঋতুরোধবশতঃ হইলে এবং অবস্থা বিশেষে রক্তরোগ নিবন্ধন উদ্ভবী
প্রভৃতি জ্বলশোথের পক্ষে ইহা উপকারী।

রক্তোক্ষুচ্ছ বা ডিস্‌মেনরিয়া রোগে মূত্রবিকার
এবং কটি ও আমাশয় প্রদেশে কর্তনবৎ বেদনা থাকিলে রোগী রজনোতে যদি
হক্ হক্ করিয়া কাসিতে থাকে সিনিসিস্ তাহার ঔষধ। সিক্ততা বা
পদ সিক্ত করা প্রভৃতি শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত আর্ভবাতাব বা
এমেনরিয়ারোগে ন্নায়ুর উত্তেজনা প্রবণতা, আলস্য এবং জল-
শোথ জন্মিলে সিনিসিস্ প্রযুক্ত হয়। রক্তহীন বা নৃৎ-
পাণ্ডুরোগগ্রস্ত (Chlorotic) বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদররোগের ইহা
বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহাদিগের গাত্রবর্ণ সব্জাভ হওয়ায় ইংলণ্ড
প্রভৃতি দেশে এই রোগে গ্রিগনিকনেস বলে।

৯। ইরিজিরন— (Erigeron)

ভুলনীল ঔষধ ।—একন, সিনামম, ইপিকা, শ্রাবাই, সিকেলি, টেরিবি, টিলিয়াম ।

সাধারণ ত্রিফলা ।—ধমনীমণ্ডলের পেশীর (unstripped muscular fibre) আক্রমণ দ্বারা ইহা শিথিলতা উৎপন্ন করায় নাসিকা, অন্ত্র ও অন্ত্রাণ্ড যন্ত্র এবং বিশেষরূপে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয় । শোণিতের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ এবং সামান্য গাত্রচালনায় রক্তস্রাবের বৃদ্ধি ইহার বিশেষতা । মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ায় ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে ।

চিকিৎসা ।

পুরাতন পণরিফ্রা বা পূহাশ্রাবুরোপে তর্গন্ধ ও জালা-বৃদ্ধ মূত্র ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গমনকালে মূত্রপথ জালা ও চন্ চন্ করিলে ইরিজিরন দ্বারা উপকার হয় । শোণিত স্রাব—কোন কোন চিকিৎসক প্রায় সর্বপ্রকার রক্তস্রাবের পক্ষেই ইরিজিরনকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন । জরায়ুর রক্তস্রাবকালে সরলাঙ্গ ও মূত্রস্থালীর উত্তেজনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র থাকিলে ইহা উপকারী । ইহার শোণিতস্রোত থাকিয়া থাকিয়া বহে ; প্রবল স্রোত বহিতে বহিতে চঠাৎ রোধ ঘটে, পুনঃ বহিতে থাকে ; শোণিত সহ কৃষ্ণবর্ণ শোণিতচাপ মিশ্রিত থাকে । প্রসবান্তিক রক্তস্রাব এবং মূত্রস্থালীতে মূত্রশিলার বর্তমানতা নিবন্ধন মূত্রস্থালী হইতে অদমনীল শোণিত স্রাব নিবারণেও ইহা সক্ষম ।

১০। যুপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটাম ।

(Eupatorium perfoliatum)

সম্ভ্রম ।—য়ুপে পার্কর পরে প্রযোজ্য—নেট মিউ, সিপিয়া ।

ভুলনীয় ঔষধ ;—চেলিড, পড, লাইক (ছাবারোগে) ।
 ব্রায়নিয়া ইহার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত সমক্রিয় ঔষধ । ব্রায় রোগীর
 প্রচুর ঘর্ম হয় ও সে বেদনার বৃদ্ধি জগ্ন স্থিরাবস্থায় থাকে ; যুপের ঘর্ম হয়,
 কিন্তু বেদনা জগ্ন সে অস্থির থাকে ।

সামান্য ক্রিয়া ;—আমাশয়, বক্রং, তান্তবোপাদান এবং
 বায়ুনদীর মৌলিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শনীয় থাকে । আমাশয়-
 বক্রংমণ্ডলের রোগলক্ষণে ইহা পিত্তবমনাদি, তান্তবোপাদান আক্রমণ-
 লক্ষণস্বরূপ অঙ্গাদির বহুতর স্থানে বেদনা ও টাটানি এবং বায়ুনদীতে
 ক্রিয়া ফলে কাসি ও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন করে । ফলতঃ, শরীরে
 ইহা যে অবস্থা উৎপন্ন করে ম্যানেরিয়ারোগলক্ষণ সহ তাহার বিশেষ
 সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় । বৃদ্ধ এবং মত্তপান্যাদিগের পক্ষে ইহা
 বিশেষ উপযোগী ।

লক্ষণ ;—ঋসবয় বিকারবশতঃ নাসিকাসন্ধিতে হাঁচি হয় ও
 প্রত্যেক অস্থি কন্ কন্ করে । স্বরথগ্নে সর্দি ও স্বরভঙ্গ । সন্ধ্যাকালে
 খ্যাক খ্যাক করিয়া কাসি । বায়ুনদীর টাটানি ও তাপ । কাসি হইলে
 চক্ষু জলপূর্ণ হয় এবং নুখের রক্তিমতা জন্মে । সুবিরাম অরের রোধ প্রযুক্ত
 প্রলাপকজ্ঞাসংযুক্ত কাসি । বক্ষে টাটানি থাকিলে ঋস টানিতে
 বর্দ্ধিত হয় এবং দাঁড়াইতে, বসিতে বা শুইতে রোগী শরীর বাঁকাইতে
 পারে না ।

রসবাতরোগ প্রবণতা বিশিষ্ট রোগীর বেদনা, অধঃ হইতে উঠে যায় এবং
 রোগ সহ পিত্তনিপ্রিত উদরাময় জন্মে । রসবাত এবং পিত্তজররোগী অস্থিরতা
 সহ পার্শ্বপরিবর্তন করে, কৈঁকায় এবং ক্লাস্তি ও মুচ্ছার ঞ্চায় বোধ করে ।

প্রতর্শক লক্ষণ ;—সম্পূর্ণ শরীরে হৃষ্টবৎ
 বেদনায় অস্থি ভঙ্গের অনুভূতি—শরীরের টাটানি ও
 কনকনানি আর্ণিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তীক্ষ্ণতায় তাহা

সুপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটামের কনকনানি বেদনা সহ তুলনীয় নহে । ইহার ঘৃষ্টাভূতি এতাদৃশ প্রবল যে, রোগী বোধ করে যেন তাহার সম্পূর্ণ শরীরের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে অথবা সন্ধিনিচয় হইতে অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটয়াছে ।

চিকিৎসা ।

সর্দিরোগ—নাসিকাসর্দি ; ইন্ফুয়েঞ্জা বা দেশ ব্যাপক প্রতিশ্চায় ; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বরযন্ত্র সর্দি ; এফনিয়া বা স্বরলোপ ; কাসি ।—সুপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটামের উপরিউক্ত সাধারণ সর্দি ও ইন্ফুয়েঞ্জা ওভূতি সর্দিরোগ মাঝেই সম্পূর্ণ শরীরের ঘৃষ্টবৎ কনকনানি বেদনার রোগী বোধ করে যেন তাহার অস্থিনিচয় ভগ্ন হইয়াছে । স্বরবৎ প্রভৃতি উর্দ্ধ শ্বাসযন্ত্রপথের অত্যন্ত টাটানি, স্বরবদ্ধ এবং কাসি হয় । সাধারণ নাসিকা সর্দিতে অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু রোগী জলপান করিলে বমন হইয়া যায় । কঠিন কাসিতে বোধ হয় যেন শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, মস্তক এবং বক্ষে আঘাত লাগায় রোগী ড্রসিবার হ্রায় মস্তক ও বক্ষ হস্ত দ্বারা ধারণ করে । সাধারণ সর্দি রোগে ইহা অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত সহ তুলনীয় । “গড় ভাঙ্গা বেদনার” বর্তমানতাই ইহার বিশেষতা । এই সকল রোগলক্ষণ সহ তরুণ পিত্তবিকারের উপস্থিতি ইহার অধিকতর নিশ্চয়্যাক প্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে । অনেক চিকিৎসক ইন্ফুয়েঞ্জারোগের প্রথনাবস্থার চিকিৎসায় কেবল সুপেটোরিয়ামের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন ।

সবিরাম জ্বর এবং প্রাতিশ্চায়িক জ্বর বা ক্যাটারেল ফিবার্,—“অস্থিবেদনা এবং শীতকম্পের অন্তর্ধানের

সঙ্গে সঙ্গে বমনের বিরতি” স্লুপে পার্ফর সবিরাম জ্বরের প্রদর্শক । এই জ্বরে ইশিকা জ্বরের ত্রায় আগাশয়লক্ষণ উপস্থিত হয়, সম্পূর্ণ শরীরে আর্গিকার ত্রায় পেশীর বেদনা থাকে এবং শীতকম্প পর্যায়ক্রমে এক দিবস সকালে ও পর দিবস সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে এবং শীতের পূর্বে তৃষ্ণা হওয়ায় জল পান করিলে তাহা ও তিক্ত পিত্ত বমন হইয়া যায় । ফলতঃ তৃষ্ণা, জলপান এবং তিক্ত বমনের উপস্থিতি প্রযুক্ত রোগী বুঝিতে পারে শীতকম্প আসিতেছে, কেননা সে “যথেষ্ট জল পান করিতে পারে না।” কটিতে শীত আরম্ভ হয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে চাপাহুভূতি জন্মে । ডাং বেজ “মস্তকে চাপ এবং ললাটে গুরুত্বাহুভূতিকে” এ জ্বরে স্লুপে পার্ফর নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করেন । তাপের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বেদনার বৃদ্ধি হয় । ঘর্ম অত্যন্ত, অথবা হয় না । কিন্তু অগ্রাণ্ড লক্ষণ স্পষ্ট থাকিলে প্রচুর ঘর্মেও ইহার ক্রিমার বাধা জন্মে না । স্লুপেটোরিয়ান্স-জ্বরের আক্রমণের অনিয়মিত পরিষ্ফুরণ হয় । যকৃতের বিকার থাকে এবং গাত্রের পীড়া জন্মে ।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে পিত্তের বমন, বক্ষ, পেশী 'ও' অস্থির বেদনা, নাসিকা হইতে সন্ধিস্রাব, চক্ষু হইতে জল স্রাব এবং চক্ষুগোলকে টাটানি এবং মস্তকে কনকনানি থাকিলে, ইহা অব্যর্থ ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

এশিস্—ডাং উল্ফ্ ইহাকে সবিরাম জ্বরের অগ্রতম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । ঘর্মে তৃষ্ণা থাকে না । অপরাহ্ন ৩ বা ৪ টার সময় শীত হয় ও তাহাতে তৃষ্ণা থাকে । রোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে আম বাতের উদ্ভেদ দেখা দেয় ।

ব্লাস্টক্—উর্দদেশে শীতের আরম্ভ হয় ও সাধারণতঃ জ্বরের সহিত গুরু কাসি থাকে ।

১১। যুপেটোরিয়াম পার্‌পূরিয়াম্ ।

(*Eupatorium purpurium.*)

তুলনীল তম্বু ১—এপিস, এপসাই, ক্যানা শ্রাট, যুপে পার্‌ক সিনিসিয় ।

সাধারণ ক্রিয়া ১—মূত্রযন্ত্র এবং পেশীমণ্ডলই হইবার ক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য। মূত্রযন্ত্রে ক্রিয়া দ্বারা ইহা মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং মূত্রস্থালীর অত্যধিক উত্তেজনা উৎপন্ন করে। পেশীমণ্ডলে ক্রিয়া বশতঃ ইহা রসবাত সৃষ্ট রোগ উৎপন্ন করে। স্নায়ুমণ্ডলে গৌণ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা স্থূল-বিশেষে অধঃ হইতে উর্দ্ধগামী স্নায়ুশূল, শ্রবণ ও দৃষ্টিভ্রম এবং চিন্তাবিন্যাস উপস্থিত করে।

লক্ষণ ১—পৃষ্ঠে প্রচণ্ড কর্তনবৎ বেদনা। বৃক্কের গভীরদেশে মুহু এবং কর্তনবৎ বেদনা। মূত্রত্যাগে মূত্রস্থালীতে এবং মূত্রপথে তীব্র চনচনি ও জ্বালা। মূত্রের পরিমাণের অত্যন্ত বৃদ্ধি। নিরীধ মূত্রক্ষরণ, বিশেষতঃ শিশুদিগের। অবিশ্রান্ত মূত্রত্যাগেচ্ছা; বারম্বার মূত্রত্যাগের পরেও মূত্রস্থালী পূর্ণ বোধ। মূত্রস্থালীতে টাটানি, বেদনা, গভীর কনকনানি অস্থস্তি এবং সর্দি।

রোগী রসবাতরোগপ্রবণ; বেদনা শরীরোধঃ হইতে উর্দ্ধগামী হয় ও পিত্ত সংযুক্ত উদরাময় জন্মে। রসবাত রোগে ও পৈত্তিক জরে রোগী অস্থির থাকে, এপাশ ওপাশ করে, কঁকায় এবং ক্রান্ত ও মুচ্ছার ভাৱ বোধ করে।

চিকিৎসা ।

স্বল্পক বা কিড্‌নি এবং মূত্রস্থালীর প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্ ১—পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল মূত্রস্থালী প্রদাহরোগে যুপে পার্‌পূ প্রযুক্ত হইয়াছে। মূত্রকৃচ্ছ ই তাহার প্রধান লক্ষণ

রূপে বর্তমান থাকে। বৃদ্ধক ও মূত্রস্থালী কনকন করে এবং অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ হইতে থাকে। উপরি উক্ত প্রকার লক্ষণের বর্তমানতায় ইহা মূত্র শিলা ও সবিরাম জ্বররোগেও প্রযোজ্য।

শৈতাসংস্পর্শ নিবন্ধন পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল কিড্‌নি-প্রদাহেও যুগে পার্শ্ব প্রয়োগোপযুক্ত ঔষধ। এখানে কঠিন পৃষ্ঠবেদনা ইহার প্রদর্শক। মূত্রত্যাগে ন্যূনাদিক কষ্ট হয় অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ঘটে। এলবুমিনুরিয়া বা লালামেহ রোগে জ্বলশোথ জন্মিলে ইহা তাহার নিবারক। রোগী অত্যন্ত পরিমাম মূত্রত্যাগ করে, বহিঃশোথ বা ইডিনা জন্মে এবং হস্ত পদ শীতল থাকে।

সায়টিকা বা গৃধ্রসী এবং রসবাত বা রুম্যাটিজম্।— অতি কঠিন বেদনায়ুক্ত দক্ষিণ পার্শ্বের সায়টিকা রোগের ক্ষুণ্ণে পার্শ্ব দ্বারা উপকার হইয়াছে। বৃদ্ধাদগের রসবাতরোগে অস্থির টাটার্নি এবং গুল্ফ বা পাদমূলসন্ধির ক্ষীতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা তাহার ঔষধ।

সবিরাম জ্বর বা ইন্টারমিটেন্ট ফিবার।— শীতকম্প পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া বিস্তৃত হইলে ক্ষুণ্ণে পার্শ্ব সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিতে পারে। ইহা এবং ক্ষুণ্ণে পার্শ্ব উভয়েই অস্থিবেদনা নিবারণে সক্ষম। অনেক লক্ষণেই উভয় ঔষধ তুল্য। ইহাদগের প্রভেদ স্থিরীকৃত হয় নাই।

১২। ট্যারাকসেকাম্ (Taraxacum) ।

উপচয়।—ইহার প্রায় সমুদয় লক্ষণই উপবেশন এবং শয়ন-বস্থায় ও বিশ্রামে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (কাউপারথোয়েট—নানাপ্রকারে শরীর চালনায়)।

তুলনীল ঔষধ।—ব্রায়, ক্যাপ্‌সি, চেলি, হাইড্রাস্, নাক্‌স্, ভ, পাল্‌স্, স্পিজি।

সাম্ভারণ ত্রিহ্না ।—ইহা প্রধানতঃ পরিপাকযন্ত্রপথ এবং যকৃতে ক্রিয়াপ্রকাশ করে ।

লক্ষণ ।—শুভ্রলেপাবৃত্ত জিহ্বার লেপ ছালের দ্বায় উঠিতে থাকে এবং জিহ্বোপরে লোহিতবর্ণ, বেদনায়ুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু এবং কলঙ্কযুক্ত স্থান থাকিয়া যায়—জিহ্বা দেখিতে চিত্রবিচিত্র মানচিত্রবৎ আকৃতিপ্রাপ্ত হয় । আহারান্তে মুখের তিক্তস্বাদ ।

তিক্ত উদগার ; হিক্কা । বিবমিষা নিবন্ধন শিরঃশূল ও উৎকর্ষা ; বসাপদার্থ আহার করার দ্বায় বমন । উদরের উভয় পার্শ্বে ও আমাশয়াদ্ধঃ উদরপ্রদেশে সূচিবোধবৎ বেদনা । যকৃতের বিবৃদ্ধি ও দড়কচড়া ভাব । প্লীহাস্থানে বেদনা । উদরের চালনায় তদভ্যন্তরে জলবিষ গঠিত ও ভগ্ন হওয়ার অনূভূতি জন্মে ও চাপের সহিত নিঃফল মলবেগ হইলে অত্যন্ত কঠিন মলত্যাগ হয় । বিষ্ঠা কঠিন না থাকিলেও তাহা ত্যাগে কষ্ট ।

চিকিৎসা ।

উদরাময় ।—পিত্তযুক্ত বিষ্ঠার উদরাময় এবং যকৃতদেশে টাটানি বেদনা হইলে, তিক্ত আশ্বাদ ও মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত জিহ্বা এবং আহার বা পানান্তে শীতের অনূভূতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ট্যারাক্সেসকাম্ উপকারী ।

জ্বর ।—ট্যারাক্সেসকামের টাইফয়েড প্রভৃতি জ্বরে রোগী স্থিরভাবে থাকিলে জ্ব্বার বেদনা অসহনীয় বৃদ্ধি পায়, এজন্ত অস্থিরতাসহ ছটফট করিতে থাকে, অবিশ্রান্তভাবে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ কহে, তাহার মস্তকপশ্চাতে ওচণ্ড, ছিন্নবৎ বেদনা হয়, এবং আহার বা পানান্তে শীত বোধ করে ও জিহ্বা মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত থাকে ।

লেক্চার ৫৬ (LECTURE LVI).

কেলি-সল্ট্‌স্‌।

১। কেলি আয়ডেটাম্‌। ২। কেলি কার্ব-
নিকাম্‌। ৩। কেলি ক্লরিকাম্‌। ৪। কেলি
নাইট্রিকাম্‌। ৫। কেলি পার্ম্যাঙ্গানেটাম্‌। ৬।
কেলি ফস্‌ফরিকাম্‌। ৭। কেলি ফেরসাইয়ানি-
কাম্‌। ৮। কেলি ব্রমেটাম্‌। ৯। কেলি মিউ-
রিয়েটিকাম্‌। ১০। কেলি সাল্‌ফুরিকাম্‌।

সাধারণ ক্রিয়া :—পটাস্‌ সল্ট বা লবন মাত্রেরই, জলসহ
অতি প্রগাঢ় আকর্ষণের সম্বন্ধ থাকায় ইহারা, বিশেষতঃ ইহাদিগের মধ্যে
কেলি বাইক্রমিকামাদি কোন কোন সল্ট জৈব পদার্থ সংস্পর্শে আসিলে
অতি গভীর দেশ পর্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন
করে। এই জন্ত এলিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ভূতপূর্বে কষ্টিক পটাসের
বহিঃপ্রয়োগদ্বারা কার্বাংকল ইত্যাদি রোগের মৃত মাংসাদি দূর করিতে
ইহার বহুল ব্যবহার করিতেন। ইহারা উদরস্থ হইলেও অতি
সাংঘাতিক ধ্বংসকর বিযক্রিয়া প্রকাশ করে। বহুযন্ত্রণাকর বিদাহী
ধ্বংসক্রিয়া হইতে রোগীর জীবন রক্ষা হইলেও উপরিউক্ত বিযক্রিয়ার
পরিণাম স্বরূপ দন্ধ গলদেশ ও অন্ত্রনালী প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্রপথের
প্রভূত সংকোচন ঘটায় রোগীর ভবিষ্যৎ জীবিতকাল ভাব্য কষ্টসাধ্য
এবং রোগজীর্ণ হইয়া থাকে।

উগ্র পটাস্‌ সল্টের তরুণ ও প্রবল বিযক্রিয়ার উপশমনার্থ
ভিনিগার, লেবুর রস ও অধিক পরিমাণে স্নিগ্ধ বা স্নেহ পদার্থের পান
ব্যবহৃত হয়।

১। কেলি আয়ডেটাম্ (Kali Iadatum)

প্রতিনামঃ কেলি হাইড্রিয়ডিকাম্ । সাধারণ নাম—আয়-
ডাইড্ অব পটাস্ ।

উপচয়ঃ—রক্তনীতে ; শীতল বায়ুতে ; বিশ্রামে ।

উপশমনঃ—গাত্র চালনায় ।

সম্বন্ধঃ । কেলি আয় যাহার কার্যপ্রতিষেধক—মার্ক্ । যাহা
ইহার কার্য প্রতিষেধক—হিপার সা ।

তুলনীয় ঔষধঃ—অরাম, যুফ্রে, কেলি বাই, হিপার সালফ্,
আয়ডি, মার্ক্, মিছিরি ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—কেলি আয়ডেটাম্ শৈথিল্য উপাদানে
ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । এই ক্রিয়া মার্ক্যারির ক্রিয়ার প্রায় তুল্য ।
ইহা তাহারই ণায় শারীরিক রস রক্তাদি তরল পদার্থের বিশ্লেষণ
এবং অত্যন্ত কঠিনতর দেহোপাদানের ধ্বংসোৎপন্ন করে । লসীকাগ্রস্থি
ও সাধারণ গ্রন্থিমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে আয়ডিনের সমান ।
তাহারই ণায় ইহা, উপরিউক্ত গ্রন্থিমণ্ডলীর বিবৃদ্ধি ঘটায় এবং
ক্রিয়ানাশ করে । ইহার প্রাতিজ্ঞায়িক প্রদাহে অজস্র স্রাব হয়,
কিন্তু তাহাতে জরের বিশেষ প্রাধান্য থাকে না । আয়ডিনের ণায়ই
ইহা মুখলালা ও মুত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং কিড্‌নির প্রদাহ উৎপন্ন করে ।
ইহার ক্রিয়ার অস্থিবেষ্টিকিল্লির ঘনত্ব জন্মে বলিয়া উপদংশজ গুটি বা নোড
রোগে ইহা প্রয়োগে উপকার দর্শে ।

লক্ষণ ।

মনঃ—দুঃখ এবং ব্যাকুলতা ।

মস্তকঃ—মূর্ছাদেশোপরে তাপ নিবন্ধন মস্তকের উপরে
বেদনা হইলে বোধ হয় যেন মস্তক সবেগে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে ।

মস্তক নত করিলে ললাটে স্ফুটবেধবৎ বেদনা । সন্ধ্যাকালে ললাটের বামপার্শ্বের বেদনার চাপে উপশম । মস্তকের শৈরিকসীতা বা সাইনাসে এবং ইথময়েডু-অস্থিকোষে কনকনানি বেদনা । মস্তকপার্শ্বে ক্ষু বসানের ত্রায় বেদনা । বাম চক্ষুর উর্দ্ধাংশে ছিন্নবৎ অথবা ঝাঁকির সহিত স্ফুটবেধবৎ বেদনা । মস্তকত্বক চুলকাইলে ক্ষত থাকার ত্রায় অল্পভূতি ।

স্নানু।—পেশীকম্পন বা সাবসাল্টাস টেণ্ডনাম । অস্থিরতাসহ শরীরচালনা । পক্ষাঘাত ।

সুখ।—সুখ পাণ্ডুর ও বর্ণহীন । মুখের এবং জিহ্বার ক্ষীতি (বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারে) ।

চক্ষুঃ।—কোটিরপ্রবিষ্ট চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ বৃত্ত । যোজক-ঝিল্লির শোণিতপূর্ণতা ও ক্ষীতি । রক্তপূর্ণ ক্ষীতিঝিল্লি বা কিমোসিস্ । চক্ষুর জালা এবং পূয়বৎ স্লেষ্মার স্রাব । ঘোরদৃষ্টি । চক্ষুপুটের শোথ । চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কণিয়ার উপরে পুয়গুটিকা ; আলোকাতঙ্ক এবং বেদনা রক্তমা থাকে না ।

নাসিকা।—তরুণ সন্ধিতে ভ্রাণশক্তির অভাব । চক্ষু, নাসিকা গলাভাস্তর এবং তালুর শৈল্পিক ঝিল্লি অত্যন্ত লোহিতবর্ণ হইলে চক্ষু হইতে প্রচুর জল স্রাব পুনঃ পুনঃ কাসির উদ্বেক এবং উর্দ্ধ চক্ষু পুটের ক্ষীতি হয় । প্রচণ্ড ইঁচি এবং নাসিকা হইতে তীব্র ও কখন কখন পরিস্কার জলস্রাব । নাসিকারন্ধ্রে অত্যন্ত আটাল স্লেষ্মার সঞ্চয় । নাসিকা হইতে ঈষৎ সবুজাভ, কাল অথবা পীতবর্ণ এবং পচাটে ও ত্বকারজনক বস্তু কিম্বা পচা, ঈষৎ সবুজাভলোহিত রক্তস্রাব । নাসিকা-মূলে পূর্ণতা ও কশাভাবের অল্পভূতি । নাসিকা এবং ললাটাস্থিতে দিপদিপানি ও জ্বালাকর বেদনা এবং ক্ষীতি । নাসিকাস্থিতে চর্কণবৎ বেদনার সঙ্গে ছুরিকাঘাত ও গর্ভ করার ন্যায় বেদনা ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

শ্বাসযন্ত্র ১—স্বরযন্ত্রে মাংসাক্তরের (Granulation) বেদনার ন্যায় অবদারণবৎ বেদনা ; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্বরযন্ত্রের টাটানি এবং গুফ কাসি । স্বরযন্ত্রে অবদারণতাব হওয়ার হক্ হক্ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি । রজনীতে নিদ্রাভঙ্গে স্বরভঙ্গ ও শ্বাসকৃচ্ছ । সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশের বেদনায় শ্বাসকৃচ্ছ । শ্বাসপ্রথাসের খর্বতা । কষ্টবোধ । অস্বস্তি । সন্ধ্যাকালে শ্বাসযন্ত্রের বেদনায় বোধ যেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে কণ্ঠিত হইতেছে । বামবক্ষের বেদনায় বোধ যেন তাহার বহির্দেশে ক্ষত আছে ; স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি । গভীর, ফাঁপা শব্দের কাসি হইলে ঈষৎ সব্জ গয়ার উঠে এবং বৃকের কড়া হইতে ছিন্নবৎ বেদনা বিস্তৃত হয় । ভ্রমণ করিতে ঠার্নাম অস্থি ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ অথবা বক্ষের গভীরদেশ পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা । প্রতিষ্ঠায়িক যক্ষ্মাকাসিতে পূষ্যাকার গয়ার উঠে এবং রজনীধর্ম ও উদরাময় বশতঃ দুর্বলতা জন্মে । নিউমনিয়া অথবা লালান্নেহরোগের শেষফল স্বরূপ ফুসফুসের শোথ জন্মিলে সব্জবর্ণ ও সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ার উঠে ।

হৃৎপিণ্ড ১—হৃৎকম্পের ভ্রমণে বৃদ্ধি ; গ্রীবাগ্রস্থির স্ফীতি ।

মুখাগ্রস্থির ১—জিহ্বাগ্রের জালা ও তছপরি রসবিষিকা । মুখের গুফতা । দন্তমাড়ির, বিশেষতঃ ক্ষয়িত দন্তের চতুর্পার্শ্বের দন্তমাড়ির স্ফীতি । মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয় । প্রচুর লালান্নাব । হনুঅধঃগ্রস্থির স্ফীতি ও পূষ্যসঞ্চার ।

পলাভ্যস্তর ১—সর্দিলক্ষণে গলার গুফতা এবং চুলকানি । থাইরইড গ্রস্থির স্পর্শসহিষ্ণু স্ফীতি । উপজিহ্বা এবং টন্সিল গ্রস্থির লোহিতবর্ণ এবং স্ফীতি জন্মিলে গিলিতে বেদনা ও কষ্ট হয় । উপজিহ্বা স্ফীত ও প্রলম্বিত ; শৈথিল্যকিয়মি শোথযুক্ত ।

আমাশয় ।—অত্যন্ত তৃষ্ণা । বিবমিষা ও বমন । অত্যধিক মুখলালার সঞ্চয় ও ভয়ঙ্কর বমন ।

উদর ।—হঠাৎ উদরের বেদনায়ুক্ত স্ফীতি নিবন্ধন উদর যেন ফাটিয়া যাওয়ার স্থায় বোধ, বায়ুনিঃসরণে নিবৃত্তি ।

মল ।—অত্যন্ত, কঠিন মলের কষ্টে ত্যাগ । পাতলা সবুজ এবং হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ উদরাময় ।

পুংজননেত্রিয় ।—লিঙ্গের বিস্তৃত স্ফীতি ও প্রদাহ ।

স্ত্রীজননেত্রিয় ।—ঋতুশ্রাবকালে পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ । পাতলা, জলবৎ ও তীর খেতপ্রদর । স্তনের ক্ষয় ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।—চালনা করিলে কটিদেশের বেদনায় বোধ যেন তাহা সাঁড়াসি দ্বারা চাপিত হইতেছে ।

অঙ্গনিচয় ।—পারদের অপব্যবহারে এবং উপদংশ, রসবাত অথবা ক্ষুদ্রবাত বা গাউট রোগ অস্থিবেষ্ট পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ, তীর বেঁধার ন্যায় অথবা চর্কণবৎ বেদনা হয় ।

হৃৎক ।—মুখে চুলকনায়ুক্ত দক্ষবৎ উদ্বেদ । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক অথবা পুয়গুটিকা মুখ, স্বরু, পৃষ্ঠ ও বক্ষোপরে অধিকতর ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—কেলি আয়ডেটামরোগের সংখ্যা অধিক নহে এবং ইহার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণও বিরল । উপদংশ ও পারদের অপব্যবহারের জন্য শরীরোপাদানাভ্যহরে রসসঞ্চয় এবং অস্থির অর্কুদ ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগে ইহার বিষয় আমাদিগের বিশেষরূপে স্মরণ হয় ।

চিকিৎসা ।

শিরগ্ৰশূল ।—ললাট হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পেশীর সৌত্রিক ঝিল্লিতে গুটিকাৎ পদার্থ জন্মিলে মস্তকবাহিন্ধ উপরিউক্ত

গুটিকাতে এই বেদনা হয় । সম্ভবতঃ উপদংশ রোগে অবৈধ পারদসেবন অথবা রসবাত নিবন্ধন ধাতুদোষ এই রোগ উৎপত্তির কারণ এবং তজ্জগ্ৰাই কেলি আয় ইহার একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য ।

মস্তিস্কোদক বা হাইড্রকেফেলাস্ ।—ডাঃ কাফকা কেলি আয়কে এ রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন । মস্তকে তীরবেধার ছায় বেদনা, মুখের রক্তমা, শুষ্ক হক্ হক্ শব্দের কাসির রজনীতে বৃদ্ধি এবং রোগীর গণ্ডমালাধাতু উহার প্রধান প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে । গুটিকারোগগ্রস্ত (Tubercular) গ্রন্থিবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের রোগে আয়ডিন প্রযুক্ত হয় ।

সান্নাটিকা বা গ্লুসী ।—কেলি আয় রোগে বেদনার রজনীতে এং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি ও শরীর-চালনায় হ্রাস । উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

কেলি বাই—বাম উরুতে তীর বেধার ছায় বেদনা হইলে ।

ফাইউল্যাক্সা—তীরবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি ।

কল্‌চিকাম—দক্ষিণ পার্শ্বের তীক্ষ্ণ বিদ্ধবৎ বেদনা জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় । চালনায় বেদনার বৃদ্ধি নিবন্ধন রোগী স্থির থাকিতে বাধ্য হয় । অসহনীয় বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া লগ্ন থাকে ।

চক্ষুরোগ ।—আইরাইটিস বা উপতারাপ্রদাহ করই-ডাইটিস্ বা কৃষ্ণঝিল্লিপ্রদাহ ; কিরাইটিস্ বা স্বচ্ছত্বক-প্রদাহ ।—উপদংশরোগ নিবন্ধন আইরাইটিস্ অথবা আইরিস এবং করইড ঝিল্লির যুগপৎ উপদংশ ঘটত প্রদাহে যদি পারদের অবৈধ ব্যবহার হইয়া থাকে, কেলি আয় সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত ; অথবা মার্ক কল ইহার অমোঘ ঔষধ । লক্ষণনিচয়ের

প্রচণ্ডতা, বিশেষতঃ উপদংশজ রোগে পারদের অপব্যবহার ইহার প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। স্বচ্ছাবরকের উপদংশ ঘটত প্রদাহরোগও পারদের ব্যবহারচর্চিত হইলে উপকার করে।

নাসিকাসর্দি ও পুতিনশ্চরোগ বা অজিনা।— পারদ-জীর্ণ শরীর ও গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পৌনঃপুনিক সর্দি রোগে লোহিতবর্ণ ও ক্ষীত নাসিকা হইতে অতি প্রচুর, পাতলা, তীব্র ও হাজাকর শ্লেষ্মা স্রাব হইলে কেলি আক্লেডেটাম প্রযোজ্য। ইহাতে চক্ষু লাল, ক্ষীত ও জলস্রাববৃদ্ধ থাকে, চন্ চন্ করিয়া জ্বালা কবে, এবং গলাভ্যন্তরে অবদারণ ভাব জন্মে। রোগী ক্ষণে শীত ক্ষণে গ্রীষ্ম অনুভব করে, তাহার মূত্র অত্যন্ত ও অত্যন্ত রঞ্জিত। সামান্য শৈতাসংস্পর্শ ও সৈঁতা বাতাস রোগের পুনরাক্রমণের কারণ। উপদংশ, পারদের অপব্যবহার ও গণ্ডমালারোগে, অথবা তিনের সংযোগোৎপন্নরোগে কিম্বা উপরিউক্ত কারণে জীর্ণশরীর ব্যক্তিদিগের সম্ভানে, রোগ পুরাতনে বা পুতিনশ্চ রোগে পরিণত হয় এবং পাতলা ও তীব্র অথবা ঘন, সবুজ ও তুর্গন্ধ স্রাব দেখা দেয়, ও নাসিকায় জ্বালা ও নাসিকাস্থিতে ছিদ্রও হইতে পারে। ইহাতেও কেলি আক্লে উপকারী।

কেলি বাই—স্রুত শ্লেষ্মা চিমসা ও সূত্রবৎ, এবং সর্দি কখন কখন গলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্বাস উপস্থিত করে। সর্দি সম্পূর্ণ শ্বাসঘর্মে বিস্তৃত হইলে অনেক সময় ইহা একনের পরে প্রযোজ্য।

ফুস্ফুসরোগ—নিউমোনিয়া; জলশোথ বা ইডিমা-পাল্মনাম্; থাইসিস্ বা বক্ষ্মাকাশ।—নিউমোনিয়া রোগে ফুস্কুসের ঘনীভূত অবস্থার আরম্ভে বিঘাতনে যদি স্পষ্ট নিরেট শব্দ প্রাপ্ত হয় বা তাহা হইলে ব্রায় ফ্রস অথবা সাল্ফারের স্পষ্ট লক্ষণের অভাবে ডাং ফ্যারিংটন আক্লেডিন অথবা

কেলি আয়ু প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কুস্কুসের অতি বিস্তৃত অংশের ঘনীভূততা অথবা হিপ্যাটিজেসন বশতঃ তাগাতে শোণিত-গতির বাধা জন্মিলে মস্তিস্কাদি যন্ত্রে রক্তাধিক্য ঘটে এবং অবশেষে মস্তিস্কে জলসঞ্চয় নিবন্ধন রোগী মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া উঠে। মুখের রক্তমা, চক্ষুতারকার নানাধিক বিস্তৃতি এবং নিদ্রালুতা প্রভৃতি ইহার প্রাথমিক লক্ষণে বেলাডনাই আমাদিগের স্মরণপথে আইসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার রোগজনন লক্ষণে 'কুস্কুসের ঘনীভূততার অভাব থাকায় তৎপরিবর্তে এস্থলে কেলি আয়ুই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া আরোগ্য করিতে সক্ষম।

কুস্কুসের জনশোথরোগেও ইহা উপকারী ঔষধ। ঈমৎ পীত ও সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ার ইহার প্রদর্শক লক্ষণ।

উপরিউক্তরূপ গয়ারনিষ্ঠীবন, রজনীঘর্ম এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকিলে স্টিকোৎপত্তি নিবন্ধন যক্ষ্মারোগেও ইহা উপকারী। শেষ রজনীতে বেন বক্ষভগ্নকর কাসি উপস্থিত হয়। ফলতঃ পটাস সল্ট বা লবণ মাত্রই রজনী শেষে ২টা হঠতে ৫টা পর্যন্ত, কাসির বৃদ্ধি করে। অনেক সময়ে এল্‌বুমিনুরিয়ারোগান্তে কুস্কুসের এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৃক্ক বা কিড্‌নির ক্ষয়রোগ।—ইহা যদি পারদের অপব্যবহার ঘটত হয় তাহা হইলে কেলি আয়ু উপকার করবে।

পুরাতন লালামেহ বা গ্লিট।—ডাং ফ্রাংক্লিন এ রোগে কেলি আয়ুকে প্রশংসা করিয়াছেন। নেট্ মিউ, থুজা, নাই গ্রাসি ও নাকস ভ সহ এস্থলে ইহা অতুলনীয়।

উপদংশ বা স্ফিলিস্—আশ্বরোগ—গামেটা প্রভৃতি।—তরুণ বা প্রাথমিক উপদংশরোগে কেলি আয়ু

কোন কার্য্য হয় না। ইহা পুতরান উপদংশ রোগজীর্ণ শরীরের বা উপদংশ রোগের তৃতীয়াবস্থার অস্থির ধ্বংসমূলক প্রাথমিক লক্ষণভ্রাপক ললাট-গহ্বরাস্থি এবং নাসিকাস্থির জ্বালাকর চর্কণবৎ বেদনায় ও উপদংশজ ক্ষতপ্রবণ ঘনবটিকানির (Papule) পক্ষে উপকারী ঔষধ। যে ঘনবটিকা ক্ষত হইলে তাহার অধস্থ উপাদানের ক্ষয় হইয়া যায় অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহার বাধা জন্মাইয়া ইহা রোগীকে সুস্থ করিতে পারে। ঘকের উপরিভাগের ক্ষতাক্ষ এবং চক্রাকার রুপিয়া (Rupia) নামক উদ্ভেদও ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। জ্ঞাত থাকা উচিত উপদংশরোগজীর্ণ শরীরের উপরিউক্ত রোগ প্রভৃতির পক্ষেই ইহা প্রধান ঔষধ; অতুথা এতদ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা নুথা। ইহা পারদের অপব্যবহার ঘটত কুফল নষ্ট করিতে সর্ব প্রধান ঔষধ বলিলেও অতুক্তি দোষ ঘটে না।

কেলি বাই—ইহার মুখের এবং গলাভান্তরের উপদংশ-জাত ক্ষত তদধস্থ উপাদান ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ গভীর হইয়া যায়।

ত্বকরোগ—পুয়গুটিকা ; ক্ষত।—কেলি আস্থিতির পুয়গুটিকা বা পাঠুল অধিকাংশ সময়ে মস্তকত্বক হইতে পৃষ্ঠের অধঃ পর্য্যন্ত স্থানে জন্মে এবং আরোগ্য হইলে, ক্ষতাক্ষ থাকিয়া যায়। গগুমানীয় অথবা উপদংশজ ক্ষতরোগে ইহা উপকারী।

২। **কেলি কার্বনিকাম্ (Kali Carbonicum)**

মহ্বক্ষ।—কেলি কার্বনিকামের কার্য্য প্রতি-
শেষক—কাম্ফর, কফিয়া, স্পি. নাই, ডাল। কেলি কার্বের
কার্য্যপূরক—কাৰ্ণ ভেজ।

কেলি কার্ব যাহার পরে সুখফলপ্রদ—কেলি সাল্ফ, ফস, ষ্টেনাম্ (সরল ঘড় ঘড় শঙ্কবৃক্ক কাসিতে)।

আৰ্ত্তবাতাব রোগে নেট্ মিউ প্রদর্শিত হইলেও তাহাতে যদি ফল না হয় কেলি কার্ব ঋতুস্রাব আনয়ন করিবে।

ভুলনীয়া ঔষধ।—আস, একন, বেল, ব্রায়, কার্ব ভেজ, ক্যাম, দিক, কনায়, জেল্‌স, কেলি বাই, ল্যাকেসি, লাইক, মার্ক, নেট মিউ, নাই.এসি, নাক্‌স্‌ভ, ওপি, ফস, পাল্‌স, রাস, সিপি, ট্র্যাম, সাল্‌ফ ।

ক্রিয়া ।—কেলি কার্বনিকামের প্রধান ক্রিয়ার স্থান শ্বাস-যন্ত্রশৈল্পিক বিল্লি, পরিপাকযন্ত্রপথ এবং অণ্ডাধার-জরায়ুযন্ত্রমণ্ডল । ইহা উপরি উক্ত শরীরস্থানে যে উদ্দীপনা উপস্থিত করে, তাহা প্রকৃত প্রদাহে পরিণত না হইলেও যে তাহার অতি নিকটবর্তী অবস্থায় উপনীত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । ইহার ক্রিয়াফলে তদদেশের ঝিল্লি অতীব শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে যে তীব্র, স্থচিবেধবৎ বেদনা জন্মে তাহা কেলি কার্বনিকামের বিশেষ লক্ষণ ।

লক্ষণ ।

মন ।—রোগী সহজেই ভীতিচকিত, খিট্‌ খিটে, কোপনস্বভাব । রোগবিষয়ক ভীতি প্রযুক্ত উৎকর্ষা । খিট্‌ খিটে ও উত্তেজনা প্রবণ ।

স্নান্দ্রু ।—পেশী আনর্জন । শরীরাবস্থাপনে চাপিত শরীরাংশে ঘূষ্টবৎ বেদনা এবং ঝিন্‌ঝিনি বোধ ; ঘর্ষ এবং মুচ্ছার ভাব । বোধ যেন বারম্বার উদগার উঠায় আক্ষেপ অন্তর্দান করে । আক্ষেপাবস্থায় সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে । আংশিক পক্ষাঘাত ; কম্প । সম্পূর্ণ শরীরে শূণ্ণবোধ যেন শরীর শূণ্ণগর্ভ হইয়াছে ।

মুখমণ্ডল ।—মুখ পাণ্ডুর ও মলিন এবং স্ফীত । মুখের আকৃতি বসা ; কদাকার । মৃতবৎ আকৃতি । গণ্ডে ছিন্নবৎ কিম্বা স্থচিবেধের স্থায় বেদনা । উর্দ্ধ ওষ্ঠোপরি শুষ্ক ছাল ওঠা ।

চক্ষু ।—দ্র এবং চক্ষুপ্রমধ্যবর্তী স্থানে ধলির স্থায় স্ফীতি । চক্ষুপ্র স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত ; প্রায়শঃ প্রাতঃকালে জুড়িয়া

থাকে। পাঠকালে চক্ষু-বেদনা। আলোকাতঙ্ক ও জলশ্রাব; দৃষ্টির দুর্বলতা; চক্ষুসম্মুখে কোয়াসার ভাব। চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল দাগ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দৃশ্য।

নাসিকা।—নাসিকা স্ফীত ও লোহিতবর্ণ; নাসারন্ধ্র ক্ষত ও মানড়িবুক্ত। শুষ্ক সন্ধিতে নাসিকার রোধ। প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তশ্রাব। স্রাবযুক্ত সন্ধি। নাসিকার জালা। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে ক্ষত হওয়ার স্থায় বেদনা।

শ্বাসপ্রশ্বাস।—আহারকালে সহজেই শ্বাসরোধ ঘটে। প্রাতঃকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা জন্মে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ ও বাকরোধ। কাসিলে স্বরবন্ধে কাঁচা ক্ষতের ন্যায় বেদনা। শেষ রজনী ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে কাসির বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে কাসির আক্রমণ; কঠায় স্ফুড়স্ফুড়ি হওয়ায় আবেশে আবেশে কাসি; আক্ষেপিক কাসিতে গলরোধ ও বমন এবং স্বরবন্ধে শ্বাস রোধকর শুষ্কতার উপস্থিতি। কঠায় স্ফুড়স্ফুড়ি জন্য শুষ্ক কাসি। রজনীতে শুষ্ক কাসি হওয়ার নিদ্রাভঙ্গ এবং কাসিলে বন্ধে তীক্ষ্ণ বেদনা, দিবসে ক্কাচিং কাসি থাকে। কাসিলে পূয়বৎ গয়ার নিষ্ঠূত। গলমধ্য হইতে ক্ষুদ্র ও গোল গোল বস্তুখণ্ড নিষ্ঠূত। দ্রুত ভ্রমণে বন্ধের দুর্বলতা এবং কশাভাব ও কষ্টও হইয়া থাকে। ভ্রমণকালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে বন্ধের আড়া আড়িভাবে টান টান বোধ। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বন্ধের কর্তনবৎ বেদনা বামকুক্ষি পর্য্যাস্ত যায়। শ্বাস টানিলে বন্ধে স্থচিবোধবৎ বেদনা। কথা কহিলে, শ্বাসপ্রশ্বাসে, ও কোন বস্তু উত্তোলন করিলে বন্ধে টাটানি বেদনা। বন্ধে চাপ বোধ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—সামান্য শ্রমেই দ্রুত ও প্রচণ্ড হৃৎকম্প। মধ্যে মধ্যে হৃৎস্পন্দনের লোপ।

নাড়ীস্পন্দন প্রাতঃকালে অধিকতর দ্রুত, সন্ধ্যাকালে তদপেক্ষা স্বল্পতর। নাড়ীস্পন্দন অসম, অনিয়মিত ; ক্ষণলোপবিশিষ্ট ; ধীর এবং দুর্বল ।

গলাভ্যন্তর :—প্রাতঃকালে গলার পশ্চাৎ অংশে অনেক আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গলা খাঁকর দিলেও সম্পূর্ণ উঠে না, অপিচ সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করিতেও পারা যায় না। শরীর শীতল হইলে গলাগ্রভাগে বৈধার ন্যায় বেদনায় বোধ যেন তাহাতে মাছের কাঁটা বিদীয়া রহিয়াছে। গলমধ্যে টাছাভাব, শুষ্কতা এবং কর্কশভাবন গলমধ্যে বিড় বিড় করায় গলাখাঁকর দিতে ও কাশিতে হয়। গলাধঃকরণের কষ্ট হওয়ায় অন্ননাশী পথে খাওয়া অতি ধীরে নামিতে থাকে এবং তাহাতে খাদ্যরোধ ও বমন হয়। গ্রীবাগ্রস্থির স্ফীতি।

আমাশয় :—আহারের পূর্বে ক্ষুধা জন্য আমাশয়ের শূন্যভাবে পেক্ষা অস্বাভাবিক শূন্যগর্ভভাবের অনুভূতিই অধিকতর থাকে ; আহারান্তে, বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্থপ পাম করিলেও অত্যন্ত উদরস্ফীতি জন্মে। আহারান্তে মানসিক ভাবাস্তর উপস্থিত হইলেই বিবসিষা হয়। সর্বদাই বোধ যেন আমাশয় জলপূর্ণ। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থান আতত ও স্পর্শসহিষ্ণু হয় এবং তাহাতে প্রচণ্ড দর্পদপানি ও কর্তনবৎ বেদনা থাকে। অন্নোদগার এবং ভুক্তবস্ত্র ও জলের উদগীরণ।

উদর :—যকৃত স্থানে তাপ এবং জ্বালা অথবা সূচিবোধবৎ বেদনা ; তাহা স্পর্শ করিলে ক্ষতবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে যকৃতে বেদনা হইলে তাহা গুরুত্ব পরিণত হয় ; যকৃতে আকৃষ্টতা সহ ক্ষতবৎ বেদনা থাকে। সামান্য কিছু আহার করিলেই উদরে পূর্ণতা, তাপ এবং অতিশয় স্ফীতি জন্মে।

অজ্ঞানি :—সন্ধ্যাকালে শয্যায় অজ্ঞানির অস্বস্তি বোধ। অঙ্গে গুরুত্ব জন্মিলে রোগী কষ্টে পদ উত্তলোন করিতে পারে। সন্ধি এবং কণ্ডুরাতে সূচিবোধবৎ বেদনা। অঙ্গে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ ।

সূচিবোধবৎ বেদনা :—সূচি বোধার ত্রায় বেদনালক্ষণে ইহা এই লক্ষণগুক্ত অন্যান্য ঔষধের অগ্রগামী। ব্রাহ্মনিহ্নাতেও এই লক্ষণের প্রাধান্য আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে ব্রাহ্মতে তাহা অধিকাংশ সময়ে গাত্র চালনাতে, কচিং স্থিরভাবে থাকিলেও বর্ধিত হয় এবং প্রায়শঃ রসঝিল্লিসহ সংসৃষ্ট থাকে ; কেলিকার্ভ-বেদনার শরীর চালনা সহ সম্বন্ধ নাই, এবং তাহা শরীরের যে কোন অংশে ও যে কোন উপাদানে হইতে পারে।

উর্দ্ধ চক্ষুপুটে জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্তমানতা।— ইহা কেলি কার্ভের অনেক রোগে উপস্থিত থাকে এবং অন্যত্র ঔষধে ইহার বিরলতা নিবন্ধন ইহা কেলি কার্ভের প্রদর্শক স্থলাভিষিক্ত হয়। রক্তনী ৩টার পর ৪টা পর্যন্ত রোগের স্বন্ধিও ইহার অন্যতম প্রদর্শক। অত্যধিক স্পর্শ-সহিষ্ণুতাও ইহার একটি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চিকিৎসা ।

স্পাইন্যাল ইরিটেষণ বা মেরুদণ্ডের উত্তেজনা, পৃষ্ঠশূল।—জরায়ুরোগসংক্রমে পৃষ্ঠে বা মেরুদণ্ডপ্রদেশে বেদনা উপস্থিত হইলে কেলি কার্ভ উপকার করিয়া থাকে। পৃষ্ঠের অধঃদেশে কোন ভারি বস্তুর ঠেলমারা এবং ঋতুকালে জরায়ুতে ঠেলমারা, ও মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণপার্শ্ব বাহিয়া জ্বালা থাকে।

ভ্রমণকালে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিলে, বসিয়া পড়িতে অথবা কোন প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। কখন কখন প্রাতঃকালে পৃষ্ঠের অধঃদেশে দপ দপ করে। সিন্ধিহ্না এবং সিন্ধিসিভেও এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকৃষ্টতা ও স্পন্দনের শয়নে উপশম হয়। শরীর সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া চিতভাবে শয়নে নেত্রান্ন মিউ বেদনার হ্রাস হয়। আন্তর্বাতাবরোপে নেত্রান্ন মিউ প্রদর্শিত হইয়াও উপকার না করিলে কেলি কার্ব প্রযোজ্য। কোন বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট জ্বীলোক আহার করিলেই অর্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা হওয়ায় কষ্ট পাইত; ডাঃ ফ্যারিংটন তাঁহাকে কেলি কার্ব দ্বারা আরোগ্য করেন।

ঈকনিহ্না ফস—মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা এবং উর্দ্ধাধঃ অঙ্গে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

টেবেরেণ্ডুলা—মেরুদণ্ডের রক্তহীনতা বশতঃ মেরুদণ্ডে আক্ষিপক বেদনা, সঙ্কোচন এবং শীতের উপস্থিতি প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে জ্বালা ও সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ।

নাসিকাসর্দি বা কন্রাইজ্জা।—স্থূলকায় এবং শিথিল শরীর ব্যক্তি, যাহাদিগের প্রবহমান বায়ুসং স্পর্শ হইলেই সর্দির আক্রমণবশতঃ স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাদিগের পক্ষে কেলি কার্ব উপকারী। সর্দিকালে গলমধ্যে কোন বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগী তাহা গলাধঃকরণের আবশ্যকতা বোধ করে। গ্রীবা অনমনীয় এবং উপজিহ্বা প্রলম্বিত হয়। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় এপিসের গায় ইহাতেও গলায় স্থলবেঁধার গায় বেদনা থাকে।

কাসি বা কফ; ছপশব্দক কাসি বা ছপিং কফ।—
কেলি কার্বনিকামের কাসির আক্রমণ আবেশে আবেশে

হয় এবং কাসিলে রোগী অল্প, শ্লেষ্মা ও ভুক্তবস্ত্র বমন করে। এইরূপ লক্ষণযুক্ত হৃৎকক্ষক কাসিতে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। ডাঃ বনিংহসেন আবিষ্কৃত কেলি কার্ভের প্রদর্শক লক্ষণ “উর্দ্ধ চক্ষুপত্রোপরি জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্তমানতা” এ রোগেও উপস্থিত থাকে।

ওতিকোৎপত্তি রোগ বা টুবাকুলসিস—যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্—কেলি কার্ভের যক্ষ্মাকাসরোগে ত্রাহনিত্রায় ত্রায় বক্ষভেদকারী সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা এবং শুষ্ক কাসি থাকে; রোগী অত্যন্ত কষ্টের সহিত কিছু গয়ার উঠাইলে বোধ হয় যেন তাহা কিয়দূর উঠিয়া বক্ষে ফিঁরিয়া যায়, অথবা কাসিবার সময় চিলের ত্রায় গয়ার মুখ হইতে ছুটিয়া পড়ে। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন “কুসকুসের ক্ষতরোগ কদাচিত্ এই এন্টিসোরিক বাতীত আরোগ্য হইয়া থাকে।” গয়ার প্রচুর ও পূয়াকার হয় এবং রক্তযুক্তও থাকিতে পারে; রজনী ৭টা হইতে ৫টা পর্যন্ত কাসির বৃদ্ধি হয়। প্রধানতঃ মধ্যাহ্নকালে শীত বোধ, নিদ্রার বাঘাতকারী শাঁই শাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বক্ষের স্পষ্টতর দুর্বলতা ইহার অগ্রাণ্ড লক্ষণ। রোগের উপসর্গ স্বরূপ হৃৎপিণ্ড বিকার অথবা শরীরের জল স্ফীতি, উর্দ্ধ চক্ষুপুটে জলপূর্ণ থলির ত্রায় স্ফীতি প্রভৃতি শোথলক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। অপরিমিত স্তম্ভদান প্রযুক্ত দুর্বলীভূত স্ত্রীলোকদিগের অপরিমুট যক্ষ্মাকাসরোগে ইহা উপকার করিতে পারে। রোগের শেবাবস্থাতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাঃ জকি তাঁহার ৬০ বৎসরের বহুদর্শিতায় যক্ষ্মাকাসরোগে কেলি হাই ও ক্যানাবিস্ স্রাতির উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। থাইসিস্ রোগে অনেক সময় ক্যান্সে কার্ভ ও কেলি কার্ভের পরে নাই এসি উপযোগী ঔষধ।

সূতিকাক্ষেপ বা শিথলিরাশি প্রক্যাম্‌সিহ্না ।—
সজ্ঞানাবস্থায় সর্কাস্ট্রীন আক্ষেপ হয় বলিয়া ডাঃ ফ্যারিংটন অনুমান করেন
যে কেলি কার্বন দ্বারা সূতিকাক্ষেপ রোগে ফল পাওয়া যাইতে
পারে । উদ্‌গার উঠিলে যেন এই ফিটের নিবৃত্তি হয় ।

দ্রৌর্ধ্বল্য—পেশীদৌর্ধ্বল্য ।—কেলি কার্বনিকাম্
অত্যন্ত পেশীদৌর্ধ্বল্য উপন্নকারী বস্তু । এজন্য ইহা কেবল
শারীরিক নহে, হৃৎপিণ্ডপেশীর দুর্ধ্বলতা উপস্থিত হইলেও উপকার
করিয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডদুর্ধ্বলতা বশতঃ নাড়ীর গতি অনিয়মিত,
অথবা ক্ষণলোপবিশিষ্ট, কিম্বা দ্রুত ও জতিশয় দুর্ধ্বল হয় । ফলতঃ
স্প্রিটাস স্পন্ট দাত্রই অত্যন্ত পেশী দুর্ধ্বলকারী বস্তু । হৃৎপিণ্ড পেশীর
দুর্ধ্বলতা, ইহাদিগের, বিশেষতঃ কেলি কার্বনের সকল রোগেই বর্তমান
থাকে বলিয়া পূর্ণ ও গোলাকার নাড়ী বর্তমান থাকিলে ইহা
কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না ।

রক্তহীনতা বা গ্রিনিহ্না ।—কেলি কার্বন
শোণিতের পরিমাণের হ্রাস এবং গুণের অপকৃষ্টতা সাধন করায় শরীরো-
পাদনের, বিশেষতঃ পেশীমণ্ডলের, পোষণবিহার ও ক্ষয় বশতঃ মূত্র
য়ুরেট সন্ট পূর্ণ হয় । এজন্য ইহা কঠিন ও বহুকালস্থায়ী রোগ এবং
প্রসব বা গর্ভপাত জনিত রক্তহীনতা এবং দুর্ধ্বলতা প্রভৃতি নিবারণে
সক্ষম । ইহার শোণিতহীন রোগী বড়ই শীতল থাকে এবং সামান্য
শীতল বায়ুসংস্পর্শেও শীত বোধ করে । তাহার সম্পূর্ণ শরীরাত্মকরে রক্ত-
হীনতাঘটিত দপদপানি উপস্থিত হয় । রক্তহীনতা জন্য শোণিতগতির
মহুরতা প্রযুক্ত শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য জন্মে । মস্তকের রক্তাধিক্য
বশতঃ কর্ণে গুণ গুণ শব্দ, মস্তক ফিরাইতে অথবা গাড়ীতে ভ্রমণকালে
শিরোগর্ঘন এবং দৃষ্টিদৌর্ধ্বল্য—বিশেষতঃ অপরিমিত ইন্ডিয়সেবা রক্ত-
হীনতার কারণ হইলে—ইহা জন্মে ।

গর্ভপাত বা প্রসবাস্তিক রক্তহীনতায় কষ্টপ্রদ পৃষ্ঠবেদনা, মাজার দুর্বলতা ও খঞ্জতা নিবন্ধন চলায় কষ্ট, জরায়ু হইতে অদমনীয় শোণিতস্রাব এবং কাসি ও পুনঃ পুনঃ রক্তনীঘর্ষ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

৩। কেলি ক্লরিকাম্ (Kali Chloricum) ।

সংস্কৃত ১—কেলি ক্লরিকাম যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—মার্ক্যারির । বিষমাত্রায় পারদ সেবন প্রযুক্ত মুখক্ষতাদির ইহা স্বরিত উপশম করিয়া থাকে ।

ডুলনীয় ঔষধ ১—বেল, বরাক্স, ক্যাঙ্কে কা, ক্যাছা, হাই-ড্র্যাপ্টিস, মার্ক আয়, নাই এসি, ফাইটল ।

সাধারণ ক্রিয়া ১—ক্লরেট অব্ পটাস্ শৈল্পিক ঝিল্লির, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের শৈল্পিকঝিল্লির প্রচণ্ড উদ্দীপনা উপস্থিত করে । ইহা মুখগহ্বরে ক্ষতোৎপাদক প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহার সম্পূর্ণ শৈল্পিক ঝিল্লি ক্ষীত ও লোহিতবর্ণ হয় । এবং গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ এবং ওষ্ঠ প্রভৃতিতে ধূসরবর্ণতলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে । লালাস্রাবী গ্রন্থি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রচুর, উগ্র লাল স্রাব হয় । আমাশয়ে ইহা ক্ষতোৎপন্ন করে এবং অস্ত্রে ইহার ক্ষতোৎপাদক শক্তি থাকায় পচা ক্ষত উৎপন্নকারী ও প্রভূত দুর্বলতাজনক আমরক্ত রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় । ইহা বৃক্কক আক্রমণ করিয়া প্রথমে মূত্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং পরে প্রদাহোৎপন্ন করায় মূত্রাঘাত জন্মে । অন্যান্য পটাস্ সল্ট অপেক্ষা ইহা হৃৎপিণ্ডকে অধিকতররূপে আক্রমণ করায় তাহার দুর্বলতা পক্ষাঘাতেও পর্য্যবসিত হইতে পারে, শরীরতাপ হ্রাস হইয়া যায় ।

লক্ষণ ।

মুখমণ্ডল ১—পাণ্ডুর এবং নীলাভ । কালচে । মুখের আকৃতি যন্ত্রণাবাজক । চক্ষুপার্শ্ব সন্নিহিত বামগণ্ডপ্রদেশে আততভাবযুক্ত

আকৃষ্টতা । মুখের বাম পার্শ্বে বৈজাতিক আঘাতবৎ স্নায়ুশূল কথা কহিলে, 'আহারকালে অথবা সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি পায় এবং পরে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা জন্মে ।

স্বাসযন্ত্র ১—স্বরভঙ্গ । স্বরযন্ত্রে উত্তেজনা হওয়ায় কাসি পায় । প্রচণ্ড প্রাতিজ্ঞায়িক কাসি । গন্ধকবাস্পের ঘ্রাণযুক্ত বায়ুর শ্বাস গ্রহণের স্থায় বক্ষে সংকোচন জাব ।

হৃৎশিঙ ও নাড়ী ১—হৃদগ্রপ্রদেশে উৎকর্ষা । হৃৎস্পন্দন অল্পভূত হয়, কিন্তু তাহা দ্রুততর হয় না এবং হৃৎপ্রদেশ শীতল থাকে । হৃৎকম্পকালে বক্ষের সংকোচন ।

নাড়ী ১—দ্রুত, কোমলস্পর্শ, ধীরগতি, ক্ষুদ্র এবং দুর্বল । পূর্ণতার স্বল্পতা এবং শক্তির হ্রাস ।

মুখপাহুবর ১—জিহ্বার উভয় পার্শ্বে একই প্রকারের ক্ষত । মুখের ক্ষতকরপ্রদাহে এবং তাহার কোষগ্রন্থির (Follicular) প্রদাহে শ্লেষ্মিক ঝিল্লির উপরিভাগ লোহিতবর্ণ ও স্পর্শামহিষু স্ফীতিযুক্ত হয় এবং গণ্ডাভাঙ্গুর ও গুঠ প্রভৃতি স্থানে ধূসরবর্ণ তলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে । মুখ-লালার বৃদ্ধি ও উগ্রতা ।

গলাভ্যন্তর ১—চাঁছাবৎ । কাঁচা ক্ষতের স্থায় অল্পভূতিযুক্ত । গুফতা । গলাধঃকরণক্রিয়া কষ্টকর । গলগহ্বর, টনসিলগ্রন্থি এবং অগ্ননাগীর শ্লেষ্মিক ঝিল্লির প্রাতিজ্ঞায় হইলে গুল নির্ঘ্যাস থাকে । ডিফ্‌থিরিয়াবৎ আটা নির্ঘ্যাস । হনুঅধঃগ্রন্থি স্ফীত এবং গলমধ্য লোহিতবর্ণ ও শোথযুক্ত ।

আমাশয় ১—বিবমিষা এবং বমন । তরুণ আমাশয়প্রদাহ । আমাশয়শূল । আমাশয়ে কর্তনবৎ বেদনা ।

অন্ন ১—উদরাময় । আমরক্তরোগ জন্মিলে অনেক রক্ত ও ক্লেদ নির্গত হয় । প্রথমে বিষ্ঠা কঠিন থাকে, পরে তাহা আম ও রক্তমিশ্রিত হয় ।

মূত্রবদ্ধ ১—বৃক্কের প্রদাহ বা নেফ্রাইটিস । বারম্বার মূত্রবেগ । রোগী কেবল কতিপয় বিন্দু শোণিতযুক্ত মূত্র নির্গত করিতে পারে । রক্তমেহ । মূত্র অত্যন্ন, কাল এবং খেতলালাযুক্ত । গর্ভাবস্থার লাল-মেহরোগ ।

ভ্রুক ১—নীলরোগ (শিরাশোণিতপ্রাপ্তিতে শরীরের নীলবর্ণ) ওষ্ঠে ও শরীরসামান্তে অধিকতর থাকে । পূয়গুটিকা । চুলকানিযুক্ত রসবিষ্মিকা ।

চিকিৎসা ১—আভ্যন্তর বিষক্রিয়ায় পটাসমস্টমধ্যে কেলি ক্লরিকাম সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই । ইহা অতি সত্ত্বর জ্বপিণ্ডের অবসাদ ও পক্ষাঘাত এবং জৈবতাপের হ্রাস উৎপন্ন করে ; কিন্তু চিকিৎসাকার্যে ইহার তদন্তরূপ কোন বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না । সুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের স্নানুশূলরোগে কোন কোন চিকিৎসক ইহা দ্বারা ফললাভ করিয়াছেন । হঠাৎ বিদ্যুতাবাতের শ্যায় বেদনার, কথা কহিতে, আহার কালে এবং সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি এবং বেদনার শেষে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা ইহার বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত ।

“জাঙ্গী ঘা”, মুখের পচা ক্ষত, মুখের এবং গলাপ্রদেশের (Pharynx) অতি দুরারোগ্য কোষপ্রস্থি-সংসৃষ্ট প্রদাহ (Follicular stomatitis and pharyngitis) কেলি ক্লরিকাম দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে । মুখের অসহনীয় দুর্গন্ধ থাকে এবং চিন্মসা সূত্রবৎ লাল্য প্রাব হয় । শিঙদিগের পচা (Gangrenous) মুখক্ষতরোগে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ।

স্তন্যপায়ী শিশুর এবং স্তন্যদাত্রী প্রসূতির মুখক্ষত এতদ্বারা আরোগ্য হয় । এই সকল রোগে, ইহার উপযুক্ত বহিরাভ্যন্তরীণ

উভয় প্রকার প্রয়োগরূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মুখে এবং গলায় অতি দুর্গন্ধবুক্ত ক্ষত থাকিলে লালামেহ, রক্তমেহ, কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে ইহা উপকারী ঔষধ । অবস্থানুসারে ডিফ্‌থিরিয়া রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আমলকরোগে ছুরিকাঘাতব্য বেদনা ; ক্ষণে ক্ষণে অতি স্বল্প-পরিমাণ, প্রায় পরিষ্কার রক্তময় মলত্যাগের কুস্থানে রোগী চাঁৎকার করিয়া উঠিলে ইহা দ্বারা উপকার হয় । এস্থলে ইহা ক্যাথারিস ও মার্কা কল সহ তুণীয় ।

মুখমণ্ডল ও পদের বৃদ্ধাস্থূঠের এশিথিলিওমা (মারাত্মক অর্বুদ) ইহা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে ।

কেলি নাইট্রিকাম্ (Kali Nitricum) ।

প্রতিনাম γ —সর্টপটার । সোরা ।

সম্পন্ন γ —বিষম গুণ—নাই, স্পি, ডাল । ক্যাম্ফরে বেদনার বৃদ্ধি । ক্যাথারিস, টাপেন্টাইন্ ও মসলার অপব্যবহারে মূত্রকৃচ্ছ্র নাইটার (সোরা) শাস্তি জন্মায় ।

ভুলনীয়া ঔষধ γ — একন, আর্স, ক্যাছা, টোরবিষ্ট ।

সাধারণ ক্রিয়া γ —মেরুজ্জা এবং নেরুজ্জের মাধুগুণে কেলি নাইট্রিকামের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় মেরুজ্জার এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতাবস্থায় ক্রিয়ারোধ ঘটে । ইহা শোণিতের অপকর্ষ ও জমাট বাধার শক্তির হানি উৎপন্ন করে । ইহা কিড্‌নি আক্রমণ করিলে উত্তেজনা ও ক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় মূত্রের পরিমাণাধিক্য সহ স্থূল উপকরণও বৃদ্ধিত হইয়া থাকে । শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লেষ্মিক ঝিলিতে ইহার উত্তেজক ক্রিয়া রক্তাধিক্য ও প্রদাহে পর্য্যবসিত হয় ।

লক্ষণ ।

নাসিকা ;—নাসিকার সদিবশতঃ ভ্রাণশক্তির অভাব ; হাঁচি ; নাসিকা রক্তের পশ্চাৎ হইতে গলগহ্বরগণ্ডে প্লেয়ার ক্ষরণ । দক্ষিণ নাসারক্তের উর্দ্ধাংশে ক্ষতবৎ বেদনা । নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; নাসিকার শুষ্কতা এবং রোধ । নাসারক্ত স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত । স্পর্শে নাসিকাস্থিতে বেদনা । দক্ষিণ নাসারক্তে স্ফীতির অস্থভূতি ।

শ্বাসপ্রশ্বাস ;—স্বররোধ ; স্বরযন্ত্রের কৰ্কশতা, চাঁছাবোধ ও স্বরভঙ্গ । শ্বাসাভাববশতঃ রোগী জল পান করিতে পারে না ; অল্প অল্প করিয়া জল পান করিতে হয় ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু দুই হাতে পানপাত্র ধরিয়া আগ্রহের সহিত ঢোকে ঢোকে জলপান করে । প্রাতঃকালে শয্যায থাকিতে বক্ষের সঙ্কোচন । বক্ষের সম্মুখ পার্শ্বে জ্বালা । প্রাতঃকালে কণ্ঠা পর্য্যন্ত জ্বালা বিস্তৃত হয় ও আলগা গয়ার থাকে । সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে শ্বাসরুদ্ধ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততা ; প্রাতঃকালে কম থাকে, রোগী সিঁড়িতে উঠিতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট । প্রাচণ্ড, অজ্ঞানকর শিরঃশূল, রাত্রি ৩টার সময় কাসিতে কাসিতে নিদ্রাভঙ্গ ; মুক্তবায়ুমধ্যে কাসি ; উচ্চে উত্থান করিতে অথবা শ্বাসরোধ করিলে কাসির বৃদ্ধি ; কাসিতে বক্ষে কৰ্ভন ও স্থচিবেধবৎ বেদনা ; গলা খাঁকর দিয়া প্লেয়া উঠাইলে কাসি ; কাসিলে জমাট রক্তের নিষ্টিবন । বক্ষের মূছ আততভাব ও সঙ্কোচন হওয়ায় বোধ যেন পৃষ্ঠ হইতে ফুসফুস আকৃষ্ট হইতেছে । দীর্ঘ-শ্বাস টানিতে অথবা কাসিতে বক্ষে স্থচিবেধবৎ বেদনা । বক্ষের রক্তাধিক্য । অত্যন্ত ভারি বস্তুর চাপ হওয়ায় গ্রায় বক্ষের গুরুত্ব ; আততভাব হইলে বক্ষপ্রাচীর একত্র চাপিত হওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ, জন্ম যে

শ্বাসরোধ ঘটে তাহা রক্তাধিকোর বা ফুসফুসের নিরেটানস্থার অমুপাতাপেক্ষা অধিকতর । ফুসফুসে পুষ্ণসঞ্চার ও বলক্ষয়কর ঘর্ষ ।

হৃৎশিশু ও নাড়ী ;—ক্রত উত্থান বা শরীরচালনা করিলে হৃৎকম্প হওয়ার মুখের তাপ ও বক্ষের কষ্ট । প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দনশব্দ শ্রুত হয়, এবং তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ ও উৎকর্থা জন্মিলে রোগী শব্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য । নাড়ী প্রায়শঃ পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ এবং ক্রত ; প্রাতঃকালে ধীর, চর্কল, ও সূত্রবৎ ।

মূত্র ;—ঈষৎ লোহিতাভ, আবিলাযুক্ত এবং অধিক পরিমাণ ফেকাসে মূত্রের বারম্বার ভ্যাগ । মূত্রে শ্লেষ্মার তলানি এবং লবণের বৃদ্ধি । মূত্রকৃচ্ছ ।

মল ;—জলবৎ, পাতলা ও মলসংযুক্ত উদরাময় ; উদরশূল সহ কোমল মলভ্যাগ । কুহন সহ রক্তসংযুক্ত মলভ্যাগ । অস্থের ঝিল্লিক অংশ ও রক্ত মিশ্রিত মলভ্যাগ । অত্যন্ত চাপ দিলে মলভ্যাগ । গো বৎসের মাংসাহার নিবন্ধন উদরাময় । কোষ্ঠবদ্ধ ।

ত্বক ;—চুলকনাযুক্ত ফুস্ফুরি ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্ণগুটিকা, ত্বকে স্ফি বেঁধার ছায় খোঁচা, পরে জালা । ত্বগুপরি পীতবর্ণ রসপূর্ণ ও জালাযুক্ত রসবিষিকার চুলকানিতে বিদারণ ।

চিকিৎসা ;—পলিপাস্ বা বহুপাদার্ক্বুদ ; হাপানি নিউমোনিয়া, থাইসিস্ প্রভৃতি বক্ষরোগ ; উদরাময়, আমরক্ত রোগ ; ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র ।—কেলি নাইট্রিকামের ঔষধগুণ পরীক্ষায় নানাবিধ যন্ত্রক্রমণের ফলস্বরূপ বহুবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । কিন্তু রোগচিকিৎসায় ইহার প্রয়োগের তাদৃশ প্রচুরতা অথবা নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক লক্ষণের বর্তমানতা দৃষ্টিগোচর হয় না । এজন্য আমরা যে যে রোগে ইহা প্রয়োগের বিধয় ;

উল্লেখ করিব তাহা, চিকিৎসকের এতদ্বিষয়ক লক্ষণের সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ।

দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের ঐচ্ছাম্বিক পলিপাস বা বহুশাদার্ভুদ রোগ সম্পূর্ণ নাসিকা পূর্ণ করিলে কেলি নাইট্র ৩× ডাইলিউষণ তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য করে (ডাং এলেন) । অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ, মুচ্ছারিভাব এবং বক্ষে মূত্র স্ফিবেধ অথবা জ্বালাযুক্ত বেদনা প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট হাঁপানিরোগে গয়ার অপেক্ষাকৃত সরলভাবে নিষ্ঠূত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় । নিউমোনিয়ারোগের অত্যধিক তাপ ও তৃষ্ণায় এবং হামফ্রাক্টেশনের সর্ব্বাধিকাংশেই, বিশেষতঃ সাময়িক বৃদ্ধিকালে, অত্যন্ত কাসি, বেদনা এই শ্বাসকৃচ্ছ প্রভৃতি তরুণক্রমণের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে । এণ্ডোকার্ডাইটিস্ ও ব্রসবাত রোগে ইহার প্রয়োগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

কেলি নাইট্র গোবৎসমাংস ভক্ষণ বশতঃ উদ্ভ্রামহের আরোগ্য করে । ইহার আমলরক্তরোগে অবিশ্রান্ত বেগ হইলে রক্তনীতে ক্লোড ও রক্তযুক্ত মলত্যাগ হইতে থাকে । ফলতঃ, তরুণ আমল রক্তরোগে একনাইট্র প্রয়োগে কর্তনবৎ বেদনা, অত্যধিক তৃষ্ণা এবং হস্তপদের শীতলতা বিদূরিত না হইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় ।

মূত্রকৃচ্ছ, মূত্র-মেহ এবং শয্যামূত্রত্যাগাদিরোগে অবস্থানুসারে কেলি নাইট্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

৫। কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানিকাম্ (Kali Permanganicum) ।

কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানামের ঔষধগুণপরীক্ষাবিষয়ে কোন নিদর্শন পাওয়া না যাইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার কিঞ্চিৎ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহা আমরা নিম্নে উল্লিখিত করিতেছি ।

চিকিৎসা—ডিফথিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত; স্কার্লেটিনা বা আরক্তজ্বর।—ডিফথিরিয়ার পচা ক্ষত হইতে পচা ও পুতিগন্ধযুক্ত পুয়স্রাবে কেলি পার্ম্যাফসফরিকাম কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার বহিঃপ্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না। ইহা দ্বারা ফলাশা করিলে নিম্ন ক্রমে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের আবশ্যক। ইহার রোগে গলদেশের বহিরভ্যন্তর উভয়ই ক্ষীণ হয় এবং তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। গলদেশ শোথযুক্ত এবং ঝিল্লি ভয়াবহ পুতিগন্ধবিশিষ্ট হয়। ল্যাকসিসের দ্বারা ইহাতেও আহাৰ্য্য গলাধঃকরণে কষ্ট এবং ভুক্তদ্রব্য উদগীরিত হইয়া থাকে। অনেক বিষয়ে ইহা এপিসিসের তুল্য হইলেও ইহার ভয়াবহ জর্গন্ধ প্রভেদকরূপে বর্তমান থাকে। ডাং ভ্যান্লেনেপ্ এ রোগে ইহাকে মহৌষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

আরক্তজ্বরের গলক্ষণে ইহার প্রয়োগ স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

৬। কেলি ফস্ফরিকাম (Kali Phosphoricum.)।

উপচয়্যঃ—আহারে; শৈত্যসংস্পর্শে; প্রাতঃকালে।

উপশম্যঃ—তাপে।

চুলনীল ঔষধঃ—আস, কষ্ট, ল্যাকসিস, জেল্‌স, মিউ এসি।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—কেলি ফস্ফের ঔষধগুণপরীক্ষার কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ডাং সুল্‌তারের অন্ততম টিসুরেমিডি। তাঁহারই মতানুসরণ করিয়া ইহার প্রয়োগ দ্বারা রোগা-রোগ্যালক্ষ লক্ষণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহার ক্রিয়ার পর্যালোচনার দেখা যায় যে ইহা সমগ্র স্নায়ুগুণে প্রভূত ক্ষমতা প্রকাশ করে।

এই ক্রিয়াফলে মানসিক অবসাদ ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি দুর্বলতার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়জ্ঞানদৌর্ভল্যা, গতিদ স্নায়ুর শক্তিহানি এবং পুনরুৎপাদিকা-শক্তিদ স্নায়ুগুণের ক্রিয়া বিদ্বস্ত হওয়ায় রসরক্ত প্রভৃতি যাবতীয় শরীরোপাদানের ধ্বংসলক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহা যুবক ও যুৱদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণঃ—মানসিক দৌর্ভল্যা বশতঃ রোগী উৎকণ্ঠায়ুক্ত, ভীত এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে না। অত্যন্ত অবসাদ। অসহিষ্ণু। রজনীতে ভীতিশঙ্কিত। সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বলিয়া বোধ। লাজুক। মস্তকে রক্তহীনতা জন্মে। দৃষ্টিদৌর্ভল্যা। অনুভূতির অভাব। চক্ষুপত্র ঝুলিয়া পড়ে। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ শ্রুত হয়। দুর্গন্ধ নাসিকাস্রাব। মুখমণ্ডল ঘোরবর্ণ এবং চক্ষু বসিয়া যায়। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক থাকে। দস্তমাড়ি স্পঞ্জের স্থায় থাকে এবং দন্ত হইতে অপস্থত হয়। গলাভাস্তরে পচা ক্ষত। স্বরতন্ত্রী পক্ষাঘাত। আমাশয়োৎসেকোটরস্থানে “কিছু নাই” ভাবের অনুভূতি। ভীতিপ্রযুক্ত উদরাময়; বিষ্ঠা পচা ও দুর্গন্ধ; রোগী দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত। আহারকালে উদরাময়। আমরক্তরোগে কেবল পরিষ্কার শোণিত নির্গত হয়; রোগী প্রলাপ কহে এবং উদর ক্ষীত থাকে। কলেরায় তণ্ডুলধৌতজলবৎ মলতাগ। হারিস জন্মে। পাণ্ডুবর্ণ, উত্তেজনাশ্রবণ এবং ক্রন্দনশীল স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব অত্যন্ত ও বিলম্বাগত। কখন বা ঋতুশোণিত অতি প্রচুর, ঘোর লোহিত বা কৃষ্ণাভলোহিত, পাতলা এবং কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত; শোণিত জমাট বাধে না। মূত্র অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ। অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। কাসিতে হরিদ্রাবর্ণ গয়ার উঠে। পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতা ও পক্ষাঘাতিক অবস্থা।

চিকিৎসা।

শুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—হোমিওপ্যাথিমতে কেলি ফস্ফরিকাস্ শুল্মবায়ুরোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। বায়ুপ্রধান ও উত্তেজনাপূর্ণ রোগীদিগের অকস্মাৎ ভাবাবিষ্টতা অথবা ক্রোধাবিষ্টতা জন্মিলে ইহার রোগাক্রমণ হয়। রোগে “গ্লোবাস হিষ্টিরিকাস্” বা শুল্মবায়ুর “অলীক শুল্ম” বর্তমান থাকে। রোগীর ক্ষণে কান্না ক্ষণে হাসি এবং মধ্যে মধ্যে জ্বন্তণ হয়। অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপও হইতে পারে। উদর স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাবুক্ত থাকে। কেলি ফস্ফ রোগী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি স্মরণীয় :—কারণভাবে ভীতি; রোগী সকল বিষয়েই অমঙ্গল আশঙ্কা করে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং হতাশ হয়; কম্প হয় ও চঞ্চল থাকে।

এগ্রাস ক্যাস্টাস্—শুল্মবায়ুরোগে কামাতুরতা বর্তমান থাকিলে।

এনাকাডিমাস্—পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটি ইচ্ছাশক্তির বর্তমানতায়।

ক্যাক্টাস্—দুঃখ, কারণভাবে ক্রন্দনের মাশ্বনা করিলে বৃদ্ধি, বিরলে থাকিবার প্রবল ইচ্ছা, মৃত্যুভীতি এবং সম্পূর্ণ শরীর তারগঠিত পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার অল্পভূতি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়া রোগে এই ঔষধ প্রদর্শিত।

কক্কুলাস্—স্পর্শজ্ঞানাধিক্য ও মূছার ভাব।

আসেনিকাস্—শুল্মবায়ু ঘটিত হাঁপানি।

কলফাইলাস্—শুল্মবায়ু ও রজোকৃচ্ছ।

টিষ্টা—রক্তের অপচয় ও গঞ্জিকাসেবন প্রযুক্ত শুল্মবায়ুরোগ। ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের অস্বতম প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

টাইফয়েড্ ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বর-
বিকার।—সুসারের টিসুরেমিডির নিয়মানুসরণে টাইফয়েড জরে
কেলিফস্ প্রযুক্ত হইয়া এরোগ চিকিৎসাতেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত
হইয়াছে। অপিচ হোমিওপ্যাথির প্রচলিত নিয়মে প্রযুক্ত হইয়াও বহুতর
টাইফয়েড জর চিকিৎসায় ফললাভ হওয়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণনিচয়
ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে :—শুষ্ক ও কটা জিহ্বা ;
কদাকার ও পুতিগন্ধ উদরাময় ; প্রগাঢ় দুর্বলতা ; নাড়ীর ক্ষীণাবস্থা ;
.. প্রশ্বাস বায়ুর দুর্গন্ধ ; দস্তুর উপরে মল (sordes) সঞ্চয় ;
প্রলাপ এবং উল্লিখিত অবস্থা সহ প্রভূত মানসিক অবসাদ। শোণিত
অত্যন্ত অপরূপ এবং টাইফয়েড বিষ মিশ্রিত থাকে। সর্বপ্রকার শ্রাবই
অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

ফলতঃ কেলি ফস্ফস্ফরিকাম্ যে অবস্থাবিশেষে পচা বা
টাইফয়েড দশাগ্রস্ত ক্ষত (gangrene), ক্ষতশ্রাব এবং উদরা-
ময় প্রভৃতি দৃষিত রোগে এবং স্নায়বিক দুর্বলতা মূলক শারীরিক
দৌর্বল্য, পেশীক্ষয়, আক্ষেপ এবং শঙ্কাস্রাবাদি
নানাবিধ রোগে উপকার করিতে পারে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদান
করিয়াছে। এই সকল রোগেও ইহার পূর্বোল্লিখিত রোগারোগ্যালক্ষণই
প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে।

৭। কেলি ফেরসায়ানিকাম্ (Kali Ferrocyanicum)।

চিকিৎসা।—শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া রোগে প্রচুর, কিন্তু অবি-
দাহী পুষ্ণবৎ শ্রাব এবং জরায়ুর ঠেলমারা ভাব থাকিলে এবং মানসিক দুঃখের
আতিশয়ো রোগী ক্রন্দন করিলে কেলি ফেরসায়ানাইডাম্
প্রযুক্ত হয়। জরায়ু হইতে মুহূ রক্তশ্রাব হওয়ায় রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে।

সিপিহ্নার ছায় ইহাতেও আমাশয়োকোটরপ্রদেশে “দমিয়া যাওয়ার ছায় অল্পভূতি” বর্তমান থাকে । প্রভেদ এই যে, সিপিহ্নাতে উপরিউক্ত অল্পভূতি জরায়ুর সগল্পভূতি ও আমাশয়ের কিঞ্চিৎ প্রকৃত স্থানচ্যুতি জন্ত, কেলি সাইহ্নার ভয়াবহ বিবক্রিয়ায় জ্বংপিণ্ডপেশীর প্রভূত দৌর্বল্য জন্মে, এজন্ত উপরিউক্ত দমিয়া যাওয়ার ভাব দুর্বল জ্বংপিণ্ড—যাহাতে জ্বংপিণ্ডের স্পন্দনসংখ্যার ওশক্তিরহাস নিবন্ধন শারীরিক শীতলতা, পতনাবস্থা, শিরোদুর্গন, অসাড়তা এবং কম্পত্তাব উৎপন্ন হয়—সংস্রবে জন্মে । ফলতঃ যে রোগে জ্বংপিণ্ডের ক্রিয়াগতির আশঙ্কা বর্তমান থাকে তাহাতেই ইহা উপযোগী । ইহা কেলি কার্ব সচ তুলনীয় ।

৮ । কেলি ব্রমেটাম্ (Kali Bromatum.)

সম্বন্ধঃ—কেলি ব্রমিকাম যাহার কাণ্যপ্রতিষেধক—লেড্ পইজনিঃ বা সীসকাবিক্রয়ার ।

যুজিনিয়া জ্যাম্বসের পরে ইহা বয়োস্ফোটক রোগে সফলপ্রদ ।

তুলনীয় ভ্রমপ্রঃ—একন্, এম্ব্রা গ্রি, বেল্, কাম্ফর, জেল্‌স্, হায়সা, নাক্‌স ভ, জিঙ্ক ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—কেলি ব্রমিকামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় মেরুমজ্জার প্রক্ষিপ্তক্রিয়া (Reflex action) বিধায়িনী অংশ আক্রান্ত হয় । এই ক্রিয়াফলে তাহার প্রক্ষিপ্তক্রিয়ার হ্রাস জন্মে । পরে ইহা কেন্দ্রাপসারী স্নায়ুর বহিঃসীমার পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে । অবশেষে ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে চক্ষুতারকার বিস্তৃতি, মাদকতা, মানসিক দৌর্বল্য এবং ভ্রমদৃষ্টি প্রভৃতি “ব্রমিজম” বা ব্রমাইড অব পটাসিয়ামের নাতিপ্রবল বিবক্রিয়ালক্ষণ প্রকাশ পায় । ইহা সাক্ষাৎ ভাবে জ্বংপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার পক্ষাঘাত, এবং রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলী আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহাদিগের আক্ষেপিক

সংকোচন এবং অব্যবহিত পরে বিস্তৃতি উপস্থিত হয়। অতএব ইহার আদি ক্রিমার ফলস্বরূপ মস্তক এবং সম্পূর্ণ শরীরে শোণিত সঞ্চালনের অবনতি হওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ শোণিতাভাবে স্নায়বিক অবসাদ প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীর-যন্ত্র ও শরীরোপাদানের ক্রিয়ানাশ ঘটে। ইহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় শোণিত-বহা নাড়ীমণ্ডলী বিস্তৃত হওয়ায় গতিদ এবং অহুভৃতিদ স্নায়ুকেন্দ্রে রক্তাধিক্য হইলে অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুকেন্দ্রের রোগজ ক্রিয়াবৃদ্ধির ফলস্বরূপ স্পর্শসহিষ্ণুতা ও ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ডাং-হেল বলেন “এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে সকল রোগে কেলি ব্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন আমরাও শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াঘটিত আক্ষেপাদি রোগে তজ্জন্মই ইহা হইতে ফল পাইয়া থাকি”। স্বক্বে ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা স্বকলক্ষেণে বিবৃত হইবে।

লক্ষণ।

মনঃ—শিশুদিগের রজনী-ভীতি, নিদ্রাবস্থায় শিশুর চীৎকার এবং কম্প। প্রলাপে ভ্রান্তদৃশ্য; রোগী মনে করে তাহাকে কেহ অহুসরণ করিতেছে, তাহাকে বিষ খাওয়াইবে; সে যেন ভগবানের প্রতিহিংসার পাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; সে মনে করে যেন তাহার সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ক্রন্দনের অদম্য যৌক উপস্থিত হয়। মদাত্যয়বৎ লক্ষণে মুখমণ্ডল শোণিতোচ্ছ্বাসযুক্ত হয় ও ভয়াবহ ভ্রমাত্মকদৃশ্য দর্শন করে। বিধাদোন্মত্ততায় ভ্রমদৃষ্টি ঘটে। মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতাহীনতা। স্মরণশক্তি দুর্বল; কথা কহিতে বাক্যের কথা-বিশেষের ভ্রান্তি অথবা বাক্যাংশের স্থলন; মস্তিষ্কের রক্তহীনতা বশতঃ চিন্তাশক্তির অভাব। লিখিত বিষয় বৃদ্ধিতে পায় যায় না, কেননা বাক্যের কথাবিশেষ বা কথার অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হয়, এক কথারই পুনরাবৃত্তি করে অথবা কথাবিশেষ অসঙ্গত স্থানে লেখে।

মস্তক ।—মস্তিষ্ক উত্তেজিত থাকায় মুখমণ্ডলের শোণিতাভা, চক্ষুতরকার বিসৃতি এবং চক্ষুর বসিয়া যাওয়ার ভাব । রোগী শিরো-
লুণ্ঠন করিতে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে,
হস্তপদ শীতল, এবং মস্তিষ্কে রসস্রাবের পূর্বে প্রবল রক্তাধিক্য । দৃষ্টির
মলিনতা, চক্ষু তরকার বিসৃতি, চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার উজ্জ্বলা-
হীনতা জন্মে ।

মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, কিন্তু অন্ত্যায় বক্ষণে মস্তব্যক্তির
হায় প্রতীয়মান হয় । রোগী ভ্রম দেখিতে থাকে ।

শ্বাসযন্ত্র ।—প্রত্যেক দুই অথবা তিন ঘণ্টা অন্তর ছপছপ কক
কাসির হায় শুষ্ক কাসির আক্রমণে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় শ্লেষ্মা অথবা
ভুক্তবস্তুর বমন এবং রজনীতে শয়ন করিলে তাহার সুন্ধি ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী ।—হৃৎপিণ্ডের শক্তিহীনতা জন্মে ;
তাহার স্পন্দনশক্তি দুর্বলতার অনুপাতাপেক্ষাও ক্ষীণতর, ও চরাগত বলিয়া
বোধ হয় ; হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া ধীর এবং পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ শব্দবিশিষ্ট
পাকে । নাড়ী প্রথমে দ্রুতগতি থাকে, ক্রমশঃ ধীরতর হয় ; ধীরগতি,
সুদ্র এবং দুর্বল নাড়ী ।

মুখগহ্বর ।—জিহ্বা বিবদ্ধিত, শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ ; পরে
লোহিতবর্ণ শুষ্ক ও কটা ; জিহ্বাপৃষ্ঠ এবং জিহ্বা পার্শ্ব শুভ্র, কথা কহিতে
কষ্ট ; জিহ্বার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা ; তোতলা কথা । শুভ্র লেপযুক্ত জিহ্বা
থাকিলে রোগীর প্রাণসে দুর্গন্ধ বাহির হয় ।

গলাভ্যন্তর ।—মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর এবং গলগহ্বরস্থানের
(Pharynx) অশান্ততা (মস্তপায়ীদিগের হইয়া থাকে) ।

আনাসযন্ত্র ।—শুক জিহ্বা থাকিলে তীব্র পিপাসা জন্মে । বিবিধা
হয়, এবং মাথা ঘোরে ; পুনঃ পুনঃ বমির বেগ এবং বমন ।

অল ।—জলবৎ মলত্যাগ ; বায়ুপ্রযুক্ত উদরশূল ।

মূত্র ।—মধুমেহ জন্মিলে মূত্র শর্করাপূর্ণ। অবস্থা বিশেষে প্রচুর ফেব্রিল ও জলবৎ মূত্রত্যাগ। প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগে অনেক ফস্ফেট পাওয়া যায়। মলত্যাগ করিতে বসিলে প্রথমে বিন্দু বিন্দু মূত্র পড়িতে থাকে। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। কখন কখন ক্ষীণ ধারে ঈষৎ পীত মূত্রত্যাগ।

পুং জ্ঞানেনক্রিয় ।—সঙ্গমেচ্ছার হ্রাস হইলে ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। রেতস্থলন হইলে মানসিক অবসাদ, চিন্তাশক্তির জড়তা ও পৃষ্ঠবেদনা হয় এবং চলিতে গাটলে; রোগী বড় দুর্বল হইয়া যায়।

স্ত্রীজ্ঞানেনক্রিয় ।—ঋতুসন্ধিকালে মস্তকে বেদনায়ুক্ত রক্তোচ্ছাস এবং রক্তাধিক্য। কামেচ্ছার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় অণ্ডাধারের স্নায়ুশূলে রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে। অণ্ডাধার এবং ভগকপাটের উত্তেজনা হওয়ায় স্ত্রী-অঙ্গের চুলকনা জন্মে।

স্বক্ ।—মাংসল এবং কদাচারী ব্যক্তিদেগের মুখে, ঋক্ষ ও বক্ষে ব্যোত্রণ। আরোগ্যাচ্ছন্নহিত, বৃহৎ এবং বেদনায়ুক্ত পুষ্পটিকা; স্ফোটক।

প্রমাইডরোগী বড় বায়ু প্রধান; ইহারা কোন না কোন প্রকার কার্য্যে অবলম্বন না করিয়া থাকিতেই পারে না।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—হস্তের চঞ্চলতা (Fidgetiness)।—স্নায়বিক উত্তেজনা বশত: রোগী সর্বদাই কোন প্রকার কার্য্যে নিপু থাকিতে বাধ্য, যেমন নিদ্রাহীনতা জন্মিলে রোগী অবিশ্রান্তভাবে শয্যাবন্দোপরি হস্ত বুলাইয়া, ঘাড়ের চেইন নাড়িয়া, কিম্বা যে কোন বস্তু পায় তাহাতেই তদুপযুক্তরূপ হস্তাঙ্গুলীর ব্যবহার করিয়া উপরিউক্ত লক্ষণের পরিচয় দেয়। এইরূপ কার্য্যে রোগীর মন নিযুক্ত থাকায় তাহার কষ্টের কিঞ্চিৎ হ্রাস থাকে। জিহ্বাম রোগী চঞ্চলতা জন্ম প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা তাহার পদসঞ্চালনে প্রকাশ পায়। ফস্ফরাসের চঞ্চলতা সর্বশরীর-

ব্যাপী, রোগী স্থির হইয়া বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিতে পারে না, অবিরত স্থানপরিবর্তন করিতে থাকে । ইহা রাসের বেদনার কিঞ্চিৎ শাস্তিপ্ৰদ পার্শ্বপরিবর্তনাদি, অস্থিরতালক্ষণ নহে ।

চিকিৎসা ।

মস্তিস্কের চর্ছলতা বা লেনেক্যাপ ।—কালব্যাপী, অপরিমিত এবং কঠিন মানসিক শ্রম প্রযুক্ত মস্তিস্কের চর্ছলতা জন্মিলে কেলি লেমিকাম্ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । চলিতে রোগীর নাথা ঘোরে ও গা টলে, এবং তাহার মস্তিষ্ক অসাড় বোধ হয় ।

হাইসান্সান্সামস—মস্তিষ্কপ্রদাহরোগে রোগী মস্তিষ্ক মধ্যে স্পন্দনশূন্য জল হিল্লোলের তায় অনুভব করে । মস্তকে ঝাঁকি দিলে তাহার উপশম হয় ।

উন্মাদরোগ বা একিউট মেনিঞ্জা ।—শিশুদিগের প্রবল, প্রচণ্ড লক্ষণযুক্ত উন্মাদরোগের কেলি ব্রমেটাম্ উপযোগী ঔষধ । শিশু মনে করে তাহাকে হত্যা করিবে অথবা সকলেই তাহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে । এস্থলে ইহা হাইসান্সান্সামস সহ তুলনীয় ।

হুগীরোগ বা এপিলেপ্সিস ।—কেলি লেমিকামের হুগীরোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা নাই ; তবে আশঙ্কিত আক্রমণের (ফিটের) অব্যবহিত পূর্বে প্রদত্ত হইলে ইহা তাহার বাধা জন্মাইয়া থাকে এবং আবশ্যকালে প্রয়োগ করিলে তাহা নিবৃত্তি পায় । এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণই এ রোগে প্রথমে ইহার ব্যবহার প্রচলন করেন এবং এককালে তাঁহারা ইহাকে অনোধ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন । এক্ষণে তাঁহারাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা উপরিউক্ত প্রশংসার উপযুক্ত নহে, এবং সাময়িক আবেশ নিবারণ জ্ঞাতও ইহার

কালবাণী ব্যবহার নির্বিঘ্ন নহে । ফলতঃ মৃগীরোগে ইহার উপশমকারী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইতে হইলে উভয় মতের চিকিৎসককেই স্থূল মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিতে ও তাহার ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয় । কিন্তু অধিককাল ব্যবহারে প্রথমে তাহাতে মাদকতা, মানসিক দৌর্বল্য, ভ্রমদৃষ্টি প্রভৃতি ঐমিঞ্জম্ বা ঐমিঞ্জ বিষলক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে মস্তিষ্কের ক্রিয়াহানি বশতঃ রোগী জড়রোগগ্রস্ত হয় ।

স্বপ্ন-ভীতি বা নাইট মেহোর্স :—দস্তোদগম ও কুমি প্রভৃতির সহানুভূতি বশতঃ অথবা মস্তিষ্কেরই রোগনিবন্ধন মস্তিষ্ক অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজনাগ্রস্ত থাকিলে অনেক শিশু নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে । বয়স্ক শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বপ্নে ভূত, প্রেত ও “ছেলে ধরা” প্রভৃতি দেখার কথা প্রকাশ করে । উপরিউক্ত মস্তিষ্কবিকারে কেলি লামিকাম একটি প্রধান ঔষধ মধো গণ্য ।

লোকমোটর এটাক্সিস বা কশেরকামাজেজ্জা স্কহরোগ :—ক্রমাইড অব পটাসিয়ামের ঋণবিকারে কিঞ্চিৎ লোকমোটর এটাক্সিরোগলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । রোগী তাহার অধোঅঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে পারে না, চলিতে গা টলে । পদে ও পৃষ্ঠদণ্ডে চন্‌চনি এবং অসাড়তা জন্মে । উপরি উক্ত লক্ষণের প্রথমাবস্থায় কানেচ্ছার অস্বাভাবিক উত্তেজনা হয় এবং রোগ ক্রমশঃ গভীরতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গের উত্থানশক্তি অন্তর্ধান করে, কিন্তু রজনীতে পুনঃ পুনঃ অটনৈচ্ছিক গুক্রম্বলন হইতে থাকে । এতদবস্থায় পূর্ক হইতে বিষন্ন রোগী অধিকতর বিষন্নচিত হয় ।

শিশুকলেরা বা সামার ডান্ডারিয়া :—অত্যন্ত দুর্বলতা, গাত্রের শীতলতা, এবং মস্তিষ্কোদকরোগের উপক্রম লক্ষণ বর্তমান থাকায় কেলি লামিকাম দ্বারা একাধিক রোগীর উপকার হইয়াছে । ইহা সিন্ধু, ক্যালকে ফস্ প্রভৃতি সহ তুলনীয় ।

হৃৎরোগ—বহ্নোত্রণ বা একনিঃ আমবাত বা আর্টিকেরিয়া ; কাউর বা একজিমা ।—হস্তমৈথুন নিবন্ধন বহ্নোত্রণরোগের অবস্থানুসারে কেলি ব্রমেটাম দ্বারা উপকার হয় । ইহাতে ত্রণাদি কৃষ্ণাভ নোহিত, কঠিনস্পর্শ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিষিকাবেষ্টিত থাকে এবং অবশেষে পাকিলে পুয় নির্গত হইয়া অন্তর্দান করে । স্নায়বিক লক্ষণযুক্ত আমবাতের ইহা ঔষধ । কেলি লমিকামের লক্ষণযুক্ত রোগীর কাউরও ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে ।

৯ । কেলি মিউরেয়েটিকাম (Kali Muraticum) ।

ইহা সুস্ফারের বারটি টিসুরেমিডিমধ্যে অত্যন্তম । হোমিওপ্যাথিমতে কেলি মিউর ঔষধগুণ পরীক্ষিত হয় নাই । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ সুস্ফার হইতেই এতদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং তদনুসারে রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগদ্বারা সাফাৎ ভাবে প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন । সুস্ফারের মতে কেলি মিউ তত্ত্বজানু পদার্থ বা ফাইব্রিণ সহ রাসায়নিক সম্বন্ধযুক্ত সন্ট । তত্ত্বজাল বা কনেক্টিভ টিসুর জালের বুনট মধ্যস্থ শূণ্য স্থানমধ্যে তত্ত্বজান পদার্থ ক্ষরিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রোগারোগ্যালক জ্ঞানদ্বারা শুভ্র অথবা ধূসরবর্ণ নিঃস্রাব, শরীরশব্দাদির শ্লেষ্মিকবিধি হইতে ঘন ও শুভ্র তত্ত্বজানপদার্থমিশ্রিত শ্লেষ্মা এবং জিহ্বামূলে শুভ্র অথবা ধূসর বর্ণ লেপা ইহার প্রধান প্রদর্শক বলিয়া স্থির করিয়াছেন ।

উপরিউক্ত নির্দারগানুসারে কেলি মিউরিয়োটিকাম্ প্রতিষ্ঠায়ক রোগ (Catarrhal diseases), নাতিপ্রবল প্রদাহিক রোগ ও

ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি যে সকল রোগে তত্ত্বজ্ঞানপদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাতে এবং গ্রন্থি ক্ষীণিতে প্রয়োগে ফললাভ হইয়া থাকে ।

১০ । কেলি সাল্‌ফুরিকাম্ (Kali Sulphuricum) ।

বর্তমান ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানও আমরা সুস্ফারের নিয়মানুসারে ইহার প্রয়োগ দ্বারা লাভ করিয়াছি । প্রদাহিক রোগের শেষাবস্থায় এবং যে সকল রোগে প্রচুর উপত্বকস্থলন বা শঙ্কপাত হয় তাহাতে কেলি সাল্‌ফুরিকাম্ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে । “পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব” ইহার প্রদর্শক । ইহার রোগের সন্ধ্যাকালীন বৃদ্ধি এবং শীতল ও মুক্ত বায়ুতে উপশমও অত্নতর প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । হৃৎস্পন্দনে বদিয়া যাওয়ায় যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে এবং অক্‌জ্যালিউরিয়ারোগে (এক প্রকার মূত্রবালুকা) স্থলবিশেষে ইহা উপকারী । যে রোগের তরুণ অবস্থায় সাল্‌সেটিলা তাহারই পুরাতনে ক্যালি সাল্‌ফুরিকাম্ উপযোগী । আমরা নিম্নে কেলি সাল্‌ফুরিকাম্‌র যে প্রধান কতিপয় লক্ষণের উল্লেখ করিলাম তাহা হইতেই এ বিষয়ের সার্থকতার উপলব্ধি হইবে যথা :—

- ১ । সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি ।
- ২ । শ্লেষ্মিক বিল্লি হইতে পীতবর্ণ অথবা সবুজাভ স্রাব ।
- ৩ । মুক্ত বায়ুতে উপশম (সাধারণ লক্ষণের) ।
- ৪ । সন্ধিতে অথবা শরীরের যে কোন অংশে রসবাতিক বেদনা ।
- ৫ । উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি ।
- ৬ । সরল কাসিতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি ।

লেখক্চার ৫৭ (LECTURE LVI.)

মিলাস্থিসিজাতীয় ঔষধনিচয় ।

১। হেলনিয়াস্ ।

২। স্মাভাডিলা ।

৩। ভিরেটাম্ ভিরিডি ।

১। হেলনিয়াস্ ডায়ইকা (Helnias Dioica)

ভুলনীর ঔষধ ১—এলেটি, সিমিসি, সিঙ্ক, ফেরাম্, লিলি টাই, ফস্ এসি. সিপিয়া, টেরিবিষ্ট ।

সাধারণ ক্রিয়া ১—হেলনিয়াস পরিপোষণযন্ত্রের ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করিয়া শোণিতজননের বাধা উপস্থিত করে। ইহাতে শরীরে শোণিতের অল্পতা বা এনিমিয়া এবং তাহার বিশ্লেষণ ও অপকৃষ্টতা জন্মে ও শরীর দুর্বল হইয়া যায়। এজন্য ইহা রক্তহীনতা ও ক্লরসিস্ রোগের ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। অত্যন্ত যত্নমধ্যে কিড্‌নি ও জরায়ু ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের উত্তেজনা হওয়ায় ক্রিয়াধিক্য জন্মে এবং অবশেষে গৌণভাবে তাহাদিগের অবসাদাবস্থা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ ।

অন্ন ১—কার্যে নিযুক্ত থাকিলে মনের নিবিষ্টতা জন্ম রোগী ভাল বোধ করে। একা থাকিতে ইচ্ছা করে, কাহারও তাহার নিকটে যাওয়া ভাল বাসেনা; আলাপে অসম্মত হয়; মানসিক অবসাদ।

স্বাস্থ্য ১—ক্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং নিদ্রালু। রোগী অলস এবং অসাধারণ ক্লান্তি বোধ করে, কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। দুর্বলতা।

মূত্রযন্ত্র :—কিউনির বেদনায় মূত্রে শ্বেতলালা বা এলবুমেন । কিউনিতে জালা । মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথে জালা ও বাল্‌মানবৎ অনুভূতি । মূত্রস্থানী মূত্রশূণ্য বোধ হইলেও অটনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব । প্রচুর এবং পাতলা রঙ্গের মূত্র ।

স্ত্রীজননেত্রিয় :—বক্ষ্য হউক বা না হউক কামেচ্ছার এবং তদ্বিষয়ক ক্ষমতার অভাব । জরায়ুর গুরুত্ব ও টাটানি বেদনায় প্রভূত বিষন্নতা এবং গভীর ও সুস্পষ্ট অবসন্নতা—“জরায়ুর বর্তমানতার অনুভূতি” । জরায়ুদংশ হইলে বস্তিদেশে কিছু ঝুলিয়া পড়ার অনুভূতি ও দুর্বলতা ; ঋতুসন্ধিকালে দুর্বল রোগীরও ঐরূপ । ক্ষতযুক্ত জরায়ুর স্থলন, এবং প্রসবাস্ত্রে অবিরত কৃষ্ণবর্ণ, পুতিগন্ধ-বিশিষ্ট ও রক্তময় স্রাব । যোনির উত্তেজনা বশতঃ পুষ্টে বেদনা । জরায়ু হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব । রক্তহীনতা ও দুর্বলতা নিবন্ধন শ্বেতপ্রদর । তীক্ষ্ণ কণ্ডুয়ন প্রযুক্ত স্ত্রীকৃষ্ণ তন্তু, রাঙ্গা ও ক্ষীত এবং তাহার উপস্থকের স্থলন । যোনি এবং যোনিকপাটের ক্ষতকর প্রদাহে ঘোলা নিঃস্রাব জন্মে । জরায়ুর দুর্বলতা বশতঃ গর্ভপাতের আশঙ্কা । স্তন ক্ষীত এবং স্তনাগ্র স্পর্শসহিষ্ণু ও বেদনায়ুক্ত ।

পুষ্ট :—বিশেষতঃ স্ফ্যাপুলা বা অংসফলকাস্থিহৃয়ের নিগ্রাক্ষমধাবর্তী পৃষ্ঠপ্রদেশে জালা এবং তাপ । কটি ও বস্তিপশ্চাদ্দেশে জালা ও ক্লাস্তিবোধ ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—স্ত্রীরোগে প্রভূত রক্তহীনতা, দৌর্বল্য ও আনন্দ এবং গভীর বিষাদ প্রভৃতি—যাহা অগ্রমনস্ক থাকিলে ক্ষণকালের জন্ম উপশম—সাধারণ প্রদর্শক ব্যতীত ইহার বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্টিগোচর হয় না ।

টিকিৎসা ।

স্নায়ুশুল্কের ক্রিয়াদৌর্বল্য বা নিউব্রিঙ্কিনা-ইয়া—অতিশয় স্নায়বিক দৌর্বল্যবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রোগারোগ্য হেলনিয়াস্ ডায়ইকা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারা সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠে দুর্বলতাবোধক বেদনা হইলে ক্লান্তিভাব কটি বাহিয়া নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সকল রোগী কার্যারম্ভকাল হইতে কার্যে লিপ্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু তাহা রাসের কার্যকালীন স্বস্তিবোধ নহে; কেননা রাসে তাহা সন্ধির কাঠিগ্ৰহাস দ্বারা প্রকটিত।

লালামেহ বা এল্‌বুমিনিউরিয়া ;—দুর্বল ও রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন কিডনি বা বৃক্কের শোণিতাধিক্য হেলনিয়াস্ লালা-মেহ বা এল্‌বুমিনিউরিয়ার কারণ। মূত্র অত্যন্ত ও ঘোলাটে থাকে। এ রোগে ইহা পাল্‌স সহ তুলনীয়।

স্ত্রীজননেদ্রিয় রোগ—শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া ; যোনিপ্রদাহ বা ভ্যাজাইনাইটিস্ ; গর্ভশ্রাব বা এবর্ষণ ; জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস্ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌প্লেসমেন্ট অব ইউটারাস্।—অতিশয় দুর্বল ও রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীরোগে হেলনিয়াস্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেদ্রিয়ের নিষ্কীৰ্ত্তা (Atony) এবং পৃষ্ঠ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা এই সকল রোগের প্রধান এবং সাধারণ লক্ষণ। “বস্তি-মধ্যে জরায়ুর বর্তমানতার অনুভূতি” ইহার সর্ব্ববাদীসম্মত প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। সুস্থাবস্থায় যত্ন প্রভৃতি কোন যন্ত্র যে আমাদিগের উদরাদি কোন শরীরগত্বরে আছে তাহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না। যখনই

শরীর গহ্বরের যন্ত্রবিশেষের অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মে তখনই ঐ যন্ত্র রোগাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবে। কেননা শরীরাত্যন্তরে কোন যন্ত্রের অবস্থিতির উপলক্ষই অস্বস্তি প্রদ ; তদ্ব্যতীতও তাহার আনুষঙ্গিক অগ্নাচ্ছ রোগজ ও কষ্টপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত থাকায় তাহা অধিকতর কষ্টের কারণ। এস্থলে জরায়ুর অস্তিত্বের অনুভূতি তাহার রুগ্নাবস্থা প্রকটিত করিলে হেলনিফ্লাস প্রদর্শিত হয়। অগ্নাচ্ছ ঔষধেও জরায়ুর বর্তমানতার অনুভূতি আছে, কিন্তু হেলনিফ্লাসে তাহা জরায়ুব অবিশ্রান্ত টাটানি ও গুরুত্ব দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে; ইহার আনুষঙ্গিক পুষ্টের এবং অঙ্গাদির ক্লাস্তি ও কনকনানি অগ্নাচ্ছ প্রভেদক লক্ষণ।

শ্রেতপ্রদর রোগে কোন সামান্য পরিশ্রমেই অবিশ্রান্ত, কৃষ্ণ-বর্ণ ও হুর্গন্ধ স্রাবের বৃদ্ধি হইলে হেলনিফ্লাস তাহাতে ফল প্রদ। অত্যধিক দুর্বলতা এবং স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে; কিন্তু ক্ষত ও ফোকা সর্বস্থলে দৃষ্ট হয় না।

যোনি ও যোনিকপাটের প্রদাহ হেলনিফ্লাসের সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য। যোনি হঠাতে পুষ্যস্রাব হয় এবং তাহার সহিত জরায়ুগ্রীবীর ক্ষতও থাকিতে পারে। পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ ও হুর্গন্ধ ঋতুশোণিতের মুহু স্রাব ঘটে।

জরায়ুর অতিশয় নির্জীবতা ও শিথিলতা বশতঃ বন্ধ্যাস্র জন্মে; অথবা গর্ভ সঞ্চারণ হইলেও কিঞ্চিদধিক পরিশ্রম করিলেই এবস্থিধ দুর্বল জরায়ু ভ্রণ ধারণে অশক্ত হওয়ায় গর্ভস্রাব ঘটিলে হেলনিফ্লাস জরায়ুর শক্তিবিনাশ করিয়া বন্ধ্যাস্র দূর করিতে এবং ভবিষ্যৎ গর্ভপাতের সম্ভাবনা নিবারণ রাখিতে সক্ষম। গর্ভাবস্থাতেও উপযুক্ত সময়ে প্রযোজিত হইলে ইহা গর্ভপাতের আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে সক্ষম।

জরায়ুব্রংশ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি জরায়ুর নানা প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থাসংশোধনেও স্থলবিশেষে হেলনিয়াস্ আমাদিগের সাহায্যকারী । স্ত্রীলোকদিগের রক্তহীন, দুর্বল এবং নিষ্কর্ষ শারীরিক অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রসবান্তে শারীরিক দুর্বলতা ও রক্তহীনতা প্রভৃতি নিবন্ধন স্বাস্থ্যহানি বশতঃ ষথাসময়ে জরায়ু প্রকৃতিস্থ না হওয়ায় রক্তসংযুক্ত, ক্রেদবৎ প্রসবান্তিক স্রাব থাকিলে জরায়ুব্রংশ এবং তাহার নানা প্রকার স্থানচ্যুতি জন্মে । অধোদরে গুরুত্ব এবং পৃষ্ঠে ক্লান্তি ও টানিয়া নামানের দ্বায় বোধ হইলে সামান্য পরিশ্রমে সমগ্র শরীরে বিস্তৃত হয় । রোগী জরায়ুর গুরুত্ব এবং বর্তমানতা অগ্রভব করে । রোগী অত্যন্ত বিষাদ এবং অবসাদগ্রস্ত থাকে । হেলনিয়াস্ জরায়ুরোগে সিন্ধিয়া, লিলিয়াস্ এবং নেট সিউ প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয় ।

বেলিস্ পেব্রিনিস—ডাঃ বাণেটের মতে “পরিশ্রান্ত” (“Fagged”) জরায়ুর বলাধান করিতে বেলিস্ পেব্রিনিস উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য । ইহাতে রোগীর শরীরিক অবস্থানুসারে অধিক বা অল্প সংখ্যক ক্রম ধারণে অতিশ্রমপ্রযুক্ত জরায়ু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে শোণিতগতির মন্থরতা জন্ম রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় ।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া ; মূৎপাণ্ডুরো বা ক্লরোসিস্—রক্তহীনতা এবং মূৎপাণ্ডুরোগের হেলনিয়াস্ অগ্রতম উৎকৃষ্ট ঔষধ । আলস্য এবং বিলাসিতা নিবন্ধন স্বাভাবিক দৌর্কল্যাবিশিষ্ট অথবা কঠিন পরিশ্রম বশতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রীলোকদিগের কালব্যাপী শোণিতস্রাবই এ রোগের বিশেষ কারণমধ্যে পরিগণিত । এই সকল স্ত্রীলোকের অতিক্লান্তির অসোদ্যস্তি বশতঃ নিদ্রাহীনতা জন্মে এবং অধিকন্তু শেথোক্ত স্ত্রীলোকদিগের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম

প্রযুক্ত দুর্বলীভূত পেশীনিচয় জালা ও কন কন করে। ইহার একট বিশেষ লক্ষণপ্রকৃতি এই যে, বিষয়ান্তরে মন আকৃষ্ট থাকিলে রোগসম্পূর্ণ উপশম থাকে; একজ্ঞ চিকিৎসক আসিলে রোগী ভাল বোধ করে অর্থাৎ যন্ত্রণা প্রকাশ করে না। উপরি উক্ত রক্তহীনতা সহ আনুষঙ্গিক রূপে মূত্রযন্ত্র ও জননেক্রিয়বিকার বর্তমান থাকে।

২। স্যাভাডিলা (Sabadilla)

উপচয় ;—ইহার সাধারণ রোগলক্ষণের প্রতিদিন একই সময়ে বৃদ্ধি হয়।

উপশম ;—অধিকাংশ রোগলক্ষণেরই শয়নে এবং মুক্তবায়ুতে হ্রাস।

সম্বন্ধ ;—স্যাভাডিলার কার্যপ্রতিষেধক—পালস্।

ভুলনীয় ঔষধ ;—একন, ত্রায়, সিক, নেট মিউ, পালস্, সিপি, ভিরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-স্নায়ুগুণ্ডে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা স্যাভাডিলা পরিপোষণক্রিয়ার বিভ্রাট উপস্থিত করে। শৈল্পিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ কার্য হইয়া থাকে; এবং মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব জ্ঞাত ইহা রোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হয়। পাতলাকেশ ও শিথিলপেশী ব্যক্তি এবং শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগচিকিৎসায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ ;—মন—কোন প্রশ্নের উত্তর করে না, অটৈচত্য়াবস্থায় থাকে, পরে লক্ষপ্রদানে উত্তিত হয় ও গৃহমধ্যে অসাবধানভাবে দোড়াদোড়ি করে। মনে করে সে পীড়িত; তাহার শরীরংশ সঙ্কুচিত হইয়াছে। দবিরাম জরকালে প্রলাপ। উন্মাদরোগে কেবল শীতল

জলে মস্তক ধোঁত করিলে ক্রোধের শাস্তি । উদরের গভীরদেশের উত্তেজনা বশতঃ বিষণ্ণতা । বিবমিষা প্রযুক্ত উৎকর্ষার অহুভূতি । রোগী সামান্য কারণেই ভীত ।

মস্তক ১—চিন্তা করিলে শিরঃশূল জন্মে । মানসিক শ্রম শিরঃশূলের বৃদ্ধি করে এবং নিদ্রা আনয়ন করে । ভীতি নিবন্ধন গুল্মবায়ুর আবেশ । অতিশয় চিন্তায় অথবা অবিশ্রান্ত মনঃসংযোগে শিরঃশূল ।

শ্রাস্তু ১—অবসন্নতা ও দৌর্বল্য । শরীরের নানা স্থানে তীক্ষ্ণ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ষ্ঠবৎ বেদনা । সমুদায় অস্থিতে, বিশেষতঃ সন্ধিতে, তীব্র বেদনায় বোধ যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা অস্থির সশ্মুখ ভাগ কাটা এবং চাঁছা হইতেছে । শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগের বৃদ্ধি । রোগের প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ এবং বাম পার্শ্বে গতি ।

নাসিকা ১—নাসিকাতে চুলকনা এবং চনচনি । নাসিকার উর্দ্ধাংশের স্পর্শাসহিষ্ণু শুষ্কতা । নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ! প্রচণ্ড আক্ৰমিক হাঁচিতে উদর কম্পিত হইলে পরে চক্ষু হইতে জলস্রাব । স্রাবযুক্ত নাসিকা সন্ধি । অত্যন্ত নাসারন্ধ্রের রোধ ; শ্বাসগ্রহণ কষ্টসাধ্য ; নাসিকার ডাক ।

শ্বাসকষ্ট ১—শ্বাসকষ্ট নিবন্ধন উৎকর্ষা । রজনীতে শুষ্ক কাসি । কঠনাগাতে চাঁছাভাব নিবন্ধন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক কাসি । অধিকাংশ সময়ে শ্বাস গ্রহণকালে অথবা কাসিতে বক্ষপার্শ্বে সূচিবোধবৎ বেদনা ।

উদর ১—অস্ত্রে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা । অস্ত্রে জালা । শূল্য উদরের ডাক ।

মল এবং মলমাত্র ১—সরলাস্ত্র ও মলদ্বারে মহীলতার স্থায় কৃমির বিচরণবৎ বিড়-বিড়ি । উদয়াময়ের বিষ্ঠার উচ্ছলিত ভাব ও কটাবর্ণ ।

জ্বক্ :—জ্বকের লোহিত বর্ণ এবং রেখাকার কলক রোগী শীতল বায়ু মধ্যে থাকিলে স্পষ্টতর হয় ।

চিকিৎসা ।

মনমেনিয়া বা একাপ্রায়োস্মাদ :—কল্পনাবৈকারিক বা কোন এক বিষয়ের ভ্রান্তিমূলক উদ্ভাদ রোগে স্ত্রাবাডিনা উপকারী ঔষধ । বায়ু কর্তৃক উদর স্ফীত হইলে রোগিনীর ভ্রান্তি বশতঃ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে সে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে ; অথবা গলমধ্যে কোন সাংঘাতিক রোগ হওয়ার অলীক ভীতি জন্মিতে পারে । এই রূপ বহুবিধ ভ্রান্ত কল্পনাব উদয় হইতে পারে ।

পুজারোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে, সে দুই বা তিন ব্যক্তি, অথবা সে কাচনির্মিত, স্পর্শ করিলে সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপী প্রতিশ্য়ান :—ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অতি কষ্টকর হাঁচির বর্তমানতা স্ত্রাবাডিনার প্রদর্শক । রোগী মুক্ত বায়ু মধ্যে গমন করিলেই হাঁচি হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে । গলাভ্যন্তর স্ফীত হয় এবং শূণ্য গলাধঃকরণ চেষ্টায় বেদনা করে ; অত্যধিক হাঁচিতে সম্পূর্ণ শরীর বাঁক হইতে থাকে । লোমাঞ্চ ; শীত গাত্রোর্দ্ধ বাহিয়া উঠার অবস্থায় শরীরের খর খর কম্পও ইহার প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য । ললাট প্রদেশে শিরঃশূল, তৃষ্ণাহীন মুখশোব এবং শয়ন করিলে যাহা বৃদ্ধি পায় একরূপ কাসি ইহার অগ্রান্ত লক্ষণ । হাঁচির প্রাধাত্যযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জার অগ্রান্ত ঔষধ মধ্যে সাইক্রেমেন্ ও স্কুফরবিয়া প্রধান ।

হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধ জ্বর :—হে-ফিবারের নাসিকা সর্দিতে গুরুর জলবৎ শ্রাব এবং ললাটদেশে বেদনা থাকিলে স্ত্রাবাডিনা মহোপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য । অবিশ্রান্ত আক্ষেপিক হাঁচি হইলেও

সামান্য সন্ধি শ্রাব হয় । রোগের উপশম করিতে সক্ষম হইলেও ইহার ক্রিয়ায় গভীরতা না থাকায় ইহা সর্বস্থলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে সক্ষম নহে । সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রত্যাশা করিলে ইহার উচ্চ ক্রমের ব্যবহার করিয়া দেখার আবশ্যক ।

ক্লিমিরোপ বা ওয়ান্‌স্‌—ক্লিমি রোগে বিবমিষা, বমন এবং বিশেষ প্রকারের উদর শূল (যাহাতে বোধ হয় যেন অন্ন চক্রের স্থায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে) থাকিলে স্ত্রাবাডিলা উপকারী ।

হাম বা মিজল্‌স্‌—হামের সন্ধি উপসর্গে প্রচণ্ড হাঁচি ও ললাট প্রদেশে শিরঃশূল বর্তমান থাকিলে স্ত্রাবাডিলা প্রযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । কোন কোন দেশব্যাপক হামরোগে ইহার উপযোগী বহুতর রোগী প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

৩। ভিরেট্রাম্ ভিরিডি (Veratrum Viride) ।

উপচয়—উখান করিলে ; ভ্রমণকালে ; সন্ধ্যাকালে ; শরীর চালনায় ।

উপশম—উষ্ণ এবং উগ্র কাফি পানে ।

ভুলমীহ্ন ঔষধ—একন, এন্টি টার্ট, বেল, ককুলাস, ডিজিট, ফেরাস্, জেল্‌স্, হেলিবো, হায়সা, ফস্, টেবেক, ভিরেট এ ।

সাধারণ ক্রিয়া—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ তাহার নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ু-কেন্দ্রাংশ, এবং প্রক্ষিপ্তক্রিয়াসাপেক্ষ গতিদ স্নায়ু-কেন্দ্র বা রিফ্লেক্স-মোটর নার্ভ-সেন্টার ভিরেট্রাম্ ভিরিডি দ্বারা আক্রান্ত হয় । ইহা ঐ সকল স্নায়ু-কেন্দ্র এবং সমগ্র শোণিতসঞ্চালন-যন্ত্রমণ্ডলের প্রভূত পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা উৎপন্ন করিলে মস্তিষ্ক এবং অস্ত্রান্ত যন্ত্রের, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুশাখাপরম্পরার কার্য্যাধীন যন্ত্রের এবং তন্মধ্যেও বিশেষরূপে আমাশয় ও ফুস্‌ফুসের প্রগাঢ় রক্তাধিক্য এবং

প্রদাহ জন্মিয়া থাকে । উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেলাডনা এবং তাহার সমক্রিয় অন্ত্রাণ ঔষধের রক্তাধিক্য হইতে ইহার রক্তাধিক্যের প্রভেদ এই যে বেলাডনাদির রক্তাধিক্য স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা এবং ভিরেট্রামের তাহা স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা ও তাহার ফলস্বরূপ শোণিতগতির বাধা এবং মছরতা উপস্থিত করে । গতিদ স্নায়ুর দুর্বলতা সাধন করিলেও ইহা প্রবল ও স্থায়ী (Tonic) এবং অধিকাংশ স্থলেই ক্ষণস্থায়ী ভাবের (clonic) অর্থাৎ তাণ্ডবরোগবৎ আক্ষেপ উৎপন্ন করিতে সক্ষম । ভিরেট্রাম ভিরিডির ক্রিম্বার প্রধান লক্ষ্য হৃদপিণ্ডের শোণিত সঞ্চালনে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; হৃদপিণ্ডের উচ্চ শঙ্কায়মান, সবল স্পন্দন, নাড়ীর সবল ত্বরিত গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের অতি ধীর সঞ্চার ইহার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য ।

লক্ষণ ।

মন :—কলহপ্রিয় এবং প্রলাপবিশিষ্ট । অতি ভয়বহ প্রলাপ বশতঃ রোগী চীৎকার করে, হাউ হাউ করে এবং প্রহাসন করে । রোগীর চক্ষুতরকা প্রসারিত থাকে এবং সে অস্পষ্ট বিড় বিড় খরে অবিশ্রান্ত প্রলাপ করে ।

মস্তক :—প্রাতে গাত্রোথানের পর শিরোঘূর্নন, চক্ষুমুদ্রিত করিলে এবং মস্তক স্থিরভাবে রাখিলে উপশম ; শয্যা অথবা আসন হইতে উত্থানের পর শিরোঘূর্নন প্রযুক্ত বিবমিষা ও বমন । শিরঃশুলের সহিত শিরোঘূর্নন । প্রাতঃকালে গ্রীবাংশচাং হইতে শিরঃশূল উদ্ভিত হয় এবং মস্তকের গুরুত্ব ও পূর্ণতার অনুভূতি জন্মে । মস্তকের প্রবল রক্তাধিক্য । ললাটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে চক্ষুর নিকটস্থ প্রদেশ পর্য্যন্ত শায়শূল । ললাটদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল নিবন্ধন বমন ।

স্নায়ু ।—মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং হস্ত ও পদাঙ্গুলির পেশীর আনর্জন এবং আকুঞ্চন । তাণ্ডরোগবৎ স্নায়বিক আক্ষেপ । শিশু ভীত হওয়ার স্মরণ কাঁপিতে থাকে এবং বোধ হয় যেন অচিরাৎ তাহার আক্ষেপ বা কন্ভালসন হইবে । পক্ষাঘাত হইলে অঙ্গাদিতে চনচনি এবং মস্তিষ্কে শোণিতগতির বৃদ্ধি । বিশেষতঃ মস্তিষ্কতলদেশ, মেরুমজ্জা, বক্ষ ও আমাশয়ে রক্তাধিক্য ।

মুখমণ্ডল ।—অবস্থানুসারে মুখ শোণিতোচ্ছাসযুক্ত, কখন পাণ্ডুর, শীতল, নীলাভ এবং শীতল ঘর্ষ্যাবৃত । মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপিক সূচিবোধবৎ বেদনা ।

শ্বাসপ্রশ্বাস ।—শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর, ধীর এবং শ্রমসাধ্য (নিউমোনিয়া রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস ৪২ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়) । আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস হইলে প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম । বক্ষের কষ্টানুভূতি । বক্ষে প্রবল রক্তাধিক্য ।

হৃৎপিণ্ড ও নার্ভী ।—হৃৎপ্রদেশে অবিশ্রান্ত, মুহু ও জালাযুক্ত বেদনা । হৃৎপিণ্ডস্পন্দন উচ্চতর শব্দবিশিষ্ট এবং প্রবল ; ধমনী মণ্ডলের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা ।

স্ট্রীজফনেনেড্রিস ।—শোণিতসম্পন্ন স্ট্রীলোকদিগের জরায়ুর অত্যধিক রক্তাধিক্য ও নৃত্তকৃচ্ছ হওয়ার পর ঋতুসংশ্রবীয় উদরশূল । ঋতুরোধ নিবন্ধন মস্তিষ্কের শোণিতাধিক্য ; শরীর শোণিতসঞ্চয় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—জিহ্বার ঠিক মধ্যস্থল বাহিয়া লম্বভাবে সূক্ষ্ম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্তমানতা ।

চিকিৎসা ।

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ ।—ডাং ইলিয়ট ভিরেট্রাম ভিরিডির নিয়ন্ত্রম মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহের পক্ষে

সর্কোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিক্য, দ্রুত নাড়ী এবং আক্ষেপের বা কন্ভালসনের উপক্রম হইলে পরে প্রভূত দুর্বলতা জন্মে।

ধনুষ্ঠঙ্কার বা টিটেনাস্—সর্কোয়ী ধনুষ্ঠঙ্কার রোগে **ভিরেট্রাম ভিরিডি** বিশেষ কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। অবস্থাবিশেষ রোগাক্রমণের উপক্রমলক্ষণের আরম্ভে প্রদত্ত হইলে রোগের বাধা জন্মাইয়া ইহা মহত্বপূর্ণ সাধন করে। অভিবাসিক রোগের ক্ষত স্থানে অসহনীয় যন্ত্রণাকর বেদনা হইলে ধনুষ্ঠঙ্কারের উপক্রমলক্ষণ দৃষ্ট হইতে পারে; এ অবস্থায় **ভিরেট্রামের** প্রয়োগে রোগাক্রমণ নিবারিত হয়। এস্থলে ইহা **হাইপেরিকাম্** সহ তুলনীয়। অত্যন্ত কঠিন ঔষধেরও অবস্থানুসারে উপরিউক্তরূপ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়—জ্বর, উৎকণ্ঠা, পেশীনিচয়ের আততভাব, চন্টনি এবং অসাড়তা থাকিলে **একনাইট**, এবং ক্ষতে পুয়স্কার হইলে অথবা হঠাৎ পুয়স্রাব রুদ্ধ হইলে **বেল**, **সিকুটা** এবং সম্ভবতঃ **এক্সট্রাক্ট** রোগের বাধা জন্মাইতে পারে।

সূতিকাক্ষেপ বা পিহ্লরপিহ্লেল কন্ভালসন ; —**ভিরেট্রাম ভিরিডি**র সূতিকাক্ষেপরোগে মস্তিষ্কের গভীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন রোগী সন্ন্যাসরোগবৎ অজ্ঞানাবস্থায় থাকে এবং তদবস্থাতেই তাহার আক্ষেপ হয়। আক্ষেপের বিরতিকালেও জ্ঞান হয় না, রোগী গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে। রোগীর মুখমণ্ডল আরক্ত ও চক্ষু রক্তপূর্ণ, এবং তাহার অঙ্গাদির প্রচণ্ড আক্ষেপিক সঙ্কোচন হয়।

সুন্ড্রি কাসি বা ত্রুপ ; **ত্রুকাইটিস্** বা **নলৌস** ; **নিউমোনিয়া** ;—এই সকল রোগের প্রথম বা রক্তাধিক্যের অবস্থায় **ভিরেট্রাম ভিরিডি** অনেক স্থলে রোগ অঙ্কুরে বিনাশ

করিতে সক্ষম। একনাইটের ছায়ই সবেল, রক্তসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা উপযোগী। অত্যধিক তীব্র শরীরতাপ, এবং পূর্ণ, কঠিন, লক্ষ্মান ও দ্রুত নাড়ী ইহার প্রদর্শক। শরীরতাপ ও নাড়ীর উপরিউক্ত অবস্থার প্রশমন হইলে ইহার কার্যকারিতার অভাব হয়। একনাইটের মৃত্যুভীতি, উৎকর্ষা এবং অস্থিরতা ইহাতে না থাকায় উভয়ের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ফেরাম ফস্ও এই সকল রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যাবস্থার ঔষধ। উৎকর্ষা প্রভৃতি না থাকায় এক হইতে, এবং স্ক্ল ও কোমল নাড়ীর বর্তমানতা এবং শরীরোপরি স্থানে স্থানে অলীক শোণিতপ্রাধাতের চিহ্নের উপস্থিতিতে উভয় হইতে ফেরাম ফস্ও প্রভেদিত হয়।

ভিরেট্রাম ভিরিডি নিউমোনিয়া রোগে বক্ষের অতি প্রবল রক্তাধিক্য জন্মে, এবং ধমনীমণ্ডলের অত্যধিক উত্তেজনা, শ্বাসকৃচ্ছ, বক্ষের কষ্ট এবং বিবমিষা ও বমন প্রভৃতি আশাশয়লক্ষণ উপস্থিত হয়। এরোগে বক্ষের প্রগাঢ় রক্তাধিক্যের বর্তমানতায় ইহা স্ফ্রুই-নেরিয়া সহ তুলনীয়; প্রভেদ এই যে, রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যের অবস্থা শেষ হওয়ার পর ফুসফুসের ঘনীভূততা বা তিপেটিজেশন উপস্থিত হইলে ভিরেট্রাম নিষ্ক্রিয় হয়, অপরের তাগাতে কার্য-কারিতার শেষ হয় না। ফলতঃ ভিরেট্রাম, স্ফ্রুইনে-রিয়ার ছায় টাইফয়েড আদি পরিবর্তনকর ঔষধ নহে। ইহার জ্বর অত্যন্ত প্রবল, হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অতি প্রচণ্ড এবং নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, লক্ষ্মান ও দ্রুত থাকে। জিহ্বোপরি ঠিক মধ্য বাহিয়া লম্বভাবের সূক্ষ্ম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্তমানতা ইহার অতি স্পষ্টতর প্রদর্শক। ইহার রোগের শেষাবস্থায় ফুসফুসের অধঃঅংশের বায়ুকোষনিচয় বৃদ্ধিবৃদ্ধ স্লেয়াপূর্ণ হইতে থাকে। ইহার নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ;

একনের নাড়ী কঠিনস্পর্শ ক্ষুদ্র, স্বরিত্বে গতিবিশিষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী স্পন্দনযুক্ত ও দ্রুত ।

হৃৎপিণ্ড বিকার—বিবৃদ্ধিসহ প্রসারণ বা হাইপার-ট্রফি উইথ ডাইলেটেমণ ; হৃৎপিণ্ড ও তদ্বেষ্ট প্রদাহ ।—
ভিরেট্রান্ ভিরিডি মস্তিষ্কের তলভাগ এবং মেরুমজ্জার উর্দ্ধাংশের শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করার নিউমোগ্যাট্রিক স্নায়ুর হৃৎপিণ্ডশাখা সংশ্রবে হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজনা হয় । পরে তাহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় উপবেশনের চেষ্টা করিলে মুচ্ছার ভাব, বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হৃৎপিণ্ড দৌর্বল্য জন্ম স্বাসকচ্ছ প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের প্রগাঢ় শক্তিহানির লক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় । শোণিত সঞ্চালনযন্ত্রমণ্ডলের প্রথমোক্ত উত্তেজনায় লক্ষণ বর্তমান থাকিলে হৃৎ-বিবৃদ্ধি ও সহকারী হৃৎপ্রসারণ রোগও উপযুক্ত সাবধানতা সহ অনেক কাল ব্যাপিষা ভিরেট্রান্ প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে । রক্তসঞ্চালনযন্ত্রের উপরিউক্ত রক্তাধিক্যাবস্থায় ইহা হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎবেষ্টের প্রদাহরোগেও ফলপ্রদ ।

লেকচার ৫৮ (LECTURE. LVIII.)

১। ব্যারাইটা কার্বনিকা। ২। ব্যারাইটা এসেটিকা। ৩। ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা।

১। ব্যারাইটা কার্বনিকাম্ (Baryta Carbonicum) ।

উপচরনঃ—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে; বেদনায়ুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে; আহাৰান্তে; রুগ্ন শরীরস্থান ধোত করিলে; প্রাতঃকালে; উপবেশনাবস্থায়।

উপশমনঃ—মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণকালে; দণ্ডায়মানাবস্থায়; শরীর-চালনায়।

সম্বন্ধঃ—ব্যারাইটা কার্বনিকার কাৰ্য্যপ্রতিষেধক—এটি টা, বেল, ক্যান্ফ, ডাক্কা, জিক্কা। স্থূল মাত্রার—সাল্ফেট অব সোডা অথবা ম্যাগ্নেসিয়া।

বাহার পূর্বে অথবা পরে প্রযোজ্য—সরি, সাল্ফ, টুবাৰু'।

অসম্মিলন—গণ্ডমালা ধাতুতে ক্যাঙ্কের পর।

ভুলনীর ঔষধঃ—এলুমি, বেল, ক্যাঙ্কে কা, ক্যাঙ্কে আই, কষ্টি, জেল্‌স্, আয়ডি, মার্ক, মার্ক-বিন-আয়, লাইক, ফস্, সিপি. সিলিক, সাল্ফ।

ক্রিয়াঃ—ব্যারাইটা কার্ব একটি প্রভূত পোষণবিভাটকারী বস্তু। দেহোপাদানের, বিশেষতঃ গলদেশের বহিরাভ্যন্তরগ্রন্থির উপাদানের পোষণের বিশৃংখলা জন্মাইয়া ইহা তাহার বিশেষ প্রকারের পোষণাপকৃষ্টতা উৎপন্ন করে। বৃহৎ মস্তিষ্কের (cerebrum) ও গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের

ইহা প্রথমে উত্তেজনা এবং পরে অবসাদ উপস্থিত করার রোগীর যে অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা মানসিক ও শারীরিক জড়ত্বের তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইহা জড়প্রায় অতি বুদ্ধিগের এবং গণ্ডমালাধাতুর জড়ভাবাপন্ন শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ।

মন *f*—বিস্মৃতিশীল; এখনই কি করিয়াছে তাহা স্মরণ থাকে না। অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক দৌরল্য; শিশুস্বভাব বুদ্ধিব্যক্তি। স্মরণ-শক্তির হ্রাস; শিশু কিছু স্মরণ রাখিতে বা শিক্ষা করিতে পারে না। আত্মবিশ্বাসহীনতা। অপরিচিত লোক দেখিলে ভীতি, জ্বীলোকেরা মনে করে তাহাদিগের দোষ ধরিতেছে ও তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করিতেছে। শিশুর খেলায় মন যায় না। ভীতি এবং কাপুরুবতা।

মস্তক *f*—শিশুস্বভাব বুদ্ধিগের সন্ন্যাস ও শিরোধূর্ন। গোল-মাল শব্দে, বিশেষতঃ মানুষের কথায় সন্ধ্যাকালীন শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

জাগ্রৎ হইলে মূর্ছাদেশে ও মস্তিষ্কে মস্তকপশ্চাৎ অভিমুখীন চাপ ও গ্রীবাকাঠিষ্ঠ। মূর্ছাদেশে চাপের সহিত খোঁচা লাগার ত্রায়-বেদনা সূর্যাতাপে দাঁড়াইলে সম্পূর্ণ মস্তক ভেদ করিয়া বিস্তৃত। মস্তক-নীর্ঘে টাক। মস্তকের শায়িতপার্শ্বের ত্বকের স্পর্শসমিচ্ছতা চুলকাইলে বর্ধিত। শুষ্ক বা আর্দ্র ছালযুক্ত হেপ্‌পীডকা। মস্তকত্বকে কোষগর্ভ অর্কুদ।

ইন্দ্রিয়ভজ্ঞান *f*—আহারান্তে ও প্রাতঃকালে দৃষ্টিদৌর্ভল্য এবং চক্ষুসম্মুখে জালদৃষ্টি। সন্ধ্যাকালে কর্ণে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ ও ঘণ্টাধ্বনিবৎ এবং গুণ গুণ ও রুণ রুণ শব্দ। শ্রবণশক্তির হ্রাস। হাঁচিলে, গলাধঃকরণ-

ক্রিয়ায় এবং দ্রুত ভ্রমণে কর্ণমধ্যে কিছু বিদীর্ণ হওয়ার ভ্রায় কর্ণ শব্দ । সবণে নাসিকা ঝাড়িলে কর্ণে শব্দের প্রতিধ্বনি ।

শ্নায়ুঃ—শ্নায়বিক অসহিষ্ণুতা, সম্পূর্ণ শ্নায়ুরই উত্তেজনা । দিবসে শরীরের ঝাঁকি ও চমক । অত্যন্ত বলক্ষয় ; রোগী দাঁড়াইতে পারে না, হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে ; ক্লান্ত বোধ করায় সর্বদাই শয়নের ইচ্ছা । সম্পূর্ণ শরীরের গুরুত্ব, শরীরোপরি ত্বক কঠিনরূপে আটা থাকার অল্পভূতি ও তাহার আততভাব ।

মুখমণ্ডলঃ—মুখ পাড়ুর ও স্ফীত । মুখোপরি মাকড়সার জাল বিস্তৃত থাকার ভ্রায় তাহার আততভাব । মুখ বন্ধ করিতে চুয়ালের সন্ধিতে বেদনা ।

চক্ষুঃ—চক্ষুর প্রদাহ ও শুষ্ক বোধ । আলোকে চক্ষু বাল-সিয়া যায় ও বেদনা করে এবং অন্ধকারে চক্ষুসম্মুখে অগ্নিস্কৃৎসিঙ্গ দৃষ্ট হয় ।

কর্ণঃ—দক্ষিণ কর্ণাধঃদেশের গ্রাহি স্ফীত ও বেদনায়ুক্ত । কর্ণে আকৃষ্ট ও বিদ্ধবৎ বেদনা । দক্ষিণ কর্ণাস্থিতে বিদ্ধ ও আকর্ষণ করিয়া ছিন্ন করার ভ্রায় বেদনা ; কর্ণে চুলকনা ।

নাসিকাঃ—নাসিকার অদমা গুরুতা ; ঘন ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মার আব । স্থূলোদর শিশুদিগের সন্ধিতে নাসিকা ও উর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত । নাসিকা হইতে বারম্বার রক্তস্রাব ।

শ্বাসযন্ত্রঃ—অল্পভূত হয় যেন স্বরযন্ত্রে ধূম অথবা আণকাতরার শ্বাস গৃহীত হইতেছে । দুস্ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে বৃদ্ধদিগের শ্বাসরোধকর সর্দি । কাসিলে বক্ষের টাটানি ।

মুখগহ্বরঃ—বিদীর্ণ ও ক্ষতযুক্ত জিহ্বায় চন্চনি ও জালাযুক্ত বেদনা । বৃদ্ধদিগের জিহ্বার পক্ষাঘাত ; কথা কহিতে পারে না । মুখগহ্বরের রসবিষপূর্ণ, তালু ও গণ্ডাভ্যন্তরে তাহার আধিক্য । মুখে অনেক

কঠিন শ্লেষ্মা। মুখ শুষ্ক; অতিশয় তৃষ্ণা; জিহ্বা লেপযুক্ত হইলে মুখের বিশ্বাদ অথবা অম্লাস্বাদ। দস্তমাড়ি হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব।

গলাভ্যন্তর ১—কোন বস্তু গলাধঃ করিতে গলাভ্যন্তরে চনচন করে, শূণ্য গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার অধিকতর চনচনি। টনসিলগ্রন্থির পুরাতন দড়কচড়াভাব; শৈত্যসংস্পর্শ হইলেই তাহার প্রদাহ জন্মে এবং তাহা পাকিবার উপক্রম হয়। গলার সঙ্কোচন; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বোধ যেন গলাভ্যন্তরে একটা ছিপি আছে। আহা-রাস্তে, উপবেশনাবস্থায় এবং লিখিবার সময় মধ্যে মধ্যে স্বাঃরোধ ঘটায় বোধ হয় যেন থাইরইড্ গ্রন্থি অভ্যন্তর পার্শ্বে চাপিত হওয়ার স্বাঃ-প্রস্থাসের রোধ হইতেছে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে বোধ যেন পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের সম্মুখে একটা অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লি রহিয়াছে। হনুঅধঃ বা সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থির বেদনায়ুক্ত দড়কচড়াভাবের স্ফীতি।

উদর ১—উদর স্ফীত, কঠিনস্পর্শ এবং বেদনায়ুক্ত। শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অল্প পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে।

গ্রীবা ও পুষ্ঠ ১—গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাতের গ্রন্থি স্ফীত। গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। কটিদেশে বিস্তৃতভাবে বেদনা।

হৃক ১—গ্রীবাদেশে বদাময় অর্কুদ (ফ্যাটা টিউমার)। হৃকের স্থানে স্থানে জালাযুক্ত বেঁধার ত্রায় অনুভূতি। গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব। হৃক অর্দ্র ও ক্ষতযুক্ত; চক্ষুকীল বা ওয়াট্।

প্রদর্শক লক্ষণ।—শরীরের আকার বা গঠন এবং মানসিক লক্ষণের বিশেষতা।—ব্যারাইটা কার্বি গণ্ডমালাধাতু সংশোধনকারী প্রধান ঔষধ মধ্যে অগ্রতম। শিশুরোগে ইহা ক্যাঙ্কেরিরা কার্বি ও সিলিসিয়া সহ তুলনার যোগ্য। কেননা শারীরাকৃতি ও মানসিক লক্ষণ বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ব্যারা কার্বের শারীরিক ও মানসিক পরিপকতার বিশেষতাম্বন্ধীয় জ্ঞান

জন্মিলেই রোগচিকিৎসায় আমরা অনায়াসে ইহার যথোপযুক্ত স্থান নিরূপণে সমর্থ হইতে পারি ।

ব্যারাইটা কার্ব—গণ্ডমালাধাতুর খর্সাকৃতি শিশু, যাহা-দিগকে শরীরায়তনের শীঘ্র বৃদ্ধি হয় না ; স্থূলোদর ও বৃহৎ মস্তক ; শীর্ণশরীর ; স্ফীত মুখমণ্ডল ; পদে ঘর্ষ ; গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়-কচড়াভাব ; অভ্যস্ত দুর্বলতা ; মানসিক জড়তা ; কিছুই স্মরণ থাকে না ; শিশুস্থলভ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তিহীন ; বিদগ্ধে কথা কহিতে শিখে ।

ক্যাক্সেরিয়া কার্ব—স্থূল ও স্ফীত শরীরবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর শিশু ; শরীরায়তনের স্থূলত্বের দ্রুত বৃদ্ধি ; গামলার পিঠের ত্রায় মুঞ্জ ও স্থূল উদর ; বৃহৎ মস্তক ; ব্রঙ্করক্কের অসম্পূর্ণতা ; মস্তক ও গ্রীবায় অল্প মন্ম ; পদ আর্দ্র ও শীতল । মানসিক প্রকৃতিতে ভীক, আলম্ভপরবশ ও জড়বুদ্ধি । ক্রোড়বিষয়ে উদাসীনতা ।

সিলিসিয়া—গণ্ডমালা ধাতুর ক্ষুদ্র ও শুকশরীর শিশু ; বৃহৎ মস্তক ; বিশেষতঃ সম্মুখমস্তকরক্ক অসম্পূর্ণ ; স্থূল ও গোলাকার উদর ; বৃহৎ ও কদাকার জাগু ; হাঁটা শিথিতে বিলম্ব হয় ; ক্যাকে হইতে মস্তক ও মস্তকত্বকের নিম্নতর অংশ, গ্রীবা ও মুখ দুর্গন্ধ ঘর্ষাবৃত ও শীতল, তাহা বস্ত্রান্নত করিলে সহজেই উষ্ণ হয় ; পদ দুর্গন্ধঘর্ষযুক্ত । গ্রন্থি বিবুদ্ধ ও পৃষযুক্ত ।

মানসিক অসহিষ্ণুতা ; একগুঁয়ে, খামখেয়ালি ; ভাল কথা বলিলেও চীৎকার করে ; চঞ্চল, অস্থির, সহজেই চমকিয়া উঠে ; লেখাপড়ায় সহজে ক্লাস্তি জন্মে, চিন্তা করা সহ্য করিতে পারে না ।

বৃদ্ধগণ মানসিক ও শারীরিক জড়তাবশতঃ শিশুবৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে শিশুর ত্রায় আচরণ করে ; বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিহীন ; মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ দুর্বলতা ; টলিতে টলিতে চলে । বৃদ্ধের রোগে এই লক্ষণ ব্যারাইটার প্রদর্শক ।

সামান্য সিক্ত ও শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন সর্দি হইলেই পুরাতন টন্সিলবিবুদ্ধির স্ফীতি অধিকতর হওয়া ব্যারাইটা কার্করোগ চিকিৎসায় তাহার প্রদর্শক ।

চিকিৎসা ।

মানসিক বিকার—জড়তা ;—যবা ও বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের অকালে বুদ্ধিহানি বা শিশুভাব জন্মিলে ব্যারাইটা কার্ক উপকারী ঔষধ । মস্তিষ্কপদার্থের ঘনীভূত অবস্থা ইহার কারণ । মস্তিষ্কে অর্কুদ জন্মিলেও এবিধ অবস্থা ঘটিতে পারে । স্নায়ুমাত্রই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে । মস্তিষ্কের চর্কলতা বশতঃ রোগী অত্যন্ত ভীক্ৰ স্ভাব হয় । অচেনা লোক বা মুখ দেখিলে স্থান পরিত্যাগ করে । সে মনে করে তাহাকে দেখিয়া লোক হাসিতেছে । সহজেই রাগ করে । ডাঃ ট্যালকট বলেন “রোগী মনে করে তাহার জজ্বা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং সে হাঁটুর উপর চাটিতেছে” ; ব্যারাইটা রোগীতে এইরূপ লক্ষণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন ।

শিরঃশূল ;—বৃদ্ধদিগের শিরঃশূলরোগে ব্যারাইটা কার্ক উপকারী । নিদ্রাভঙ্গ, আহারান্তে এবং অগ্নির তাপে ইহা জন্মে । বর্ধিত হয় । রোগী প্রায় হতজ্ঞান থাকে । ব্যারাইটাধাতুর বৃদ্ধদিগের শিরঃশূল ও হতজ্ঞানভাব সন্ন্যাসরোগের পূর্বলক্ষণও হইতে পারে ।

সন্ন্যাসরোগ বা এন্সেফলিস ;—ব্যারাইটা কার্ক মণ্ডপায়ীদিগের সন্ন্যাস রোগের অল্পতম ঔষধ ।

মাণ্টিপল স্ক্লুরোসিস্ অব ব্রেণ এণ্ড স্পাইন্যাল কর্ড বা মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার গুচ্ছাকার ঘনীভূততা সংযুক্ত স্থূলতা ।—ব্যারাইটা মিউরিয়োটিকা এবং কার্ক-নিকা উভয় ঔষধই এরোগে ব্যবহৃত হইতে পারে । দুইপোষ্য

শিশু ও বালকদিগের মধ্যে এরোগ তাদৃশ বিরল নহে। ইহা তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব ও তদানুযায়িক পূর্ববর্ণিত অত্যাশ্রয় লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত হয়। বুদ্ধদিগেরও এবস্থিধ রোগে উপরি উক্ত শিশুরোগবৎ লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগে যে শরীরকম্প জন্মে তাহাতে হান্সসান্সামাস্ স্মরণ পথে আইসে।

শিশুমস্তিস্কের অভ্যন্তরীণ ক্রমোৎকর্ষ-হীনতা এবং তাহার কল স্বরূপ বুদ্ধির জড়ত্বাদি লক্ষণ থাকিলেও ব্যারাইটা তাহার উপকার করিতে পারে। এস্থলে ইহা কপ্তিকাম্ সহ তুলনীয়।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ :- অবস্থাবিশেষে শিশু কিম্বা বৃদ্ধ উভয়েরই পক্ষাঘাতরোগে ব্যারাইটা কার্বন প্রয়োগ হইতে পারে। জড়ভাবাপন্ন শিশু দেখিতে অতি নির্যাস বহিরা প্রতীয়মান হয়। জিহ্বাদির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত মুখবাদান থাকে এবং বক্ষ ও উদর বাহিরা অবিরত মুখলালা করে। শিশুর মুখ ভাবহীন। কখন কখন শরীরের কম্প হয় এবং আনরা একাধিক রোগীর সর্কাজীন আক্ষেপ হইতে দেখিয়াছি। বৃদ্ধদিগের মস্তিস্কের ক্ষয় ও সঙ্কোচন হওয়ায় তাহারা প্রায় শিশুপ্রকৃতি পায় এবং তাহাদিগের উপরি উক্ত বুদ্ধিহানি ও জিহ্বাদির পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃদ্ধদিগের রক্তবহা নাড়ীর উপাদানগত বিকার বশতঃ পক্ষাঘাত রোগেও ইহা উপকারী। ইহাদিগের উপরি উক্ত ধমনীরোগ প্রমনীপ্রসার বা এনুরিজেন্সে পরিণত হইলেও ইহা প্রযোজ্য।

দৃষ্টিমানিন্দ্র বা এম্প্লিয়া সাইক্সা :- মস্তিস্কের পূর্বকথিত বিকার বশতঃ বৃদ্ধদিগের রোগে ব্যারাইটা ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌশ :- বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাতিক অবস্থায় বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে ; কিন্তু রোগী তাহা উঠাইতে না পারায় শয়ন করিলে মৃত্যুকালোপযোগী শ্বাসকৃচ্ছ

উপস্থিত হয়। ইহাতে **এন্টি টার্ট** প্রয়োগে সম্পূর্ণ ফল না পাইলে **ব্যাৱা কা** তাহার কার্যসম্পূরকরূপে ফলপ্রদ।

টনসিলাইটিস্ বা **টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ**—**ব্যাৱাইটা কার্ব** ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহপ্রবণতা থাকিলে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইলে **ব্যাৱাইটা** দ্বারা শিশুর ধাতু সংশোধিত ও উপস্থিত রোগ আরোগ্য হয়। এই সকল শিশুর মস্তকে শুষ্ক মামড়ি জন্মে। **ব্যাৱা কার্ব** ও **মিউ কনেক্টিভ** বা **যোজকোপাদানের** প্রজনন ক্রিয়া বৃদ্ধি করে; এছাড়া সৌত্রিকোপাদানের উপদাহ এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বশতঃ **টনসিলাইটিস্** ও **অন্তঃ গ্রন্থির** ক্ষতি ও **দড়কচড়া** ভাব জন্মিলে তাহার নিবারণ ও দূরীকরণ দ্বারা ইহা রোগ আরোগ্য করে। সামান্য সিক্ত বায়ু সংস্পর্শ হইলেই এবং ঠাণ্ডা দিনে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। সহজেই টনসিলে পুথ জন্মে। হৃৎস্রবঃ ও কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থি ক্ষীণ হয়। **বেলের** স্থায় গলার দক্ষিণপার্শ্বে ইহার আক্রমণ অধিকতর এবং শূণ্ণ গলাধঃ-করণক্রিয়ায় বহুপ্রণা বৃদ্ধি পায়। ডাং ফ্যারিংটন ইহাতে সুরাসার ও জল মিশ্রিত ‘খোবন’ ব্যবহার করিতে বলেন। এই রোগ সহ **নাসিকাপশ্চাতের** সর্দি ও তথায় ও উপজিহ্বামূলে মামড়ি জন্মিলে এবং উদ্ধৌষ্ঠ ও নাসিকা ক্ষীণ হইলে ইহা উপকারী।

ডাং গুড্‌নে এ রোগে **ব্যাৱা আক্স**র প্রশংসা করেন। রোগ পুরাতন হইলে ডাং টাকারের মতে **কক্কুলাস্** **ভেসিকুলোসাস** উপযোগী হয়।

ক্যাল্‌কে কা—স্থূলকার, শ্লেষ্মিক ধাতুর শিশুর রোগে।

ক্যাল্‌কে ফস—পুরাতন রোগ; অস্থিবিকার থাকে।

ইঞ্জেলিসিয়া—অত্যন্ত বৃহৎ টনসিলোপরি অগভীর, প্রশস্ত ক্ষত থাকিলে।

হিঙ্গার—গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; শ্রবণকষ্ট ; গলদেশে মাছের কাঁটা ফুটিয়া থাকার অসুভূতি ।

লাইক—বৃহৎ টনসিলোপরি দড়কচড়াভাবেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত ।

ক্যাল্কে আই—কোন কোন গ্রন্থিবিবৃদ্ধিরোগে ব্যারাইটাই-
টার—তুলা লক্ষণে, বিশেষতঃ স্ফীত টনসিলাভাস্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটরবৎ গহ্বর থাকিলে ।

কোম্বারাম্—বিবৃদ্ধ টনসিল পূয়জননপ্রবণ না হইলে ।

গণ্ডমালারোগ বা ক্ষুফুলা :- গণ্ডমালারোগের অত্যাশ্রিত
ঔষধ হইতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা ব্যারাইটা রোগ প্রভেদিত
করা যায় :- শরীরের শীর্ণতা, উদরের স্থূলতা ; অতিক্রমা এবং শরীরের
শুকতা ; মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা ; ত্বকে দুস্গন্ধি, সিক্ত ক্ষত
এবং অগ্ন প্রকারের উদ্বেদ ; শরীরের স্থানে স্থানে ও গ্রন্থিতে প্রস্তুরবৎ
কঠিন স্ফীতির বর্ধমানতা ।

গ্রন্থিরোগ বা প্ল্যাগুলায় অ্যাক্ফেসন :- ব্যারা
মিউ ও ব্যারা আয়ডির শেষক নাড়ীতে (Absorbent
Vessels) বিশেষ ক্রিয়া হয় । ব্যারা মিউ গ্রন্থির প্রস্তুরবৎ কাঠিন্য
দূরীকরণে সমর্থ । সাল্ফার প্রকৃতিবিশিষ্ট গণ্ডমালারোগীর কুচকি,
কক্ষ; চোয়ালাধঃ এবং স্বগধঃ দেশ প্রভৃতির গ্রন্থিস্ফীতি ইত্যাদি রোগ
সাল্ফার আরোগ্য করিয়া থাকে ।

অম্লবেষ্ট ঝিল্লির বা মিসেণ্টারিক গ্রন্থিরোগ
প্রসুক্ক ক্ষয় বা টেব্‌স মেসেণ্টারিকা :- অম্লবেষ্ট ঝিল্লির
গ্রন্থির গণ্ডমালারোগ নিবন্ধন শিশুক্সয়রোগে ব্যারাইটা ফলপ্রদ ।
শিশুর ভুক্ত বস্তু অন্ননালীপথে নামিয়া যাইবার সময় ক্ষত থাকার হ্রায়
বেদনা হয় । আহাৰান্তে আমাশয়ে অবিশ্রান্ত বেদনা হইতে থাকে । কখন

কখন অজীর্ণ ভুক্ত-বস্তুপূর্ণ মলত্যাগ হয়। উদর স্ফীত ও কঠিন এবং পদ সিন্ধিসিন্ধার গায় ঘর্ম্মযুক্ত থাকে।

আম্বাডিন—ব্যারাইটার গায় ইহাও জড়ভাবের রোগীর পক্ষে উপযোগী। গাত্রবর্ণাদিবিসয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। **আম্বাডিন** রোগীর ত্বক ঈষৎ পীতভ এবং কেশ ও চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ; রোগীর ভয়ানক ক্ষুধা হয়, যে পর্য্যন্ত না খায় থিট্‌থিট ও ক্রন্দন করে এবং যতই আহার করুক, কিছুকালের জন্ম মাত্র তৃপ্ত থাকে; আহার গায় লাগে না। রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। “অসহনীয় থিট্‌থিটে স্বভাব” এরোগে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

শিশুক্ষরোপ বা **ম্যারেস্‌নাস্** ;—খর্ব্বাকৃতি, জড়-প্রায় অলস এবং ঢর্কল অরণশক্তিবিশিষ্ট শিশু। ইহাদিগের গ্রীবাগ্রস্থি স্ফীত, উদর বড় ও গোলাকার এবং শারীরিক ও মানসিক ঢর্কলতা থাকে। এই সকল **ব্যারাইটা** রোগী সর্বদা খাই খাই করে; মিষ্ট বস্তু কিম্বা ফল ভালবাসে না এবং সামান্য আহারে তৃপ্ত হয়।

আর্ভিমিসিন্ধা এনটেনাম—রোগী অনেক খায় অনেক মলত্যাগ করে; আমাশয় ও উদর বেদনা করে এবং উদর স্ফীত থাকে।

ত্বকুরোগ—পামা বা **একজিমা**; **দক্ষ** বা **হার্পািজ**—
হস্তপৃষ্ঠে **ব্যারাইটার** পামারোগ জন্মিলে তাহার ত্বক কর্কশ, শুষ্ক ও বিদারণবিশিষ্ট হয়। ইহা অবস্থা বিশেষে দক্ষরোগ আরোগ্য করে।

২। ব্যারাইটা এসেটিকা (Baryta Acetica)।

সাম্ভারণ শিষ্ণা ;—স্থূলতঃ ব্যারাইটা কার্ক হইতে ব্যারাইটা এসেটিকার জিয়ার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তথাপি শেযোক্ত ঔষধসহ এসেটিক এসিড থাকায় যে সামান্য কিঞ্চিং প্রভেদ ঘটে ঔষধ নির্দ্বাচন করিতে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

চিকিৎসা ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেন্জিফিয়া ;—দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতের স্নায়ুশূলরোগে ব্যারাইটা এসেই প্রশংসা লাভ করিয়াছে ।

৩ । ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (Baryta Muriatica) ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকার ক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যারাইটা কার্বের তুল্য ।

চিকিৎসা ।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস্ অরিফ্রাম্ ;—কর্ণে ছম্ছম্, গুণ-গুণ প্রভৃতি শব্দ হইলে ব্যারাইটা মিউ নিবারণ করিতে পারে । রোগী ব্যারাইটাইটার গণ্ডমালক্ষণযুক্ত থাকে । চর্কণ করিতে ও গলাধঃকরণকার্যে কর্ণে শব্দ হয় ।

টন্সিল গ্রন্থির পুরাতন বিরুদ্ধি বা ক্রনিক হাইপারট্রফি অক্ষয়ি টন্সিল এবং তৎসম্মিত হস্তের পক্ষাঘাত ;—ব্যারাইটা কার্বের দ্বায়ই ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা টন্সিল গ্রন্থির পুরাতন বিরুদ্ধি-রোগে ফলপ্রদ । ফ্যারিংগ্ ও যুগ্ঠেকিয়ান টিউবের পক্ষাঘাতরোগে গলাধঃকরণক্রিয়ায় অথবা হাঁচিতে যদি 'ক্লক্' 'ক্লক্' শব্দ হয় তাহাতে ইহা উপকারী । ইহাতে বেগে মধ্যকর্ণে বায়ু প্রবেশ করে ।

এনুরিজম বা রক্তনাড়ীর স্ফীতি ;—কতিপয় এনুরিজম রোগ আরোগ্য কয়্য ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে ।

লেখক্চার ৫৯ (LECTURE LIX.)

১। ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা। ২। ক্যাল্কেরিয়া এসেটিকা। ৩। ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুরিকা। ৪। ক্যাল্কেরিয়া আয়ডেটা। ৫। ক্যাল্কেরিয়া হাইপফস্ফরিকা। ৬। ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফুরিকা।

১। ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা (Calcareo Phosphorica)।

উপচয় :—প্রাতঃকালে; সন্ধ্যাকালে; শরীরচালনায়; প্রদোষাদির কৃত্রিম আলোকে; শৈতে; আহারান্তে; রমাণ ফলাহারে; বায়ুর পরিবর্তনে অথবা বর্ষণ-সিক্ত হইলে।

উপশমন :—শয়নে।

সম্বন্ধ :—কার্যাপূরক—কটোর। যাহার পূর্বে প্রযোজ্য—আয়, সরি, শ্রানিকু, সাল্ফার। যাহার পরে প্রযোজ্য—আর্স, আয়, ট্রাবাকু।

ভুলনীর ঔষধ :—ব্যারা কা, বার্কেরিস, ক্যাল্কে কা, ফ্লুর এসি, আয়, নাই এসি, ফস, কটা, সিলিক, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া :—জীবনরীর গঠন সংস্থষ্ট যন্ত্রমণ্ডলে ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকার একমাত্র ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহাকে “টিউ রেমিডি” বা শরীরযন্ত্রের গঠনবিকার সংশোধনকারী ঔষধ বলা যায়; কেননা ইহা শরীরোপাদাননিচয়ের, বিশেষতঃ আস্থ ও গ্রন্থিমণ্ডলের অসম্যক পরিপোষণ প্রযুক্ত ও অসম্পূর্ণ কোষিক স্ফূরণ ক্ষয় এবং ধ্বংস নিবারণে সক্ষম হইয়া থাকে। শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলের পক্ষেই ইহা উপযোগী। পুষ্টিহীন, পাতলা এবং শীর্ণকায় শিশুর উদর বসিয়া যায় ও শিথিল

হইয়া পড়ে এবং সে গ্রন্থি ও অস্থিরোগপ্রবণ হয়। মস্তক বৃহত্তর হয় এবং মস্তকের উভয় রক্ত, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের অস্থায়ী রক্ত, অসম্পূরিত থাকে। মস্তকাস্থিনিচয় অস্বাভাবিক পাতলা ও ভঙ্গপ্রবণ হয়। শিশু যথাকালে হাঁটিতে শিখে না; দুর্বলতা বশতঃ মেরুদণ্ড দেহবহনে অসমর্থ হয়; দুর্বল ও কৃশ গ্রীবা মস্তকধারণে অক্ষম থাকে। ফলতঃ শিশু কদাকার এবং খঞ্জর প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ ।

মন ১—শিশু ক্রোদী ও খিটখিটে। অমনোযোগী, চিন্তাসাধা কার্গো অক্ষম।

মস্তক ১—পশ্চাৎ মস্তকোর্দ্রে বরফ সংলগ্ন থাকার ছায় ও মস্তকোর্দ্রে কীট বিচরণবৎ অন্তর্ভুক্তি; মস্তক তপ্ত; কেশমূলের চন্‌চনি। মস্তকের অস্থায়ী রক্ত, বিলম্বে সম্পূরিত হয় অথবা সম্পূরিত রক্তের পুনরায় অসম্পূর্ণতা জন্মে। মস্তকের, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাতের অস্থি কোমল ও পাতলা থাকে এবং চাপিলে কাগজের ছায় করুক্‌ করে।

২—অদম্য নিদ্রাবেশে মুখবাদন করে। প্রাতঃকালে নিদ্রা-ভঙ্গ হয় না।

স্নায়ু ১—দুর্বলতা; অবসাদ; ক্লাস্তি; শিশু চলিতে শিখে না অথবা তাহাতে অক্ষম থাকে। হস্ত ও পদের কম্প। শিশু চিত্তভাবে শয়ন করিলে চমকিয়া উঠে, পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহা নিবারিত হয়। কেবল হৃদয় হৃদয় শরীরস্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে।

মুখপ্রমণ্ডল ১—মুখে, বিশেষতঃ উর্দ্ধ চুম্বালাস্থির দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থান বাহিয়া বেদনা; বেদনা অত্যাগ্ন স্থান হইতে মুখে আঠসে অথবা মুখ হইতে অগ্ন স্থানে যায়। উজ্জ্বলিত, কখন বা বেদনামুক্ত ও কঠিন থাকে এবং আলা করে।

চক্ষু ।—আলোকে, বিশেষতঃ বাতির এবং গ্যাসের আলোকে চক্ষু-বেদনা ।

কর্ণ ।—কর্ণে শোঁ শোঁ প্রভৃতি শব্দ । মধ্য ও বহিষ্কর্ণ ক্ষীত, লাল, টাটানি ও চুলকণাযুক্ত এবং তপ্ত । কর্ণ হইতে ক্ষতকর শ্রাব ।

নাসিকা ।—শীতল গৃহে সন্ধি করে ; উষ্ণ বায়ুতে ও গৃহের বাহিরে শুষ্ক হয় । অপরাহ্নকালে রক্তশ্রাব ।

মুখপহর ।—জিহ্বাগ্রে ক্ষত, জালা ও অবস্থানসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ্ঠা । শিরঃশূলে প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত থাকে ।

গলাভ্যন্তর ।—ক্ষতভাবে টাটানি ; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বৃদ্ধি ।

আমাশয় ।—অপরাহ্ন ৪টার সময়ে আহারের অভ্যাস না থাকিলেও অস্বাভাবিক ক্ষুধা ; শিশু সর্বদাই গুণ্ণপান করিতে চাহে । আহারের চেষ্টা করিলেই উদরে বেদনা । পূর্ণ ভোজনের পর বুকজালা ও অগ্নাৎ কষ্ট ।—উদগার উঠিলে আমাশয়োপরি জালা । আমাশয় স্থানে খালি খালি ও দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ । গলা পাঁকর দিয়া স্লেষ্মা উঠাইলে বমন । শিশুদিগের বমন করিতে কেহন কষ্ট হয় না । আমাশয়োপরি জালা ও মুখে জল ঠঠা । আমাশয়-প্রসারিত বোধ ।

উদর ।—নাভির চতুঃপার্শ্বে কনকনানিয়ুক্ত টাটানি, দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণে নিবৃত্তি । উদরে জালা । কর্তন ও চিমটি কাটার শ্রায় তীক্ষ্ণ উদরশূলের পর উদরাময় ।

মল ও মলছার ।—অতি দুর্গন্ধ উদরাময় । রসাল ফল ও আপেলের মণ্ডপানে ও বিরক্ত হইলে উদরাময় ; বিষ্ঠায় পুষ্পের ন্যায় স্তম্ভ ও বিন্দু বিন্দু পদার্থ অথবা ছিবড়া থাকে এবং অল্প পরিমাণ বিষ্ঠাসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হয় । মলছারের ক্ষতভাব তাহার বাহিরে

অধিক থাকে এবং তাহাতে সূচিবোধবৎ বেদনা, জালা ও দপ্পদপানি হয়। মলদ্বারে চুলকনা।

মূত্রশালিত্ব :—কোন বস্তু উত্তোলন করিলে এবং নাক ঝাড়িলে কিডনি-প্রদেশে ভয়ানক বেদনা। মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে দুর্বলতার অনুভূতি।

পুংজননেক্রিয়া :—গাড়ীতে ভ্রমণকালে কামেচ্ছাহীন লিঙ্গো-থান। মলদ্বার ও লিঙ্গমূল মধ্যস্থ প্রদেশ ভেদ করিয়া তীরবেধবৎ বেদনা লিঙ্গমধ্যে যায়। অণুকোষ ক্ষীত, অণুকোষবেষ্ট ত্বক ক্ষতযুক্ত থাকে ও তাহা চইতে রস নিঃসৃত হয়।

স্ত্রীজননেক্রিয়া :—জরায়ুপ্রদেশে দুর্বলতা ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি, মলমূত্রের নির্গমনকালে অধিকতর। কেশমুক্ত স্থানের উদ্ভাভিমুখে চাপ। কামোদ্দাপনার অনুভূতিবশতঃ বোধ যেন জননেক্রিয়াংশ-নিচয় রক্তপূর্ণ হইতেছে, তাহার সকল স্থানই দিপ দিপ করে এবং কামেচ্ছার বৃদ্ধি হয়। যুবতীদের অতি শীঘ্র উজ্জ্বল এবং লোহিত, বয়স্কাদের অতি বিলম্বে কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রথমে উজ্জ্বল লোহিত পরে কৃষ্ণবর্ণ ঋতুশ্রাব। লবণাক্ত বলিয়া শিশু স্তন্য দুগ্ধ পান করে না। অণুর শুভ্রাংশের ন্যায় শ্বেতপ্রদরের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। স্তন স্পর্শে বেদনায়ুক্ত।

শ্বাসশালিত্ব :—স্বরভঙ্গ। স্বর পরিষ্কার করিবার জগ্গ গলা খাঁকর দেওয়ার বা কাদিবার আবশ্যিকতা। অনৈচ্ছিক দীর্ঘশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাস অধিকতর দ্রুত, খর্ব্ব এবং কষ্টকর। বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ রজনী ১০টা পর্য্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ, শয়নে উপশমিত এবং উথানে বর্দ্ধিত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ :—সামান্য বায়ুসংস্পর্শেই গ্রীবার রসবাতিক বেদনা ও কাঠিন্য জন্মিলে মস্তকের জড়ভাব গ্রীবাতে খল্লীবৎ বেদনা, প্রথমে এক পার্শ্বে পরে অন্য পার্শ্বে হয়। পৃষ্ঠশূল ও জরায়ুর বেদনা।

কটির টাটানি নিবন্ধন বোধ যেন সন্ধির অস্থি স্থানভ্রষ্ট ও ভগ্ন । অসং-
ফলকাঙ্ক্ষির অধঃদেশে দপ্দপানি বা হঠাৎ আকৃষ্টতা ।

উল্কাঙ্ক্ষা ।—স্কন্ধ এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা । হস্তের নখের
চতুঃপার্শ্বে বেদনা প্রযুক্ত বোধ যেন ক্ষত হইয়াছে ।

নিম্নাঙ্ক্ষা ।—নিম্নাঙ্গে ঝিনঝিনি ধরে এবং রোগী অস্থির ও উৎ-
কর্থাযুক্ত হওয়ার তাহার চালনা করিতে বাধা হয় । ক্লান্ত, দুর্বল এবং
অস্থির পদের বিড়বিড়ি ও চন্‌চনি । ভ্রমণ করিতে জানুসন্ধির উল্কে
বেদনা । জজ্বাপশ্চাতে থল্লীবৎ বেদনা ।

অজ্ঞাসাধারণ ।—বর্ষণ জলে সিক্ত হইলে নিতম্ব এবং অঙ্গাদির
সর্বস্থানেরই চতুঃপার্শ্বে বেদনা ছুটিয়া বেড়ায় । অঙ্গাদির কনকনানি ও
ক্লান্তি ।

জ্বর ।—শরীরে বারম্বার কম্প বিচরণ করে । রজনীতে শরীরঃশ
বিশেষে প্রচুর ঘর্ম হয় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—শিশুদিগের বিশেষ প্রকারের শরীরাকৃতি
ও পোষণ-বিকার ইহার প্রধান প্রদর্শক । ক্যাঙ্কেরিয়া সহ ফস্ফরাসের
রাসায়নিক সংমিলনে এই ঔষধ গঠিত ; এজন্য ইহার রোগীতে উভয় ঔষধের-
মিশ্রিত ক্রিয়া প্রকাশিত হয় । শিশুতে ক্যাঙ্কে কার্কের পোষণবিকার
দৃষ্ট হইলেও তাহার নাম ইহাতে রোগী স্থূলকায় হয় না । রোগী ফস্ফরাসবৎ
একহারা গঠনের ও শীর্ণ থাকে ; উদ্ভর সান্নি-
ন্দার গহবর (খোলের) বৎ ও শিথিল হয় । অধি-
কাংশ সময়ে মস্তকশ্চাতের অথবা সম্মুখের অস্থায়ী
রন্ধু অসম্পূর্ণ থাকে বা সম্পূর্ণিত রন্ধু পুনরায়
মুক্তভাবে প্রারণ করে ; ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ক রোগী ডিমের ভক্ত
হয় ; ক্যাঙ্কে কস্ লবণ ও রক্ষিত মাংস খাইতে
চাহে ; ইহার শিশুরোগী উদরাময়প্রবণ হওয়ায় তাহার অধিকাংশ

রোগ সহ উদরাময় থাকে। ইহার সম্বন্ধবর্ণ, ক্লেন্ডযুক্ত ও উষ্ণ মলত্যাগ সহ পটি পটি শব্দে প্রচুর বায়ু নির্গমন হওয়া প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূলঃ—বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিরঃশূলে ক্যাল-কেরিয়া ফস্ উপযোগী। বালকদিগের বর্দ্ধমান শারীরিক অবস্থায় রক্তহীনতা জন্মিলে মস্তকশীর্ষে ইহার শিরঃশূল হয়।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিস্কোদকঃ—পাণ্ডুর অথবা ঈষৎ পীতাত্ত মুখাবয়ববিশিষ্ট শিশুদিগের মস্তিস্কোদকরোগে ক্যালক্কে ফস্ উপকারী। ইহাদিগের কর্ণ ও নাসিকাগের শীতলতা এবং সম্বন্ধবর্ণ, ক্লেন্ডযুক্ত ও পাতলা উদরাময় থাকে; শিশু সর্বদাই খাই খাই করে এবং আলু (Patato), শ্বেতসারময় খাদ্য ও লোনা মৎস ভক্ষণে ইচ্ছা প্রকাশ করে; শীঘ্র দস্তোদগম হয় না। তরুণ ও প্রবল মিনিঞ্জাইটিসরোগা-স্তিক মস্তিস্কোদকরোগের প্রথমাবস্থায় কন্ভাল্‌সন প্রভৃতি প্রবল লক্ষণের বর্তমানতায় বেবল প্রয়োগে রোগ নিবারিত না হইয়া উপরি লিখিত অবস্থায় নীত হইলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কলেরা প্রভৃতিতে জৈব-রসক্ষয়রোগের কারণ হইলে সিন্ধুনাভ প্রয়োগে রোগের শাস্তি না হইলেও ইহাই প্রায় একমাত্র জীবনরক্ষক বলিয়া বিবেচিত। কলেরা রোগান্তিক মস্তিস্কোদকরোগে জিঙ্কান্ ইহার তুল্য হইলেও তাহার পদের স্পষ্ট চঞ্চলতা (Fidgety motion) প্রভেদক থাকে।

দস্তরোগঃ—দস্ত যথাসময়ে পরিপুষ্ট হয় না ও বিলম্বে দস্তোদগম ঘটে। থম্‌থমে শরীর, শীর্ণ শিশু, বাহাদিগের মস্তকপশ্চাতের অস্থায়ী রন্ধু (Fontanelles) অসম্পূর্ণ থাকে এবং বিলম্বে হাঁটিতে শিখে ক্যালক্কে ফ স্ত্রীহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

ম্যাগ্নে কার্ব—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দস্তশূল । ডাং লিভেট্
এস্থলে সিপিহ্যাকে অব্যর্থ মনে করেন ।

টনসিলাইটিস্ :—গণ্ডমালাশিশুদিগের পুরাতন টনসিলাই-
টিসরোগে গ্রহি খস্‌খসে ও ফেকাসে হইলে এবং কোষগ্রহি বা ফলিকলের
পুরাতন প্রদাহ, ও বদ্বিতা থাকিলে ক্যাল্‌কে ফস্ অমোঘ
ঔষধ । ক্যাল্‌কেফ্লিহা আকৃতিতে গ্রহি ব্যারাইটার
ব্রায় কর্ঠিন, লোহিত বর্ণ এবং গিট পূর্ণ থাকে । লম্বিণের গ্রহি
লাল, ক্ষীত এবং কৈশিক ধমনীজালে আবৃত দেখা যায় । লাইকর
পুরাতন প্রদাহযুক্ত গ্রহির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয় । সেরাম
ফসের রক্তপূর্ণ বৃহত্তর গ্রহির ক্ষীতি দেখিতে ও স্পর্শে মস্‌ণ
থাকে ।

কলেরা বা ওলাউতা :—শরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখের
পাণ্ডুরতা এবং শুষ্ক ও লবণাক্ত মাংস (শূকরের) আঠারে প্রবল লালসা
প্রভৃতি থাকিলে শিশুকলেরারোগে ক্যাল্‌কে ফস্ প্রদর্শিত হয় ।
অতিরিক্ত শর্করা ভোজন প্রযুক্ত শিশুকলেরায় আর্জেন্টাই
প্রয়োজ্য । ক্যাল্‌কে কার্ব শিশুকলেরায় অণুভোজনে প্রবল
ইচ্ছা, বড় বড় চাপবাঁধা ছানার বমন এবং ঈষৎ সবুজ অজীর্ণ, জলবৎ
ও অন্নগন্ধের উদরাময় থাকে এবং রক্তনীতে বৃদ্ধি পায় ।

সেরাম ফস্—গ্রীষ্মকালীন উদরাময় বা কলেরারোগে
অজীর্ণ ভুক্তবস্ত্র মিশ্রিত মলত্যাগ হইলে শিশুদিগের পক্ষে ইহা অতি
উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ক্লরসিস্ বা স্নেহপাণ্ডুরোগ এবং রক্ত-
হীনতা :—অন্নবয়স্ক যুবতীদিগের এই রোগে ক্যাল্‌কে ফস্
বিশেষ উপযোগী ঔষধ । ইহা সাধারণতঃ “গ্রিগ সিকনেস্” নামে খ্যাত ।
যুবতীদিগের, বিশেষতঃ গৌরাদ্বীদিগের, বর্ণ শাদাটে, ওষ্ঠ ও

কর্ণ প্রায় শুদ্ধ থাকে এবং চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয় ; ইহাদিগের বিকৃত হাঁসি রুগ্নভাব প্রকাশ করে। মুখ কখন কখন দ্রব হরিদ্রাভ থাকে। শ্বতু অতি শীঘ্রাগত হয়। ক্যাল্কেরিয়া সল্ফিট মাত্রই রক্তহীনতার অতি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য।

গণ্ডমালাধাতুদোষযুক্ত রোগীর উদরের ক্ষীতি এবং শিরোগর্ধন থাকিলে, উপর তলায় উঠিতে জংকম্প হইলে, মাংসে ঘৃণা এবং অল্প ও গুরুপাক বস্তুতে লালসা জন্মিলে ক্যাল্কে ক্রী পদর্শিত হয়। এই প্রকার ধাতুদোষযুক্ত ক্লরিস্ রোগীর এলুমিনিয়া অল্পতর ঔষধ। স্তম্ভপানাভাবে অসম্যক পোষণ নিবন্ধন শিশুরোগেও এলুমিনিয়া উপযোগী। আমাশয়ান্তিক রোগ নিবন্ধন পুষ্টিহানি ও রক্তহীনতা জন্মিলে নাক্স ভ তাহার ঔষধ। অদমা ক্লরিস্ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্লাস্মাম কার্যা করিয়া থাকে। সর্ষিক ধাতুর যুবতীদিগের প্লেটপেনসিল, থাপরোল (পাংখোলা) ও চাখড়ি প্রভৃতি অপাচ্য বস্তু আহারের প্রবৃত্তিও এলুমিনিয়া দ্বারা নিবারিত হয়।

শিশুক্ষয়রোগ বা অ্যারেস্ মাস্ ;—শিশুক্ষয়রোগে ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফিট আমাদিগের প্রধানতম সহায়। পূর্ক বর্ণিত অসম্পূর্ণ ও বিকৃত গঠন, শীর্ণকায়, লোণ চক্ষু এবং বুদ্ধের গায় আক্যর বিশিষ্ট শিশুর টর্কল মেরুদণ্ড দেহভারবহনে অশক্ত হওয়ায় মস্তক ঝুলিয়া পড়ে এবং দেহ বক্রতা প্রাপ্ত হয়। শিশু অবিরতভাবে বমন করে, এবং সব্জ, ক্রেদময় এবং অপক্ক ভুক্ত বস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠা সহ প্রভৃত বায়ুনিঃসরণ হয়। গ্রন্থির বিরুদ্ধি ও টনসিলের ক্ষীতিযুক্ত শিশুর স্পষ্ট গণ্ডমালাদোষ থাকিলে ক্যাল্কে আই উপকারী।

রসবাত্ বা রিউম্যাটিজম্ ;—ক্যাল্কে ফস্ফাটু বিশিষ্ট পুষ্টিহীন শিশুর বয়সের বৃদ্ধির সহিত অস্থিবিকারলক্ষণ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। সামান্য আর্দ্রবায়ু সংস্পর্শই তাহাদিগের সর্কশরীরে

কনকনানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়। সামান্য শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হওয়ায় এমন কি শিশুকে কোলে লইতেও ক্রন্দন করিয়া উঠে। ঠাণ্ডা লাগিলেই শিশু শরীরে তাপ বোধ করে এবং অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি ও সন্ধি-নিচয়ের যুগ্ প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ক্যালকেকে ফস্ ইহার প্রধান ঔষধ। ইহাতে ফল না হইলে সিল্লিসিল্লিয়া প্রয়োগোপযুক্ত। অর্জ শৈতা সংস্পর্শে যদি স্ত্রীলোকদিগের সন্ধির বেদনা উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা উপকারী।

অস্থিরোগ :- অস্থির পোষণবিকার সংশোধনে ক্যালকেকে-রিল্লিয়া ফসকে অদ্বিতীয় ঔষধ বলিলেও অতুষ্টি দোষ ঘটে না। উপরি উক্ত বিকারগ্রস্ত অস্থি ভগ্ন হইলে তাহার সংযোগ হয় না। অস্থির পুষ্টিসাধন দ্বারা তাহার মিলনের সাহায্য করিতে ইহা অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহা স্কুলকায় শিশুদিগের অস্থি বিকার সংশোধনে সক্ষম।

সিন্ধ্রাইটাস্—অস্থির ভগ্নসীমায় অত্যন্ত স্বায়বিক উত্তেজনা থাকিলেই ইহা উপকারী।

সাল্ফার—অপ্তিবিকাররোগে শিশু খাট খাই করে, ভুক্তবস্তুর সমীকরণ হয় না বা তাহা “গায় লাগে না” ; শরীর শীর্ণ হইয়া যায় । -

২। ক্যালকেরিয়া এসেটিকা (Calcarea Acetica)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা :- ক্যালকেরিয়া ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শ্লেষ্মিকঝিল্লির, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের ও স্ত্রীজননেত্রি-য়ের শ্লেষ্মিক ঝিল্লির উপরে অলৌকিকর প্রদাহ উৎপন্ন করায় ক্যালকেরিয়া এসেটিকা চিকিৎসাজগতে সুপরিচিত হইয়াছে। কার্যক্ষেত্রেও সর্বাঙ্গিক বা মেমেনু-নাস্, ব্রঙ্কাইটিস্ এবং সর্বাঙ্গিক বাধক বেদনা বা রক্তঃকৃচ্ছ আরোগ্য করায় ইহা মুখ্যতঃ লাভ করিয়াছে।

৩। ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা (Calcareo Fluorica)

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকার সাধারণ ক্রিয়া এই যে ইহা শরীরস্থ স্থিতিস্থাপক তন্তুবিধানের শিথিলতা উৎপন্ন করিলে রক্তবহানাড়ীর বিস্তৃতি নিবন্ধন ভেত্রিকজ ভেইনস্ বা শিরা-প্রসারণ ও শোণিতভার্দ্রুদ প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় গ্রাস্তিবুদ্ধি ও অস্থির পুষ্টিহানি উৎপন্ন হওয়ার গ্রহির ক্ষীতি ও অস্থির, বিশেষতঃ দন্তের, ক্ষত এবং অস্থির অক্ষুদ উৎপন্ন হয়। উপদংশ ও পারদ ঘটিত অস্থিরোগের ইহা অচ্চতম মহৌষধ।

আস্থিকত—বস্তিকোটরাস্থি ক্ষত ও বস্তিকোটরের পূর্য শোধ ; নাসিকাস্থি ক্ষত ।—উপদংশ বা পারদের অপবাবহার নিবন্ধন বস্তিকোটরাস্থির ক্ষত হইয়া স্লেভিক এবসেস্ বা পূর্যশোথ জন্মিলে এবং নাসিকাস্থির ক্ষত ও ধ্বংস হইলে ক্যালকে স্ক্লু দ্বারা উপকার হয়। অস্থির কাঠিন্য, তাহাতে কৌকড়ানভাবের উচ্চতা এবং খেঁতলানবৎ বেদনা ইহার প্রদর্শক। অস্থির অক্ষুদ ইহা দ্বারা আবেগ্য হইয়া থাকে।

স্ট্রীজননেড্রিয় রোগ—নেনরেজিহা বা আর্ন্তবাধিক্য; জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ুপ্রংশ। —স্ট্রীজননেড্রিয়ের স্থিতিস্থাপক তন্তুবিধানের শিথিলতা বশতঃ জরায়ুর শোণিতবহা নাড়ীর প্রসারণ ও শিথিলতা জন্মিলে ঋতুর আধিক্য, জরায়ুর রক্তপ্রাব, এবং শোণিতভারাক্রান্ত জরায়ু প্লথবন্ধনী হওয়ার তাহার স্থানচ্যুতি ও স্মলন উৎপন্ন হইলে ক্যালকে স্ক্লু উপকার করিয়া থাকে; বস্তিঘঙ্গে ঠেল মারা ও টানিয়া নামানের ন্যায় বেদনা ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

পুষ্টিশূল ; **কটিবাত বা ল্যাঙ্সেপ** ।—ক্যালেক্‌সের পুষ্টির কনকনানি বেদনার মেরুদণ্ডের উত্তেজনার ভ্রম জন্মে। পুষ্টির অধোংশে বেদনা হইলে তাহাতে পূর্ণতা ও জ্বালাবোধ হয়। ইহার **কটিবাতে** শরীর চালনার প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি ও কিছু কাল চালনার পর তাহার হ্রাস হইয়া যায়। কটিতে টান লাগিয়া **বাত** জন্মিলেও ইহা উপকার করে। **ক্যালেক্‌সেরিয়া** ধাতুর বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক।

অর্কুদ ও স্ফীতি ।—**ক্যালেক্‌সেরিয়া ফ্লুইডি-কার্** অর্কুদ বা স্ফীতির প্রস্তরবৎ **কাঠিন্য**ই প্রদর্শক। এজন্য স্ট্রীলোকদিগের স্তনে অতি কঠিন গিটগিট, কুলের আঠির ন্যায় স্ফীতি ও চাপ জন্মিলে এবং পেণীবেষ্ট ও স্ক্রির বন্ধনী বা লিগামেন্টে কঠিন স্ফীতি উৎপন্ন হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

৪ ।—**ক্যালেক্‌সেরিয়া আয়ডেটা** (*Calcarea lobata*) ।—সাবম্যাক্‌জিলারি বা হনুঅধঃগ্রন্থি প্রদাহ ; টুবাকুলার মিন্‌জ্‌স্ট্রাইটস বা মস্তিষ্কবেষ্ট প্রদাহ ; কর্ণের পলিপাস্ বা বহু পাদার্কুদ ; জরায়ুর ফ্রাই-ব্রইড বা তাম্ববার্কুদ ; প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর, রজনী ঘর্ম ও সবুজ, পুষাকার গয়ারের নিষ্টিবন হওয়া প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত, দিবারজনীস্থায়ী কাসি প্রভৃতি রোগারোগ্যে ইহা কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

৫ । **ক্যালেক্‌সেরিয়া হাইপফস্‌ফরিকা** (*Calcarea Hypo-phosphorica*) ।—ডাং ন্যাস ইহা দ্বারা ৮ বৎসর বয়সের একটি বালকের জাম্‌স্ক্রির চতুঃপার্শ্ব বাপী একটি অতি বৃহৎ **এব্‌সেস্** বা **পুষ্টিশোথ** আরোগ্য করিয়াছেন। তাহাতে টিবিয়াস্থির প্রায় অর্দ্ধাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত এবং বালক জীর্ণ, শীর্ণ ও ক্ষুধাহীন হওয়ায় অতি শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। টিটুরেবণ ১ প্রতি দিন একবার প্রদত্ত হয়। ইনি ইহা দ্বারা অনেক বৃহৎ বৃহৎ পুষ্টিশোথের শোষণ সম্পাদন করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। পুষ নিষ্ক্রান্ত হয় নাই।

৬। ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফুরিকা (Calcarea Sulphurica)।

সাধারণ ক্রিয়া।—হিষ্কার সাল্ফার হইতে ইহার ক্রিয়া গভীরতর। পুষ্টি নিবারণে হিষ্কারের কার্যশেষ হইলে অর্থাৎ উহা দ্বারা আর বধন কার্য পাওয়া যায় না তখন সিলিন্-সিফার পূর্বে ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ক্যাল্কে সাল্ফুরিকার ক্রিয়া প্রভূত পুষ্টিজননে পর্যাবসিত হয়।

চিকিৎসা—স্বতঃই হউক আর অস্ত্র চিকিৎসার ফলস্বরূপই হউক এবসেস্ বা পুষ্টিশোথ হইতে পুষ্টিস্রাব আরম্ভ হইলে যদি তাহা শীঘ্র আরোগ্য না হয় তাহাতে ক্যাল্কে সাল্ফুরিক উপকারী। পুষ্টিশোথের ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত পুষ্টি নির্গত হইতে থাকা ইহার প্রদর্শক। টনসিল গ্রাণ্ড ও কণিয়ার পুষ্টিশোথরোগে, কুস্কুসের পুষ্টিস্রাবে এবং স্ফোটক অথবা ক্ষত প্রভৃতি হইতে পুষ্টিস্রাব হইলে ইহা দ্বারা ফলের আশা করা যায়।



লক্ষণ ।

মস্তক ।—সর্দি হইলে সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে শিরঃশূল জন্মে, উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে হ্রাস হয় । ললাট পার্শ্বে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ললাট পার্শ্বের শিরঃশূল ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চক্ষু মিটি মিটি করিলে বৃদ্ধিত হয় এবং বাম পার্শ্বে অধিকতর থাকে ।

চক্ষু ।—লোহিতবর্ণ চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু থাকে ও তাহা হইতে অত্যধিক অশ্রু জল নিঃসৃত হয় ; বাম চক্ষুতে রোগ অধিকতর থাকে এবং সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি হয় । চক্ষু চুলকায়, কানড়ায় ও জ্বালা করে । বেদনায় বোধ হয় যেন চক্ষুর পশ্চাৎ পার্শ্ব সূত্র হইতে আলগাভাবে ঝুলিতেছে ।

নাসিকা ।—নাসিকা এবং চক্ষু হইতে প্রচুর, জলবৎ শ্রাব । উষ্ণ গৃহে প্রবেশকালে অবিশ্রান্ত হাঁচি ও প্রচুর এবং তীব্র সর্দিশ্রাব । শ্রাবযুক্ত সর্দি, শিরঃশূল, চক্ষুর জলশ্রাব, কাসি, তাপ, তৃষ্ণা এবং হস্তের কম্প প্রভৃতির সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে হ্রাস ।

শ্বাসযন্ত্র ।—সর্দি জন্ত স্বরভঙ্গ । গলদেশে শুড় শুড়ি এবং স্বরযন্ত্রে কনকনানি । শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি । স্বরযন্ত্রে দপদপানি ও সঙ্কোচন বোধ । অনবরত খ্যাক্ খ্যাক্ করিতে ইচ্ছা । স্বরযন্ত্রের ভয়ানক প্রাতিশ্রাবিক প্রদাহ নিবন্ধন স্বরভঙ্গ ; কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় । বক্ষের মধ্যভাগে চাপ হওয়ার শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ।

পাল্মোমেন্ট্র্য ।—গলার বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । গলার সম্মুখভাগে সঙ্কুচিতবৎ বেদনা । সন্ধ্যাকালীন শরীর তাপ নিবন্ধন তৃষ্ণা ।

উদ্ভৱ ১—উদরের ডাক । অতি দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ । অধো-
দরের পার্শ্ব হইতে হঠাৎ সূত্রবৎ সূক্ষ্ম স্থান ব্যাপিয়া জ্বালা অথবা শীতলতার
ভাবযুক্ত কর্তনবৎ বেদনা উর্দ্ধ ও অভ্যন্তরাতিমুখে যায় ।

চিকিৎসা ।

নাসিকা সর্দি বা করাইজা ১—এলিহান্স সেশা-
সর্দির হাঁচি হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে তাহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া
যায় । নাসিকা ও চক্ষু হইতে অজস্র জল নিঃসরণ । নাসিকার জলের
তীব্রতাপ্রযুক্ত নাসিকা দি দেশের অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালায়, উক্কৌঃ ও নাসাপুট
হাজিয়া যায় এবং পরে তাহাদিগের লোহিতবর্ণ ও কাঁচাভাব জন্মে ।
এস্থলে দ্রাত থাকা আবশ্যিক যে ইহার নাসিকাস্রাব তীর ও
হাজাকর এবং চক্ষুজল অনুগ্র ও স্নিগ্ধ এবং স্লুসেট-
সিল্লার চক্ষুজল তীর ও হাজাকর এবং নাসিকা-
স্রাব অনুগ্র ও স্নিগ্ধ ১ নাসিকায় পূর্ণবোধ, দপ্দপানি ও জ্বালা
এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ! ললাট এবং মস্তক পশ্চাতে
কঠিন শিরঃশূল নিবন্ধন রোগী আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না ।
মস্তকে বিদারণবৎ অন্তভূতি । রোগীর মুক্ত বায়ুমধ্যে গমনে ইহার সর্দিস্রাবের
রোধ এবং গৃহ প্রবেশে পুনরাবর্তন । সর্দিকালে স্বরযন্ত্রকাসি থাকিলে,
স্বরযন্ত্র ভেদ হওয়ার ঞায় বেদনায় রোগী যদি পশ্চাৎদিকে হঠিয়া
যায় ও জড়সড় হয় তাহাতে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত । ডাং ফ্যারিং-
টনের মতে এলিহান্স সেশা কর্তৃক সর্দি নাসিকা হইতে
বন্ধে বিতাড়িত হইলে ফস্ফরাস প্রয়োগের প্রয়োজন । যাহাই
হউক সর্দির প্রথমাবস্থায় ইহা কার্য্যকরী বলিয়া জানিতে হইবে ।
ইহার সর্দি বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায় । আর্সেনিক
ইহার সহিত তুলনীয় হইলেও তাহাতে উষ্ণ গৃহ হইতে শীতল বায়ুতে

বাইলে হাঁচি হইতে থাকে এবং এলিয়ামসের ঠায় স্রবযন্ত্র লক্ষণ থাকে না। মাল্‌কু'রিয়ামসের ঠায় তীব্র ও হাজার হইলেও তাহা এলিয়ামসের ঠায় পাতলা নহে। এলিয়াম্ সহ স্ক্লেসিয়া, এরাম টি, এবং আসের তুলনা শিক্ষাপদ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপী প্রতিশ্য় :— এলিয়াম্ সেপার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে নাসিকা হইতে প্রচুর, হাজার ও জলবৎ সর্দিশ্রাব হয়। নাসিকা হইতে নির্দীপ জলশ্রাব ও উত্তেজনা-বৃদ্ধি কামি হইতে থাকে এবং ক্ষীণ মুখ প্রদাহিত বনিয়া বোধ হয়।

ক্যান্সার—সর্দির সূচনামাত্রই ক্যান্সার প্রদত্ত হইলে ইহা অধুনা রোগ নিবারণ করিতে পারে অথবা প্রকোপের হ্রাস করিতে সক্ষম হয়।

২। এলো (Aloe)।

প্রতিশ্রাম :—এলো স্ক্‌কটিনা।

উপচয় :—প্রত্যেককালে ; ব্যায়ামহীনতায় ; উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুতে ; আহার ও পান্যে ; দণ্ডায়মান বা ভ্রমণের অবস্থায়।

উপশ্রাম :—শীতল জলে ; শীতল বায়ুতে ; মল অথবা বায়ু নিঃসরণে।

সম্বন্ধ :—উদরে শোণিত প্রাচুর্য ও পোটাল শিরায় রক্তাধিক্য থাকিলে সাল্‌ফারের ঠায় এলো অনেক পুরাতন রোগে কার্যকরী ; ইহাও অন্তপ্রবিষ্ট উদ্ভেদ পুনরানয়নে সমর্থ। এলোর কার্যপ্রতিষেধক—সাল্‌ফার এবং মাষ্টার্ড।

তুলনীয় ঔষধ :—ইস্কু, বার্সে, কলিন্স, ক্রটন, টি, আইরিস, লাইক, নাক্‌স ভ, পড, পাল্‌স, সাল্‌ফ।

সাম্প্রাণ ক্রিয়া :—প্রধানতঃ যকুৎ আক্রমণ করিয়া এলো পোর্টাল শিরা অথবা উদরযন্ত্রাদির রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে, তাহাতে পিত্ত্রস্রাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গোণভাবে ইহা বৃহদস্ত্রের পেশী এবং সরলান্ত্র আক্রমণ করায় শেষোক্তের প্রগাঢ়তর রক্তাধিক্য প্রযুক্ত অর্শ উৎপন্ন হয়। যন্ত্রনিচয়ের পরস্পর সংশ্রব নিবন্ধন উপরি উক্ত বস্তিকোটরস্থ অত্যাশ্রয় যন্ত্র মধ্যে স্ত্রীজননেক্রিয়েই রক্তাধিক্যের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সরলান্ত্রই ইহার প্রধানতম ক্রিয়াক্ষেত্র।

লক্ষণ।

মস্তক :—ললাটের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্যাস্ত মুহু শিরঃশূল নিবন্ধন মস্তকে এবং চক্ষুতে গুরুত্ব এবং বিবমিষা। চক্ষুর্দ্বক ও ললাট প্রদেশে মুহু চাপবৎ বেদনা। মুর্দ্ধায় গুরুত্বানুভূতি। শিরঃশূলের তাপে বৃদ্ধি এবং শৈত্যপ্রয়োগে উপশম। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এবং আমাশয়ান্ত্রপ্রদেশের উত্তেজনা হইলে শিরঃশূল জন্মে।

উদর :—যকুৎ প্রদেশে অস্বস্তি, তাপ, চাপ, এবং আতত-
ভাব। দক্ষিণ পার্শ্বের পশ্চীমার্শ্বের অভ্যন্তর পার্শ্বে মুহু বেদনা। নাভির চতুঃপার্শ্বস্থ উদরপ্রদেশ বেদনায়ুক্ত; তাহাতে মোচড়ানি ও কামড়ানি বেদনা থাকিলে রোগী সম্মুখে নত হইয়া বসিতে বাধ্য; এবং মলত্যাগের বেগ হইলে কেবলমাত্র বায়ু নিঃসরণ হয়। উদর, বিশেষতঃ তাহার আমাশয়োপরিস্থান, বায়ু কর্তৃক বিস্তৃত হয় ও বায়ু চলিয়া বেড়ায়। প্রচুর, জ্বালাকর ও হর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে উদরবেদনার উপশম। মলত্যাগের পূর্বে, সময়ে এবং পরে কামড়ানি বেদনা ও বিষ্ঠাসহ উচ্চ শব্দে বায়ুর নিঃসরণ। উদরের বিশেষ হর্ষলতায় বোধ

যেন উদরানয় হইবে। আমশয়াধঃ প্রদেশে ও সরলাস্ত্রে ভার বোধ। স্পর্শে, মলবেগে অথবা শায়িতাবস্থা হইতে উত্থানে উদরের পেশীতে বেদনা।

মল ও মলদ্বারঃ—দরলাস্ত্র এবং মলদ্বারে তাপ, টাটানি ও ভারিবোধ। সরলাস্ত্রে তাপ ও জ্বালার অনুভূতি। মলদ্বারে চুলকনা ও জ্বালা এবং তাহার সংকোচক পেশীর দুর্বলতা। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে গাঁচা এবং কর্তনবৎ বেদনা। দিবসে অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকে; রাতিতে জাগ্রৎ হয় ও প্রাতে ছয়টার সময় শয্যা হইতে উঠে। মলত্যাগের বেগে মূত্রের নিঃসরণ। উদরাময়ের ছায় তাড়াতাড়ির সতিত মলত্যাগের বেগ কেবলমাত্র উষ্ণ বায়ু নিঃসরণে উপশম; কিন্তু তাহা শীঘ্রই পুনরাগত হওয়ায় বোধ যেন সরলাস্ত্রের পশ্চাত্ত্ব কক্সিক্স অস্থি ও মস্মুথের পিউবিস্ অস্থির সংযোগস্থান এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে একটা ছিপিবৎ কঠিন বস্তু প্রতিষ্ট আছে। মলত্যাগান্তেও বোধ যেন সরলাস্ত্রে মল রহিয়া গিয়াছে। বায়ুর নিঃসরণসহ অর্নৈচ্ছিক মল ত্যাগ। কিছু পান অথবা আহার মাত্রই তাড়াতাড়ির সতিত মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়। কোন চেষ্টা বাতীত মলত্যাগ হওয়ায় বোধ যেন বিষ্ঠার অত্যন্ত গুরুত্ব বশতঃ অস্ত্রের বাহিরে স্থলিত হয়। মলমূত্র একযোগে নিঃসরণ হইয়া যায়। মলত্যাগকালে দুর্বলতা। বিষ্ঠা অল্প, কটাসে, ক্রেন্দনুক্ত, অর্দ্ধ তরল ও উজ্জল হরিদ্রবর্ণ এবং কাদার ছায় কোমল; বিষ্ঠা চাপ চাপ, জলবৎ, এবং জিউলির আটার ছায় আময়ুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—ঋতুর পূর্বের ছায় তলপেটে বেদনা। জরায়ুপ্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্ব হওয়ায় কটি এবং কুঁচকিতে প্রসব বেদনার ছায় বেদনার দাঁড়াইলে বৃদ্ধি। শীঘ্রাগত ও প্রচুর ঋতুশ্রাব। রক্ত ও শ্লেষ্মায়ুক্ত শ্বেতপ্রদরের পূর্বে উদরশূল।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক্,—নাক্স ভমিকার ছায়
এলোজ্ চক্ষু উর্দ্ধের শিরঃশূলে উপকারী । রোগী বোধ করে যেন
তাহার চক্ষুপত্র ভারাক্রান্ত রইয়াছে । আংশিকরূপে চক্ষু মুদ্রিত
করিলে তাহার উপশম হয় ।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া ।—এলোজ্‌এর ক্রিয়া প্রধানতঃ
স্বরলায়ে প্রকাশ পায় । ইহা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছা উৎপন্ন করে
এবং মলত্যাগকালে প্রভূত বায়ু নিঃসরণ হয় । স্বরলায়ে অশান্তি ও
ভারিবোধ, তাহার দুর্বলতা এবং অসামান্যভাবে ইহার উদরাময়ের
বিশেষতা ; সর্বদাই বিষ্ঠা নির্গত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকায় মল নিঃসরণ
হইবার অশঙ্কাশ্রযুক্ত রোগী বাতকর্ম্ম করিতেও ভীত ।
উদরের বান পার্শ্বে গড়গড় করিয়া ডাকিয়া উঠিলে মলবেগ হয় ।
অনেক সময়ে বায়ু নিঃসরণ করিতে শিশুর মল নির্গত হইয়া যায় ।
প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা সাল্‌ফার, স্‌জ্‌ফা এবং লোহ
সহ ভুলনীয় । সাল্‌ফারের ছায় ইহার রোগীও প্রত্যয়ে শয়ত্যাগ
করিয়া তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যায় । আহায়ে ইহার
রোগের বৃদ্ধি হইলেও দিবসে রোগী মলত্যাগ করে না । ফসফরিক
এসিডেও মলদ্বারের দুর্বলতা আছে এবং বায়ু নিঃসরণ কালে বিষ্ঠা
বাহির হইয়া পড়ে । মূত্র ত্যাগ করিতেও এলোজ্‌এর রোগীর
মল নিঃসরণ হয় এবং মলত্যাগের সঙ্গে অর্শের বাল বাহিরে আইসে ।
ইহার বিষ্ঠা পীতবর্ণ, কাদার ছায়, থানা থানা এবং জলবৎ ; মল-
ত্যাগের পূর্বে অধোদরের পাশাপাশি ভাবে এবং নাতির চতুঃপার্শ্বে
কামড়ানি বেদনা হয় ; মলত্যাগকালে বেদনা থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ
মলত্যাগের পরে তাহার উপশম হয় । পিপার মুখ হইতে অতি বেগের

সহিত জল পড়ার ছায় নির্ধাধস্রাবী পুঞ্জার উদরাময় গো-বীজের টীকা বা গনরিয়ার পর জন্মিয়া থাকে।

অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্, পাইল্‌স্।—এলোজ্‌ট অর্শ-
রোগের অগ্ৰতম প্রধান ঔষধ। আঙ্গুরগুচ্ছের ন্যায় থোলো থোলো
অর্শগুটির বহিনিঃসরণ ইহার প্রদর্শক। অনেক সময়েই ইহার অর্শ
হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় এবং ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে যন্ত্রণার লাঘব
হইয়া থাকে; মিউ এসির তাহা উষ্ণ জলে হ্রাস পায়। মলদ্বারে স্পষ্ট
জ্বালা থাকে এবং অল্প যেন চাঁছা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে
উদরাময় পবণতা সহ মলদ্বারের প্রসিক্‌ অসামালভাব বর্তমান থাকে।
কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় কলিনসনিহ্না ইহা হইতে প্রভেদিত হয়।

রেট্যানিহ্না—মলদ্বার জ্বালা করে এবং কঠিন মলত্যাগে অর্শের
বলি নির্গত হয়। মলদ্বারের জ্বালা, বিদারণ, এবং সরলাস্ত্রের
বেদনা ও স্পর্শসহিযুতা ইহার প্রদর্শক।

ক্যাপ্‌সিকান্—রক্তস্রাবযুক্ত অর্শরোগে মলত্যাগকালে মলদ্বারে
জ্বালান্নময় বেদনা, চুলকনা, চন্‌চনি এবং জ্বল-
বৈধাবোপ্র ইহার প্রদর্শক।

ফক্‌ৎ রোগ।—এলোজ্‌ট যকৃতের স্রাববৃদ্ধি হওয়ায়
প্রভূত পরিমাণ পিত্ত নিঃসৃত হইলে হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় জন্মে ও উদরে
কামড়ানি বেদনা হয়। ইহাতেও সিপিহ্নার ছায় উদর যজনিচয়ে
রক্ত ধাবিত হওয়ায় তথাকার শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ হয় এবং যান্ত্রিক
উত্তেজনা জন্মে। কিন্তু সিপিহ্নার যান্ত্রিক শিথিলতা ও দমিয়া
যাওয়াভাবের পরিবর্তে ইহাতে সরলাস্ত্রাদির সম্পূর্ণ অবশতা থাকে। জরায়ু
ও সরলাস্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে গুরুত্বের ও বুলিয়া পড়ার অনুভূতি জন্মে এবং
মলদ্বার দুর্বল হইয়া পড়ে।

৩। কনভ্যালেরিয়া মেজাস্ (Convallaria Majus) ।

তুলনীয়া ঔষধ—ডিজিট্যালিস্ ।

সাধারণ ক্রিয়া—কনভ্যালেরিয়া প্রগাঢ়রূপে হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা ও নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার হ্রাস হইলে ফল স্বরূপ বমন ও পতন বা কোলাপ্স্ লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

ইহার ঔষধ গুণপরীক্ষায় হৃৎপিণ্ড শব্দের ক্ষীণতা, জাগুলার শিরা হইতে রক্তহীনতার মন্ডর শব্দ, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, এবং তাহাতে যেন থর থর কম্প ভাব জন্ম (Fluttering) একরূপ অস্বস্তির অনুভূতি প্রদৃতি উপন্ন হইয়াছিল ; কিছু শ্রমের কার্য্য করিলে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার বোধ এবং তাহার পুনরারম্ভে মুছ্রী ও বিবমিষার অনুভূতিও ইহার পরীক্ষোৎপন্ন লক্ষণ ।

চিকিৎসা ।

হৃদ্রোগ—ক্রিয়াগত বা ফাংসন্যাল হৃৎপিণ্ড রোগ এবং যন্ত্রগত বা অর্গ্যানিক হৃৎকপাটরোগ ।— অধুনা হৃদ্রোগের অনেকগুলি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে অনেকেরই হোমিওপ্যাথিসম্মত ঔষধগুণ পরীক্ষা হয় নাই ; শোণিত-যন্ত্রে তাহাদিগের স্বাভাবিক বা ফিজিয়লজিক্যাল ক্রিয়ালুসারে তাহারা হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এজন্য প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না । তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকসকলগণ এ রোগে তাহাদিগের ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা নিম্নে তাহাদিগের বিষয় উল্লেখ করিলাম ।

আমাদিগের বর্তমান আলোচ্য ঔষধ কনভ্যালেরিয়ার হোমিওপ্যাথিকতে পরীক্ষোৎপন্ন হৃৎপিণ্ড লক্ষণের বিষয় আমরা উপরে

উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তদনুসারেই হৃদ্রোগচিকিৎসায় ইহা প্রযোজিত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত মূত্রশ্রাব, উদরী প্রভৃতি শোথ এবং অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ, বর্তমান থাকিলে হৃৎকপাটরোগে কন্ভ্যালেরিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হৃদ্রোগঘটিত কুসুফুসের শোথরোগের অনেক রোগী ইহার সেবনে উপশম পাইয়া বহুকাল পরে শয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মাইট্রেল বা দ্বিপক্ষহৃৎকপাটের রোগ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ, হৃৎকম্প এবং শোথরোগগ্রস্ত রোগী ইহা দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছে। কন্ভ্যালেরিয়া লক্ষণে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উপরি উক্ত অস্থি জন্মে বলিয়া ইহা তামাক বা সিগারেট সেবন জগ্ন হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে।

এডনিস্ ভার্গ্যালিস্—ইহা ধমনীসমূহের আততভাবে র বৃদ্ধি করে এবং নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার হ্রাস এবং হৃৎপিণ্ডসংকোচনের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া হৃদস্পন্দন নিয়মিত করে। হৃদ্রোগে ইহার প্রয়োগ জগ্ন এ পর্য্যন্ত কোন কুফল দৃষ্ট হয় নাই। ইহা অতি শীঘ্র মূত্রবৃদ্ধি করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডস্বকীয় অগ্নাগ্ন ক্রিয়ায় ইহা ডিজিটালিসের তুল্য।

লাইকোপাস্ ভার্জিনিকাস্—অবসাদক অথবা উত্তেজক ঔষধের অপব্যবহার বশতঃ হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতা সহ দৌৰ্ব্বল্যে, এবং অত্যন্ত হৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে এবং পেশীদ্রব্বলতায় লাইকোপাস্ উপকারী। হৃদ্রোগ ঘটিত হাঁপরোগের ইহা বিশেষ ঔষধ মধ্যে গণ্য।

কলিন্সনিয়া—ইহাও হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতার ঔষধ এবং ডিজিটালিস্ ও লাইকোপাসের স্থায়ী ফললাভ হয়।

স্ট্রোপেছাস্—হৃৎকলতা, হৃৎবিবৃদ্ধি এবং উত্তেজনাপ্রবণতা প্রভৃতি হৃৎপিণ্ড-রোগে ধমনীমণ্ডলের আতত অবস্থা এবং নির্ক্ষাধ মূত্রস্রাব থাকিলে **স্ট্রোপেছাস্** উপকার করে। সম্ভবতঃ কিডনি বা বৃক্করোগ নিবন্ধন হৃৎপিণ্ড বিকারে ইহা উপযোগী ঔষধ মধ্যে গণ্য হইতে পারে ।

ক্র্যাটিগাস্ অক্‌সিহা ক্যান্থা—হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্ষীণ ও অনিয়মিত এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হইলে **ক্র্যাটিগাস্** উপকার করিয়া থাকে । রোগী বোধ করে যেন হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে ।

স্পাটিন্ সাল্‌ফেট—ইহা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডবিশিষ্ট বাতপ্রকৃতির ও গুল্মবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ঋতুসন্ধিকালীন রোগে উপযোগী ।

কিডনি বা বৃক্করোগ—হৃৎপিণ্ডরোগের ফলস্বরূপ কিডনিরোগ জন্মিলে **কন্‌ভ্যালেনরিহা** দ্বারা উপকার হয় । হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও অনিয়মিত থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দ্বিপক্ষ-কপাট বা মাইটাল ভাল্ভের অসম্পূর্ণতা বশতঃ স্বক্‌ শোথ বা এনাসার্কী এবং উদরী জন্মে ।

এপসাইনান্—মূত্রের অল্পতা থাকিলে **এপসাই** জলশোথ-রোগের দমন রাখিতে পারে । ইহা অন্তঃসত্ত্বাবস্থার অটৈতত্ত্ব বা কোমা এবং সর্ক্ষাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর করিতে সক্ষম ।

৪ । লিলিয়াম্ টিগ্রিনাম্ (*Lilium Tigrinum*) ।

উপচয়—সন্ধ্যাকালে ; আত্মসংবমহীনতা বশতঃ রজনীতে ।

উপশম :—দিবসে ; বিগুহক বায়ুতে ; কশ্ম্রে লিপ্ত থাকিলে ; উষ্ণ গৃহে ।

সম্বন্ধ :—লিলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—হেলনিয়াস্ (এটিভার্সন), নাক্‌স্ (উদরশূল) ।

ভুলনীয় ঔষধ :—এলো, এপিস্, বেল, ক্যাষ্টাস, ক্যাছা, সিমিসি, হেলনি, ইগ্নে, নাক্‌স্ ভ, প্লাটি, পড, পাল্‌স্, সিপি, স্পাইজি, মাল্‌ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—স্বীজননেক্রিয় এবং জ্বর্পণে লিলিয়াম্ টিগ্রিণামের প্রভূত আক্রমণ হয় ; প্রথমোক্ত যন্ত্রের ইহা উত্তেজনা ও নাতিপ্রবল প্রদাহ এবং ফলস্বরূপ জরায়ুর নানাবিধ স্থানচ্যুতিদোষ ঘটায় । স্বীজননেক্রিয়ের প্রক্ষিপ্ত (Reflex) ক্রিয়া দ্বারা ইহা জ্বর্পণের অবসাদ, উত্তেজনাপ্রবণতা এবং জ্বকম্প প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত করে । জ্বরাসুপ্রদেশে তৈলমাত্রা ও সকলই ফেন চাপিহা বাহির করিহা দেওয়ার অনুভূতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

লক্ষণ ।

মন ।—মানসিক অবসাদ ; ভীকতা, বিপদাশঙ্কা এবং ক্রন্দন-প্রবৃত্তি । জরায়ুরোগে রোগিণী আত্মার উদ্ধার বিষয়ক চিন্তায় যত্ননা ভোগ করে । কামোত্তেজনাকালে রোগী অবশ্ব কর্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইবে বলিয়া অশ্রান্ত ব্যস্ততা বোধ করে । রোগীর শাপ দিতে, প্রহার করিতে এবং অশ্লীল বিষয়ের চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং এইরূপ মানসিক অবস্থা উপস্থিত হইলে কামোত্তেজনার হ্রাস হয় ।

অস্ত্রক ১—অধিকাংশ সময়ে জরায়ু বিকার প্রযুক্ত শিরঃশূল জন্মে ।
চক্ষুর্দ্ব ললাটপ্রদেশে মূঢ় বেদনা ।

চক্ষু ।—দূরদৃষ্টি এবং নিকটদৃষ্টি । দৃষ্টির গোলমাল হওয়ায় রোগীর
চক্ষু ঢাকিতে ও তাহাতে চাপ দিতে ইচ্ছা হয় ।

বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ড ১—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে মূঢ় চাপবৎ বেদনা ।
রজনীতে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডবেদনার বৃদ্ধি । বাম বক্ষে . অবিশ্রান্ত
গুরু চাপের অনুভূতি । হৃৎপিণ্ডে থর থর কম্পভাব (Fluttering) ।
বাম বক্ষে তীব্র ও ত্বরিত্ব আক্রমণকারী বেদনা ; বোধ যেন হৃৎপিণ্ড
সাঁড়াসীর মধ্যে নিষ্পীড়িত হইতেছে, অথবা পর্যায়ক্রমে হস্তদ্বারা তাহা
দৃঢ়রূপে ধৃত করা ও মৃষ্টি শিথিল করা হইতেছে । হৃৎপিণ্ডের থরথরভাব
(Fluttering) অথবা স্পন্দন ।

মল ও মলদ্বার ।—সরলাস্ত্রে চাপ থাকায় অবিশ্রান্ত মল-
ত্যাগেচ্ছা ।—প্রাতকালীন উদরাময়ে পাতলা, পিত্তসংযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ ও
ভর্গক মলত্যাগের অসহনীয় বেগ হইলে রোগী এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা
করিতে পারে না ; মলত্যাগের পূর্বে সরলাস্ত্রে কামড়ানি বেদনা
অথবা চাপ হওয়ায় অত্যধিক ক্লেশ এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার ও সরলাস্ত্রে
চনচনি ও জ্বালা । কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রাশয় ১—দিবসে বারবার মূত্রত্যাগ ও মূত্রনালীতে জ্বালাযুক্ত
চনচনি । মূত্রস্থালীতে অবিশ্রান্ত চাপ । অবিরত মূত্রত্যাগেচ্ছা থাকিলে
অত্যন্ত মূত্রত্যাগ এবং মূত্রনালীর জ্বালা ও চনচনি ।

স্ত্রীজননেত্রিয় ১—জরায়ুপ্রদেশে গুরুভার, চাপের অনুভূতি
এবং ঠেলমারা উপস্থিত হইলে বোধ হয় যেন বস্তি কোটরস্থ সকল বস্ত্রই
চাপসহ যোনি পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে ; যোনি কপাটে হস্তের
চাপ দিলে তাহার উপশম হয় । অণ্ডাধারপ্রদেশে তীব্র বেদনা । পৃষ্ঠ

এবং দক্ষিণ অণ্ডাধারে বেদনা। অণ্ডাধার চাপিত করিলে টাটানি বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর। দক্ষিণ অণ্ডাধারে চর্কণ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, ভ্রমণ করিলে বর্দ্ধিত। জরায়ু সম্মুখ দিকে হেলিয়া পড়িলে রোগী স্নায়ু-শূল প্রযুক্ত স্পর্শ এমন কি তাহাতে শয্যাবস্ত্রের চাপ এবং সামান্য ঝাঁকি পর্য্যন্ত সহ করিতে পারে না। জরায়ু শরীর ঝুলিয়া পড়ায় মূত্রস্থালীর অভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহার গ্রীবা সরলান্ত্র চাপিত করে। জরায়ু ঠেলমারিলে বাম অণ্ডাধার ও স্তনে বেদনা হয়। যোনিতে পূর্ণতা বোধ হইলে তন্মধ্যে শুভ্রশুক্রে কামান্নভূতি জন্মে এবং বাম অণ্ডাধারে ছলবেধবৎ বেদনা হয়। কামেচ্ছার বৃদ্ধি হইলে তাহা শোণিতোচ্ছ্বাসে শেষ হয়। উজ্জ্বল পীতবর্ণ, তীব্র ও ক্ষতকর শ্বেতপ্রদরে কটা দাগ লাগে।

চিকিৎসা।

ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগ বা স্ফাংসনেল হান্‌উ ডিজিৎস্—লিলিয়াম্ ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডে কতিপয় বিশেষ লক্ষণ উপন্ন হওয়ায় কোন কোন ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার হৃৎপিণ্ডবেদনায় রোগী বোধ করে যেন তাহা 'সাঁড়সী দ্বারা দৃঢ়তাসহ ধৃত হইয়াছে এবং তাহাতে রোগীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়! হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ অন্নভূতি বা খরখরভাব এবং রোগীর মুচ্ছার ভাব জন্মে। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড দৃঢ়তাসহ চাপিত হইতেছে ও মুক্তি পাইতেছে। ইহা যন্ত্রবিকারী রোগের ঔষধ নহে। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্বলতানিবন্ধন উত্তেজনা প্রবণতা ও স্নায়বিক হৃৎকম্প থাকে এবং বামপার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিলে উপরি উক্ত রোগযন্ত্রণার উপশম হয়। শরীরচালনায়

কণ্ঠের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । জরায়ুরোগ প্রযুক্ত স্নায়বিক হৃৎকম্প এবং ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগের ইহা ঔষধ ।

সাল্ফার—হৃৎপিণ্ডमध्ये अधिकतर शोणित प्रवेशের অনুভূতি সহ হৃৎকম্প, খাবি খাওয়ার ছায় শ্বাস প্রশ্বাস এবং বক্ষকোটরাপেক্ষা হৃৎপিণ্ড যেন অতি বৃহৎ বলিয়া স্থানাভাবের অনুভূতি হইলে সাল্ফার উপযোগী ।

উদরাময়—লিলিহ্যাম টিপ্রিশাম্ অবস্থা বিশেষে প্রাতঃকালীন উদরাময় আরোগ্য করিয়া থাকে । মলত্যাগের বেগ হইলে রোগী তাড়াহাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং পীত বর্ণ, কোমল বিষ্ঠা ত্যাগ করায় মলদ্বার হাজিয়া যাওয়ার ছায় বোধ করে । এস্থলে ইহা প্রাতঃকালীন উদরাময়ের প্রধান ঔষধ সাল্ফার সহ তুলনীয় ।

শ্রীজ্বননেক্রিরোগ—শ্বেত প্রদর বা লুক-রিয়া; সাবইনভলিউশন; রেট্রিভার্সন ও এন্টিভার্সন বা পশ্চাৎ ও সন্মুখপার্শ্বে জ্বরাম্বর স্থানচ্যুতি; জ্বরাম্বু ভ্রংশ বা প্রল্যাপ্সাস্—ঋতুপ্রাবে লিলিহ্যামের বিশেষ কোন ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না । ইহার শ্বেতপ্রদররোগ সিপিহ্যার শ্বেতপ্রদর সহ তুলনা করা যাইতে পারে । লিলিহ্যামের শ্বেতপ্রদর জলবৎ, পীত, অথবা ঈষৎ পীত কপিশ এবং বিশেষ প্রকারের তীব্র ও হাজাকর । হাজা বা ক্ষতকর শ্বেতপ্রদরচিকিৎসায় ক্রিন্হাজেতাটি প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়াছে । সিপিহ্যার শ্বেতপ্রদর কচিং তীব্র ও হাজাকর হয় । লিলিহ্যামের জরায়ুরোগে রোগী বড় বাত্যাচ্ছন্ন থাকে । তাহার উদেগবিহীন ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্ৰকারিতা দৃষ্ট হয় । আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং দৌর্বল্য নিবন্ধন

চাঞ্চল্য ইহার বিশেষ মানসিক প্রকৃতি বলিয়া গণ্য। অন্তঃসত্তাবস্থায় এবং প্রসবাস্তিক জরায়ুরোগে ইহা মহৌষধরূপে বিবেচিত। ইহাতে প্রসবাস্তে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া অন্তঃসত্তাবস্থার পূর্বের ত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না (subinvolution); বৃহত্তর, গুরু এবং শিথিল বন্ধনীয়ুক্র থাকে। অধোদরে বা বস্তুকোটরাভ্যন্তরে কিছু বুলিয়া পড়ার ত্রায় ও আকৃষ্টবৎ অনুভূতি জন্মে, এবং পশ্চাৎ অথবা সম্মুখ পার্শ্বে স্থানচ্যুতি হওয়ায় জরায়ু ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে (Retroversion and Anteversion)। কখন কখন তাহার উপরি উক্ত অবস্থায় জরায়ুর ভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাম্ উৎপন্ন হইলে বস্তুকোটরাভ্যন্তরে ঠেলমারা ও যোনিপথে জরায়ু নামিয়া আসার অনুভূতি জন্মে এবং রোগিণী যোনি কপাটাঙ্গি স্থানে হস্তের চাপ দ্বারা তাহার বাধা দিতে চেষ্টা করে; সিন্‌সিহ্লা রোগিণী উভয় উরু পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া এবং নেট্‌মিউ রোগিণী উপবেশন করিয়া তাহার বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে বাধা হয়। এ রোগে অনেক সময়েই উপরি উক্ত লিলিয়াম্‌রোগীর মূত্রস্থালীর ও বস্তু কোটরস্থ অগ্নাশ্র যন্ত্রের উত্তেজনা প্রস্তুত মূত্রস্থালীর কুস্থন এবং মূত্রবেগ ও মলবেগ বর্তমান থাকে। কখন কখন কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা নিবন্ধন রোগী অতি অশ্লীল ব্যবহার করে, সিন্‌সিহ্লা রোগীর পুংসংসর্গে বেদনা হয় বলিয়া তাহাতে ভীতি প্রকাশ করে; নেট্‌মিউ রোগীর যোনিপথ শুষ্ক থাকায় সঙ্গমে বেদনা পায়, এবং তজ্জগ্‌ই সে সঙ্গমে অনিচ্ছুক থাকে। মিউরেক্‌স ঔষধেও কামেচ্ছা অতীব প্রবল হয়, কিন্তু তাহাতে বস্তুকোটরের কোন এক স্থানে বেদনা অথবা বেদনার অনুভূতি বর্তমান থাকিয়া অগ্নাশ্র ঔষধ হইতে প্রভেদ জ্ঞাপন করে। লিলিয়াম্‌ রোগযন্ত্রণার অপরাহ্নকালে বৃদ্ধি হয়, সিন্‌সিহ্লার তাহা ঐ সময়ে উপশম পায়।

অণ্ডাধারশূল :—লিলিফ্রামে অণ্ডাধারে বেদনা হইয়া থাকে ; এই বেদনা সিম্পিফ্রামে বেদনা হইতে তীব্রতায় অধিকতর । ইহাতে বাম অণ্ডাধারই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় এবং তথা হইতে তীর বেঁধার স্থায় বেদনা উরুর সম্মুখ ও অভ্যন্তর ভাগ বাহিয়া অধাভিমুখে যায়, রোগীর গুত্র বায়ুর আক্ষেপ হইতে পারে ।

৫ । প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়া (Paris quadrifolia) ।

সম্বন্ধ :—প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়ার কার্য্যপ্রতিবেদক—কফিয়া ।

ভুলনীয় ঔষধ :—লিডাম, লাইক, রাস্ ।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া :—প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়া মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জায় স্নায়ুগুণ্ডল আক্রমণ করিলে স্নায়ুশূল এবং অত্যাগ্ন স্নায়বিক উত্তেজনার লক্ষণ উৎপন্ন হয় । ইহার সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া স্বাস্থ্যবন্ত্রপথে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।

মন :—বহুভাবিতা, বিশেষপ্রকারের উন্মাদরোপ ; নির্যোথের স্থায় আলাপ এবং মূর্খের স্থায় ব্যবহার ।

মস্তক :—শিরোগূর্ণন ও মস্তকে জড়তাব । মস্তকে এবং মস্তক পার্শ্বে বিদ্ধ করার স্থায় ও ঐকৈক স্থিতিবেদন বেদনা ; পরে ললাটের সম্মুখের গুরুত্ব সম্মুখে নত হইলে বর্দ্ধিত হয় । ললাট এবং ললাটপার্শ্বে সংকোচনকারী চাপ ; মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং স্বকের আততভাব এবং অস্থি চাঁচা হওয়ার স্থায় টাটানিয়ুক্ত ভাব শরীর চালনায়, উত্তেজিত হইলে অথবা চক্ষুর ব্যবহার করিলে এবং সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত । দক্ষিণ ললাটপার্শ্বে চাপবে বেদনার করতল চাপে উপশম । স্পর্শে মস্তকের বাম পার্শ্বের অস্থিতে ঘৃষ্টবে বেদনা ।

স্বাস্থ্যঃ—সম্পূর্ণ অঙ্গে সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা । সন্ধিতে সংকোচন-
বৎ চাপ । সম্পূর্ণ অঙ্গেই গুরুত্ব বোধ ।

শ্বাসযন্ত্রঃ—বেদনাহীন সাময়িক স্বরভঙ্গ । স্বরভঙ্গ ও স্বর ক্ষীণ
থাকে, অবিশ্রান্ত গলা খাঁকর দ্বারা শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন এবং স্বরযন্ত্রে
জ্বালা । ঙ্গবৎ পীত ও আটা শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন । বক্ষে কষ্ট হওয়ায় দীর্ঘ
শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা । স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে আটা শ্লেষ্মা থাকায় অবিশ্রান্ত
গলা খাঁকর এবং শ্বাসরোধ । বক্ষে সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা ।

চিকিৎসাঃ—প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া একটি
নবাবিষ্কৃত ঔষধ । রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগস্থল অতি সঙ্কীর্ণ,
বিশেষতঃ অত্যন্ত প্রচলিত ঔষধ সহ তুলনা দ্বারা প্রয়োগোপযোগিতা
নির্ণয় করা ব্যতীত রোগ চিকিৎসায় ইহার সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন ।
স্থানান্তরে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে ও হইবে ।

৬ । স্কুইলা, সিলি ম্যারিটিমা (Squila, Scilla Mari-
tima) ।

সম্বন্ধঃ—স্কুইলা, ত্রায়নিম্বার পরে সূক্ষ্মলব্ধ ।

ভলনীয় ঔষধঃ—এটি টার্ট, ত্রায়, কষ্টি, সেপা, কেলি কার্ক,
নাক্‌স্‌ ভ, রাস্‌, মাল্‌ফ ।

সাম্ভারণ ক্রিয়াঃ—শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রপথে স্কুইলার
ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহাদিগের উত্তেজনা, এমন কি প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন
করিতে পারে । কিডনি বা বৃককেও ইহার ক্রিয়া আছে ; তজ্জগু
অত্যধিক মূত্রশ্রাব, রক্তসংযুক্ত মূত্রশ্রাব এবং মূত্ররোধ হয় ।

লক্ষণ ।

শ্বাসযন্ত্রঃ—থাইরইড উপস্থির নিম্নপ্রদেশে শুড় শুড়ি হইলে
প্রচণ্ড কাসি হওয়ায় বক্ষপার্শ্বে বেদনা ও শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হয় এবং শ্বাস

টানিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক কাসি আসে। প্রাতঃকালে কাসি হওয়ায় প্রচুর ক্লেদবৎ গম্মার উঠে। কাসিতে বমনের বেগ। শুষ্ক ও প্রচণ্ড কাসিতে উদর যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং কণ্ঠার শুষ্কতা জন্মে। শ্বাসকৃচ্ছ, বশতঃ রোগী গভীর শ্বাস গ্রহণে বাধ্য, কিন্তু তাহাতে কাসির উদ্রেক। বক্ষে কষ্ট ও কশাভাব। শ্বাস-কষ্ট জন্ম বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে শ্বাস টানিলে তাহা অধিকতর হয়। প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টিকিল্লির প্রদাহ নিবন্ধন বক্ষের সূচিবেধবৎ বেদনা শ্বাস গ্রহণকালে বদ্ধিত।

উদ্ভৱ ১—উদরে এবং মূত্রস্থানীপ্রদেশে বেদনামুক্ত স্পর্শ-সহিষ্ণুতা।

মূত্রযন্ত্র ১—মূত্রস্থানীতে অবিশ্রান্ত বেদনামুক্ত চাপ। মূত্র-ত্যাগের প্রবল ইচ্ছার প্রচুর জলবৎ মূত্র-শাব। মূত্র লোহিত বর্ণ ও ঘোর। অত্যন্ন মূত্র-শাব। মূত্রশাবের অত্যন্ত বুদ্ধি।

চিকিৎসা ১—কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, প্লীহারোগ, মূত্রমেহ এবং অগ্নাত্ত মূত্রবিকারাদি সুইলা চিকিৎসার রোগের বিষয় আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিয়াছি ও প্রয়োজন বোধ করিলে বর্ণনা করিব।

লেকচার ৬১ (LECTURE LXI.)

আম্বেলিফেরি জাতীয় ঔষধ নিচয় ।

- ১। ইথুসা সিনেপিয়াম । ২। ইন্যান্থি ক্রকেটা ।
- ৩। ইরিঞ্জিয়াম একয়াটিকাম্ । ৪। এসাফিটিডা ।
- ৫। কনায়াম্ মেকুলেটাম । ৬। পেট্রসিলিনাম্ ।
- ৭। ফেলাগুয়াম্ একয়াটিকাম্ । ৮। সিকুটা
- ভিরোনা । ৯। হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা ।

১। ইথুসা সিনেপিয়াম (*Ethusa Cynapium.*)

সম্বন্ধঃ—ইথুসা যাহার কার্ষ্য প্রতিবেধক—ওপিয়াম্ । ইথুসার কার্ষ্য প্রতিবেধক—উত্তিঞ্জান্ননিচয় ।

ভলনীয়া তৈলঃ—এটি টাট, ক্যাক্সে কাব, সিকুটা, ইপিকা, গ্র্যাটি, গ্যাষোজ, নাক্‌স্‌ম, সাল্‌ফ, সাল্‌ফ এসি ।

সাম্ভারণ ক্রিয়াঃ—পূৰ্ব্বেকালীন চিকিৎসকগণ ইথুসাকে অতি সাংঘাতিক বিষগুণবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া গণনা করিতেন, কিন্তু অধুনা ইহা অতি নিদোষ, বিষগুণহীন বস্তু বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । তথাপি ইহার উপাদানসহ যে উগ্রগুণবিশিষ্ট তৈল আছে তাহা আমাশয়ান্ত্রিক উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া বিবিধা এবং বমন ও বিরেচনাদি নানাবিধ লক্ষণ উৎপন্ন করিতে পারে । ইথুসা ত্বগুপরি কালশিরা ও সম্পূর্ণ শরীরে কাল এবং নীলবর্ণ কলঙ্ক জন্মাইয়া থাকে । শিশুদিগের দস্তোদগমকালের যোগে ইহা বিশেষ উপকারী ।

লক্ষণ ।

স্নানু ১—মৃগীবৎ আক্ষেপে রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে করতল-সংক্রান্ত, এবং মুখ লাল, চক্ষু নিম্নদিকে ঘূর্ণিত এবং চক্ষুতারকা বিস্তৃত ও গতিহীন ; চক্ষু স্থিরদৃষ্টিবিশিষ্ট এবং নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ ও তরতরু গতিবিশিষ্ট ; মুখে গেজলা উঠে এবং দস্তে দস্ত দৃঢ় সংবদ্ধ হয়। অজ্ঞান অথবা প্রলাপাবস্থায় আক্ষেপ হইতে থাকে। অত্যন্ত উৎকর্ষা বশতঃ রোগী অস্থির হয়। অত্যন্ত দৌর্ভল্য ; শিশু দণ্ডায়মান হইতে এবং মস্তক উন্নীত রাখিতে পারে না।

মুখমণ্ডল ১—মুখের আকৃষ্ট অবস্থা, ইহা নাসাপুটে আরম্ভ হইয়া মুখকোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুখমণ্ডলের দৃশ্য অত্যন্ত উৎকর্ষা ও যন্ত্রণাবাজক থাকে।

দস্ত ১—দস্তনাড়িতে ছলবেদা অথবা ছিন্ন করার ভয় বেদনা।

আনামাশয় ১—খাদ্য বস্তু দৃষ্টি মাত্র বিবমিষার উদ্বেক। বমনের বেগে শ্লেষ্মা উঠে। স্তম্ভপায়ী শিশু স্তম্ভ সহ্য করিতে পারে না, পান মাত্র বেগের সহিত উঠিয়া যায় এবং পরে শিশু দুর্ভলতা বশতঃ নিদ্রালু হয়। প্রচণ্ড বেগে ছানা বাঁধা দুগ্ধ ও পনীরবৎ পঁদার্থের বমন।

উদর ১—উদরশূলে বমন ও শিরোগূর্ণন হয় এবং দৌর্ভল্য জন্মে।

চিকিৎসা ।

বমন বা ভম্বি ১—শিশুদিগের বমন নিবারণের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে শিশু বেগের সহিত সবুজ বর্ণের অতি বৃহৎ ছফ্কাপের বমনান্তর দুর্ভলতা বশতঃ নিদ্রিত হইয়া

পড়ে কিন্তু কিছুকাল পরেই ক্ষুধায় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং দ্রব পান করিলেই পূর্ববৎ বমন হইয়া যায় । বিবিধা বর্জনান থাকায় শিশুর মুখাকৃতির আকৃষ্টবৎ দৃশ্য ।

দস্তোদগ্নাবিকারেও ইথুসা অবস্থাবিশেষে আমা-
দিগের সাহায্যকারী ঔষধ । দস্তমাড়ি ক্ষীত ও লোহিত বর্ণ হইলে যদি উপরি উক্ত বৃহৎ দ্রব চাপের বমন হয়, তাহাতে ইহা অতি শীঘ্র শিশুর রোগারোগা সাধনে সমর্থ ।

২ । ইথ্রাছি ক্রকেটা (*Cenanthé Crocata*) ।

উপাচয় ।—জনসংস্পর্শে ইহার সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি ।

তুলনীয়া ঔষধ ।—এগারি, সিকু, ষ্ট্রাম, হাইড্রা এসি ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—আর্থেলিকের জাতীয় অধিকাংশ ঔষধই বিষগুণ বিশিষ্ট হইলেও ইথ্রাছি ক্রকেটা ক্ষীণতর বিষ গুণযুক্ত বস্তু । ইহা মস্তিষ্কমেরুজ্জয় ন্যায়ুন্মণ্ডলে অতি প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ করায় মৃগীবৎ আক্ষেপ এবং মেডুলা অবলঙ্কেটা ও তৎসম্বন্ধিত স্নায়ু পদার্থের প্রদাহ এবং কোমলতা উৎপন্ন করে ।

লক্ষণ ।

মন ।—অতিশয় মত্ততা বশতঃ উন্মত্তবৎ প্রাচণ্ড প্রলাপ ; উন্মাদ রোগ । হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য ।

স্নায়ু ।—মৃগীবৎ আক্ষেপ । ভয়াবহ সর্কাদীন আক্ষেপান্তে অচৈতন্য অথবা গভীর নিদ্রা । সর্কাদীন আক্ষেপ বা কন্ডাল্‌সনকালে শিরোগূর্ণন, উন্মত্ততা, বিবিধা, বমন, অজ্ঞানতা ও মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ বশতঃ মুখের অলীক হাস্যভাব বা “রাইসাস্‌ মার্ভনিকাস্‌” এবং চক্ষুগোলক উর্দ্ধবুর্ণিত ও তারা বিস্তৃত । হঠাৎ কন্ডাল্‌সন,

হনুস্তম্ভ এবং জিহ্বা দংশনের পর সম্পূর্ণ অচেতনাবস্থা । আক্ষেপ কালে মুখ স্ফীত ও নীলাভ ; মুখ এবং নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত মিশ্রিত বৃন্দ বৃন্দ নির্গত ; আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস ; অজ্ঞানতা ; নাড়ীর স্ফীণতা এবং প্রভূত দুর্বলতা ।

চিকিৎসা ।

. কাস্মি ।—বক্ষের নিম্নভাগে শ্লেষ্মার বড় ঘড়ি ও শুভুশুভিযুক্ত বৃন্দখুক কাস্মি ইন্ড্যান্সি দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিদ্য ডাং এলেন্ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাহাতে ঘন এবং বৃন্দবৃন্দযুক্ত গম্বার নিষ্ঠূত হইয়াছিল ।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি ।—ইন্ড্যান্সি ক্রেকের লক্ষণে যেরূপ মৃগীরোগের প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ অত্র কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না । ইহার বিবলক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহা বহুবিধ মৃগীরোগে প্রযোজ্য হইতে পারে । সম্পূর্ণ চৈতন্যের লোপ, মুখের স্ফীতি এবং বৃন্দবৃন্দযুক্ত এবং ঘোর বর্ণ মুখ এবং চক্ষুতারকার অসম পার্শ্ব বিস্তৃতি, এবং আক্ষেপাবস্থায় হনুস্তম্ভ ও অঙ্গসীমার শীতলতা প্রভৃতি ইহার পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত ।

ডাং ট্যাঙ্কট ইহার বহুল ব্যবহারে যেরূপ উপকার দর্শন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

১। শতকরা ৪০ হইতে ৫০ সংখ্যক রোগীর ফিটের প্রবলতার হ্রাস হয় ।

২। কন্ভাল্‌সনের গুরুত্ব কমিয়া যায় ।

৩। ফিটের পূর্বের উন্মাদবৎ লক্ষণের হ্রাস হয় ।

৪। ফিটের পনের নিদ্রাহীনতা, অজ্ঞানতা এবং অস্বাসনা-
ভাবের হ্রাস হ্রাস এবং দুর্বলতার লক্ষণ অধিককাল স্থায়ী হয় না ।

৫। ইন্ডাষ্টি দ্বারা চিকিৎসিত রোগী পূর্ববৎ উত্তেজনাপ্রবণ,
সন্ধিগুচিত এবং দোষ অনুসন্ধিৎসু থাকে না ।

৬। রোগীকে সহজে শুশ্রূষাদি যত্ন করা যায় ।

ডাং ডিউই মৃগী রোগে ইন্ডাষ্টি ক্রোকেটার সহজে যে
বহুদশিতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফল এই যে ইহার ৩^২ অথবা ৬^২
ক্রম মূল অরিষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ এবং ইহা দ্বারা আরোগ্য
রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে । ভীতি অথবা অন্ত্রবিধ মান-
সিকভাববৈপরীত্য জনিত মৃগীরোগে ফিটপরম্পরার আক্রমণ দ্রুত গতিতে
হইলে, এবং “পেটিট মল” বা মূত্র অপস্মার, যাহাতে রোগী মুহূর্তকালের
জন্ত চেতনাহীন থাকিয়া অচিরাৎ অবলম্বিত কার্য দ্বারা পুনরারম্ভ করে,
তাহাতে আর্টিনিসিহ্না ভলুপারিস্ দ্বারা বিশেষ ফললাভ
হয় । আর্টিনিসিহ্না এবসিন্হিহ্নাম্ এবং সোলেননাম্
কেবলিনেনেন্স্ দ্বারাও কতিপয় মৃগীরোগ আরোগ্য হইয়াছে ।
ডাং ইমনস্ পেমের মতে সোলেননাম্ দ্বারা মৃগীরোগের ফিটের
সংখ্যার আশ্চর্য্য হ্রাস হইয়া থাকে । ডাং হেল্‌বার্টও ইহার প্রশংসা
করিয়াছেন । বিষাদলক্ষণ ইহার প্রদর্শক ।

ভার্বিণা হেপ্টেটা—ইহাও মৃগীরোগে উপকারী, কিন্তু ইহার
কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না ।

ইণ্ডিগো—বোষ্টনের ডাং কন্ডি ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন ।

৩। ইরিঞ্জিয়াম্ একয়াটিকাম্ (*Eryngium Aquaticum*) ।

সাধারণ ত্রিহ্না ।—জননেদ্রিয়ে ইরিঞ্জিয়াম্ একয়াটিকামের
প্রধান ক্রিয়া হওয়ার ইহা কামেছার অবসাদ এবং সঙ্গমশক্তির দুর্বলতা

উৎপন্ন করে । ইহা শ্বাসযন্ত্র এবং মূত্রযন্ত্রপথের স্নেহিক বিধি আক্রমণ করায় তাহাদিগের উত্তেজনা ও প্রতিশ্রায়িক প্রদাহ করে ।

লক্ষণ ।

শ্বাসযন্ত্র :- কুদ্র কুদ্র শ্বাসক্বেকে কাসি হইলে সাদাটে পীত বর্ণের ঘন ও মৃত্যাকার ও অত্যন্ত স্লেয়া উঠে ।

মূত্রযন্ত্র :- পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছার সহিত অত্যন্ত পরিমাণে মূত্র-ত্যাগকালে মূত্রনাগীতে জালা এবং জালাযুক্ত চন্‌চনি ।

জন্মনেন্দ্রিয় :- কামেচ্ছার লোপের পর তাহা পুনরুত্তেজিত হইলে রোগী অস্বীল স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নদোষ হয় ; সামান্য কারণেই রেতঃখলন হইয়া যায় ।

চিকিৎসা ।

শুক্রমেহ বা স্পাস্মাটরিয়া :- রেতঃ সঞ্চয় দৌৰ্ব্ব-ল্যেই ইন্ডিঞ্জিফ্রাম একস্মাটিকামের প্রধান প্রয়োগিতা । অতিরিক্ত হস্তমৈথুন জন্ত রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া গণ্য । দিবস এবং রজনী যে কেন সময়ে লিঙ্কোথান ব্যতীতই সামান্য কারণে শুক্রক্ষরণ ।

মূত্রস্থানী এবং বায়ুনালাীর (Bronchi) প্রতি-শ্চায় রোগেও ইহার ফলবন্তা শ্রুত হওয়া যায় ।

৪ । এসাকিটিডা (Asafœtida) ।

সম্প্রস্ক :- এসাকিটিডার কার্যপ্রতিবেদক—কষ্টিক, ক্যান্দ, লিঙ্ক, মার্ক, পাল্‌স্‌ । ইহার অপব্যবহার হইলে বৈছ্যতিক

শ্রোত বা ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রয়োগ তাহার কুফল সংশোধন করিতে পারে।

এসফিটিডা যাহার কার্যপ্রতিষেধক—মার্ক, পাল্‌স।

সাপ্রান্ননে ক্রিয়মাণঃ—এসফিটিডার ক্রিয়া বিশেষভাবে স্ত্রী-জননেদ্রিয় এবং শ্বাসযন্ত্র সংস্থষ্ট স্নায়ুগুণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার যে সকল রোগলক্ষণ জন্মে তাহা অপ্রাধিকার উত্তেজনা, গুল্মবায়ু, তাণ্ডব এবং এজমা বা হাঁপানি প্রভৃতি রোগের ছায়া স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ইহা গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, শ্লেষ্মাপূর্ণ, স্থূলকায় এবং অসাবধান শিশুদিগের রোগের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থাবিশেষে গ্রহিবিবৃদ্ধি, স্নায়ুশূল এবং অস্থিরোগ প্রভৃতি আরোগ্য করে।

লক্ষণ।

মনঃ— দুর্মতি বা বদখেয়াল ; খিটখিটে ; আশঙ্কাম্বিত।

মস্তকঃ—ললাটপ্রদেশ অভ্যন্তর হইতে বহির্দেশাভিমুখে চাপিত করার ত্রায় বেদনা। ললাটের বাম পার্শ্বের উচ্চতর স্থানের গভীর দেশে একটি মাত্র স্থিতি বিদ্ধ হওয়ার ত্রায় বেদনা। মস্তক বা ললাট-পার্শ্বে আকৃষ্টতাসহ ছিপি বসানের ত্রায় বেদনা ; অধিকাংশ স্থলে বাম পার্শ্বে। দক্ষিণ কর্ণের উর্দ্ধের আকৃষ্টতা, স্থিতিবেধের ত্রায় বেদনায় পরিবর্তিত।

স্নায়ুঃ—গুল্মবায়ুৎ লক্ষণ জন্মিলে গলাভ্যন্তর ও অন্ত্রনাদী প্রদেশে অভ্যন্ত কষ্ট। পেশীর আনর্জন ও কাঁকি। তাণ্ডব রোগবৎ লক্ষণ। শরীরাকার কুৎসিৎ।

বেদনায় অসাড়তা জন্মে। পেশীতে জালাযুক্ত, চাপবৎ ও খোঁচার ত্রায় বেদনা। শরীর চূর্ণ করার ত্রায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি। সম্পূর্ণ শরীরেই অত্যধিক গুরুত্ব। স্ফাগ্র কাঠখণ্ড বেঁধার ত্রায় বেদনা।

চক্ষুঃ ।—উপদংশ জন্তু উপতারার প্রদাহ জন্মিলে রজনীতে মস্তকের চতুর্দিকে দপ্দপানি বেদনা। চক্ষুর কালা ক্ষেত্রের বা কর্ণীয়ার উপরি ভাগে অতি বিস্তৃত ক্ষত হওয়ায় জালা, খোঁচানি অথবা অভ্যন্তর হইতে বহির্দিগাভিমুখীন চাপবৎ বেদনার বিশ্রামে এবং চাপে উপশম। দক্ষিণ চক্ষু চুলকায়। চক্ষুগোলক জালা করে। চক্ষুর উর্দ্ধপ্রদেশে পাশাপাশি ভাবে চিমেটি কাটা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। জর-উর্দ্ধে গর্ভ করার স্থায় কঠিন বেদনা।

নাসিকা ।—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ স্রাবের নিঃসরণ, নাসিকাস্থি ক্ষীত ও প্রদাহযুক্ত; অস্থিক্ষত জন্মে।

শ্রাসহস্র ।—বক্ষের আক্ষেপিক আকৃষ্টতা থাকায় বোধ হয় যেন ফুসফুস সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করা বাইবে না। বক্ষের ময়লাদায়ক চাপবৎ এবং কনকনানি বেদনা। বক্ষের অভ্যন্তর হইতে বাহিরেভিমুখীন চাপবোধ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—উপবেশনকালে থর থর হৃৎকম্প এবং ক্ষুদ্র নাড়ী, ঝরিত গতিবিশিষ্ট ও অনিয়মিত থাকে।

গলাভ্যন্তর ।—মুখ, গলাভ্যন্তর এবং অন্ননালীর শুষ্কতা। আমাশয় হইতে গলাভ্যন্তরে একটি গোলাকার পিণ্ড উৎথিত হওয়ার অনুভূতি হইলে রোগী বারম্বার গলাধঃকরণ ক্রিয়া দ্বারা তাহা অধঃ রাখিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য এবং সময়ে সময়ে তাহাতে শ্বাসকষ্ট জন্মে; অপস্মার বায়ুর গুল্ম। অন্ননালীতে অনুভূতি জন্মে যেন তাহার তরঙ্গায়িতগতি (Peristaltic motion) অধঃ হইতে উর্দ্ধদিকে হইতেছে।

আমাশয় ।—আমাশয়োর্ধ্বের কোটরস্থানে স্পন্দন। আমাশয় ও অয়ের ক্ষীতি জন্মিলে বোধ হয় যেন অন্ননালীর আক্ষেপিক ক্রিয়া বশতঃ তরঙ্গায়িতগতি উন্টা দিকে হইতেছে। উদ্বাগর রক্তনর ভ্রাণযুক্ত এবং কটু, তীব্র অথবা পচা আশ্বাদযুক্ত। উদ্বাগর উঠে কিন্তু বাতকর্ম্ম মোটেই হয় না।

উদর :—অত্যন্ত উদরক্ষাতি। আমাশয়প্রদেশে ও সমগ্র উদরে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার স্থায় পূর্ণতা বোধ হইলে আমাশয়ে পূর্ণতা থাকে এবং উদগার উঠে। উদরপেশী অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট হইলে উদরপার্শ্বে কন্কন্ করে। উদরে কামড়ানি বেদনা হইলে বায়ু নির্গত হয়। শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার স্থায় উদরে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন উদরাময় জন্মিবে এবং তাহাতে কাকের স্থায় অতি ক্ষুধার উৎপত্তি।

মূত্রনালী :—মূত্র উষ্ণ এবং নাসিকায় জালাযুক্ত চন্চনিভাব-উৎপাদক ভ্রাণবিশিষ্ট।

স্ত্রীজননেত্রিয় :—জরায়ু প্রদেশে প্রসববেদনার স্থায় বেদনা হইলে তাহা কর্তন করা ও ঠেলামারার প্রকৃতি ধারণ করে। প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা এবং ভগ্নক শ্বেতপ্রদর। জননেত্রিয়ের ক্ষাতি এবং প্রদাহ।

অক্ষ :—উচ্চ ও কঠিন পার্শ্ববিশিষ্ট, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং সহজেই রক্তস্রাবের প্রকৃতিযুক্ত ক্ষতবিশিষ্ট এবং তাহা হইতে প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা, ভগ্নক এবং কল্তানির স্থায় স্রাবও নিঃসৃত হইতে পারে।

চিকিৎসা।

শুক্রবায়ুরোগ বা ত্রিষ্টিরিহা :—এসাকিটিডার শুক্রবায়ুরোগেও অত্যন্ত কতিপয় ঔষধের স্থায় শুক্র বা বাত-শিলার উৎপত্তি, বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে। অভ্যন্তর পলদেশে উপরি উক্তরূপ বায়ুর গোলার বর্তমানতার অনুভূতিই এসাকিটিডার প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। অল্পের কোন প্রকার অভ্যন্ত স্রাব রোধ ঘটিলেও যে, এইরূপ বায়ুরোগের লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা শিক্ষার্থীদের স্মরণ রাখা উচিত। উদরে বায়ুসঞ্চিত হওয়া ইহার অত্যন্ত প্রধান লক্ষণ; তাহার উর্দ্ধ গতিতে

শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলতঃ আমাশয় হইতে এই উর্দ্ধগামী বায়ু গলদেশে উথিত হওয়াতেই উপরি উক্ত গুল্মের অনুভূতি, এবং অধিকতর আহার ও শরীর চালনায় তাহার বৃদ্ধি। ইহা একরূপ ফাটিয়া যাওয়ার ছায় অনুভূতি, বোধ হয় যেন সকলই বেগে ফাটিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। উপরিউক্ত কারণেই গুল্মবায়ুঘটিত উদরশূলে **এসাক্সিটিডা** দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া নিউক্লিওটিকা—উপরি উক্ত ঔষধের কোন কোন লক্ষণ **ম্যাগ্নেসিয়া নিউক্লিও** দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতেও বায়ু সঞ্চিত হয় এবং বলের আকারে তাহা গলদেশে উঠিলে শ্বাসরোধের উপক্রমের উদ্যোগে উপশম থাকে। **এসাক্সিরোগী** অনবরত গিলিয়া গোলা নিম্নে রাখিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতেই তাহার শ্বাসকষ্ট স্বীকৃত পায়। **এসাক্সি** রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উৎকর্ষায়ুক্ত এবং তাহার মানসিক লক্ষণ পরিবর্তনশীল। ইহাতে পেশীর ঝাঁকি ও আনন্দন দৃষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণ শরীর অস্বাভাবিকরূপে স্পর্শসহিষ্ণু থাকে। কোন প্রকার স্রাবরোধ বশতঃ গুল্মবায়ু রোগে প্রায়শঃ **এসাক্সি** প্রদর্শিত হয়। গলদেশের লক্ষণের প্রাধান্য সর্ব্ব স্থলেই ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চক্ষু প্রদাহ—আইরাইটিস্ বা উপতারা-প্রদাহ :—**এসাক্সিটিডা** চক্ষুর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। পারদের অপব্যবহার, বিশেষতঃ উপদংশরোগে পারদের অপব্যবহার জন্য আইরাইটিস্‌রোগ সহ চক্ষুর চতুর্দিকের অস্থিতে জ্বালা, দপ্দপানি বেদনা এবং টাটানি থাকিলে **এসাক্সি** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এস্থলে **অরান্ন** ইহার সহিত তুলনার যোগ্য। তাপে **অরান্নের** এবং চক্ষুগোলকে চাপ দিলে **এসাক্সি** রোগের উপশম হয়।

অস্থিরোগ—অস্থিক্ষয় বা কেরিজ্‌—অস্থিক্ষয়-রোগে দুর্গন্ধস্রাব এবং ক্ষতের চতুর্দিকে অসহনীয় টাটানি থাকিলে **এসাকিটিড** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাতে টিবিয়া বা জঙ্ঘার বৃহত্তর অস্থির ক্ষতের এতাদৃশ টাটানি হয় যে, রোগী তদুপরি ঔষধাদির প্রয়োগও সহ করিতে পারে না।

ষ্ট্রিনশিয়ানা কার্বনিকা—লঙ্গ বোনস্ বা দীর্ঘাস্থির ক্ষতরোগে ক্ষয়োৎপাদক উদরাময় জন্মিলে **ষ্ট্রিনশিয়ানা** উপকারী। ইহার অস্থিক্ষতের স্রাব সহ অস্থিখণ্ড নির্গত হয়।

ষ্ট্রিলিঞ্জিয়া—দীর্ঘাস্থির উপদংশজ অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি এবং অস্থি-প্রদাহরোগে যন্ত্রণাদির রজনীতে এবং সিক্ত দিনে বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা সুফল দর্শে। নাতিপুরাতন বা দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশজ আব বা নোড রোগ (node) আরোগ্যে ইহা মহৌষধ।

উপদংশ রোগ বা সিম্ফলিস্—পায়ের নলির বা শিনবোনের (shin bone) উপদংশ রোগে রজনীতে বেদনা হইলে **এসাকিটিড** উপকারী। পায়ের নলিতে ক্ষত হইলে স্পর্শ-সহিষ্ণু বেদনা জন্মে এবং তাহা হইতে পাতলা, দুর্গন্ধ পৃথনিঃসরণ হয়। উপদংশজ অস্থিক্ষত ও অস্থিগুতা বা নিক্রোসিসরোগে রজনীতে অত্যধিক বেদনা থাকিলে **এসাকি** প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে।

মেজিফ্রিয়াম—উপদংশরোগে রজনীতে অস্থির বেদনা হইলে তন্নিবারণে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ; পায়ের নলীর অস্থিবেষ্ট-ঝিল্লির উপদংশজ প্রদাহে, অক্রান্ত স্থান ক্ষীত হয় ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব দেশ সামাগ্র স্পর্শই অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত থাকে। উপদংশজ স্নায়ুশূল এবং পৃথগ্‌টিকাতেও ইহা উপকারী।

ষ্ট্রিলিঞ্জিয়া—অধিকাংশ স্থলে দীর্ঘাস্থির অতি কঠিন বেদনায়

এবং পায়ের নলীর ও মস্তকের অস্থির অর্কুদ বা নোডের ভ্রমাবহ যন্ত্রণায় ইহা উপকারী ।

৫। কানায়াম্ (Conium) ।

প্রতিনাম ১—কনায়াম্ ম্যাকুলেটাম্ ।

প্রস্ফোপরূপ ১—টাটকা চারাগাছের অরিষ্ট বা টিংচার ।

সম্প্রক্ক ১—কনায়াম্ যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—নাই এসি ।

কনায়ামের যাহা কার্য্য প্রতিষেধক—কফিয়া, নাই এসি, নাই স্পি-ডাল্ ।

সাম্প্রাধরণ ত্রিক্রিয়া ১—কনায়াম্ গতিপ্রদ স্নায়ুসূত্র, বিশেষতঃ তাহাদিগের সীমান্ত প্রদেশের, আক্রমণ দ্বারা পক্ষাঘাতিক অবস্থা উপন্ন করে। ইহা মস্তিষ্কের অসাড়তা উপন্ন করার শিরোত্বর্ন, চক্ষু-তারকার বিস্তৃতি এবং সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ পর্য্যন্ত জন্মে। গ্রন্থিমণ্ডলে ইহার বিশেষ কার্য্য হওয়ায় তাহার রক্তপূর্ণতা, দড়কচড়াভাব এবং গ্রন্থির উপাদানের যান্ত্রিক পরিবর্তন সংসাধিত হয়। গ্রন্থিতে শেযোক্ত প্রকার কার্য্য হওয়ায় গ্রন্থির গণ্ডমালাবিকারে এবং কৰ্কট বা ক্যান্সার রোগে ইহা দ্বারা আমরা মহত্বপকার পাইয়া থাকি। কনায়াম্ ঔষধের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধ পুরুষ, কঠিনশরীর এবং গণ্ডমালা ও কৰ্কটরোগগ্রস্ত ব্যক্তির এবং যে সকল শিশুর অকালবৃদ্ধত্ব জন্মিয়াছে তাহাদিগের রোগে উপযোগী ।

লক্ষণ ।

অন্ন ১—প্রলাপ। কুস্বভাববিশিষ্ট বা বদ্ মেজাজী এবং হ্রাশিত মানসিক ভাব। চিন্তোন্নততা ঘটিত অবসাদ এবং ওদাদীত্ব। মানসিক চেষ্টা রক্ষা করিয়া যাওয়ার অসামর্থ্য। স্মরণশক্তিহীনতা। কার্য্যে প্রবৃত্তি-

হীনতা । বুদ্ধিহীনতা ; পঠিত বিষয় বৃথিতে কষ্ট । মনুষ্যসঙ্গ করিতে অথবা তাহাদিগের কথা শুনিতে অনিচ্ছা । তাহাদিগকে ভৎসনা করার প্রবৃত্তি ।

মস্তক ১—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোথানে, ভ্রমণ কালে, বিশেষতঃ শয়নে ও শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তনকালেও শিরোধ্বনি । মস্তকে গুরুত্ব । ভ্রুপ্রদেশে ও নাসিকামূলে অবিশ্রান্ত বিশৃঙ্খলভাব । মস্তকে সৃচিবৈধার ছায়, ফাটিয়া যাওয়ার ছায় এবং ছুরিকাঘাতাদির ছায় নানাবিধ বেদনা ।

স্নানু ১—সর্কাস্তান কম্প । সর্কাস্তান আক্ষেপে স্বাসরোধের আশঙ্কা । সহজেই শ্রান্তি । ভ্রমণকালে হঠাৎ শক্তিহানি ঘটিলে উপবেশনের ইচ্ছা । আক্ষেপ ব্যতীতই পেশীর পক্ষাঘাত । রোগী শক্তিহীন ও মুছার ভাবগুরু, অল্প ভ্রমণেই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত । প্রত্যুষে শব্যায় থাকিতে পীড়িত ও মুছার ভাব বিশিষ্ট ; মুছার আক্রমণ ।

মুখমণ্ডল ১—মূর্ছণ ও শীতাত ; পাণ্ডুর ; ঘোর লোহিত ও স্ফাত । রক্তনীতে মুখে ছলবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা । মুখমণ্ডলোপরি সিক্ত এবং বিস্তারশীল দক্ষ । ওষ্ঠে জ্বালা ও তীরবেধবৎ বেদনা, হনুনিম্ন বা সাবম্যাক্লারিগ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন ।

চক্ষু ১—দৃষ্টিদৌর্ভল্যা । চক্ষুর দুর্বলতা ও বলহান ভাব হইলে শিরোধ্বনি এবং দৌর্ভল্যা, বিশেষতঃ হস্ত এবং পদের দুর্বলতা, রোগী চলিতে মাতালের ছায় টলে । চক্ষুতে জ্বালা । কনৌনিকার বিসৃত্তি । চক্ষুপত্রের উর্দ্ধপ্রদেশ জ্বালা করে । চক্ষুর শুভ ক্ষেত্র পীতাত । চক্ষুপত্র ভার বস্ত দ্বারা চাপিত হওয়ায় যেন কষ্টে উত্তোলন করিতে পারা যায় এবং নিত্রা যাইবার আবশ্যিকতা জন্মে । রোগী ধীরতা সহ চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের জল্প উপযোগী করিয়া লয় ।

কর্ণ ১—কর্ণে টং টং, গুণ গুণ এবং উচ্চ রব প্রভৃতি। কর্ণে এবং কর্ণের চতুর্দিকে সূচিবোধবৎ বেদনা। নাক ঝাড়িলে তাহা বন্ধ থাকার শ্রায় বোধ। কর্ণমল রক্তের শ্রায় লাল।

শ্রাসযন্ত্র ১—নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব। স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে কোন গুরু স্থান বিড়বিড় করায় প্রায় অবিশ্রান্ত গুরু কাসির উদ্ভেজনা। প্রচণ্ড, আক্ষোপক গুরু কাসি প্রায়ই কেবল দিবসে অথবা রজনীতে প্রথম শয়নকালে হইয়া থাকে। উপবিষ্টাবস্থায় ষ্টার্নাম বা বুক্কাণ্ড হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কোন ধারাল অস্ত্র ঋজুভাবে বক্ষভেদ করিয়া সবলে প্রবেশ করার শ্রায় বেদনা। ভ্রমণকালে প্রত্যেক শ্বাসগ্রহণে দক্ষিণ বক্ষের স্তন সন্নিহিত স্থানে প্রচণ্ড সূচিবোধবৎ বেদনার হস্ত দ্বারা গুরু চাপ দিলে উপশম।

হৃৎশিথ ১—হৃৎকম্প; স্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট। কিছু পান করিলে প্রচণ্ড হৃৎকম্প। নাড়ীস্পন্দন পরস্পর অসমশক্তিবিশিষ্ট এবং কখন কখন তাহার স্পন্দনের নিয়মও ভঙ্গ হয়; দ্বি-পত্র বা মাইট্রাল হৃৎকপাটের অসম্পূর্ণতা।

মুখাভ্যন্তর ১—টনসিলগ্রন্থির প্রদাহ। জিহ্বার পক্ষাঘাত হওয়ায় কথা কহিতে কষ্ট।

গলাভ্যন্তর ১—গলা চুলকাইলে কাসির উদ্বেক।

উদর ১—বাম কুক্ষিতে সূচিবোধবৎ বেদনা। নিম্নোদরে প্রসবাস্তিক বা ভাদালির বেদনার শ্রায় সংকোচক বেদনা হওয়ায় মলবেগ উপস্থিত হয়।

মলত্যাগ ১—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ। কোষ্ঠবন্ধ। প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর সৰ্ব্বমল দৌর্ভলা।

মূত্রবন্ধ ১—রজনীতে বারম্বার মূত্রস্রাব । মূত্রত্যাগান্তে মূত্র ঝরিতে থাকে । মূত্রত্যাগকালে ও তাহার পরে জ্বালা হয় । মূত্রস্রোতের হঠাৎ অবরোধ ঘটে এবং অল্পকাল রুদ্ধ থাকার পর তাহা পুনরায় বহিতে আরম্ভ করে ।

পুংজলনেনক্রিয় ১—লিঙ্গোথানরহিত কামেচ্ছা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কৌতুক করিতে করিতেও রেতঃস্রবণ । লিঙ্গাগ্রভ্রকের চুলকনা হইলে কামবিষয়ক চিন্তা বাতীতই শরীরাবস্থাপনের প্রত্যেক পরিবর্তনে শুক্রস্থলন হয় । অণ্ডকোষের স্ফীতি ।

স্ত্রীজলনেনক্রিয় ১—যোনিয় গভীর স্থানে কঠিন চুলকনা । শ্বেত প্রদরস্রাবের পূর্বে কটিদেশের দুর্বলতা এবং পক্ষাঘাতের অনুভূতি ; কটির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রসববেদনার স্থায় সংকোচক বেদনা আগিলে ঘন চঞ্চের নাগ্য স্রাব ; শুভ্র ও তীব্র শ্লেষ্মাস্রাবে জ্বালা উপস্থিত করে । ঋতুরোধ ঘটে অথবা ঋতু বিলম্ব হয় । জরায়ু, অণ্ডাধার এবং স্তনের দড়কচড়াভাব । ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা । ঋতুস্রাবের পূর্বে স্তনের টাটানি ও স্ফীতি । কাণেচ্ছার প্রবলতা জন্মিলে স্তন কুঁচকিয়া যায় । বাম স্তনে সূচিবেধবৎ বেদনা । অণ্ডঃস্রাবস্থায় ভয়াবহ বিবমিষা ও বমন । স্তনে অর্কদ জন্মিলে বিদ্ধবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং গ্রহি স্পর্শে বেদনায়ুক্ত থাকে ।

পুস্ত্র ১—অসফলকাস্তিষ্ণয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা । দণ্ডায়মানাবস্থায় কটিপশ্চাদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে কটিকশেককাস্তির মধ্য দিয়া আকৃষ্টতা বোধ ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ১—সকল অঙ্গেরই কম্প । হস্তাঙ্গুলিপৃষ্ঠের চুলকনা । অঙ্গাদি চালনা করিতে কষ্ট ; রোগী চলিতে পারে না । দৌর্কলোয় অনুভূতি হওয়ান্ন ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুর কম্পও হইতে পারে । প্রথমে নিম্নাঙ্গের এবং পরে উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে ।

চিকিৎসা ।

বিষাদোন্মত্ততা বা হাইপকণ্ড্রোসিস :- কাম-
প্রবৃত্তির অপরিমিত পারিতৃপ্ত সাধন অথবা অববাহিতাবস্থায় শুক্রধারণের
চেষ্ঠা কন্যাস্থানের বিষাদোন্মত্ততা বা মানসিক অবসাদবায়ুর কারণ ।
ইহার ক্রিয়ায় আমরা অবসাদবায়ু ব সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক দেখিতে পাই । রোগী
যাহার পর নাই দুঃখভারাক্রান্ত গোধ করে ।

জিঙ্ক অক্সাইড—ইহা কন্যাস্থানের তুণ্য ঔষধ ।
প্রভেদ এই যে কন্যাই সম্পূর্ণরূপ অবসাদকর, জিঙ্কাম উত্তেজনা-
মিশ্রিত অবসাদকর ভাৱের ঔষধ ।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো :- বৃদ্ধ এবং অত্যধিক তাম্র-
কুটসেণী ব্যক্তিদিগের শিরোঘূর্ণনরোগে কন্যাস্থান উপযোগী
ঔষধ । মস্তিষ্কের রক্তহীনতা জন্ম রোগ হইলেও স্থলবিশেষে ইহা দ্বারা
উপকার হয় । একরূপ শিরোঘূর্ণনরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট পদার্থের
দিকে অনিমেষ তাকাইয়া থাকিলে বোধ করে যেন তাহা চক্রবৎ ঘূর্ণিত
হইতেছে । গাত্রোপ্থান করিতে অথবা সিঁড়ি দিয়া নামিতে অত্যন্ত
দুর্জলতা নিবন্ধন নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি জন্মে । মস্তিষ্কে অসাড়তা
বোধ হওয়ায় অজ্ঞানবৎ অহুত্বের শব্দনাবস্থায় অথবা শব্দ্যায়
পার্শ্বপরিবর্তন করিতে বৃদ্ধি হয় ।

এম্ব্রা প্রিসিনা—বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোঘূর্ণনে ইহা
উপকারী ।

আইওডিন—ইহাও বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের পুরাতন রক্তাধিক্য
নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন নিবারণ করিতে সমর্থ ।

কাসি বা কফ :- ক্ষয়কাসের রোগী গয়ার উঠাইয়া ফেলিতে
না পারায় গগিতে বাধ্য হইলে কন্যাস্থান উপকারী । ডাং ফ্যারিংটন

বলেন “দিবাভাগের অতি যন্ত্রণাকর কাপিতে ইহা ফলপ্রদ” । ডাং ডিউইর মতে অতি যন্ত্রণাকর শুষ্ক কাসির শয়নে, সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি হইলে ইহা উপযোগী ।

হ্রোপ-হ্রুপিওদৌর্ভন্য ।—হ্রুপিওর উর্ধ্বলতা বশতঃ নাড়ী ক্ষণে পূর্ণ ও নিয়মিত এবং পরক্ষণেই অতি কোমলস্পর্শ, উর্ধ্বল এবং অনিয়মগতি হইলে কনায়াম্ হ্রুপিওপেশীর বলাধান করিয়া তাহার সংশোধন করিতে পারে । বৃদ্ধদিগের মধ্যে একরূপ ঘটনা অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে । হ্রুপিওদশে হঠাৎ বাঁকি অথবা ধাক্কা (Shock) উপস্থিত হইলে কনায়াম্, জিঙ্কাম ও অরাম্ সহ তুলনীয় হয় ।

কর্ণমূলগ্রন্থিপ্রদাহ বা মাম্পস্, প্যারটাইটিস্ ।—কর্ণমূলগ্রন্থিপ্রদাহে ক্ষীত গ্রন্থি অত্যধিক কঠিনস্পর্শ হইলে কনায়াম্ প্রযোজ্য । রোগের উপসর্গ স্বরূপ একশিরা বর্তমান থাকিলে অরাম্ ও ক্লিনেটিস্ তাহার ঔষধ ।

কোষ্ঠবন্ধ বা কনুষ্টিপেশন ।—কোষ্ঠবন্ধরোগে নাকস্ ত দ্বারা সম্পূর্ণ ফললাভ না হইলে কনায়াম্ তাহার সম্পূর্ণতা সাধন করে ।

শুক্রেমেহ বা স্পাস্মাটরিয়া ।—অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত শুক্রেমেহরোগ চিকিৎসায় কনায়াম্ সদৃশ মানসিক লক্ষণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । ইহা অতি পরিশুদ্ধ চিন্তোদ্বেগলক্ষণ উৎপন্ন করে । স্বভাবতঃ উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী শুক্রেদৌর্ভন্য বশতঃ অতিবিবলতাগ্রস্ত হয় । স্বাভাবিক কামেচ্ছার রোধ ক্রম স্বপ্নদোষ হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ ; অশুক্রেমেহে বেদনা থাকে, সামান্য উত্তেজনায় কারণ উপস্থিত হইলেই রেতঃস্ফারণ হয় । জিঙ্কানের গ্রাম ইহাতে কোন স্থানিক উত্তেজনা হয় না ;

সিন্ধিহ্মাত্তে শারীরিক উত্তাপ (Erethism) জন্মিলে সহজেই শুরু স্থলিত হয়।

মুক্তস্থলীপ্রদাহ বা সিন্ধিহ্মাত্তিস্—মুক্তস্থলীর পুরাতন প্রদাহরোগে সবিরাম মূর্ধনঃসরণ হইলে কন্যাহ্মাত্ত উপকার করিয়া থাকে। মূর্ধনোত্তে চলিতে চলিতে বন্ধ হয়, আবার চলে। ডাং ক্যারিংটন বৃদ্ধদিগের প্রস্টেটগ্রন্থিবৃদ্ধি বশতঃ রোগে ইহা দ্বারা ফললাভ করিয়াছেন।

স্ত্রীরোগ—স্তনের রক্তাধিক্য ; প্রদাহ ; অর্কবৃদ্ধ ; কক্কট বা ক্যান্দার ; আভিঘাতিক রোগ ইত্যাদি।—
স্তন সহ কন্যাহ্মাত্তের বিশেষ ক্রিয়াগত সম্বন্ধ আছে। একজন্ম ইহা স্তনের শোণিতপূর্ণতা অতি শীঘ্র বিদূরিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক শৈতাসংশ্রব নিবন্ধন গ্রন্থিপ্রদাহ জন্মিলেও ইহা তন্নিবারণে উপযোগী। স্তনান্তস্তরে কক্কটরোগের সন্দেহযুক্ত অর্কবৃদ্ধ ইহার ব্যবহারে অন্তর্দান করিয়াছে। ইহাতে স্তনে বিদ্ধ করার জায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং স্তন স্পর্শে বেদনায়ুক্ত থাকে। ডাং ডিউই এস্থলে ঔষধের ৩০ ক্রমের উপর নির্ভর করিতে বলেন। স্তনে হস্তমুষ্টিাদি দ্বারা প্রহার অথবা গুরুতর চাপ বশতঃ বিশেষ প্রকৃতির কাঠিচ্ছ এবং যাহার পর নাই স্পর্শসঙ্ঘিষ্ট বেদনা জন্মিলেও কন্যাহ্মাত্ত অধিকাংশ স্থলে তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে। স্তন এতই বেদনায়ুক্ত হয় যে রোগী তাহাতে বস্ত্রসংস্পর্শ অথবা সামান্য ঝাঁকিও সহ করিতে পারে না। এই সকল রোগে স্তনে চুলকনা হওয়া কন্যাহ্মাত্তের অগ্রতম প্রদর্শক।

গ্রন্থিরোগ—গ্রন্থিবৃদ্ধি ; গ্রন্থির অর্কবৃদ্ধ, কক্কট ;
গ্রন্থির আঘাতজ রোগ প্রভৃতি।—কন্যাহ্মাত্তের

ক্রিম্বার গ্রন্থির বিবৃদ্ধি একটি সাধারণ লক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় রোগজ গ্রন্থিবৃদ্ধি বা এডিনমেটা, কক্কট বা ক্যান্সার প্রভৃতি দ্রুত অর্কুদ এবং পেয়ণ, ঘর্ষণাদি আঘাত প্রযুক্ত গ্রন্থিবিশেষের ক্ষীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি গ্রন্থিরোগে প্রযোজিত হইয়া ইহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়াছে। আক্রান্ত গ্রন্থি প্রস্তুতবৎ কঠিনস্পর্শ হয়। এইরূপ ক্ষীতি ও কাঠিগ্র সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্তনে ও জরায়ুতে এবং অণ্ডকোষে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও কখন কখন উহাতে তীব্রবেদার হ্রায় বেদনা হইতে পারে, কিন্তু প্রায়শঃ উহা বেদনাহীন থাকে। স্ক্রাস-অর্কুদের প্রথমাবস্থায় ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। আঘাতপ্রাপ্ত গ্রন্থি প্রস্তুতবৎ কঠিন হইলে ইহা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। চর্কল ব্যক্তিদিগের কোষময় বা সেলুলার ঝিল্লির দড়কচড়াভাব, শরীর দক্ষ হওয়ার পর গ্রন্থির ক্ষীতি, বিশেষতঃ স্তনগ্রন্থির বেদনাহীন অথবা ছুরিকাঘাতের হ্রায় বেদনায়ুক্ত ক্ষীতি প্রভৃতিতেও ইহা উপকারী। ডাং ডিউক ইহার ৩০ ক্রমেরই বিশেষ পক্ষপাতী কিন্তু তাঁহার মতে ২০০ ক্রমেও কার্য হইতে পারে।

অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থির উপরি উক্ত ক্ষীতি ও অর্কুদাদি রোগ বেদনাহীন থাকে এবং বেদনায়ুক্ত হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং স্থান-পরিবর্তনশীল প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় ও রজনীতে বৃদ্ধি পায়। রোগীর উত্তেজনা-প্রবণতার ভাব ইহার প্রদর্শক। এম্পিথ্রিলিওমা শ্রেণির ক্যান্সারেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কাণ্ডুরেজ্জ—ইহা আশায়ের ক্যান্সাররোগে বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং নানাপ্রকার কার্সিনমা বা কক্কট-রোগেও ইহার ১^২ ক্রমে ব্যবহার উপকার করিয়াছে। ক্ষতযুক্ত ক্যান্সারের ও দ্রুত ক্ষতের ইহা বেদনার হ্রাসকারী ঔষধ।

ব্যারাইটা কার্ব—শরীরের স্থানে স্থানে বসাময় অর্কুদ বা ক্যাটি টিউমার জন্মিলে ব্যারাইটা কার্ব তাহার ঔষধ।

ফাইটলেস্কা—ইহাতে শরীরের বস্য বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকায় ইহা বসাময় অর্কুদ এবং স্তনের কঠিন ও বেদনাযুক্ত গুটিকাও আরোগ্য করিতে পারে।

৬। পেট্রোসিলিনাম (Petroselinum.)

ভুলনীয় ঔষধ।—ক্যান্থ', ক্যানা স্টি, কপেবা।

সাধারণ ক্রিয়া।—মূত্রনালীর শৈল্পিক ঝিল্লিতে পেট্রোসিলিনাম অতি পারিস্কুট ক্রিয়া প্রকাশ করায় তাহার উত্তেজনা এবং নাতি প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এজন্য ইহা নাতিপ্রবল পূয়মেহ বা সাব একিউট গনরিয়া এবং পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিটরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মূত্রনালী এবং জননেন্দ্রিয়।—মূত্রনালী হইতে দুগ্ধবৎ তরল পদার্থের স্রাব। মূত্রনালীমুখ শ্লেষ্মায় জুড়িয়া থাকে। মূত্রনালী হইতে পীতবর্ণের স্রাব হয়। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালী মুখসন্নিহিত নেভিকিউলার ফসা বা কোটরস্থান জালা করে। মূত্রনালীর মুখসন্নিহিত নেভিকুলার ফসাতে আকৃষ্টতা ও খোঁচানি হইলে মূত্রত্যাগান্তে তাহা কঠিনবৎ কামড়ানিতে পরিবর্তিত হয়। সম্পূর্ণ মূত্রনালীপথে বিড়বিড় ও শড়শড়ি। নেভিকুলার ফসার ঠিক পশ্চাতে চাপবোধ। নেভিকুলার ফসাতে পুনঃ পুনঃ কামোদ্দীপক স্ফুড়স্ফুড়ি। নেভিকুলার ফসা বা মূত্রনালীমুখের নিকটস্থ বিস্তৃত প্রদেশের পশ্চাতে বিড়বিড় করিলে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে। লিম্বোথান হইলে লিম্ব বক্র হইয়া যায়। প্রায়শঃই শেষ রজনীতে শুক্রক্ষরণ হয়।

চিকিৎসা ।

পূয়মেহ বা পানরিক্তা ।—সাব একুট বা নাতিপ্রবল পূয়মেহ এবং পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিটরোগ মূত্রনালীর নেভিকিলার ফসা (Navicular fossa) হইতে মূত্রস্থাদীর গ্রীবাদেশ পর্যাস্ত আক্রমণ করায় নিষ্ক্রমূলে বেদনা ও উপরি উক্ত অন্যান্য অস্বস্তিকর অনুভূতি জন্মিলে পেট্রিসিলিনাম প্রযুক্ত হয় । মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অদমনীয় মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে ।

৭ । ফেলাণ্ডিয়াম একয়াটিকাম ।

(Phelandrium Aquaticum.)

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেঙ্ক ।—যে সকল স্নায়ু মস্তক হইতে চক্ষু মধ্যে যায় তাহাদিগের আক্রমণকারী মস্তক বেদনায় ফেলাণ্ডিয়ামের কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহাতে মস্তকশীর্ষোপরি বিদীর্ণবৎ অনুভূতি জন্মে এবং চক্ষুর জালা ও জলস্রাব হয় ।

৮ । সিকুটা ভিরসা (Cicuta Virosa.)

সম্বন্ধ ।—সিকুটা বাহার কার্যপ্রতিষেধক—ওপিয়াম ।

বাহা সিকুটার কার্যপ্রতিষেধক—আণি, ওপিয়াম্ । অধিক মাত্রায় টুবাক ।

ভুলনীয় ঔষধ ।—এবসিছ, একন, বেল, কনায়, কুপ্রায়, ল্যাকেসি, হাইড্রকট ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—সিকুটা ভিরসা প্রধানতঃ স্তম্ভিক মেরুচুম্বকীয় উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করায় ধনুষ্টঙ্কার এবং মৃগীবৎ

আক্ষেপ, হ্রস্বস্তম্ভ ও স্থানিক, প্রবল ও স্থায়ী এবং ক্ষণিক বা অস্থায়ী আক্ষেপ উপস্থিত করে। ইহার ও নাক্স ভমিকার ক্রিয়ামণ্ডো অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও শেষোক্তের চৈতন্ত অক্ষুণ্ণ থাকায় এবং প্রথমোক্তের মস্তিষ্কক্রিয়ার পক্ষাঘাত বশতঃ চৈতন্তের সম্পূর্ণ অভাব হওয়ায় উভয় ঔষধ সমাকরূপে প্রভেদিত হয়।

লক্ষণ ।

মনঃ—ক্রন্দন, কেঁকানি এবং বিকট স্বরে চীৎকার। উদ্ভ্রান্ত মানসিক অবস্থা, গীত গাওয়া, হাত্তোদ্দীপক পদবিক্ষেপ এবং চীৎকারে গোলমালের উপস্থিতি। মানসিক শৈথিল্য, সৃষ্টি এবং আনন্দ। মানসিক অবসাদ, বুদ্ধিহীনতা, কল্পনার অভাব এবং চৈতন্তের লোপ। হৃৎক বিষয়ক গল্পে অত্যন্ত অভিভূতি, উৎকর্ষার ভাব। উত্তেজিত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের জল্প আশঙ্কায়িত অবস্থা।

মস্তকঃ—শিরোরঘর্ষন, শরীরঘর্ষন এবং মূত্রিকায় পতন। মস্তকের ঝাঁকি এবং আনর্জন। মস্তকপশ্চাতে কঠিন শিরঃশূল। ললাটের বহির্দেশে অজ্ঞানকর বেদনার বিশ্রামকালে বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কন্কাসন নিবন্ধন রোগ ; আক্ষেপ।

স্নায়ুঃ—সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ বা কন্ভালসন হইলে রোগী অচেতন হয় এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সম্পূর্ণ শরীর ভগ্নাবহরূপে বক্র হইতে থাকে। কন্ভালসনে শরীর পশ্চাদিকে বক্র হয়। মৃগীবৎ আক্ষেপ হইলে ডায়াক্রামপেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপ হওয়ার ঞায় আমাশয়ের স্ফাতি, হিক্কা এবং হৃদয়বিদারক চীৎকার, মুখের রক্তিনা, হ্রস্বস্তম্ভ, জ্ঞানের অভাব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোচড় ও অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। হঠাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনমনীয় ও চালনার অযোগ্য অবস্থা জন্মে। সামান্ত স্পর্শে, ঘোরোদঘাটনের শব্দে এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলায় প্রবল ও স্থায়ী

আক্ষেপ। স্বপ্নসঞ্চার (Somnambulism), স্থির দৃষ্টি এবং জ্ঞানের আংশিক অভাব। কুমির উপদ্রবকালে হঠাৎ শরীরের কাঠিঝ ঝাঁকি হইলে পরে শরীরের অত্যন্ত শিথিলতা এবং দৌকল্য জন্মে। অত্যন্ত বলক্ষয় হয়।

মুখমণ্ডল ।—মুখ লোহিতবর্ণ, পাণ্ডুর এবং মৃতবৎ দৃশ্যযুক্ত। মুখের ভ্রূবাহু অথবা হাত্তজনক ভঙ্গি। মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ।

চক্ষু ।—কোন বস্তুর প্রতি একদৃষ্টিে চাহনি। কণীনিকার বিস্মৃতি ও চেতনারাহিত্য। কণীনিকা প্রথমে সম্মুচিত পরে বিস্মৃত। দৃষ্ট-বস্তু ত্রুইটি দেখায়। দৃষ্টবস্তু পর্যায়ক্রমে নিকটে আইসে ও দূরে যায়।

মুখগাহবর ।—দন্তে দন্তে সংবদ্ধতা, হনুস্তম্ভ, দন্ত কিড়িমিড়ি। মুখে বুদবুদ উঠে।

গলাভ্যন্তর ।—বোধ যেন গলার ছিদ্র জুড়িয়া গিয়াছে, গলাধঃ-করণের ক্ষমতা থাকে না। গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা।

আমাশয় ।—অত্যন্ত তৃষ্ণা। প্রচণ্ড হিকা। কন্ভালসন হইলে বমন। আমাশয়ের হঠাৎ অবসাদিত ভাব (Shock) জন্মিলে রোগী পশ্চাৎ-পার্শ্বে বক্র হয়।

উদর ।—উদরে গড়গড়, হড়হড় ডাক। উদরের স্ফীতি ও বেদনা।

অন্ন ।—পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগ। প্রত্যবে উদরাময় হইলে অদমা মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে।

জ্বক ।—মুখমণ্ডল ও হস্তোপরি মটরের ছায় বড় বড় উদ্ভেদ স্পর্শে জ্বালাযুক্ত থাকে এবং পরে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। পূয়জননশীল উদ্ভেদ জ্বালা করে। দক্ষিণ অংসফলকাস্থির উপরিভাগে লোহিত রসবিষিকা জন্মে এবং তাহা স্পর্শ করিলে জ্বালা হয়।

চিকিৎসা ।

স্মূগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি :— সিন্‌কুটার স্মূগীরোগে শরীর হঠাৎ শক্ত হওয়ার পর ঝাঁকি এবং প্রচণ্ড বক্রতা ও অবশেষে সম্পূর্ণ বলহানি জন্মে। এই বলহানি ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে কেবল চাইনিলাম আর্সেনি-কোসাম ইহার সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত। ইহার প্রবল ও স্থায়ী (Tonic) আক্ষেপে স্ট্রিক্‌নিফার আক্ষেপের ভীতি জন্মিতে পারে; কিন্তু সিন্‌কুটার আক্ষেপকালে রোগীর চৈতন্যের অভাব বড়িয়া স্মূগীর আক্ষেপের সাদৃশ্য প্রকাশ করে; অপরে তদ্রূপ হয় না। ইহার রোগে অত্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ, হস্তস্তম্ভ, মুখমণ্ডলের ঘোর রক্তিনা, মুখে গেঁজলা উঠা এবং দেহের পশ্চাদিকে বক্রতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে। স্পর্শ প্রভৃতি আগন্তুক উত্তেজনার অসহিষ্ণুতাপ্রবণতা স্ট্রিক্‌নিফা অপেক্ষা ইহাতে স্বল্পতর বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থির চক্ষুর একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকা ইহার অত্যন্ত প্রদর্শক; আক্ষেপের পূর্বে ও পরে শরীরের কম্প এবং আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে মস্তকে অদ্ভুত প্রকারের অনুভূতি ইহার অত্যাগ্র বিশেষ লক্ষণ। ডাং বেজ্ পেশীর আক্ষেপকে কুপ্রোমেসের বিশেষ ও প্রধানতম লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ধনুষ্ঠকার বা টিটেনাস্ :— ধনুষ্ঠকারে আক্ষেপকালে শরীরের হঠাৎ কাঠিগ্ন এবং ঝাঁকি হওয়ার পর অতিশয় দুর্বলতা জন্মিলে সিন্‌কুটা বিশেষ উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে অত্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ ও হস্তস্তম্ভ জন্মে এবং স্পর্শ করিলে ফিট পুনরাগত হওয়ায় রোগী পশ্চাদিকে বক্র হইয়া যায়। অন্ননাশীর আক্ষেপ হয় এবং রোগী কোন নিদ্রিষ্ট বিন্দুর প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্ভালসন্স—সূতিকাক্ষেপ ; কৃমিআক্ষেপ ইত্যাদি ।—আমরা ইতিপূর্বে মৃগী এবং ধনুষ্টকার প্রভৃতি রোগে সিন্ফুটোর যে প্রকৃতির আক্ষেপ এবং তদানুসঙ্গিক লক্ষণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি কৃমিরোগ, জ্বর, সূতিকাবস্থা কিম্বা অল্প যে কোন কারণে কি অবস্থায় উপরি উক্তরূপ আক্ষেপাদি উপস্থিত হইলে সিন্ফুটা দ্বারা তাহাতে উপকার প্রত্যাশা করা যায় ।

ত্বকরোগ—অর্কুদরোগ—এপিথ্যালিয়মা ।—এপিথ্যালিয়মাক্যান্সার বা মারাত্মক কৰ্কটরোগের অর্কুদ মধুর গায় বর্ণবিশিষ্ট নামড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে সিন্ফুটা আরোগ্য করিতে পারে । ফলতঃ ডাং ফ্যারিংটন দুইটি এই প্রকারের ক্যান্সাররোগ প্রকৃত পক্ষেই ইহা দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ।

মুখের চতুর্পার্শ্বের উদ্ভেদ মধুর গায় হরিদ্রাভ মামড়িতে পরিণত হওয়ায় তাহার সহিত শর্শু জুড়িয়া যাইলে সিন্ফুটা তাহা দূর করিতে সমর্থ ।

৯ । হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা (Hydrocotyle.) ।

তুলনীল ত্বক ১—আর্স, সিলিক, লাইক ।

সাধারণ শিলা ১—হাইড্রকটাইল ত্বকে অতীব গুরুতর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বিশেষতা লাভ করিয়াছে । ইহা ত্বকে নানাপ্রকার কুষ্ঠ, মহাব্যাধি বা লেপ্রসি, লুপাস নামক কঠিন ক্ষত এবং অন্যান্য গুরুতর রোগের গায় উদ্ভেদাদি লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে ।

ইহার রোগে রোগীর অভ্যস্ত মানসিক অবসাদ ও বিষণ্ণতা জন্মে । যেন একটা সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ও অবসন্নতার ভাব উপস্থিত হয় । রোগী ক্লান্ত বোধ করে এবং তাহার পেশীমণ্ডলীতে ঘুষ্ঠভাব জন্মে ।

লক্ষণ ।

মূত্রযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—মূত্রস্থানীর গ্রীবার উত্তেজনা ; জরায়ুর গ্রীবা লোহিতবর্ণ হইলে তাহাতে তাপ এবং যোনিতে চুলকনা হয় ।

ছক ১—বিসর্পবৎ লোহিতবর্ণ । প্রায় সম্পূর্ণ চক্রাকার ছককলঙ্কের শঙ্কযুক্ত পার্শ্ব কিঞ্চিৎ উন্নত থাকে । উভয় জজ্বাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ পীতবর্ণ স্থানে এবং মুখে পীড়কা জন্মে । বক্ষে পুয়গুটিকা । ভিন্ন ভিন্ন শরীর স্থানে চিমাটি কাটার গ্রায় অনুভূতি । অনেক স্থানে অসহনীয় চুলকনা । প্রচুর ঘর্ম ।

চিকিৎসা ।

লেপ্রসি বা মহাব্যাধি ; টুবার্কুলার বা গুটিকামংস্কট লেপ্রসি বা কুষ্ঠরোগ ; গোদ ; লুপাস একজুডেনস বা মারাত্মক ক্ষত বিশেষ ; পুরাতন কাউর প্রভৃতি নানাপ্রকার ছকরোগ এবং উপছকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা প্রভৃতি হাইড্রকোটাইল দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে । ফলতঃ উপছকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা এবং তাহার স্থলনই ইহার প্রদর্শক ।

আমি কোন পরিবারস্থ চইটি ভ্রাতার টিউবার্কুলার লেপ্রসি রোগের চিকিৎসা করি । ছোট্টকে এনকার্ডিহ্যান প্রয়োগ করিয়াছিলাম । তাহাতে তাঁহার কোন ফল হয় না । অবশেষে তাঁহার ক্ষয় কাসিতে মৃত্যু ঘটে । কনিষ্ঠের শরীরের নানা স্থানে ক্ষত হইয়াছিল এবং হস্তাঙ্গুলিতেও ক্ষত ও তাহার বক্রতা জন্মিয়াছিল । হাইড্রকোটাইল ৩০ প্রয়োগে উক্ত বক্রতা ব্যতীত তাঁহার সম্পূর্ণ গাত্রেরই ক্ষত আরোগ্য হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দিত ও সুস্থবোধ করিয়া-

ছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়, মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই এবং কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই। অত্র একটি প্রায় ৪৫ বৎসর বয়স্ক রোগীর সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ মুখ, কর্ণাদি এবং জজ্বা ও পদের ত্বক কৰ্কশ, স্থূল ও বিদারণযুক্ত হইয়াছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উপত্বকেরও জ্বলন হইত। জজ্বা ও পদে শোথবৎ ক্ষাতি ছিল। হাইড্রকটাইলের প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। একটি ভদ্রলোকের প্রতি অমাবস্থা ও পূর্ণিমাতে জ্বর হইত ও তাঁহার কোরন্দ বা ফ্রটাল টিউমারের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। হাইড্রকট দ্বারা জ্বর বন্ধ এবং উক্ত টিউমারলক্ষণও নিদ্রিত হইয়াছিল। ২১৩ টি বেরিবেরির রোগীর পদের ক্ষাতি জন্ত আমি ইহার প্রয়োগ করায় তাঁহার ফল পাইয়াছিলেন। অতএব আমি বিবেচনা করি, এই প্রকার রোগে হাইড্রকটাইলের যথেষ্ট ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত।

লেখক্চার ৬২ (LECTURE LXII.)

লেগুমিনসি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয় ।

১। ডলিকস্ । ২। ফাইজস্টিগ্মা ৩। মেলি-
লটাস্ ।

১। ডলিকস্ (Dolichos Pruriens.)

ভুলনীর ঔষধ ।—ক্যাঙ্কে কা ; চেলি, হিপার সা, রেনাস্ক বা,
পড, রাস, সাল্ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ডলিকস্ যক্বে আক্রমণ করে এবং তাহার
ফলস্বরূপ ঠাণ্ডা বা জ্বিগ্গিস্, কোষ্ঠবদ্ধ এবং শুভ্রবর্ণ বিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয় ।

লক্ষণ ।

স্নায়ু ।—রসবিষিকায়ুক্ত বিসর্পিকা রোগান্তে স্নায়ুশূল ।

চক্ষু ।—পীতাত চক্ষু ।

মন ।—দন্তোদগম অথবা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ । শুভ্র-
বর্ণ বিষ্ঠা ।

স্নাসযন্ত্র ।—রজনীতে শয়ন করিলে কাদি হয় ।

হৃৎক ।—দ্রষ্টবা কোন উদ্ভেদ ব্যতীতই সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড চুল-
কনা । অঙ্গে ও বাহুতে শুষ্ক, বিসর্পিকাৎ চুল কনা ।

চিকিৎসা ।

দন্তোদগম রোগ—আম্বেক্ষপ ৩ জ্বর ।—ডাং ক্যারিং-
টন বলিয়াছেন যে “দন্তোদগমকালে জ্বর হইলে প্রথমে একমাত্র এক

নাইট প্রয়োগের পরে ডলিকস্ বাবস্থা করা উচিত ; যে স্থলে এইরূপ সাবধানতার অবলম্বন করা না হইয়াছে তখনই পরে সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ হইয়াছে” । ক্রমিসৎ স্ফষ্ট আক্ষেপেও ইহা ফলপ্রদ ।

স্মাৰ্ভা বা জ্ফণ্ডিস্—স্মাৰ্ভারোগে গুহ্মর্ণ মলত্যাগ হইলে এবং গাত্রে কঠিন চুলকনা জন্মিলে ডলিকস্ উপকারী ।

রসবিন্ধিকায়ুক্ত বিসর্পিকা বা হার্পিস্ জ্ফটার।—এ রোগে চুলকনা, জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চনচনি থাকিলে ডলিকস্ প্রযোজ্য । রোগাবস্থানে যে স্নায়ুগুল জন্মে তাহাও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে ।

২ । ফাইজস্টিগ্‌মা (Physostigma Benenosum) ।

উপচল্ল্য—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ; শ্রম করিলে ; মানসিক কার্যে ।

উপশমন—মুক্ত বায়ুতে এবং ভ্রমণে ; চক্ষু মুদ্রিত করিলে নিরুপদ্রব শাস্তির অবস্থায় থাকিলে ; উষ্ণ গৃহে বাস করিলে ; ক্যাম্ফরের স্রাণ লইলে ; আর্শিকা সেবনে ।

ভুলনীয়া ঔষধ—এগারি, এট্রপিয়াম, জেল্‌স্, জাব, নাকস্ ভ, ওপিয়াম্, ষ্ট্র্যাম, টেবেকা ।

সাধারণ ক্রিয়া—ফাইজস্টিগ্‌মা মেরুমজ্জা আক্রমণ করায় শরীর সাধারণের পক্ষাঘাত হয় এবং অনুলভব শক্তির অভাব ঘটে । স্বাদ-ক্রিয়ার পক্ষাঘাত অথবা হৃৎক্রিয়োস্তেজক হৃৎস্নায়ুগ্রন্থির পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার হ্রাস—গত্যার কারণ হয় ; জীবনের শেষদীর্ঘ পর্য্যন্ত স্পর্শানুভূতি এবং জ্ঞানশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায় । ইহা প্রথমে ক্ষুদ্রতর রক্তবহানাড়ীর সঙ্কোচন এবং পরে প্রসারণ উপন্ন করে । সেবন করাই হউক অথবা চক্ষুতে বহিঃপ্রয়োগই হউক ইহা

উপতারাশেণীর আক্ষেপ উৎপন্ন করিলে ক্ষুদ্র ও ঘন ঘন বাঁকি কিশ্বা আনর্ডন হওয়ায় কাণীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত কারণ বশতঃই ইহার ক্রিয়ায় চক্ষুর দূর ও নিকট দৃষ্টিবিষয়ক ক্রিয়া সামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে। গতিদ্রব্যায়ুসীমার পক্ষাঘাত বশতঃ স্থানিক উত্তেজনায় পেশীহস্ত্রের অবিশ্রান্ত আনর্ডন হয়। উপরিউক্ত কারণেই অনৈচ্ছিক পেশীর (Involuntary muscles) ধনুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপক অবস্থা হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রস্রাব বমন এবং বিরেচন হইতে থাকে এবং অন্ত্রে পাকলাগায় তাহা গিঁট বন্ধ হয়। ইহাতে সর্কপ্রকার স্রাবেরই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলেও চক্ষুজল এবং মুখলালার বৃদ্ধিই বিশেষতা লাভ করে। চক্ষুতেই ফাইজষ্টিগ্ণার ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কণীনিকার সংকোচন ও দৃষ্টির উপযোগী পেশীক্রিয়ার সামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা হয় এবং কাণীনিকার স্থায়ী সংকোচন ইহাতে ও ওপিয়ামে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ ।

মন ।—অসাধারণ মানসিক ক্রিয়োত্তেজনা। একাগ্রতার অভাবে চিন্তা করা কঠিন। আবহাওয়ার অধিক বস্তু গৃহে থাকে, কিন্তু কিছুই ঠিক মত থাকে না, রোগী অনবরত তাহার গণনা করে।

মস্তক ।—মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব; শিরোবর্ধন। মস্তকের অব-সন্নতা, গুরুত্ব, নির্ঝোঁধের হ্রাস ভাব। মস্তকে রক্ত ধাবিত হয়।

স্নায়ু ।—অত্যন্ত ক্লাস্তি এবং অবসন্নতার অহুভূতি; হর্কলতা। আক্ষেপক আনর্ডন, সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড কম্প, পেশীমণ্ডলীর অত্যন্ত বলক্ষয়। শীতল জলের ভয়ে রোগী স্নান করে না। সম্পূর্ণ শরীরেই ঠাণ্ডা লাগার হ্রাস আড়ষ্টতা ও টাটানি। শরীরের নানাস্থানে কঠিন ও তীক্ষ্ণ বেদনা।

মুখমণ্ডল ১—মুখ পাণ্ডুর; মুখে শোণিতাভা। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বে স্নায়ুশূল। মুখপার্শ্বে সংকুচিতবোধ।

চক্ষু ১—প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম চক্ষুর প্রদাহ; চক্ষুর শুভ্র ঝিল্লি শুষ্ক, লাল এবং ক্ষাত; চক্ষুগোলকে বেদনা ও জ্বালাযুক্ত চনচনি; চক্ষুপত্র ক্ষতযুক্ত বোধ। চক্ষুতে তীরবেধবৎ তীক্ষ্ণ, বেদনা, আকৃষ্টতা ও মোচড়ানিবৎ অনুভূতি। চক্ষু পাশাপাশি ভাবে চালনা করিলে টাটায় ও বেদনা করে। বোধ হয় যেন চক্ষুর ইন্টার্গাল রেস্তাসপেশী ঠিকভাবে কার্য না করায় উভয় চক্ষুর অক্ষরেখার সামঞ্জস্য থাকিতেছে না; জলস্রাব জন্ম চক্ষুতে দুর্বলতা বোধ। দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত ও ঘোর চক্ষুপরি জ্বাল জ্বাল ভাব; দৃষ্ট বস্তুনিচয় পরস্পর মিশিয়া যায়; অবশেষে চক্ষু উপরিভাগে ও উভয় চক্ষুর বাবধান স্থানে মৃৎ বেদনা। চক্ষুস্বখে শুভ্র ও কাল কীটবৎ পদার্থের দৃষ্টি। অক্ষিকোটরের পশ্চাৎ অংশের কনকনানি পশ্চাতে নান্তিকে বিস্তৃত হয় এবং পাঠ কালে তাহার বৃদ্ধি হইয়া বিবিধা উৎপন্ন করে। চক্ষুপত্র ভারি বোধ করায় রোগী তাহা উত্তোলন করা সহ্য করিতে পারে না। চক্ষুপত্রের আনর্জন। কণীকায় সংকোচন। চক্ষুর আলোকাসংস্কৃতা। চক্ষুর ক্রিয়োপযোগিতার ব্যতিক্রম; দূরের বস্তু নিকটে দৃষ্টি হয়। দৃষ্টির অস্বাভাবিক তেজস্বিতা; দ্বিভূদৃষ্টি; দৃষ্টি মলিন এবং অপরিষ্কার, ধূস্রাকার, অস্বচ্ছ ও কোয়াসাবৃত।

চিকিৎসা।

স্পাইন্যাল ইরিটেমেন বা পৃষ্ঠবেদনা ১—ফাইজটিগ্‌মাতে স্পাইন্যাল ইরিটেমেনের সম্পূর্ণ আদর্শ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার লক্ষণে মেরুদণ্ডের জ্বালা ও চাঁড়ক মারা থাকে; প্রত্যেক মেরুমাঙ্জের স্নায়ুই উত্তেজিত হওয়ার হ্রায় বোধ; হস্ত ও পদের অসাড়তা; খল্লীবৎ বেদনা;—পৃষ্ঠের পেশীনিচয়

অনমনীয় ও কশেকঁকামধ্যবর্তী স্থান চাপিত হইলে সাল্ফারের রোগের দ্বায় বেদনা । অনেক সময়ে নিদ্রাকর্ষণ হইলে হস্ত ও পদাদিতে হঠাৎ ঝাঁকি ।

থেরিডিয়ন্—মেরুদণ্ডে বেদনা থাকায় আঘাত লাগিবার ভয়ে রোগী কাঁচতভাবে বাসতে বাধা ।

হনুষ্ঠকার বা টিটেনাস্ ;—ফাইজুষ্টিগ্‌নার ধনু-
ষ্ঠকার রোগে অনুভূত হইয়া উত্তেজনা প্রবণ থাকায় আগন্তুক উত্তেজনায়
প্রাক্ষিপ্ত ক্রিয়ায় আক্ষেপ উপস্থিত হয় ; মেরুদণ্ড ও পদের কাঠি জন্মে,
এবং কণীনিকা পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত ও সংকুচিত হইতে থাকে । বর্ণিত
লক্ষণনিচয়ই ইহার প্রদর্শক বনিয়া অনুমিত হয় । ইহা বাতাত হনুস্তম্ভাদি
নানাধিক সাধারণ লক্ষণ বর্তমান থাকে ।

চক্ষুরোগ ;—ফাইজুষ্টিগ্‌নার চক্ষুলক্ষণ বিবেকে উপরে
যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, ইহা বহুগত ও ক্রিয়াগত
নানা প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য করিতে পারে । কাষাক্ষেত্রেও নিকটদৃষ্টি
বিষন্নদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি, সিলিয়ারিপেশীর আক্ষেপ,
উপতারার নানা প্রকার বিকার এবং চক্ষু কাল-
ক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার প্রদাহ, ক্ষত ও অস্বচ্ছতা
প্রভৃতি ইহা যে আরোগ্য অথবা উপশম করিয়াছে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত
হওয়া যায় । উপতারার সংকোচন জন্মাইবার প্রভূত ক্ষমতা থাকায় কণিয়া
সহ সংযুক্ততা ছিন্ন করিতে ব্যবহার সফল হইয়াছে ।

৩। মেলিলোটাস্ (*Melilotus Officinalis*) ।

উপচয় ;—আগতপ্রায় ঝটিকাগম কালে ; পরিবর্তনশীল বায়ুতে ;
বর্ষণযুক্ত দিবসে ।

উপশম ;—মুক্ত বায়ুমধ্যে ; ভ্রমণে ; শরীরাবস্থাপনের পরিবর্তনে ।

তুলনীয় ঔষধ ১—এমিল নাই, এটি কু, বেল, ক্যাক্টাস্, মন, ফেরাম্, গ্রাফুই।

সাধারণ ক্রিয়া ১—মেলিলোটাস্ নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা শোণিত্বের উদ্ভেজনা উপাঙ্কত করে। তাহার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কের রক্তাধিকা, মুখের রক্তিকা, তীক্ষ্ণ শিরঃশূল এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব পর্যাস্ত হয়। ইহার ক্রিয়াবীজ “কুমেরিণ” বিষ নাম্নায় সেবন করিলে বিবর্মিষা, শিরোবৃণন, বমন, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলভাব এবং তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি বরণা উৎপন্ন হয়। ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত করায় হস্ত পদাদি শীতল হইয়া যায়।

লক্ষণ।

মন ১—রোগী কোপনস্বভাব, অধৈর্য্য, অসন্তুষ্ট এবং দোষাত্মসঙ্কিৎসু। রোগী অলস, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অপারগ, বুদ্ধিহীন এবং উদাসীন। রোগী অধ্যয়ন করিতে অশক্তি, কিছুই মনে রাখিতে পারে না; লিখিতে কথা বা অক্ষর পড়িয়া যায়।

মস্তক ১—শরীর চাণনায় শিরোবৃণন। মস্তিষ্কে আন্দোলিতবৎ অন্তর্ভুক্তি ও ক্লাস্ত ভাবের বেদনা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শিরঃশূলের উপশম। শিরঃশূল হওয়ায় মুখের রক্তিকা ও চক্ষুর রক্তপূর্ণতা জন্মে এবং অবশেষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহার উপশম হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব অথবা ঋতুস্রাব হইলে বমনযুক্ত শিরঃশূলের হ্রাস। সাময়িক নায়ুবিক শিরঃশূল প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি চতুর্থ সপ্তাহে একবার করিয়া হয় এবং শীত ঋতুতে সংখ্যায় অধিকতর দেখা যায়। প্রবল রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কের গুরুত্ব, পূর্ণতা এবং দপ্পদপানি জন্মিলে বোধ হয় যেন নাসিকা, চক্ষু এবং কর্ণের মধ্য দিয়া প্রবলবেগে রক্ত ছুটিয়া বাহির হইবে, তাহার সহিত শিরোবৃণন প্রযুক্ত

বিবমিবার শরীর চালনায় বৃদ্ধি হয় । ললাট প্রদেশে দপদপানি শিরঃশূল হওয়ার পূর্বে অত্যন্ত চর্কলতা জন্মে এবং তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হওয়ার পূর্বে মুখের তাপ ও রক্তমা এবং জ্বরভাব উৎপন্ন হয় । পূর্বাঙ্ক ৯টা হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত দক্ষিণ ললাটের উন্নত স্থানে দপদপানি শিরঃশূল ।

নাসিকা ১—নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব হইলে সাধারণ রোগের উপশম হয় ।

শ্বাসযন্ত্র ১—বক্ষের পূর্ণতা নিবন্ধন কাসি । কাসিলে উজ্জ্বল রক্ত উঠে । শ্বাসরোধবৎ বোধ, রোগী যথেষ্ট বায়ু গ্রহণে অক্ষম । বক্ষোপরি গুরুত্বানুভূতিবশতঃ শ্বাসকষ্ট; বক্ষে ও নস্তুকে পূর্ণতা । বক্ষে প্রবল রক্তাদিকা ;

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক ১—শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে মেলিনলোভাসের দ্বারা অনেকেই বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন । শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন ললাট বিদীর্ণ হওয়ার মস্তিষ্ক বাহির হইয়া যাইবে, শিরঃশূলের তীক্ষ্ণতা এবং দপদপানিতে রোগী প্রায় উন্মত্তবৎ হয়, চক্ষু শোণিতপূর্ণ থাকে এবং শিরঃশূল প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে পুনরাবর্তন করে । কখন কখন নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইলে শিরঃশূল উপশম পায় । ইহাতে মস্তিষ্কে সিমিসিসফুগার তায় আন্দোলিতবৎ অনুভূতি বর্তমান থাকে ।

ব্রাহ্মনিহা—রসবাতগ্রস্ত রোগীদিগের মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার তায় অনুভূতিযুক্ত শিরঃশূল ।

ধর্মোশ্মাদ, চিত্তোশ্মাদ, ফুস্ফুসের প্রদাহ, শিশুর দন্তোদ্যম নিবন্ধন আক্ষেপ এবং সূতিকাক্ষেপ প্রভৃতি রোগ ও অবস্থা বিশেষে মেলিনলোভাস দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

লেকচার ৬৩ (LECTURE LXIII)।

ফ্রুফুলেরিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয়।

- ১। যুফেসিয়া। ২। গ্র্যাটিয়লা।
৩। ভার্বেস্কাম্। ৪। লেপ্টেগ্ৰা।

১। যুফেসিয়া।

(*Euphrasia Officinalis.*)।

উপচয়।—প্রাতঃকালে ; গৃহমধ্যে ; সন্ধ্যাকালে।

উপশমন।—শব্দাত্যাগ করিলে ; আহারে ; কাফি পানে।

সম্বন্ধ।—যুফেসিয়ার কার্য প্রতিবেদক—ক্যাফ, পাল্‌স্‌।

ভুলনীর ঔষধ।—একন, আর্জে নাই, আর্স, সেপা, কনায়, হিপার সা, কেলি বাই, মার্ক কর, নাক্‌স্‌ ভ, পাল্‌স্‌ ফস্‌, সাল্‌ফ্‌।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্রদ্রবিত্ত বায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা যুফেসিয়া শরীরস্থ প্রায় সম্পূর্ণ শৈল্পিক বিল্লিতে, বিশেষতঃ চক্ষু, চক্ষুপুট এবং স্বাস্থ্য পথের উর্দ্ধাংশের শৈল্পিক বিল্লিতে, যে প্রতিষ্ঠায়িক প্রদাহ (Catarhal inflammation) উৎপন্ন করে, তাহা ইনফ্ল্যেঞ্জা রোগের তুল্য ; এবং তাহাতে যে অত্যধিক জলবৎ স্রাব হয় তাহা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে বিশৃঙ্খলভাব এবং স্থূষ্টবৎ বেদনা। ললাটে মূহ শিরঃশূল।

চক্ষুঃ—চক্ষুতে জ্বালা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব । চক্ষুতে চাপ সহ জলস্রাব । চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ জ্বালা ও কান্ডানি, এবং তাহা হইতে কান্ডানি উৎপাদক জলের স্রোত বহে । চক্ষুতে চুলকণা ও জ্বালা হওয়ায় রোগী বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও ধৌত করিতে বাধ্য । চক্ষুপুটের কিনারায় রক্তিমতা, জ্বালা এবং ক্ষীতি । বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিবার প্রবৃত্তি । চক্ষুপত্র স্পর্শসহিষ্ণু ও ক্ষীত । চক্ষু হইতে প্রভূত জলস্রাব হওয়ায় দৃষ্টির প্রায় সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে । সন্ধ্যাকালে পর্দার মধ্য দিয়া দেখার স্থায় অস্পষ্ট দৃষ্টি । বোধ যেন চক্ষুর কাল ক্ষেত্র বা কর্ণিকা শ্লেষ্মাবৃত আছে এবং তাহাতে রোগীর দৃষ্টিমালিন্য উৎপন্ন হওয়ায় সে বারম্বার চক্ষুর্মূদ্রিত করিতে ও চক্ষু পত্রে পত্রে চাপিতে বাধ্য হয় । অত্যধিক আলোকাতঙ্ক । কর্ণিকায় কলঙ্ক, রসবিদ্বিকা এবং ক্ষত । চক্ষুর উপরিভাগে একগাছি কেশ খুলিতেছে বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহা পুছিয়া ফেলিবার আবশ্যিকতা জন্মে ।

নাসিকা—নাসিকা হইতে প্রচুর ও স্নিগ্ধ সর্দিস্রাব কালে চক্ষু হইতে বিদাহী জলস্রাব হয় এবং আলোকে বিদ্রোষ জন্মে, সকলই সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে বদ্ধিত হয় । শৈতাসংস্পর্শ অপবা কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতীতই প্রচণ্ড হাঁচির উদ্ভেদনা জন্মে । প্রাতঃকালে প্রচুর সর্দিস্রাব এবং অত্যন্ত কাসি হইলে গয়ার নিষ্ঠূত হয় ।

শ্বাস সঙ্কল্প—সর্দি জগ্ন প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ । প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিলে কাসি হওয়ায় অনেক শ্লেষ্মা উঠে । ইচ্ছা করিয়া থ্যাঙ্ক্ থ্যাঙ্ক্ কাসিলে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয় । ষ্টার্ণাম অস্থির অধোভাগের বা সম্মুখ বক্ষের নিম্নে চাপবৎ বেদনা হইলে বক্ষের স্থানে স্থানে খোঁচা লাগার স্থায় ক্ষণস্থায়ী বেদনা ।

স্রীজননেক্রিয়া :—আর্ন্তবাহ্য হইলে চক্ষুপদাহ ও নাসিকায় ক্ষত থাকে । বেদনায়ুক্ত ঋতুস্রাব এক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয় ; ঋতুস্রাবের সময় অনিয়মিত । স্রীঅঙ্গে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিমেন্টো জন্মে ।

ছক্ :—স্বকে চর্মকীল (Warts) জন্মে ।

চিকিৎসা ।

চক্ষুরোগ—যোজকঝিল্লিপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস ; গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ ; অক্ষিপুটপ্রদাহ বা রেফারাইটিস ; দানায়ুক্ত বা গ্রাণুলার চক্ষুপুটপ্রদাহ ; চক্ষুপুটপতন বা টাসিস ; আইরাইটিস বা চক্ষুতারাপ্রদাহ ।—আঘাতজ এবং গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে নিম্নলিখিত লক্ষণের বর্তমানতায় ফুল্ফেসিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে :—চক্ষুর কালক্ষেত্রে বা কণিয়োপরি অথবা তৎসন্নিহিত স্থানে অতি ক্ষুদ্রায়তন রসবিধিকানিচয় জন্মে ; চক্ষুর স্রাব তীব্র ও গুরাকার থাকে এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব উৎপন্ন হওয়ার বোধ হয় যেন সন্নিহিত শ্লেষ্মা পর্দাকারে কণিয়ার উপরিভাগে পতিত হইয়াছে । চক্ষু পুছিলে অথবা মিটি মিটি করিলে অস্পষ্ট দৃষ্টির উপশমন হওয়া ফুল্ফেসিয়ার প্রদর্শক । পাঠ করিলেও চক্ষু বেদনা করে ।

ইহার চক্ষুপুটপ্রদাহে চক্ষুপুট, বিশেষতঃ তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ লোহিত বর্ণ, রক্তপূর্ণ এবং ক্ষীত ও কালচে লোহিত থাকে, তাহাতে ক্ষত জন্মিতে পারে এবং তাহা হইতে ঘন ও বিদাহী স্রাব হওয়ার গণ্ডদেশ হাজিয়া যায় ; আলোকাতঙ্ক উৎপন্ন হইলে রোগীর পক্ষে সূর্যালোকাপেক্ষা কৃত্রিম আলোক অধিকতর অসহনীয় হয় ।

দানাবুজ্জ বা প্র্যানুলার পুরাতন চক্ষুপ্রদাহ তরুণ-
ভাব ধারণ করিলে ইহা তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম।

বেলেডনা—কৃত্রিম আলোকে অসহিষ্ণু।

একনাইট—সূর্যালোক সহ্য করিতে পারে না।

ক্রিস্ভাজেটি—ইহার চক্ষুপুট প্রদাহে উৎকর্ষ জনস্রাব হয়।

রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগীর শৈতাসংস্পর্শ চক্ষুপুট পতন বা
টসিসুরোপে রাস্ এবং কষ্টির ঞায় স্ফুফেসিহ্নাও
ফলপ্রদ। তৃতীয় স্নায়ুগুণের পক্ষাঘাত ইহার রোগের কারণ রূপে
বর্তমান থাকে।

স্ফুফেসিহ্না ও আণিকা—আঘাতজ কঙ্কা:টিভাইটিস্ রোগের
আণিকা মুখ্য ঔষধ হইলেও স্রাব যদি বিদাহী থাকে এবং
চক্ষুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবাতিকা জন্মে, সে স্থলে স্ফুফেসিহ্নাই উপযুক্ত
বলিয়া বিবেচিত।

আইরাইটিস্ বা উপতারৌষরোপ রসবাতোৎপন্ন
হইলে স্ফুফেসিহ্না তাহার ঔষধ। আলোকে উপতারার প্রতিক্রিয়া
হয় না এবং প্রদাহোৎপন্ন স্রাব মিশ্রিত হওয়ায় একুয়ামহিঁমার (চক্ষু
মধ্যস্থ স্ফুচ্ছ জলভাগ) সমল হইয়া যায়। চক্ষু হইতে তীব্র জলস্রাব এবং
স্রাহাতে জ্বালাযুক্ত ও সূঁচি এবং তীরবেধার ঞায় বেদনা থাকে।

নাসিকা সর্দি বা কনাইজাঃ—স্ফুফেসিহ্নার
সর্দিতে নাসিকা এবং শ্বাসযন্ত্রের উর্দ্ধ ভাগের শ্লেষ্মিক ঝিলি আক্রান্ত
হয়। সর্দিরোগে ইহার নাসিকাস্রাব সম্পূর্ণ শ্লিষ্ণ ও উগ্রতাহীন,
কিন্তু তাহার আনুসঙ্গিক চক্ষুজলস্রাব অত্যন্ত তীব্র
ও হাজারকর। সেপার ঞায় ইহাতেও নাসিকা ও চক্ষু হইতে
প্রচুর জলস্রাব হয়, কিন্তু সেপার নাসিকাস্রাব তীব্র ও

চক্ষুজল স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট। ইহার চক্ষুজলে গণ্ডস্থল সর্ষদা দিক্ত থাকে ও হাজিয়া যায়। হানরোগের পূর্বের নাসিকা সন্ধিতে হামের কাসির দ্বারা বিশেষ শব্দবৃত্ত কাসি উপস্থিত হইলে স্কুফেসিয়া তাহার উপশম করে।

সর্দির জলবৎ শ্রাবে স্কুফেসিয়া এলিয়ান্ সেপা, এরাম ট্রাই এবং আস সহ তুলনীয়।

কণ্ডিলমেটা বা প্লেগ্মাণ্ডিটা।—সাইকসিস্ বা পৃথমেহ রোগ প্রযুক্ত মলদ্বারের প্লেগ্মাণ্ডিকা স্কুফেসিয়া আরোগ্য করিয়া থাকে। স্কুফেসির কণ্ডিলমেটা আকারে প্রশস্ত এবং চেপ্টা হইয়া যায়। গুটিকাসিগ্ধিত স্থান সাধারণতঃ শ্রাবসিক্ত থাকে।

হান বা মিজলন্স্।—হানরোগে সর্দি লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে স্কুফেসিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লোহিতবর্ণ ও স্ফীত চক্ষু হইতে বিদাহী ও জলবৎ শ্রাব শ্রোত বহিয়া পড়ে এবং গলাভাঙ্গা শুষ্ক কাসি ও তাঁর দপদপানি শিরঃশূল উদ্ভেদ বহির্নিষ্ক্রান্ত হইলে উপশম পায়। চক্ষুর হাজাকর শ্রাব ইহাকে এলিয়ান্ সেপা হইতে প্রভেদিত করে। কৃত্রিম আলোককে আলোকাতঙ্কের স্বাক্ষি এবং সর্দির আক্রমণ থাকা সময়েও চক্ষুর বিশেষ প্রকারের উজ্জ্বল্যের বর্তমানতা স্কুফেসিয়ার প্রদর্শক।

২। গ্র্যাটিয়লা (Gratiola Officinalis)

তুলনীয় ঔষধ।—ক্রটন টি, কল্টি, আইরিস, ম্যাগ্নি কা, নেট কা, সাল্ফ এসি. থুজা, ভেরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্র্যাটিয়লা পরিপাকপথের শৈল্পিক ঝিল্লির বিশেষ উত্তেজনা দ্বারা বমন এবং বিরেচন উৎপন্ন করে। পরিপাকপথের

প্রদাহ উপস্থিত হইলে তাহা বস্ত্রযন্ত্র পর্যন্ত ধাবিত হয় এবং মূত্রযন্ত্রের বিশেষ আক্রমণ সংঘটিত হয় ।

লক্ষণ ।

আমাশয় ১—খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা ; উদ্‌গার । শিত্ত মিশ্রিত বস্তুর বমন এবং পীতবর্ণ, তিক্ত ও অল্প জলের অনা-
হ্নাসসাপ্ত্য বমন । বিবমিষা চইলে আমাশয়ে শৈত্যানুভূত জন্মে
এবং তাহা জলপূর্ণ বোধ হয় ।

উদর ১—উদরে অত্যন্ত ডাক ও গড়গড় শব্দ । উদরে কামড়ানি
বেদনা এবং অস্থিস্তি বোধ ।

মল ও মলদ্বার ১—মলদ্বারের সংকোচন এবং তাহাতে চুলকণা
কেবল পীতবর্ণ ঈষৎ সবুজাভ জলবৎ উদরাময়ের পরে
মলদ্বার জ্বালা করে । অবস্থানুসারে বেগে সবুজবর্ণ, বৃদ্ধবৃদ্ধ-
যুক্ত জলবৎ মলত্যাগ ; বেদনাহীন মলত্যাগ ; কখন বা উজ্জ্বল
হরিদ্রা বর্ণ জলবৎ বিষ্ঠায়ুক্ত মলত্যাগে শীতের অনুভূতি এবং
কখনও বা পাতলা, তরল ও হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠার উদরাময় হয় । পুতিগন্ধযুক্ত
আম নিৰ্গত হইলে সরলায় এবং মলদ্বারের উত্তেজনা জন্মে ।

মূত্রযন্ত্র ১—মূত্রত্যাগকালে ও পরে মূত্রনলীতে জ্বালা । মূত্র
অত্যন্ত এবং ঈষৎ লাল থাকে এবং কিছুকাল স্থিরভাবে রাখিলে বোলা
হইয়া যায় ।

চিকিৎসা ।

উদরাময় ।—প্রচুর ঈষৎ পীত জলবৎ মল কলের নল হইতে
নিৰ্গত হওয়ার ঠায় প্রবল বেগে নিৰ্গত হইলে প্র্যাতিফ্লুলা তাহার
ঔষধ । উষ্ণ হটক বা না হটক, অতিরিক্ত জলপানই ইহার উদর-

ময়ের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে । গ্রীষ্মকালেই এই উদরাময়ের প্রারম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা প্রধানতঃ ক্রটন তি, ইলেট এবং শডর সমক্রিয়া ঔষধ । অনেকের মতে উদরে শীতের অন্তর্ভুক্তি ইহার প্রদর্শক ।

৩। ভার্বেস্কাম (Verbascum Thapsus.)

সম্বন্ধ —ভার্বেস্কামের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যান্ফর ।

ভুলনীর ঔষধ —নাক্‌স্‌ ভ, প্লাটি, ষ্টেনাম্ ।

সাধারণ ক্রিয়া —ভার্বেস্কাম্ মস্তিষ্ক-হের্মজ্জের স্নায়ুগুণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া শিরঃশূল এবং মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল উৎপন্ন করে । চির্বিৎসা কার্য্যে ইহা সম্পূর্ণ নিদ্রিষ্ট প্রকারের গলাভাঙ্গা ও গুরু কাশি বিশেষে প্রদর্শিত হয় ।

লক্ষণ ।

স্নায়ু —শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ ও স্থচিবোধবৎ বেদনা । রোগী অত্যন্ত গা মোড়ামুড়ী দেয় ও হাই তোলে । আহার করিলে অত্যন্ত নিদ্রালুতা জন্মে । সম্পূর্ণ শরীর শীতল থাকে ।

মুখমণ্ডল —বাম গণ্ডাষ্টি ও গণ্ডের অগ্রাংশ অস্থিতে প্রচণ্ড, অজ্ঞানকর এবং চাপ হওয়ার হ্রায় অথবা আতত ভাবের বেদনার চাপে, গুরু বায়ুতে, দমকা বাতাসে, বায়ুর তাপের পরিবর্তনে অথবা মুখপেশীর চালনায় বৃদ্ধি । চিবুকের স্বকে, ম্যাসিটার পেশীতে এবং কণ্ঠায় প্রচণ্ড আতত বা টান টান ভাব ।

শ্বাসযন্ত্র —উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কালে স্বরভঙ্গ । সদি হইলে স্বরভঙ্গ ও বক্ষের কষ্ট উপস্থিত হয় । বক্ষে স্থচিবোধবৎ বেদনা । বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে গভীর, গলাভাঙ্গা, গুরু অথবা ফাঁপা শব্দের কাসি ।

মুক্তশূল।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রস্রাব হইবার পরে তাহার পরিমাণ স্তম্ভ হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেন্‌জিয়া।—জাইগম্যাটিক বা গণ্ডের অস্থিতে চাপ ও আততবৎ বেদনা চাপে, চর্কণে এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে বদ্ধিত হইলে **ভার্বেস্কান্** ফলপ্রদ। বেদনায় বোধ যেন আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াসি দ্বারা পেষণ করা হইতেছে; কথা বলিলে ও হাঁচিলে তাহার বৃদ্ধি হয়।

ক্যালুমিনা—শৈতাসংস্পর্শ নিবন্ধন স্নায়ুশূল উর্দ্ধচ্যুতলের দন্তনিচয় আক্রমণ করিলে ক্যালুমিনা উপকারী। বিদার্বৎ বেদনার, ক্লান্ত ও মানসিক উত্তেজনায় বৃদ্ধি হয় এবং তাহা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক থাকে।

প্রসপ্যাল্‌জিয়া বা মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল।—আক্রান্ত শরীররাংশ সাঁড়াসির চাপে ভগ্ন হওয়ার ঞায় বেদনা কথা কহিলে, হাঁচিলে, বায়ুর তাপ পরিবর্তনে এবং প্রতিদিন পূর্কাক্ষ ৯টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সন্ধ্যে বদ্ধিত হইলে **ভার্বেস্কান্** উপকার করে।

কাসি বা কক্ষ।—স্বরগন্ধ ও শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়ার রোগবশতঃ কক্ষণ, কঠিন, এবং খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দের কাসিতে রোগীর স্বর ভঙ্গ ও গভীর কক্ষণ স্বর জন্মিলে **ভার্বেস্কান্** উপযোগী। ইহার শঙ্কিরোগে মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল জন্মে।

৪। লেপ্ট্যাণ্ড্রা (Leptandra Virginica.)

সাধারণ ক্রিয়া।—যক্ৎ এবং অন্ত্রপথে লেপ্ট্যাণ্ড্রার প্রধান কার্য হওয়ায় ইহা তাহাদিগের শ্রাবণক্রিয়ার বৃদ্ধি করে। প্রচুর

আলকাতরার স্নায়ু কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ মলত্যাগ
ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

মনঃ—যক্কুরোগে জন্মিলে রোগী নিরুৎসাহ ও নিদ্রালু থাকে।

মস্তকঃ—ললাটদেশে অবিশ্রান্ত, মূহ শিরঃশূল; শিরোগূর্ণন;
উদরে বেদনা।

মুখপার্শ্বঃ—প্রাতঃকালে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ লেপযুক্ত। প্রাতঃ-
কালে বিশেষতা হীন ও অপ্রীতিকর স্বাদ জন্মে।

আমাশয়ঃ—পিত্ত বমন, হরিদ্রাভ জিহ্বা, যক্কুদেশে তীরবেধবৎ
বেদনা এবং কাল বিষ্ঠা।

উদরঃ—যক্কুরোগে কনকনানি মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং
পিত্তকোষপ্রদেশে অধিকতর। নাভি দেশে কনকনানি এবং উদরের
ডাক ও মলত্যাগের বেগ, প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং পুতিগন্ধ মলত্যাগ করিলে
উপশমিত হয়। প্রাতঃকালে নিম্নোদরে কষ্টপ্রদ ডাক হইলে ইহার
বিশেষতায়ুক্ত মলত্যাগ হয়।

মনঃ—শ্রোত বহিয়া প্রচুর, কাল এবং দুর্গন্ধ মলত্যাগ। বিষ্ঠার
প্রথমংশ কঠিন, কাল এবং থানা থানা থাকে, পরে নরম ও থস্থসে
মলত্যাগ হয়।

প্রদর্শনিক লক্ষণঃ—কাল ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠা ইহার
শ্রেষ্ঠতম বিশেষতা।

চিকিৎসা।

যক্কুরোগে—লেপ্‌ট্যাণ্ড্রার যক্কুরোগে দক্ষিণ
কুক্কুদেশে, বিশেষতঃ তাহার পিত্তকোষস্থানে, মূহ কনকনানি বেদনা

হয় এবং তাহা যকৃতের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করে। অনেক সময়েই যকৃতের কনকনানি বেদনাকালে তাহাতে টাটানিও থাকে, কখন, বা রক্তাধিক্য অধিকতর হইলে যকৃতে ও তৎসন্নিহিত স্থানে জ্বালাযুক্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। অনেক সময়েই এই জ্বালা ও কষ্ট আশায় ও উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যকৃতরোগের অবশ্যস্বাভাবী উপসর্গ স্বরূপ উপরি-উক্ত নিদ্রালুতা ও উৎসাহহীনতা উপস্থিত হয় এবং রোগী কাল ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে। ইহা সহরবাসী আলমুপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের জন্ম বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

উল্লেখ্যঃ—যকৃতরোগের আনুসঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ কাল, প্রায় আলকাতরার গ্রায় বিষ্ঠার উদরাময় হইলে **লেপত্যাগ** প্রযোজ্য হয়। ইহার সহিত নাভিদেবে জ্বালা ও অতি যন্ত্রণাপ্রদ উদর শূল থাকে। অবস্থা বিশেষে কৰ্দমবর্ণ বিষ্ঠা, নাভিদেবে জ্বালা এবং পিত্তের বমন হইয়া থাকে। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ অথবা অধিকাংশ স্থলে কাল লেপযুক্ত হয় কিম্বা তাহার মধ্যাংশ বাহিয়া কৃষ্ণাভ কটা এবং কাল থাকে। উপরি উক্ত লক্ষণের বর্তমানতায় ইহা **শিত্তজ্বর** এবং **টাইফয়েড** ফিবারেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

লেখক্চার ৬৪ (LECTURE LXIV.)

কনিফেরি জাতীয় ঔষধনিচয়।

- ১। এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্ । ২। এবিস্ নাইগ্রা ।
৩। স্মাবাইনা ।

১। এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্ (*Abies Canadensis*) ।

ভুলনীয় ঔষধ :—ইন্ডু, কপেবা, নাক্‌স্‌ ভ, ইগ্নে, টেরিবি ।

সাম্ভারণ ত্রিক্রমা :—শৈল্পিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ আমাশয়ের শৈল্পিক ঝিল্লিতে এবিস্ ক্যানাডেন্সিসের ক্রিয়া হওয়ায় তাহার প্রতিক্রমিক অবস্থা জন্মে ।

লক্ষণ ।

আমাশয় :—মুখের শুষ্কতা । আমাশয়োর্ক প্রদেশে চর্কণ-বৎ বেদনা, অতি ক্ষুধার অনুভূতি এবং মূচ্ছার ভাব । মাংস, লোনাবস্ত্র এবং অন্যান্য সুল খাড়ে লালসা । পরিপাকশক্তি অপেক্ষা আহারের ঝৌক অধিকতর থাকে । অন্তের মোচড় হইয়া বিবমিষা । আমাশয় এবং আমাশয়োর্ক প্রদেশে ক্ষীতি ও জ্বালা ।

স্ত্রীজননেত্রিয় :—চিন্তা হয় যেন “জরায়ু কোমল ও দুর্বল” বোধ হইতেছে । জরায়ুশরীরোপরি (Fundus) টাটানি বেদনার চাপে উপশম ।

চিকিৎসা :—উপরি লিখিত লক্ষণানুসারে এবিস্ কেনা আমাশয়াজর্জন ও তদানুযুক্ত জ্বর প্রভৃতি এবং জরায়ুভ্রংশরোগ আরোগ্য করিয়াছে ।

২। এবিস নাইগ্রা (Abies Nigra) ।

তুলনীয় ঔষধ :- ত্রায়, ক্যাম, ইগ্নে, নাক্স ড, ল্যাক্টিক এসি ।

সাম্ভারণ ক্রিয়া :- এবিস নাইগ্রা প্রধানতঃ আমাশয়ের মৈত্রিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া প্রকাশ করায় পরিপাক বিশুদ্ধতা এবং তৎফল স্বরূপ অনেক লক্ষণ উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ ।

মন :- অত্যন্ত অবসাদিত এবং বিষম্বতাপ্রস্তু ; বাত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগী চিন্তা করতে কিম্বা পাঠ করিতে অশক্ত ।

আমাশয় :- মন্বাভাবিক ক্ষুধা এবং রজনীতে নিদ্রাহীনতা । প্রাতঃকালে ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু অপরাহ্নে ও রজনীতে খাণ্ডে প্রবণ আকাঙ্ক্ষা । পূর্ণ ভোজন করিলে বেদনা হয় ; আমাশয়ের চতুঃপার্শ্বে অবিশ্রান্ত কষ্টানুভূতী বশতঃ বোধ যেন সকলই গিট দ্বারা আবদ্ধ আছে ; রোগী দুঃখল হইলেই তাহার বৃদ্ধি । বোধ যেন আমাশয়ে একটা অজীর্ণ, অতিসিক্ত কঠিন ডিম রহিয়াছে ।

মন :- কোষ্ঠী বন্ধ ।

প্রদর্শক লক্ষণ :- রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন কোন চুম্বিত বস্তু আহাৰ করায় আমাশয়ের হৃৎপিণ্ড সীমায় (বন্ধদেশে) আটকাইয়া রহিয়াছে ; অনেক চিকিৎসকই এবিসু নাইগ্রার এই প্রদর্শক লক্ষণ প্রমাণিত করিয়াছেন ।

চিকিৎসা :—রোগীর বুকের নিম্নাংশে অজীর্ণ, অতিসিক্ত কঠিন ডিম অথবা কোন কঠিন দ্রব্যখণ্ড আটকাইয়া থাকার অনুভূতিরূপ উপরিউক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকলে এবং আহারাণ্ডেই আমাশয়ে বেদনা উপস্থিত হইলে এবিস্ নাইগ্রা অজীর্ণ রোগে উপকারী। ইহা তামাক ও চা পান জনিত অজীর্ণ রোগেও ফলপ্রদ হয়।

৩। শ্রাবাইনা (Juniperus Sabina.)

উপচয় :—সামান্য শরীর চালনাতে ও উষ্ণ বায়ুতে অথবা গৃহপ্রবেশে।

উপশমন :—শীতল, মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে।

সম্বন্ধ :—শ্রাবাইনার কার্য প্রতিষেধক—ক্যান্ফর, পাল্‌স্।

শ্রাবাইনা বাহার পরে সফলপ্রদ—কণ্ডিলোমেটা এবং সাইকোটিক রোগে থুজার পরে।

কার্য্যপূরক :—থুজার।

ভুলনীয় ঔষধ :—আগি, বেল, ক্যাঙ্কে কা, ক্রোকাস্, ককুল, ইপিকা, মিলিফ, পাল্‌স্, রাস্, রুটা, সাল্‌ফ, ট্রিলি।

সাধারণ ক্রিয়া :—স্ত্রীজননেক্রিয় শ্রাবাইনার প্রধানতম কার্য্যক্ষেত্র হইলেও মূত্রযন্ত্র এবং আমাশয়-অন্ত্রপ্রণালীও ইহা গভীররূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। উপরিউক্ত যন্ত্রসাধারণে ইহা অতি প্রথমে উত্তেজনা উৎপন্ন করায় তাহা রক্তাধিক্যে এবং প্রদাহে পর্য্যবসিত হয়; এবং ইহার ফলস্বরূপ জরায়ুর রক্তস্রাব ও গর্ভপাত, মূত্রযন্ত্র বিকারে মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং অন্ত্রের রোগবশতঃ উদরাময় ও রক্তভেদ হয়। ইহার ক্রিয়ায় হস্তপদ ন্দীত ও নীলবর্ণ হইয়া যায়; শরীরে জলশোথ জন্মে। ইহা রসবাতগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ ।

মন ।—অবিশ্রান্ত খিটখিটে ভাব ; অতি সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠা ; কম্প, উৎকর্ষা এবং অস্থিরতা ।

স্বাস্থ্য ।—শরীরে অত্যন্ত আগ্রহের ভাব এবং গুরুত্ব ।

স্ট্রীজনেন্দ্রিয় ।—স্বাতন্ত্র্য অতি প্রচুর, অতি শীঘ্রাগত এবং অত্যধিক কাল স্থায়ী হয় । উত্থান করিলে রক্তের চাপ নির্গত হইতে থাকে । প্রায় অতৃপ্তব্য সঙ্গমের ইচ্ছা জন্মিলে তদনুরূপই তাহাতে সন্তুষ্টি লাভ হয় । জরায়ু প্রদেশে সংকোচনকারী বেদনা । গর্ভপাত কিম্বা প্রস্রাবের পরে জরায়ুর দুর্বলতা ও শিথিলতা জন্মিলে তাহা হইতে থাকিয়া থাকিয়া কখন কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ, কখন বা লোহিতবর্ণ ও প্রচুর রক্তস্রাবকালে পৃষ্ঠ হইতে বিটপস্থান বা পিউবিস্ (Pubes) পর্য্যন্ত বেদনা থাকে এবং সকল শরীর চালনায় বন্ধিত হয় । সাধারণতঃ তৃতীয় মাসে গর্ভপাত হইয়া থাকে । ঋতুরোধ হওয়ার পর ঘন, করিজাত এবং তর্জক শ্বেত প্রদর হয় ।

পুং জননেন্দ্রিয় ।—লিপ্সু ও এবং তাহার শ্লেমাণ্ডি বা কণ্ডোমেটাতে জালাযুক্ত টাটানি ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।—কটি পশ্চাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং টানিয়া নামানের স্থায় অনুভূতি বিটপদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পৃষ্ঠ বেদনায় রোগী সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য হয় । পৃষ্ঠে পক্ষাঘাতিক শূল ।

অঙ্গনিচয় ।—অধিকাংশস্থলে স্ফীত, লোহিতবর্ণ ও চক্চকে মণিবন্ধ এবং পদাঙ্গুলিতে, বিশেষতঃ রজনীতে, আকৃষ্টতা এবং ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি হয় । ঊরুসম্মুখের মধ্যস্থল ঘৃষ্ট

ও বেদনায়ুক্ত বোধ হয় । কনুইসন্ধিতে স্ফিবেধবৎ বেদনা ; গুল্ফ সন্ধিব বেদনা বাহ্যদিকে বিস্তৃত হয় ।

প্রদর্শক লক্ষণ—শ্রাবাইনার মানসিক লক্ষণ—**গীত-বাছোর অসহিবৃত্তা**—ইহার সাধারণ প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা বাইতে পারে ; কেননা সকল রোগেই এইরূপ মানসিক প্রকৃতি বর্তমান থাকে । উগাতে এতই স্নায়বীয় উত্তেজনা ঘটে যে, বোধ হয় যেন গীতবাছোর পক্ষি রোগীর হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিতেছে । গীতবাছো খুজারোগী ক্রন্দন করে ।

চিকিৎসা ।

স্রাজনেন্দ্রিয়রোগ—**রজঃকৃচ্ছ** বা **ডিস্মেনোরিয়া** ; **জুরায়ুর রক্তস্রাব** বা **হিমরেজ** **ফুম ইউটারাস**—**শ্রাবাইনার** **রজঃকৃচ্ছ**রোগে উদরশূল এবং কটিপশ্চাৎ হঠতে বিটপদেশ বা পিউবিম্ পর্য্যন্ত প্রসববেদনাবৎ বেদনা হয় ; পাতুর উপযুক্ত সম্বোধন অতি শীঘ্র এবং কখন বা থাকিয়া থাকিয়া অতি প্রচুর, আংশিক তরল ও আংশিক চাপ চাপ, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ, চর্গাক্ত শোণিত স্রাব হইয়া থাকে । রোগীর প্রায় অতৃপ্তবা কামেচ্ছা বর্তমান থাকে । **জুরায়ুর রক্তস্রাবে** রোগিনীর বস্ত্রপশ্চাৎ হইতে পিউবিম্ পর্য্যন্ত বেদনা অথবা অস্বস্তিভাব থাকে । কখন কখন জুরায়ু হইতে কৃষ্ণবর্ণ চাপ মিশ্রিত প্রচুর উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব সামান্য শরীর চালনায় বর্জিত বা পুনরারম্ভ হয় কিন্তু অধিকতর ভ্রমণে তাহা হ্রাস পাইয়া থাকে । অনেক সময়েই রোগের উপসর্গ রূপে সন্ধিবেদনা, উদরের আক্ষেপ এবং গভীর দুর্বলতা উপস্থিত হয় ।

গর্ভাবস্থার রোগ এবং **প্রসবান্তিক** রোগ ; **গর্ভপাত** বা **মিস্ক্যারেজ** ; **প্রসবান্তিক রক্তস্রাব** বা **পোর্ট পার্টাম**

হিমরেজ ; ভ্যাডালব্যথা বা আফ্টার পেন্‌স্‌।—অন্তঃস্রাব তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে তন্নিবারণে স্ত্রাবাইন্যা শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় । অনেক সময়ে তাহার প্রথম লক্ষণে নূনাদিক শোণিতস্রাব উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকে । পরে পৃষ্ঠবেদনা বস্তি ভেদ বা বেঠন করিয়া সম্মুখে বিটপদেশে যায় । সেক্রাম অস্থি বা বস্তিপশ্চাৎ হইতে তাহার সম্মুখ পর্যাস্ত বেগে ঠেল মারা এবং টানিয়া ধরার দ্বারা বেদনা থাকে । চাপ চাপ উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব হয় । গর্ভস্রাবাস্তক জরায়ুপ্রদাহে রক্তস্রাব থাকিলেও ইহা উপকার করে ।

সিন্‌আম্‌নাম্‌—বস্তিতে টান লাগা অথবা পদস্থানন জন্ত প্রচুর রক্তস্রাব ও অল্প বেদনা হওয়ায় গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা জন্মিলে সিন্‌আম্‌ন উপকারী ।

আর্শিক।—অভিঘাত জন্ত গর্ভপাতের উপক্রম হইলে । শরীরে বৃষ্টবৎ বেদনা হয় ।

প্রসবাস্তে জরায়ুকৃম্ম জরায়ুমধ্যে আবদ্ধ থাকিলে যদি পূর্ববর্ণিত জরায়ুর রক্তস্রাবের আনুষঙ্গিক লক্ষণনিচয় বর্তমান থাকে এবং শোণিত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ও চাপ মিশ্রিত হয় তবে স্ত্রাবাইন্যা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ । প্রসবাস্তিক বা ভ্যাডালব্যথাতে বস্তিপশ্চাৎ হইতে বস্তিকোটর ভেদ করিয়া তাঁরবেগে বেদনা তাহার সম্মুখদিকে ধাবিত হইলে স্ত্রাবাইন্যা উপযোগী হয় । সিপিহ্যার বেদনা তীরের দ্বারা উদ্ধে ধাবিত হয় এবং তাহাতে সরলদ্বয়ে গুরুত্ব জন্মে ।

স্ত্রাবাইনার জরায়ুবেগে সেক্রাম বা নিম্নপৃষ্ঠ হইতে তীরবেগে বস্তিভেদ করিয়া বেদনার সম্মুখ দিকে বা বিটপদেশে (Pubes) ধাবিত হওয়া ইহার প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয় ।

রক্তপ্ৰকল্প ও জরায়ুর রক্তস্রাব প্রভৃতি নানাপ্রকার
জীজননেদ্রিয় রোগে নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় স্বাভাইনা সহ তুলনীয়—

ইরিজিৱরণ—ইহা স্বাভাইনার প্রায় তুল্য ঔষধ। ইহাতে
মূত্রাশয় ও সরলাস্ত্রে উত্তেজনা থাকে এবং হঠাৎ রক্তস্রাব হওয়ার কিছু-
কালের জন্ত তাহার নিবৃত্তি হয়। রক্ত কালচে ও চাপ চাপ থাকে।

ক্লেবিকাস—গুল্মবায়ুগ্ৰস্ত রোগীদিগের মৃদু রক্তস্রাবে উপযোগী।
ক্লফবর্ণ, আটা এবং আলকাতরার ছায় কাল এবং বিশিষ্ট রূপ প্রচুর
রক্তস্রাব শরীরের চালনা হইলেই বন্ধিত হয়।

ট্রিলিয়াম্—মৃদু অথবা প্রবল রক্তস্রাব শরীর চালনা করিলেই
বন্ধিত হয়। বোধ হয় যেন নিম্নপৃষ্ঠ এবং তিপ বা অবানসন্ধি স্থিধা হইতেছে,
ফিতা বা ব্যাণ্ডেজ বাধিলে তাহার উপশম হয়।

আপ্টিলেপো—সামান্য কারণে, যেমন জরায়ুর পরীক্ষা জন্ত
তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেই যদি মৃদু অথবা প্রবল রক্তাধিক্যযুক্ত
জরায়ু হইতে উজ্জ্বল এবং আংশিকরূপে চাপবাধা রক্তস্রাব হয় তাহাতে
ইহা উপকারী।

ক্যাণ্ডলোমেটা বা **ক্লেস্মাগুটিকা**—ক্যাণ্ডলোমেটা,
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ক্যাণ্ডলোমেটা জ্বালা করিলে ও চুলকাইলে
স্বাভাইনা প্রযুক্ত হয়।

রসবাতিক প্রদাহ—অস্বাভাবিক পরিমাণ রক্তসম্পন্ন বা
শ্লেথরিক স্ত্রীলোকদিগের গুল্ফসন্ধির রসবাতজ প্রদাহ চিকিৎসায়
স্বাভাইনা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

লেখক্চার ৬৫ (LECTURE LXV) ।

সোলেনেসি জাতীয় ঔষধ ।

১। ক্যাপ্‌সিকাম । ২। টেবেকাম ।

১। ক্যাপ্‌সিকাম্ ।

(Capsicum Annum) ।

সম্ভবক্র ১—ক্যাপ্‌সিকাম্ বাহার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যালাডি, সিন্ধো, কফিয়া ।

ক্যাপ্‌সিকামের পরে প্রযোজ্য—সবিরাম জরে দিনা ।

ভুলনীয় ঔষধ ১—আর্জে নাই, আর্স, বেল, ক্যালাডি, ক্যাফা, সিন্ধো, ক্রোটন, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক কর, নেট মিউ, নাক্‌স্‌ ভ, পাল্‌স্‌, রাস্‌, ভেরেট এ ।

সাধারণ ক্রিয়া ১—ক্যাপ্‌সিকাম কেবল মাত্র শৈথিলিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্রপথের শৈথিলিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে তৎফলস্বরূপ তাহার তীব্র উত্তেজনা, রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ইহা স্বাস্থ্যযন্ত্রপথের শৈথিলিক ঝিল্লিতেও প্রায় এইরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । ইহা যে জরোৎপাদন করে তাহা ম্যালেরিয়া জর সদৃশ প্রতীয়মান হয়। ক্যাপ্‌সিকামের প্রদাহ শরীরোপাদান বা টিসুধ্বংসপ্রবণ হওয়ায় তাহা ক্ষত, পূয়শোথ এবং গভীরোপাদান ধ্বংসকারিতা পর্ধ্যবসিত হয়। ক্যাপ্‌সিকামের ছায় ইহাও মূত্রযন্ত্রপথ দ্বারা নিঃসারিত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রবেগ প্রভৃতি জন্মে ।

মূত্রযন্ত্রপথে মরিচ সংস্পর্শবৎ অত্যন্ত জালা, ও চনচনি উৎপন্ন করা ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যো গণ্য ।

আলস্ত্রপরতন্ত্র এবং শিথিলশরীর ব্যক্তিদিগের ঔষধের প্রতিক্রিয়া-শক্তির অভাব হইলে ক্যাম্পসিকাম তাহা পুনরুদ্ধাপিত করিতে সক্ষম ।

লক্ষণ ।

মন f —রোগী মৌন, এক গুঁয়ে এবং সামান্তেই ক্রোধপ্রবণ থাকে গৃহধিরহাতুরতা জন্মিলে গণ্ডের রক্তমা, অনিদ্রা এবং গলান্ন গহ্বরে তাপানুভূতি হয় ।

মস্তক f —শিরঃশূলে বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে; কাসিলে মস্তক চালনা করিলে অথবা ভ্রমণে তাহার বৃদ্ধি হয় ।

প্রাণ f —প্রতিক্রিয়াহীনতা, বিশেষতঃ স্থূল ব্যক্তিদিগের; জীবনী শক্তির পতনাবস্থা । বলক্ষয় । শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে প্রবল ইচ্ছা; রোগী এককালীন শ্রম করিতে চাচে না । কখন এক স্থানে, কখন বা স্থানান্তরে, এইরূপ শরীরের নানা স্থানে প্রচণ্ড বেদনা; শিশুদিগের স্নায়ুশূল । শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপরিভাগে আকৃষ্টবৎ বেদনা । জালা ও জালাযুক্ত চনচনির অনুভূতি । শরীরংশে কিন্বিনি লাগার হ্রাস বোধ ।

কর্ণ f —কর্ণপশ্চাতে বেদনাযুক্ত ক্ষীতি; ম্যাষ্টইড্ প্রসেসের (চুচক প্রবর্দ্ধন) ক্ষত বা কোঁরজ । বামকর্ণের পশ্চাতে ছিন্নবৎ বেদনা । কর্ণে চাপ লাগার হ্রাস বেদনা, কাসিলেই অধিকতর হয় এবং তাহাতে বোধ হয় যেন ক্ষত ফুটিয়া বাহির হইবে ।

প্রাসবন্ত্র f —সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে বিড় বিড়, শুড় শুড় করায় শুক ও থ্যাক্ থ্যাক্ কাসি হয় । কাসিলে

ফুস্ ফুস্ হইতে দুর্গন্ধ প্রকাশ বাহির হয়। বোধ হয় যেন আমাশয় হইতে শ্বাসকৃচ্ছ জন্মিতেছে। পৃষ্ঠের অনমনীয়তা সহ শ্বাসকৃচ্ছ হইলে মুখ লোহিত বর্ণ অথবা পর্যায়ক্রমে লোহিত ও পাণ্ডুর হয়; উদগার উঠে; বক্ষ বিস্তৃত বোধ হয়; শ্বাস টানিলে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে এবং তাহা শরীর চালনাকালে, উর্দ্ধে উত্থানকালে অথবা ভ্রমণে বর্ধিত হয়।

মুখগহ্বর ১—মুখে পচা গন্ধ। মুখে চিম্‌সে শ্লেষ্মা। মুখে জলবৎ স্বাদহীনতা জন্মিলে পরে বুকজালা করে।

পলাভ্যন্তর ১—গলার জ্বালা ও বেদনা গলাধঃকরণক্রিয়াঘূয়ের মধ্যবর্তী কালে অধিকতর হয়। কাসিলে গলায় বেদনা লাগায় বোধ হয় যেন তাহা গলার বেদনাবৃত্ত স্ফীতি অথবা ক্ষত হইতে হইতেছে। গল-দেণের আক্ষেপিক সংকোচন।

আমাশয় ১—আমাশয়ে জ্বালা, বিশেষতঃ আহারান্তে। বুকজালা; মুখে জল উঠে। শিরঃশূলে বিবিধা ও বমন হয়; স্নায়বীয় আক্ষেপিক বমন। শীতকম্পকালে শ্লেষ্মা বমন; সাংঘাতিক প্রকৃতির জরে বমন হয়। আমাশয়ে বরফবৎ শীতলতা জন্মিলে পরে তাহাতে কম্প অথবা জ্বালায় অনুভূতি হয় ও মধ্যে কটু উদগার উঠে।

উদর ১—উদর স্ফীত হওয়ার ঠায় উদর হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আতত ভাবের বেদনা। বায়ুশূলে আকৃষ্টবৎ ও মোচড়ানির ঠায় বেদনা হয়। উদর স্ফীত; শ্বাস প্রকাশ বাধা পাওয়ার শ্বাসরোধ ঘটে। গ্ৰীহা স্ফীত এবং স্পর্শসহিবু থাকে।

মল এবং মলদ্বার ১—কুস্থন; মলদ্বারে জ্বালাযুক্ত বেদনা। অর্শ জ্বালা করে ও চুলকায়। জল পান করিলে পুনঃ পুনঃ রক্ত সংযুক্ত আম নির্গত হওয়ায় কুস্থন জন্মে; শ্লেষ্মাময়

মল। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পরেই তৃষ্ণা এবং প্রত্যেক-
বার জলপানের পরেই কম্প হয়।

মূত্রবন্ধন ।—মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা, কামড়ানি এবং জ্বালাযুক্ত চন্-
চনি। মূত্রত্যাগের পূর্বে, সময়ে, এবং তাহার পরে মূত্রনালীর মুখে জ্বালা
হয়। মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রনালীর সম্মুখ ভাগে ও তাহার মুখে
স্বচিবেধবৎ বেদনা। মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে মূত্রস্থালীর কুস্থন হয়। জ্বালাযুক্ত
মূত্র।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—গলাভাঙরে ও শরীরের অত্রান্ত অংশে
মরিচের জ্বালার ন্যায় জ্বালা ও জ্বালাযুক্ত
চন্‌চনি, তাপে তাহার উপশম হয় না।

চিকিৎসা ।

গৃহবিব্রহাতুরতা বা হোম-সিক্‌নেস্ ।—এই
মানসিক বিকারাবস্থা ক্যাপ্‌সিকামের প্রায় সর্বাধিক রোগেই
উপস্থিত থাকে। রোগী বড়ই বিষণ্ণচিত্ত ও অসম্ভট হয়। তাহার গণ্ডদেশ
লোহিতবর্ণ থাকে এবং অনিদ্রা হয় ও গলমধ্যগহ্বরে (Fauces) তাপের
অনুভূতি জন্মে।

কর্ণরোপ ।—মধ্যকর্ণাংশ বা পটাহপ্রদাহ, কাণপাকা;
ম্যাফ্টইড প্রসেস বা কর্ণাস্থিপশ্চাতের উচ্চ অংশের প্রদাহ;
ইউস্টেকিয়ান নালীর নাতিপ্রবল প্রদাহ।—কর্ণের মধ্যাংশ বা
পটহে প্রদাহ ও পূয় উৎপন্ন হওয়ায় তাহা বিদীর্ণ হইলে ক্যাপ্‌সি-
কাম্‌ প্রযুক্ত হয়; ইহাতে কর্ণাস্থিপশ্চাতের উচ্চতর অংশের প্রদাহ বা
টাটানি জন্মে। পুরাতন কাণপাকা রোগে মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ছায়
বেদনা এবং শীতের ভাব থাকিলে ইহা উপকারী। কর্ণ উষ্ণ থাকে, বেদনা

গলাভাস্তরে যায়, পটাশ ছিদ্র হয় এবং কর্ণ হইতে হরিদ্রাবর্ণ পুয়াকার পদার্থের স্রাব হইতে থাকে । হিম্পার সাল্ফারের কর্ণবেদনা স্পর্শসহিষ্ণুতায়, ক্যাম্পসিকামে তাহা ব্যাপকতায় অধিকতর থাকে এবং ইহাতে রোগ মাল্‌রিভাসের হ্রাস রজনীতে বদ্ধিত হয় না । ইউষ্টেকিয়ান নালীর নাতিপ্রবল প্রদাহে অত্যন্ত বেদনা এবং গলমধ্যে শুষ্কতা ও তাপের অনুভূতি জন্মিলে ক্যাম্পসিকাম উপযোগী হয় ।

কর্ণের মধ্যভাগ বা পটাশ পাকিলে তাহার পুরাতন অবস্থায় সাই-লিসিহা শ্রেষ্ঠতর ঔষধ । ম্যাষ্টইড্ প্রেসেসের পূয়শোথ জন্মিলে অরাম এবং নাই গ্রিসি অগ্রগণ্য ঔষধ ।

ইম্পানিরোপ বা এজ্‌মা :—ক্যাম্পসিকাম রোগীর ইম্পানি হইলে তাহার মুখ লাল হয় এবং বক্ষমধ্যে হিস্ হিস্ শব্দ থাকে । রোগী কাসিয়া শ্লেষ্মা উঠাইতে পারিলে হাঁপের উপশম হয় ।

প্লীহারোপা :—ডাঃ জারের মতে ক্ষীণ, দিবদ্ধিত এবং স্পর্শ-সহিষ্ণু প্লীহার পক্ষে ক্যাম্পসিকাম শ্রেষ্ঠতম ঔষধ বলিয়া গণ্য ।

অর্গিকা—অস্বাতজ প্লীহাপ্রদাহে রোগী অবসাদগ্রস্ত এবং উদাসীন থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয় । পচনশীলতা বা টাইফয়েড অবস্থার দিকে রোগের গতি হইলে বেদনা মুত্‌ই হউক আর তীব্রই হউক ইহা যে-তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ তদ্বিষয়ে বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

বেলিসে প্লীহাপ্রদেশে ক্ষীণ জন্মে ; নেট মিউ এবং ফেরাম্ মেট প্রাচ্যবিদ্যাক্তর ঔষধ মধো গণ্য ।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টান্সিটেণ্ট ফিবার।—ক্যাম্পসিকামের সবিরাম জ্বর বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে । ইহার রোগী স্থূলকায় ও শিথিলশরীর হয় । ইহাতে শীতের প্রাধান্ত

থাকে, এবং তাহা পৃষ্ঠে আরম্ভ হয়; পৃষ্ঠে তাপ প্রস্রোপে রোগী তাহার উপশম পায়। শীতে তৃষ্ণা থাকে, তাপকালে থাকিলেও তাহার প্রথম অবস্থায় থাকিতে পারে। ক্লেদযুক্ত মলত্যাগে মলদ্বার জ্বালা করে। শীতের অবস্থায় প্রীহার স্ফীতি ও বেদনা জন্মে।

২। টেবেকাম (Nicotiana Tabacum) ।

উপচয় ।—অতিশয় তাপে অথবা শৈতো, বিশেষতঃ ঝটিকাময় দিবসে; ভ্রমণে, গাড়িতে চলিলে, এবং রেলগাড়ির ঝাঁকিতে।

উপশম ।—মুক্ত বায়ুতে; বমনে।

সম্ভব ।—টেবেকাম্ বাহার কার্যপ্রতিবেদক—সাইকুটা, ষ্ট্রামো। যাহা টেবেকামের কার্য প্রতিবেদ করে—আর্স, ক্যামো, ইগ্নে, ইপিকা, নাক্‌স্‌ ভ, পালস্‌।

তাম্রকূট সেবনের কুফল সংশোধনের ঔষধ।—
অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন জন্ম ইপিকা। তামাকের পাতা খাওয়াতে রোগ জন্মিলে আর্স। অতিরিক্ত ধূমপান প্রাতঃকালের অসুখ জন্ম নাক্‌স্‌ ভ। তাম্রকূট সেবনে হৃৎকম্প ও জননেদ্রিয়ের দুর্বলতা জন্মিলে ফস্‌। তিকা নিবারণে ইগ্নে। দস্তশূল হইলে ক্লিমেটিস্‌ ও প্ল্যাণ্টেগো। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলে, অজীর্ণে এবং বায়ুরোগে, বিশেষতঃ তাহা আলস্ত পরায়ণ ব্যক্তিদিগের হইলে সিপিয়া। অতিরিক্ত ধূমপান জন্ম ধ্বজভঙ্গ, আক্ষেপ এবং শীতল ঘর্ম হইলে লাইকো। ধূমপায়ীর মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূল ও শিরোঘূর্ণনে জেল্‌স্‌। টেবেকাম্ ২০০ অথবা ১০০০ গ্রাম, তামাক সেবন পরিত্যাগ জনিত অদম্য মুখলালাশ্রাব নিবারণ করে।

ভুলনীর ঔষধ ।—এণ্টি টা, আর্স, বেল, ককুল, ভিজিট, লোবে, ইপিকা, নাক্‌স্‌ ভ, ওপি, ফস্‌, ষ্ট্রামো, ভেরেট এ।

সাম্প্রারণ ক্রিয়া ১—টেবেকাম মেডুলা অবলেঙ্গটা এবং নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ু আক্রমণ করিলে অনৈচ্ছিক পেশীমণ্ডলীর (Involuntary muscles) সম্পূর্ণ শিথিলতা ও পক্ষাঘাত হওয়ায় বিবমিষা, বমন, ফুংপিণ্ডের ক্ষীণতা, শরীরে তাপের হ্রাস, শিরোঘূর্ণন, প্রণোপ এবং পতন বা কোল্যাপ্‌সুলক্ষণ উৎপন্ন হয়। অধিক কালব্যাপী তাম্বুকুট সেবনের কুফল স্বরূপ স্নায়ু পদার্থের অপকৃষ্টতা জন্মিলে পেশীর ক্ষয় ও পক্ষাঘাত জন্মে। ইহা দ্বারা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর পরিপাকঘন্ত্রশাখা আক্রান্ত হওয়ায় আমাশয়ান্ত্রিক বিকার, এমন কি তাহার প্রবল প্রদাহ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। ডাং বার্থোলোর মতে ইহা কতক মস্তিষ্ক আক্রমণ ও আমাশয়ের উত্তেজনা এবং ইহার বস্তুগত স্বাভাবিক গুণ এই ত্রিবিধ কারণই নিশ্চি-রূপে বমন উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ার আঙ্গিক শৈল্পিক ঝিলি স্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং অঙ্গের পেশীস্তর ধনুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপাক্রান্ত হওয়ায় বিরেচন হইয়া থাকে। মৃত্যুকল্প বিবমিষা এবং তাহার আনুষঙ্গিক পাণ্ডুরতা, শিরোঘূর্ণন, শীতল ঘর্ম ও ঘনলোপবিশিষ্ট নাড়ী ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ মণো গণ্য।

লক্ষণ ।

মন ১—উৎকর্ষা; ক্রন্দন করিলে রোগী ভাল থাকে। মনঃ-সংযোগ করা কঠিন হয়।

মস্তক ১—আমাশয় মোচড়াইয়া বিবমিষা বশতঃ শিরোঘূর্ণন জন্মিলে গৃহমধ্যে তাহার বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস হয়। স্নায়বীয় শিরঃশূলে বোধ হয় যেন হঠাৎ মস্তকে হাতুড়ির আঘাত লাগে। ললাটের এক পার্শ্ব হইতে অত্র পার্শ্ব পর্য্যন্ত শিরঃশূলে চক্ষুকোটর আক্রান্ত হয় অথবা শিরঃশূল তীরবেগে বাম চক্ষুতে যায় এবং শৈত্যপ্রয়োগে তাহার

হ্রাস হয়; মস্তকে গুরুত্ব জন্মে। বহুকাল তাম্রকূট সেবনে সন্ধ্যাসরোগ জন্মিতে পার।

স্নান্য়ুঃ—ক্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত; কম্প। ভয়ঙ্কর বেদনার আনুষঙ্গিক লক্ষণে অনৈচ্ছিক পেশীসংকোচন হয়। পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন, আক্ষেপ, সর্বাঙ্গীন অট্টেতত্তের ভাব, শরীরের শিথিলতা।

মুখমণ্ডলঃ—আমাশয় গোচড়াইয়া বিবমিষা জন্মিলে মুখের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা হয়। মুখ পাণ্ডুর, বসা এবং শীতল ঘর্ষ্যাবৃত। সন্ধ্যাকালে মুখের অস্থি ও গণ্ডে প্রচণ্ড ছিন্নবৎ বেদনা।

মুখগহবরঃ—মুখে গেঁজলা উঠে। প্রচুর মুখলালাশ্রাব। মুখ এবং গলমধ্যে শুভ্র ও আটা শ্লেষ্মা সংগ্রহ হইলে বারম্বার তাহা নিষ্ঠুত করিতে হয়।

আমাশয়ঃ—অতিশয় তৃষ্ণা; রজনীতে তাহার বৃদ্ধি। বিবমিষা ও বমন শরীর চালনায় বন্ধিত হয়। থাকিয়া থাকিয়া মৃতকল্প বিবমিষা হওয়ায় শিরোগূর্ণন ও শরীরে শীতল ঘর্ষ্য হয়। প্রচণ্ড বমন; অন্ন ও তরল পদার্থের সহজে বমন হয়। প্রাতঃকালে জলবৎ, বিশ্বাদ ও কখন কখন তিক্ত বমন হয়। বিবমিষা হইলে আমাশয় শীতল বোধ হয়। আমাশয়োক্তি কোটরস্থানে দগিয়া যাওয়ার ভাব; তাহাতে শিথিলতার অনুভূতি জন্মে।

উদরঃ—নাভি অভ্যন্তরদিকে বেদনাসহ আকৃষ্ট হয়; উদর পেশীর সংকোচন। ফাঁসবন্ধ অল্পবৃদ্ধি।

মলঃ—কুস্থন এবং জালাযুক্ত নরম মলত্যাগকালে কটিপশ্চাতে প্রচণ্ড বেদনা হয়। উদরাময় হইলে রোগী ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ ক্লেদবৎ মলত্যাগ করে। কলেরার ঞ্চায় মলত্যাগ; জলবৎ, বেগশীল ও বেদনাহীন উদরাময়।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী :—প্রচণ্ড হৃৎকম্প । হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্বল । রজনীতে থাকিয়া থাকিয়া হৃৎকম্প হওয়ায় হৃদগের কষ্ট এবং উভয় স্বন্ধ মধ্যস্থ স্থানে বেদনা হয় । নাড়ী ক্ষীণ, কোমলস্পর্শ এবং ধীরগতি ; তর্কোদ্যা, ক্ষুদ্র এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—প্রচণ্ড ও মৃত্যুকল্প বিবমিষা, মৃতবৎ পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ শরীরে শীতল স্বর্ণের বর্তমানতা প্রভৃতির শরীর চালনায় বুদ্ধি ও তাহার আনুষঙ্গিক শিরোগূর্ণন প্রভৃতি দুর্বলতার লক্ষণ ইহার সাধারণ রোগের প্রদর্শক ।

চিকিৎসা ।

ধনুষ্ঠকার বা টিটেনাস্ :—গ্রীবা এবং পৃষ্ঠপেশীর অনমনীয়তা ও পশ্চাদিকে মস্তকের আকৃষ্টভাব, চক্ষুপুট ও চর্কণক্রিয়াসাধক পেশীর (Masseter muscle) সংকোচন, স্বরঘন্ত্র ও শ্বাসনালীপেশীর আক্ষেপ বশতঃ হিস্ হিস্ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, পণ্যায়ক্রমিক, পবল ও ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপের পর সম্পূর্ণ শরীরের শিথিলতা ও কম্পাণিত ভাব, অস্ত্র ও মূত্রপথাদির সংকোচন, অভ্যন্তর দিকে উদর পেশীর আকৃষ্টতা এবং উপরিউক্ত লক্ষণ জনিত আনুষঙ্গিক তীব্র বেদনা, বিবমিষা, শীতল স্বর্ণ ও শ্বাসরোধ বশতঃ ত্বরিত পতনাবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ধনুষ্ঠকাররোগে **টেবেকাম** ও **নিকোটিনাম** উপযোগী হয় । ইহার শ্বাসরোধকর আক্ষেপবিশিষ্ট ধনুষ্ঠকার আক্ষেপের **স্ট্রিক্‌নিয়ার** আক্ষেপ অপেক্ষা **হাইড্রোসাইয়ানিক এসিডের** আক্ষেপের সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

সি-সিক্‌নেস্ বা আর্ণব বমন :—টেবেকামের বিবমিষা ও বমনের আর্ণব বমন এবং শকটারোহণ জন্ত বমন সহ অতি আশ্চর্য্য

সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কার্যক্ষেত্রেও উচ্চ ক্রমের টেবেকাম্ এ রোগের অবস্থাবিশেষে যথেষ্ট উপকার দর্শাইয়া থাকে।

কলেব্রা বা ওলাওটা;—ভেরেট্রাম এ, সিকেলিন অথবা ক্যাস্ফর প্রয়োগ কলেবর উদরাময় বন্ধ হওয়ার পরেও যদি বিবমিষা এবং শীতল ঘর্ম থাকিয়া যায় তাহাতে টেবেকাম্ উপকার করিয়া থাকে। এই বিবমিষার আলুম্বাঙ্গিক লক্ষণ রূপে উদরপ্রদেশে জ্বালাময় তাপ এবং তদ্ব্যতীত শরীরান্তে শীতল ঘর্ম থাকে। রোগী ক্রমাগত উদর অনাবৃত করে। এস্থলে ইহা হাইড্রস্যা এন্সি, ভেরেট এ, ক্যাস্ফর সহ ভূগনীয় হয়।

মূত্রশূল ও ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি।—মৃত্যুকল্প বিবমিষা, বমন ও ক্রেদবৎ উদরাময় থাকিলে টেবেকাম্ মূত্রশূল ও ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে উপকারী হয়।

উপরে টেবেকামের যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে ইহা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, শ্বাসকুচ্ছ, এঞ্জাইমা পেকটরিস্ বা হৃদশূল এবং অর্জীর্ণ প্রভৃতি রোগে উপকার করিতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যুকল্প বিবমিষা ও বমন, সর্বাস্থান শীতল ঘর্ম এবং শারীরিক শিথিলতা প্রদর্শকরূপে বর্তমান থাকে।

লেখক্কার ৬৬ (LECTURE LXVI)।

জান্তব ঔষধ—অফিডিয়া জাতি।

১। ক্রোটেলাস্ হরিডাস্। ২। অ্যাজা ট্রিপু-
ডিয়ানস্। ৩। ইল্যাপ্‌স্ কেরোলিনাস্।

১। ক্রোটেলাস্ হরিডাস্ (Crotalus Horridus.)।

সম্প্রক্ক ১—ক্রোটেলাসের কাধা প্রতিষেধক—এমনিয়া, ক্যান্ফর, এল্কোহল, বিকীর্ণ তাপ।

ল্যাকেসিসে অক্ শীতল ও চটচটে, ক্রোটেলাসে তাহা শীতল ও শুষ্ক থাকে। ইল্যাপ্‌স্ দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ আক্রমণ করিলে কাল রক্ত নিষ্ঠ্যাত হয়।

ভুলনীন্ন ঔষধ ১—এপিস্, অর্স, কাহ্‌স্, কার্‌ক ভে, চেলি, ইল্যাপ্‌স্, ল্যাকেসিস, অ্যাজা, টেরেন্টু।

সাধারণ ক্রিয়া ১—ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি সর্পবিষের ঞায় ক্রোটেলাসেরও প্রাথমিক বা মৌলিক ক্রিয়া মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের ঞায়কেন্দ্রে প্রকাশ হইয়া থাকে। ল্যাকেসিসের ক্রিয়া বর্ণনায় যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে ইহা তদনুরূপই পরোক্ষভাবে শোণিতের বিশ্লেষণ, তাহার তন্তুজ্ঞান বা ফাইব্রিণ পদার্থের ধ্বংস, শোণিত স্রাব এবং কালশিরা প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া সর্পবিষ ঞাত্রেই ক্রিয়ার সাধারণ ত্রৈক্যতার পরিচয় দেয়। ক্রোটেলাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার বিষলক্ষণের পীতজ্বরলক্ষণ সহ সাদৃশ্য থাকায় উক্ত রোগের চিকিৎসায় প্রযোজিত হইলে ইহা সফলপ্রদান করে।

লক্ষণ ।

চক্ষুঃ—**চক্ষুতে** এবং সম্পূর্ণ শরীরে হরিদ্রাবর্ণ । চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে নানবর্ণ চক্র । চক্ষু হইতে শোণিতের নিঃসরণ । অস্পষ্ট দৃষ্টি । চক্ষুতে জ্বালা । চক্ষুর একদ্ব্যস্ গিউমার বা সন্মুখগহ্বরস্থ স্বচ্ছ রসভাগ ঘোণাটে । চক্ষুর্দ্ধে চাপ ও কষ্ট ।

কর্ণঃ—উচ্চ শব্দে অসহিষ্ণু । উচ্চ শব্দের অনুভূতিহীনতা । নায়বিক বধিরতা ।

শ্বাসন্যস্ত্রঃ—স্বরভঙ্গ স্বর দুর্বল এবং কর্কশ । নাতি-প্রবল কাসিতে রক্তবৃক্ক শ্লেষ্মার নিষ্টিবন । কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস । ছপশব্দক কাসি নিবন্ধন দুর্বলতা, নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব ও মুখের স্ফাতি, মুখের নীলাভা অথবা পাণ্ডুরতা, আক্রমণের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় ; বৃদ্ধদিগের বক্ষ শোথ এবং জ্বর ও প্লাহাজ্বর বা এণ্ড জন্ম শ্বাসকষ্ট ।

মুখগহ্বরঃ—**জিহ্বার স্ফাতি ও প্রদাহ** ।—জিহ্বা এবং গলাভাণ্ডরে সংকোচন নিবন্ধন বাকরোধ ।

পলাভ্যন্তরঃ—গলা শুষ্কতা প্রযুক্ত তৃষ্ণা । কোন কঠিন বস্তু গলাধঃকরণ অতান্ত কষ্ট ।

মূত্রযন্ত্রঃ—মূত্রনদী হইতে রক্তশ্রাব । পিত্তমিশ্রিত মূত্রের পীত অথবা দীঘং লোহিতাভ পীত বর্ণ । টাইফয়েড জ্বর, ডিফথেরিয়া প্রভৃতি রোগে লালামেহ জন্মে এবং শোণিতমিশ্রিত হওয়ায় মূত্র ধূম্বা কার থাকে ।

হৃৎকঃ—স্বক হরিদ্রাবর্ণ ; শ্রাবা বা জঞ্জিস্ ; সেপ্তাসিনিয়া বা রক্ত-বিষাক্ততা । হৃৎকের নানাপ্রকার টাইফয়েড বা পচনলক্ষণযুক্ত উদ্ভেদ ।

চিকিৎসা ।

রসরক্ত প্রভৃতি শারীরিক উপাদানের পচনশীলতাবিশিষ্ট সাংঘাতিক জরবিকার ও ক্ষত প্রভৃতি নানাবিধ রোগে সম্পূর্ণ শরীর অথবা

ব্যাধিগ্রস্ত যন্ত্রবিশেষের শোণিতস্রাবপ্রবণতা দৃষ্ট হইলে ক্রোটে-
ল্যাস প্রযুক্ত হয়। শোণিত রসাদির ধ্বংসকারী বহুব্যাপক অথবা
স্বল্পব্যাপক যে কোন রোগে ল্যাক্সেসিস প্রভৃতি ইহার
সমশ্রেণীর অন্যান্য সর্পবিষও প্রযোজ্য, মূলতঃ তাহাতেই ইহারও
প্রয়োগ হইয়া থাকে। তুলনাসৌকর্য্যার্থে আমরা ল্যাক্সেসিস-
রোগ বর্ণনাকালে ইহারও অধিকাংশ রোগের আলোচনা করিয়াছি।
তাহা তত্তৎ স্থানে দ্রষ্টব্য। ফলতঃ সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর, বিশেষতঃ
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং কৃষ্ণলোহিত ও স্পর্শে বেদনাব্যুক্ত অথবা
পচা ক্ষতবিশিষ্ট (Gangrenous) টনসিল গ্রন্থি থাকিলে; ডিক্‌থিরিয়া;
রক্তস্রাবযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ এবং লেপা হাম; টাইফয়েড ও রক্তস্রাবযুক্ত
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ সাংঘাতিক জ্বর; বিষাক্ত ক্ষত নিবন্ধন
পারিমিয়া, সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতি রক্তদোষযুক্ত সাংঘাতিক জ্বর, এবং দ্রুত
শ্রাবা রোগ এবং শরীরের নানা স্থান হইতে পচা রক্তস্রাববিশিষ্ট বহুবিধ
রোগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ।

সাংঘাতিক পীতজ্বর বা ইন্ডালফ্রিবাইরের লক্ষণ
সহ ক্রোটেলাস লক্ষণের বিশেষ ত্রিক্যতা থাকায় তাহার চিকিৎসাতেও
ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কাল বস্তুর বমন, দুর্বলতা-
জ্ঞাপক মুহু প্রলাপ; পীতবর্ণ ত্বক এবং শরীরের সর্কবিধ বাহু দ্বার
হইতে রক্তস্রাব, এমন কি সম্পূর্ণ ত্বকের ঘর্মগ্রন্থি হইতে রক্তস্রাব বা
রক্তময় ঘর্ম প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা উপকারী।
এ রোগ শরীরে যে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্ন করে তাহা শ্রাবারোগাপেক্ষা
রক্তের শোচনীয় ও সাংঘাতিক বিষাক্ত অবস্থারই অধিকতর পরিচয় দেয়।
ক্যাডমিয়াম্ সালফেও কাল বমন হয় বলিয়া তাহা
ক্রোটেলাস সহ তুলনীয়।

শোণিতস্রাবপ্রবণতা; শারীরিক উপাদাননিচয়ের পচিতাবস্থা

(Putrescence) ; প্রভূত দুর্বলতাদি টাইফয়েড লক্ষণ ; রক্ত অথবা পিত্তের বমন ; জিহবার শুষ্ক, কটা ও বিদীর্ণ অবস্থা অথবা তাহার মধ্য বাহিয়া পীত ও কটা বর্ণ এবং পার্শ্বে লোহিতাভার বর্তমানতা এবং মূত্রের স্বল্পতা ও প্রায় গভীর কাল বর্ণের ত্রায় কৃষ্ণাভা অথবা কখন মূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায় ।

২। শ্রাজ্জা (Naja Tripudians.)

সম্প্রস্ক ১—শ্রাজ্জার কার্গা প্রতিষেধক—তাপ, এলকহল, সল্ট ।

ভুলনীয় ঔষধ ১—এপিস্, আর্স, ক্যাষ্টাস্, ক্রেটন টি, হিপার মা, ল্যাকেসি, মার্ক ।

সাধারণ ক্রিয়া ১—ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি অশ্রাণ সর্পবিষের ত্রায় শ্রাজ্জা মেরুমজ্জা-মাস্তক্ষয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলেও নিউমোগ্যাষ্ট্রিক এবং গ্লসো-ফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুতেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে । এজন্য শোণিতের পচন ও অধিকতর তারল্য নিবন্ধন কালশিরা ও রক্তস্রাব প্রভৃতি সর্পবিষের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীতও ইহা বিশেষ স্বাসকষ্ট ও জ্বংপণ্ডযন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া থাকে ।

লক্ষণ ।

মন ১—আত্মহত্যার প্রবৃত্তিসূচক উন্মাদ রোগ । প্রলাপ । রোগী হুঃখিত এবং চিন্তাশ্রিত ; মানসিক অস্বস্থ্য ; বিষন্নতা ; রোগী কাল্পনিক ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্য-বিষয়ে চিন্তা করিয়া আপনাকে অসুখী করে ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী ১—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবসাদ এবং অস্বস্তির অনুভূতি । হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীব্র বেদনা । হৃৎপিণ্ডের খর খর বা পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ গতি এবং হৃৎকম্প । হৃৎস্পন্দন শ্রুত হওয়া যায় ।

নাড়ী ধীরগতি, তাহার ছন্দ এবং বেগ অনিয়মিত ; দুর্বল, সূত্রবৎ ; কচিৎ বোধ্য ।

গলাভ্যন্তর ।—গলমধ্যে অনেক প্লেগ্মার সঞ্চয়। গলমধ্যে চাপ ও গলরোধ। গলমধ্যে কর্কশ ও টাছা ভাব। শ্বাসরোধের অহুভূতি প্রযুক্ত রোগীর গলা চাপিত বোধ। গলমধ্যে ও গলগহ্বরে শুষ্কতা ও সংকোচন। গলার বাম পার্শ্বে টাটানি ও চিমটি কাটার ভাব। অন্ননাদীর সংকোচন বশতঃ গেলা কষ্টকর অথবা অসম্ভব। গলগহ্বরের কৃষ্ণলোহিতবর্ণ।

শ্রীজ্বরনৈমিক্স ।—বাম অণ্ডাধারে খল্লীবৎ বেদনা। পাতলা ও শুভ্র শ্বেত প্রদর। স্তম্ভচক্ষুর হাস।

জ্বর ।—শরীর শীতল এবং পতন বা কোলাপ্সলক্ষণযুক্ত। অঙ্গনিচয় শীতল, পদ বরফবৎ শীতল। মুখমণ্ডলে জ্বালাযুক্ত তাপ। রোগী অত্যন্ত অস্থূল, উষ্ণ থাকে এবং জ্বরভাবযুক্ত বোধ করে।

চিকিৎসা।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত ।—গলগহ্বরের কৃষ্ণলোহিতবর্ণ, পৃতিগন্ধ প্রশ্বাস এবং গলাভাঙ্গা কাসি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ল্যারেক্সিসিসাণ্ডি সর্পবিষের তুলা। ল্যারেক্সিসিসে কণ্ঠার অত্যধিক স্পর্শাসক্তিতা; শূন্য গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় ও কঠিনাপেক্ষা তরল বস্তু গলাধঃকরণে বেদনার আধিক্য এবং নিদ্রায় রোগের বৃদ্ধি; **স্ত্রাজ্জার** রোগের স্বরবস্ত্র আক্রমণ, তজ্জন্ত শ্বাসরোধের অহুভূতি নিবন্ধন রোগীর কণ্ঠ চাপিত বোধ, স্বরবস্ত্র এবং শ্বাসনলীতে কাঁচা বা অবদারণভাবের অহুভূতি এবং হৃৎপিণ্ড আক্রমণে তাহার পক্ষাঘাতের উপক্রম প্রভৃতি উভয় ঔষধের প্রভেদক। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম হইলে রোগীর শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়; সে খাবি খাওয়ার স্মায় অবস্থায় নিদ্রোপ্তিত হয়; এবং তাহার নাড়ী ক্ষণলোপবিশিষ্ট ও সূত্রবৎ থাকে। ডিফ্‌থিরিয়া রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ায় উপরি উক্ত

লক্ষণনিচয় উপস্থিত হইলে ডাং পেট্রন শ্রাজ্জার প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন ।

ফলতঃ হুৎশূল বা এঞ্জাইনা পেট্টারিস্‌, হুৎকম্প, হুৎকপাটবিকার, হুৎপিণ্ডপ্রদাহ এবং হুৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতিক অবস্থা প্রভৃতি হুৎপিণ্ডের নানাবিধ ক্রিয়াগত ও উপাদানগত রোগে অত্যন্ত সর্পবিষাপেক্ষা শ্রাজ্জার অধিকতর সম্বন্ধ থাকাই অনুমিত হয় এবং কার্যক্ষেত্রেও ইহা অধিকতররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । হুৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম, হাঁপানিলক্ষণের উপস্থিতি, হুৎপিণ্ডের কম্পান্বিতভাব এবং অধিকন্তু যন্ত্রগত রোগে খুবখুব কাঁসর আক্রমণ ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য । রোগীর শ্বাসরোধের ভাব শয়ন করিলে অথবা নিদ্রাস্তে বদ্ধিত হয় ।

৩। ইল্যাপ্‌স্‌ (Elaps Corallinus) ।

সম্বন্ধ ১—সাধারণভাবে ইল্যাপ্‌স্‌ সমশ্রেণীর সর্পবিষ সহ প্রায় সর্ব বিষয়েই তুল্য ।

সাধারণ ক্রিয়া ১—অত্যন্ত সর্পবিষক্রিয়া সহ ইল্যাপ্‌স্‌ ক্রিয়ার সাধারণ মাদৃশ্য থাকা ব্যতীত ইহার ক্রিয়ার বিশেষতা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জ্ঞাত নহি । তবে রোগচিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহা ইহার রোগারোগ্যালক্ষ বহুদশিতার ফল ।

চিকিৎসা কর্ণরোগ—প্রতিশ্রায় ; কাণপাকা ।—
ইল্যাপ্‌স্‌সের কর্ণসন্ধি রোগে কর্ণে কাল খটল জন্মে, কর্ণনাদ হয় ও কর্ণ পাকিয়া উঠে । ইহার তরল পূয়ের বর্ণ পীতাম্বুজ এবং রক্তমিশ্রিত । ইহা ল্যাকেসিস এবং ক্রেটেলাস সহ তুলনীয় ।

লেকচার ৬৭ (LECTURE LXVII.)

জান্তব ঔষধশ্রেণী ।

ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী জীবোৎপন্ন ঔষধ ।

১। ক্যাক্টরিয়াম্ । ২। হিপ্‌মেন্‌স্ । ৩। ক্যাক্টর
ইকুই । ৪। মস্‌কাস্ । ৫। মেফিটিস্ । ৬। ল্যাক্
কেনিম্ । ৭। ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম্ ।

উপরি উক্ত ঔষধনিচয়ের পরীক্ষা আশানুরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খতা সহ না
হইলেও রোগচিকিৎসায় তাহাদিগের উপকারিতা সন্দেহে আমরা নিতান্ত
অজ্ঞ নহি। চিকিৎসক বিশেষের বহুদশিতাদেয় জ্ঞানের উপর আনাদিগের
এই সকল ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত। অতএব নিম্নে এই সকল
ঔষধের লক্ষণ সন্দেহে যাহা বিবৃত হইল, চিকিৎসক-মণ্ডলের ভবিষ্যৎ
অনুসন্ধানের উপরে যে তাহার উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা বলা বাহুল্য।

১। ক্যাক্টরিয়াম্ (Castorium.) ।

(বিভার নামক সামুদ্রিক জন্তুবিশেষের লিঙ্গত্বকের শুষ্কীভূত স্রাব) ।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াঃ—ক্যাক্টরিয়ামের যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও
ইহার লক্ষণ সন্দেহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বাতপ্রকৃতির উত্তেজনা প্রবণ জ্বীলোক, যাহারা কোন কঠিন রোগাক্র-
মণের পর প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব বশতঃ গুল্মবায়ুরোগাক্রান্ত হয়, তাহা-
দিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। নিম্নে ইহার লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

লক্ষণঃ—ক্যাক্টরিয়ামের লক্ষণ—বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট, আশঙ্কান্বিত
এবং বিমর্ষ রোগিনী ঋতুস্রাবকালে চঞ্চলতাগ্রস্ত হয়। ছিন্নবৎ বেদনার

ঘর্ষণে বা চাপে উপশম । ঋতুকালে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ চাপ । বায়ু কর্তৃক উদরস্ফীতি, ঋতুকালে কুঁচকিতে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি এবং মলত্যাগেচ্ছা । নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্তনবৎ বেদনা । রক্তসংযুক্ত আমের মলত্যাগে, অথবা সাদাটে জলবৎ উদরাময়ে মলদ্বারের জ্বালা । মলত্যাগের পূর্বে কর্তনবৎ উদরশূলের চাপে অথবা রোগী দ্বিভাঁজ হইলে উপশম ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল ।—বাতপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের টাইফয়েড জ্বরান্তে জৈবপ্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগত না হওয়ার শিরঃশূল-প্রবণতা জন্মে । শিরঃশূলে মস্তক বন্ বন্ করে । মস্তকতক্ স্পর্শসহিষ্ণু এবং কীট বিচরণে অনুভূতিযুক্ত থাকিলে কাষ্টরিয়াম্ প্রযুক্ত হয় ।

উদরশূল ।—ভাবপ্রণতা বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক উদরশূলে শরীরের পাণ্ডুরতা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হঠাৎ দৈহিক শক্তির অভাব বশতঃ পদ শীতল হইলে ডাং ট্রোবোঁ কাষ্টরিয়াম্ প্রয়োগ করিতেন ।

আর্ন্তবাতাব বা এমেনরিয়া ।—আর্ন্তবাতাবরোগে বেদনায়ুক্ত উদরস্ফীতি জন্মিলে এবং জরায়ুর সংকোচন সহ কুছন বশতঃ ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তস্রাব হইলে ডাং ট্রোবোঁর কাষ্টরিয়াম্ প্রয়োগের ডাং টিষ্ট্ অনুমোদন করিয়াছেন ।

উদরাময় ।—দুর্বল ও বাতপ্রকৃতির শিশু, যাহারা গ্রীষ্মতাপে অথবা দস্তোদগমকালে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহাদিগের জলবৎ অথবা সবুজ আমযুক্ত উদরাময়ের যদি প্রচলিত ঔষধদ্বারা কোন উপকার না হয়, কাষ্টরিয়াম্ প্রয়োগোপযুক্ত ।

২। হিপমেন্‌স্ (Hippomanes Mancinelle.)।

লক্ষণঃ—প্রলাপ; গলক্ষত রোগে গলায় এবং অনমনীয়তে সংকোচন নিবন্ধন রোগী কিছু গলাধঃকরণ অসমর্থ; চক্ষুপট মুদ্রিত করিলে চক্ষুজ্বালাব বৃদ্ধি। স্বকে রসবিষিকা জন্মে।

চিকিৎসাঃ—উপরিউক্ত লক্ষণানুসারে স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের হিপমেন্‌স্ দ্বারা উপকার হইয়াছে।

৩। ক্যাস্টর ইকুই (Castor equi)।

চিকিৎসাঃ—ঘোটকের ক্ষুরের অভ্যন্তর ভাগে যে লোহিতবর্ণ পদার্থ জন্মে তাহাকে ক্যাস্টর ইকুই বলা যায়। ইহা স্তনাগ্রের ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হওয়ায় ফল দর্শাইয়াছে। স্তনের বোটা ফাটিয়া যায়, কর্কশ হয়, এমন কি দুর্দশাগ্রস্ত বোটা বুলিয়া পড়ে।

৪। মস্কান্, মুগনাভি, কস্তুরী (Moschus, Musk.)।

সম্বন্ধঃ—মস্কান্ বাহার কার্যপ্রতিষেধক—থায়ডিয়ন (শিরঃশূল জন্মাইলে)।

লক্ষণ।

মন প্রবল স্নায়ুঃ—রোগী সুরাপানোমত্তবৎ উত্তেজিত; নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুত; শরীরতাপ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিত; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; উন্মত্তবৎ প্রলাপ, শৃঙ্খলাহীন দ্রুত কথা; শুষ্ঠ নীলবর্ণ এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া যেপর্যন্ত রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত না হয় কটুবাচ্য বলিয়া থাকে; কোন প্রকার শব্দ হইলেই রোগী চমকিয়া উঠে; মৃত্যু সম্বন্ধীয় উৎকণ্ঠা; উৎকণ্ঠা জন্মিলে মুচ্ছার ভাব; মুচ্ছায় শরীরের শীতলতা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য; শুন্মবায়ু-রোগবৎ লক্ষণ; পানোমত্তবৎ প্রলাপ কথন; নিদ্রাহীনতা; পেশীর

আনর্জন ; শারীরিক ক্রিয়াবৈষম্য বা এট্যাক্সিয়া ; মুখের আশ্চর্যান্বিত ভাব ; ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ অপেক্ষা প্রবল ও স্থায়ী আক্ষেপ অধিকতর।

চিকিৎসা।

শুল্কবান্ধু বা হিষ্টিরিয়া ;—মস্কাস্ শুল্কবান্ধু রোগের লক্ষণমধ্যে মুচ্ছাই প্রধান। এসাফ্রিটিডা, ককুল্যাস, ইপ্সেসিয়া, এবং নাকস অস্কেরটা প্রভৃতি ঔষধের শুল্ক-বায়ুতেও মুচ্ছাই হইয়া থাকে, কিন্তু রোগলক্ষণের মধ্যে মুচ্ছাই প্রধান স্থানীয় হইলে অদিকান্ত স্থলে, মস্কাস্ লক্ষণসহ সাদৃশ্য প্রকাশ করায় রোগের উপস্থিত কালে ইহা উপযোগী। ধনুষ্টঙ্কার-বৎ আক্ষেপ, অজ্ঞানতা এবং পুনঃ পুনঃ মুচ্ছাইর আক্রমণ ইহার প্রদর্শক স্থানীয় লক্ষণ। কথিত লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে ডাং চিউজের মতে ইহা স্কোৎরুষ্ট এবং ডাং হেবারস্মিথের মতে শুল্কবান্ধু রোগে ইহা অত্যন্ত ঔষধ বলিয়া গণ্য। পেশীর আনর্জন এবং বক্ষের প্রচণ্ড আক্ষেপ অথবা সংকোচন বর্তমান থাকে। মুখে গর্জনা উঠে, রোগী শীত বোধ করে এবং তাহার মুখ নীলবর্ণ হইতে পারে। মস্কাস্ রোগী প্রচুর ও ফেফাসে মূত্রত্যাগ করে, তাহার “ম্লোবাস্ হিষ্টিরিকাস্ বা শুল্ক”, শিরঃশূল এবং উদর স্ফীতির লক্ষণ উপস্থিত হয়। অনেক সময়েই সহানুভূতিশীল বা সিম্প্যাথটিক স্নায়ুগুণ্ডলের উদরস্থ সোলার প্লেক্সাস্ বা স্নায়ুজালের উপর বায়ুর চাপ ইহার মুচ্ছাই এবং অটোতলের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়; এই সকল রোগীর বেগে উদগার উঠিলে রোগের উপশম হয়। অদম্য হাস্ত এবং মনভাবের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনে পর্যায়ক্রমে আনন্দ ও দুঃখের উপস্থিতিও ইহার লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

কামপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়ার কামোন্মাদনের লক্ষণ উপস্থিত থাকিতে পারে। শুন্সবায়ু ঘটিত হিকা ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে এবং শুন্সবায়ু-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উচ্চ শব্দের উদগারের পক্ষে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্কাস্ শুন্সবায়ুরোগী বড় কলহপ্রিয় বা কটুভাষী, এবং কলহ করিতে করিতে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্যালান্দিহাম ঔষধও কটুভাষিতা এবং তিরস্কার করার জন্ম খাত। সংক্ষেপতঃ আক্রমণ, পর্য্যায়ক্রমিক ক্রন্দন ও হাস্ত, গ্লবাস হিষ্টিরিকাস্ বা গুল্মের বর্তমানতা, প্রচুর ফেকাসে মূত্রত্যাগ এবং হঠাৎ অজ্ঞানতার উপস্থিতি প্রভৃতি শুন্সবায়ুরোগলক্ষণ অস্কাসের পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে। জাস্তব পদার্থোৎপন্ন অঙ্গাঙ্গ ঔষধমধ্যে ক্যাস্ট্রিফ্রাম ও অস্কাসের ত্রায় বহুতর স্নায়বিক দুর্বলতা ঘটিত অসতিমুতাদি শুন্সবায়ুর পূৰ্ণরূপ লক্ষণ পক্ষে উপযোগী। বাহাদিগের শরীরের অবস্থা শুন্সবায়ুরোগাক্রমণের আশঙ্কাত্ত বলিয়া অগ্নমিত হয় তাহাদিগের সেই অবস্থার সংশোধনে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্ ট্রাইডুলাস্ ; আক্ষেপিক হাঁপানি ; ফুসফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাত ; এঞ্জাইনা পেক্তুরিস্ বা হৃৎশূল ; হৃৎ-শব্দক কাসিস্ ; হৃৎকম্প।—এই সকল স্নায়ু বৈকারিক রোগেও অবস্থাবিশেষে অস্কাস্ উপকারী। এই সকল রোগের সহিত অনেক সময়েই শুন্সবায়ু লক্ষণের আভাস থাকে। খর্ খর্ শব্দবিশিষ্ট নিঃশ্বাস থাকিলে এবং আহারে ও হাস্তে রোগের আক্রমণ হইলে ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্ ট্রাইডুলাস্ রোগে (ইহার অধিকাংশ রোগে স্বরঘন্ত্র ও বক্ষের সংকোচন থাকায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়), আক্রমণ হঠাৎ হইলে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ শ্লেষ্মাপূর্ণ বক্ষে ঘড়ঘড়ি

থাকিলে ও বক্ষের খল্লীবৎ অবস্থায় তাহার সংকোচন বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ, জন্মিলে হাঁপানিরোগে, বক্ষে সংগৃহীত অত্যধিক প্লেথ্রা, নিষ্ঠূত করিবার কষ্টজনক ফুস্ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে, বক্ষের অতিশয় কশাভাব উপস্থিত হওয়ায় অনবরত দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তিবৃদ্ধি হৃৎশূল রোগে, যৎপরোনাস্তি শ্বাসকৃচ্ছ, ও প্লেথ্রার ঘড়ঘড়িযুক্ত হৃৎশব্দক কাসিতে এবং শ্বাসকৃচ্ছ, ও মৃত্যুকল্প উৎকর্থা প্রকাশক হৃৎকম্পরোগে অস্ফাট্ উপযোগী ঔষধ বনিয়া বিবেচিত হইয়াছে ।

৫ । মেফিটিস্ (Me phitis Americana.) ।

তুলনীয়া ঔষধ ১—এম্ব্রা, আর্স, ককাস্, করেলকরা, ড্রসিরা ।

সাম্প্রদায়িক ত্রিফলা ১—মেফিটিস্ প্রধানতঃ মস্তিষ্কমেরুমজ্জা আক্রমণ করায় নিউমোগাষ্ট্রিক্ স্নায়ু আক্রান্ত হইলে শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপক অবস্থা উৎপন্ন হয় । এজন্য ইহা হাঁপানি এবং হৃৎশব্দক কাসি প্রভৃতি রোগ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা ভূমের দেশীয় বিড়ালবৎ জন্তু বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ ১—শ্বাসযন্ত্র—পান করিতে জল স্বরযন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে । মথপায়াদিগের হাঁপানি এবং নিদ্রাকালে গন্ধকের বাষ্পাস্রাণের দ্বারা হাঁপানি । শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর, শ্বাসত্যাগ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে অথবা তাহাতে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ উৎপন্ন হয় । বক্ষের অবদলনভাব, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষভেদকারী বেদনা থাকায় জলপান করিলে, কথা কহিলে অথবা উচ্চ স্বরে পাঠ করিলে, ফাঁপা স্বরের আক্ষেপিক অথবা গভীর কাসির অবস্থায় শ্বাস টানিলে শ্বাসরোধের অহুভূতি জন্মে ; রোগী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না, আহ্বারের কতিপয় ঘণ্টা পর ভুক্ত বস্তু বমন করিয়া

ফেলে ; রোগ লক্ষণ রজনীতে ও শয়ন করিলে বৃদ্ধিত হয় এবং প্রাতঃকালে কাসি সরল হইলে কিঞ্চিৎ গয়ার উঠে।

চিকিৎসা।

হৃৎশব্দক কাসি বা হৃৎপিং কফঃ—স্বরযন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম আক্ষেপযুক্ত হৃৎশব্দক কাসিতে মেফিতিস্ উপকারী ঔষধ। রজনীতে শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে শ্বাসবোধের অনুভূতি জন্মিলে শিশু শ্বাস ফেলিতে পারে না। ডাং ফ্যারিংটন বলেন বাহির্দৃষ্টিতে ঔষধ রোগের বৃদ্ধি করে বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাতে ভোগকালের খর্বতা জন্মাইয়া থাকে। মেফিতিস্ রোগে প্রতিশ্রায়িক অবস্থাপেক্ষা হৃৎশব্দকেরই প্রাধান্য থাকে। ইহাব শ্বাসরোধ-কর অবস্থা কাসির সঙ্গে সঙ্গে এবং কেরেলিহাম রুডাভামের তাহা কাসির পূর্বে উপস্থিত হয় এবং তাহার পরে বোগী বড় দুর্বল হইয়া পড়ে। মেফিতিসের কাসিতে অধিক গয়ার থাকে না। ডাং ফিসার তাহার শিশু চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকে হৃৎপিংকাসিতে মেফিতিস্ অপেক্ষা ন্যাস্প্র্য্যালিন্ অধিকতর প্রশংসনীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যন্ত শুষ্ক কাসিতে প্রতিশ্রায়িক লক্ষণ সূক্ষ্ম না থাকিলে, কাসির আবেশের স্থায়িত্ব কাল অত্যধিক হইলে এবং তাহাতে বক্ষের সংকুচিতভাব বর্তমান থাকিলে ডাং ডিউইও ন্যাস্প্র্য্যালিনের উপকারিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। অতি যত্নপ্রদ হৃৎপিংকাসিতে মহাত্মা হ্যানিমান লিডামের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

হাঁপানিরোগ বা এড্‌হুনাঃ—মণ্ডপায়ীদিগের হাঁপানিরোগে মেফিতিস্ কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ক্ষয়কাশরোগের শ্বাসকৃচ্ছ, ড্রসিরা দ্বারা প্রশমিত না হইলে ইহার ব্যবহার করা

যাইতে পারে। **রুমেক্স** এবং **ষ্টিক্টাও** এখানে দৃষ্টব্য। রজনী ২ টার সময় রোগের বৃদ্ধি হইলে **রুমেক্স** এবং ডাং ব্লেকের মতে বিদীর্ণবৎ শিরঃশূল-উপসর্গযুক্ত রোগে **ষ্টিক্টা** উপযোগী। **মেক্সিটিস** রোগী বিলক্ষণ শৈত্যসিদ্ধি। বরফবৎ শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলেও রোগী আনন্দানুভব করে।

৩। ল্যাক্‌ কে‌নি‌নাম্‌, ল্যাক্‌-দুগ্ধ (Lac caninum)

সম্বন্ধ—ল্যাক্‌ কে‌নি‌নামের সমক্রিয় ঔষধাবলী—এপিস্‌, কনায়, মিউরেক্স, ল্যাকেসি, কেলি বাই, পালস্‌ সিপি, সাল্‌ফ।

সাধারণতঃ ইহার একমাত্রা ঔষধে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

সাধারণ ক্রিয়া—ল্যাক্‌ কে‌নি‌নাম বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও উপরি উক্ত স্নায়বিক এবং অস্থান্ন শরীরঘটনলক্ষণের যে বিশেষতা দৃষ্ট হয় তাহাতে রোগচিকিৎসায় ইহার নির্বাচন বিশেষ কষ্টসাধ্য বলিয়া অনুমিত হয় না। নিম্নে আমরা ইহার বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণের উল্লেখ করিয়া রোগ বর্ণন কালে অস্থান্ন লক্ষণের যথাযথ বিবরণ করিব।

মানসিক লক্ষণে রোগীকে অত্যন্ত বিস্মৃতিশীল দৃষ্ট হয়, রোগী কোন বস্তু ক্রয় করিলে তাহা ফেলিয়া চলিয়া যায়, কোন বিষয় লিখিতে অনেক অনাবশ্যক কথা লিখে অথবা আবশ্যক কথা লিখে না; শেষের কথা পরিত্যাগ করে; লিখিতে বা পড়িতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; অত্যন্ত বাতিকগ্রস্ত থাকে।

বিষন্ন এবং ভরসাহীন রোগী মনে করে তাহার রোগ অসাধ্য; তাহার বন্ধু বান্ধব কেহ জীবিত নাই; বাঁচিয়া ফল নাই; যে কোন সময়ে ক্রন্দন করিতে পারে।

অসঙ্গত এবং উত্তেজনা প্রবণ ; সকল সময়েই, বিশেষতঃ রজনীতে, শিশু ক্রন্দন করে ও চীৎকার করে।

মৃত্যু ভয়ে, উন্মাদ হইবে বলিয়া, সিঁড়ি হইতে পতিত হইবার আশঙ্কায় এবং একা থাকিতে রোগী ভীত হয়।

শরীর অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণ, অস্থির এবং স্পর্শসহিষ্ণু থাকে।

রোগ লক্ষণ এক স্থানে স্থির থাকে না, ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে, ঘরিত শরীরের একাংশ হইতে অন্যংশে ধাবিত হয়, কতিপয় ঘণ্টা অথবা দিবসের পর পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যায়।

চিকিৎসা।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো :—ল্যাক কেনির শিরোঘূর্ণন অতি আশ্চর্য্য প্রকারের। ভ্রমণকালে রোগীর অনুভূতি ভুলে যে, সে উচ্চে বায়ুমাগরে ভাসমান হইতেছে; শব্দনাবস্থায় বোধ করে যেন সে শস্যোপরি নাই। ল্যাকেসিস রোগী শয়ন করিলে বোধ করে যেন সে বায়ুমধ্যে ভাসিতেছে, তাহার শরীরে শয্যা সংস্পর্শ হইতেছে না, অথবা সে নিম্নে নামিয়া পড়িতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে ইহার পরীক্ষোত্তৃত লক্ষণের তাদৃশ প্রাচুর্য্য নাই অথবা রোগচিকিৎসায় ভ্রয়ো ব্যবহৃত হইয়া তাহার চিকিৎসকমণ্ডলীতে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বিশ্বাস বলিয়া গৃহীতও হয় নাই। তথাপি লক্ষণ নিচয়ের অবিরত স্থান পরিবর্তনশীলতা—যাহাতে রোগ প্রাথমিক আক্রমণ স্থান হইতে অন্যংশে যায় এবং পরেই পূর্ব্ব বা তৎসম্মিহিত স্থানে পুনরাবর্তন করে—এবিষয়ে চিকিৎসক মণ্ডলীত ঐকমত্য আছে। ফলতঃ বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগ লক্ষণের আড়াআড়ি ভাবে পুনঃ পুনঃ

স্থান পরিবর্তন ল্যাক্‌কেনির অকাটা ও অন্তঃসাধারণ প্রদর্শক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । উপরি উক্ত রূপ লক্ষণপ্রকৃতি বর্তমান থাকিলে পিনস বা অজীনারোগে পর্যায়ক্রমে এক নাসিকার রোধ ও অন্তর হইতে স্রাব, রসবাত বা রিউম্যাটিজম্, গলক্ষত, মারাত্মক গলক্ষত বা ডিফথিরিয়া (ক্ষত কাচের ছায় মসৃণ ও চক্চকে থাকে), ম্যাষ্টাইটিস বা স্তনপ্রদাহ প্রভৃতি প্রদাহিক রোগ এবং এমন কি গুল্মবায়ু প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক না কেন তাহার আনুষঙ্গিক বেদনাদি লক্ষণের যদি আড়া আড়ি ভাবের স্থান পরিবর্তন শীলতা বর্তমান থাকে ল্যাক্‌কেনি নাম্ তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

রক্তোবাহুল্য বা মেনেরিজিয়া ।—উজ্জল লোহিতবর্ণ, চটচটে এবং হৃতা হৃতাভাবের ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রগত ও অতি প্রচুর হইলে ল্যাক্‌কেনি উপকারী । ঋতুর পূর্বে ও ঋতুকালে স্তন ক্ষীণ, বেদনাত্মক এবং স্পর্শসহিষ্ণু থাকে । ক্রকাসের ঋতুশোণিত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং হৃতা হৃতা ভাবের হয় । স্তনের ক্ষীণি প্রভৃতিতে ইহা কন্যাস্থান সহ তুলনীয় ।

ফাইসমেট্রা বা ঘোনির ক্ষীণি ও ঘোনি হইতে বায়ু নিঃসরণরোগ—ল্যাক্‌কেনি আরোগ্য করিতে সক্ষম । এ রোগে ইহা ল্রিমিণ, লাইক, নাক্স ভ স্যাঙ্কুই সহ তুলনীয় ।

সহজ ও উপদংশজ ক্ষতের আকৃতি কাচবৎ মসৃণ ও চাকচিক্যশালী হইলে ল্যাক্‌কেনি উপকার করে ।

স্তন্য রোধ করিবার আবশ্যক হইলে ল্যাক্‌কেনি দ্বারা তাহা প্রায় নিশ্চিতরূপে সংসাধিত হয় । রুদ্ধ হৃৎ পুনরা-

নয়নে ল্যাক ডিফ্লু এবং এসাফি শ্রেষ্ঠ । ভ্যারেন্দ্ৰা-পাতার উষ্ণ পোপাণ্ডিসও রক্ত হৃৎ পুনরায়ন করিতে পারে । শিক্ষার্থীদের স্বরণ রাখা কর্তব্য যে ল্যাক কেমিনাম গলাভাস্ত্রে অনেক লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে ; এজ্ঞ ইহা তাহার রোগা-রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত ।

৪ । ল্যাক্ ডিফ্লরেটাম (Lac Defloratum.)

(শক্তিতে পরিণত হৃৎ বা ঘোল)

সাধারণ ক্রিয়াঃ—ডাং ডুকিন ঘোল দ্বারা বহুমূত্র ও লাল্যমেহ বা প্রসূমিত্তাররোগে চিকিৎসায় আশাতীত ফল লাভ করায় ডাং সোয়ান ইহাকে হোমিওপ্যাথি প্রথানুসারে শক্তিতে পরিণত করেন । তদবধি বহুতর কৃত্রিমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অতি কঠিন কঠিন রোগে ইহার ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত হলে ইহার অমোঘ রোগারোগ্য শক্তির নিঃসন্দিক্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

আমরা অনেকেই জ্ঞাত আছি কোন কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃই হৃৎবিদ্রোহী থাকে অথবা যে কোন প্রকার আকারে হৃৎ পান করিতে, এমন কি ছানা, মাখন প্রভৃতি হৃৎের অংশ বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী তাহারা আহাৰ করিতে পারে না, কিম্বা আহাৰ করিলে রুগ্ন হইয়া পড়ে । এই সকল ব্যক্তি হৃৎে বড়ই অসহিষ্ণু থাকে ; হৃৎের ঔষধগুণ পরীক্ষায় ইহারাই উপযুক্ত পাত্র । ইহারাই হৃৎ, ঘোলাদি যে কোন প্রকার হৃৎ, হইতে প্রস্তুতপদার্থ আহাৰ করিলে যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেই আমরা ইহার রোগারোগ্যকর ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি ।

হৃৎে অসহিষ্ণু ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীর অত্যন্ত শীতল ও রক্তহীন থাকে । উষ্ণ গৃহপ্রবেশ অথবা উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করা, ইহারাই কিছুতেই

ইহাদিগের শরীর উষ্ণ হয় না। ইহারা এতদূর শীতকাতর যে নিকীত গৃহেও বোধ করে যেন গাত্রে পাখীর বাতাস লাগিতেছে। ইহারা সিক্ত বায়ুতে বা আব হাওয়াতেও অসহিষ্ণু। ইহাদিগের সম্পূর্ণ শরীরে, বিশেষতঃ মস্তকে, রসবাতজ্জ বেদনা ও স্নানশূল হয়। শিক্ষার্থীদিগের স্রবণ রাখা উচিত যে হ্রস্বে বিষেষবিশিষ্ট ব্যক্তি, “হ্রস্ব পান করিলেই ঘাহাদিগের উদরাময় এবং বিবমিষা, বমন, বমনযুক্ত শিরঃশূল ও উদ্‌গার প্রভৃতি আমাশয় লক্ষণ উপস্থিত হয়” তাহারাই ল্যাক ডিফুরিটাম্ উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র।

লক্ষণ।

স্বভাবঃ—ভ্রমোৎসাহ, জীবন রক্ষার্থ চেষ্টাহীনতা; যত্ন হওয়ার নিশ্চিত ধারণা থাকিলেও রোগী তজ্জগত ভীত হয় না।

সম্প্রস্ক ১—বমনযুক্ত শিরঃশূল (আমেরিকার) প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিলে লগাটিদেশে আরম্ভ হইয়া মস্তকপশ্চাতে বিস্তৃত হয় (ব্রায়); ঋতুস্রাবকালীন তীক্ষ্ণ দপদপানি শিরঃশূলে বিবমিষা, বমন, অন্ধ্র, অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে; গোলমাল শব্দে, আলোকে ও শরীরচালনায় বদ্ধিত হয়; মস্তকে কশিয়া ফিতা বান্ধিলে তাহার উপশম হয়; শিরঃশূল হইলে রোগী প্রচুর ফেকাসে মত্ৰত্যাগ করে।

স্বভাবঃ ১—গুণ্ণবায়ু রোগে বোধ হয় যেন একটি বৃহৎ গোলা বা গুণ্ণ (Globus hystericus) আমাশয় হইতে উথিত হইয়া গলদেশে যাওয়ায় শ্বাসরোধ করিতেছে (এসফি)। নিদ্রাহীনতা বশতঃ বহুকালস্থায়ী এবং যৎপরোনাস্তি কষ্ট (ককু, নাই এসি) ও অন্ত্যস্ত অস্থিরতা জন্মে এবং কোন কার্য্য করুক বা না করুক রোগিণী

অত্যন্ত শক্তিহীন বোধ করে, ভ্রমণকালে ক্লান্ত হয় । রোগিনী বস্ত্রাবৃত থাকিলেও বোধ করে যেন শরীরোপরি শীতল বাতাস বহিতেছে ; যেন তাহার শয্যাবস্ত্র সিক্ত আছে ।

মল এবং মলদ্বার ;—নিষ্ফল মলবেগ ; বিষ্ঠা শুষ্ক এবং কঠিন ; বিষ্ঠা বৃহদায়তন ও কঠিন থাকে এবং অত্যন্ত বেগ দিয়া তাহা ত্যাগ করিতে মলদ্বার ক্ষত হয় ও রোগী বেদনায় চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে ।

স্রীজননেস্রিয় ;—ঋতুস্রাব বিলম্বে হয় ; শীতল জলে হস্ত ডুবাইলে ঋতুরোধ ঘটে (কনায়) ; ঋতুস্রাবকালে এক পেয়লা ছুঙ্ক পান করিলে তৎক্ষণাৎ ঋতুরোধ ঘটিয়া পরের ঋতু কাল পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ থাকে (কন্) ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক্ ;—নলাট প্রদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল আরোগ্য ল্যাক ডিফ্লুরেটান্ কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাত (লাভ) করিয়াছে । শিরঃশূল দপদপানি প্রকৃতিবিশিষ্ট । রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায় । রোগিনীর কঠিন কোষ্ঠ বন্ধ থাকে এবং বিবমিষা ও বমন হয় ।

বল্লমূত্র, মধুমেহ বা ডাইয়াবিটিস্ মেলি-টাস্ ;—মধুমেহ চিকিৎসায় ননি তোলা (টানা) ছুঙ্ক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রথমে রোগীর অবস্থা বিশেষে কিঞ্চিৎ ন্যানাধিক সাধারণ পেয়ালার এক পেয়লা (অঃ ৬-৮) করিয়া ছুঙ্ক পূর্কীক্ল, মধ্যাক্স, এবং রক্তনীতে পানের ব্যবস্থা করিয়া তাহা সহ হইলে এবং রোগীর অবস্থা ক্রমে উন্নতি লাভ করিলে তাহার মাত্রার বৃদ্ধি করা আবশ্যিক । এক্ষণে রোগী

দৈনিক ৪।৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিতে পারে। ফলতঃ আমরা রোগীকে উপরি উক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করাইয়াছি। শর্করায়ুক্ত খাদ্য রহিত করিতে হয়।

জরায়ুব্রংশ বা প্রল্যাপ্সাস্ ইউটারাই।—
রক্তাল্পতা, বিশিষ্ট, পুষ্টিহীন, দুর্বল এবং শীর্ণকায় স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর রক্তাধিক্য ব্যতীতও যদি শিথিল জরায়ু স্থানচ্যুত হইয়া বুলিয়া পড়ে ল্যাক ডিফ্লুরেটাম তাহা আরোগ্য করিতে পারে। এনে-
ট্রিস্, কলফা, এবিস্ কেনা, ক্যাক্সে ফস্, নেট্‌মিউ, হেলনিয়াস্ এবং নেট্রাম হাইপক্লর প্রভৃতি ইহার অগ্গাণ্ড ঔষধ।

রক্তপ্লোরোথ বা সাপ্রেসন অব মেসস্।—শীতল জলমধ্যে হস্ত ডুবাইলে অথবা নানাধিক এক বাটি ঠাণ্ডা ও কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে ল্যাক ডিফ্লুরেটাম ঋতুরোধ ঘটে। ঔষধের ব্যবহার না করিলে, তৎপরে শীতল জলমধ্যে হস্ত রাখিলে কোনার্হামেও ঋতুরোধ ঘটে। ইহা এ রোগে ফসফরাস সহও তুলনীয় হয়।

জলশোথ বা ড্রুপসিস্।—উপাদানগত হৃৎরোগ, পুরাতন যক্ষ্মাবিকার ও বহুকালের লালামেহ বা এম্‌মিউরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্ম এবং সবিরাম জরাস্ত্রিক জলশোথরোগ ল্যাক ডিফ্লুরেটাম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

অদম্য কোষ্ঠবন্ধরোগে বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুষ্ক ও কঠিন থাকিয়া পুনঃপুনঃ নিষ্ফল মলবেগ হইলে এবং বেগ দ্বারা অতি কষ্টে মলত্যাগ করিতে মলদ্বার ছিন্ন হওয়ায় যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চাঁৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে ল্যাক ডিফ্লুরেটাম্ তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

ফলতঃ ননী বিবর্জিত অথবা নির্জলা বা অমিশ্র গো-দুগ্ধ রোগীর অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ব্যবস্থা করিয়া আমরা বহুতর অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ, পুরাতন উদ্ভ্রামহ, পুরাতন আমরক্ত এবং জলশোথ-রোগ আরোগ্য করিয়াছি। বসাপকৃষ্টতারোগেও এরূপ চিকিৎসায় উপকার পাওয়া যায়; মেদরোগ বা শরীরে বসাদিক্য জন্ম স্থূলতা নিবারণের ইহা অতি প্রকৃষ্ট উপায়। তাহাতে ননী তোলা দুগ্ধই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। এরূপ চিকিৎসায় আমরা জল একরূপ বন্ধ করাই শ্রেয় মনে করি, তবে রোগীর নির্বন্ধাতিশয় জন্ম অল্প পরিমাণ জল দেওয়া ঘাইতে পারে। জলের পরিবর্তে বেদানার রস উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

রুসিয়া এবং মধ্য এশিয়া দেশে মধুমেহ, লালামেহ, হস্তম্বাকাশ এবং নানাপ্রকার জলশোথ রোগাদির জন্ম একরূপ চিকিৎসা প্রচলিত আছে, তাহা “কুমিস্ চিকিৎসা” নামে খ্যাত। ঘোটক অথবা গাভীর দুগ্ধ হইতে “কুমিস্” প্রস্তুত হয়। রুসিয়া দেশে ইহার এইরূপ প্রস্তুত প্রণালী—দুই চামচপূর্ণ গোধূমের ময়দা, ত্রৈরূপ এক চামচ মধু, এক চামচ বিয়ার মত্তের গাঁজলা ও যথোপযুক্ত দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত ও কাদার ছায় প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিলে তাহা ফাঁপিয়া উঠে বা উচ্ছলিত হয়। এই বস্তু বস্তুর খলিতে পুরিয়া ৭।৮ সের দুগ্ধ পূর্ণপাত্রের উপর ১৬ হইতে ২৪ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিলে খলি হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ পদার্থ দুগ্ধে পতিত হওয়ায় দুগ্ধ পরিবর্তিত হইলে “কুমিস্” প্রস্তুত হয়। রোগীর অবস্থানুসারে ইহা প্রতিদিন ৪।৫।৬ সের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা যায়।

লেখক্কার ৬৮ (LECTURE LXVIII)

বাট্র্যাচিয়া জাতিভুক্ত ঔষধ ।

বাফ রেণা (Bufo Rana.) ।

সাধারণ নাম :—কটকটে ব্যাঙ্গ বা টোড (Toad.) ।

ভুলনীয় ঔষধ :—এথাস্ ক্যা, কনায়, ল্যাকেসি, ফস্ ।

সাধারণ ক্রিয়াজ্ঞা :—বাফের পরীক্ষালক্ক বিশ্বাসযোগ্য কোন লক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। ইহার ক্রিয়াবিষয়ে যাহা লিখিত হইল তাহার অধিকাংশই চিকিৎসালক্ক বহুদর্শিতা ও কিঞ্চিৎ উপরি-উক্ত পরীক্ষা হইতে সংগৃহীত লক্ষণ মাত্র। ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধিবৃদ্ধি এবং গতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানের বিকার বশতঃ রোগীর কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হইলে রোগী পশুবেৎ আচরণ করে। তাহার মাদক দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা জন্মে এবং হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় সে নিভৃত স্থানের অব্যেগণ করে। প্রবাদ আছে ইহাতে ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হয় বলিয়া কোন কোন অসতী স্ত্রীলোক স্বকার্য্য সাধন মানসে স্বামীর ধ্বজভঙ্গ উৎপাদন জন্ত ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় মুগীবৎ সর্কাস্ট্রীন আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ইহা অতি সত্বর লসীকামণ্ডলী আক্রমণ করায় রস প্রণালী বাহিন্য়া নীলবর্ণ ক্ষীতি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ সময়ে এই ক্ষীতি কোন ক্ষত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে ; স্বক্কে ইহার প্রগাঢ় ক্রিয়া আছে।

চিকিৎসা ।

স্বগীরোপ বা এপিলেপ্‌সি :—ভীতি ও হস্তমৈথুন অথবা অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন মুগীরোগের বাফ অত্যন্ত প্রধান

ঔষধ রূপে গণ্য। ইহার “অরা” অথবা রোগাক্রমণের পূর্বে সতর্ককারী লক্ষণ জননেক্রিয় হইতে উখিত হয়, এবং সঙ্গমের অবস্থাতেও রোগের আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। ইহার রোগের প্রকারভেদে “অরা” সোলার প্রেক্সাস বা উদরাভ্যন্তরীণ সহানুভূতিক স্নায়ুজালবিশেষ হইতেও বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগাক্রমণের পূর্বে রোগী উত্তেজনা প্রবণ থাকে, অনেক সময় অসংলগ্ন কথা কহে, এবং অল্পেই ক্রোধান্বিত হয়। কিন্তু অথবা ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রযুক্ত রোগ চিকিৎসাতেই বাহ্যিক রোগের প্রকৃষ্ট উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোগের আক্ষেপকালে মস্তক পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাং লিপি বলেন “ঋতুস্রাবের অবস্থার এবং চর্চাৎ ভীতি প্রযুক্ত মূরীরোগে ইহা উপকারী।”

কুমির উত্তেজনা বশতঃ মৃগীবাৎ আক্ষেপকালে অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখিত রোগী যদি “নীলবর্ণ” হইয়া যায় তাহাতে ইন্ডিগো ফলপ্রদ। নাকস ভনিকার স্নায়ু বাহ্যিক ও অন্তঃস্থ উগ্রস্বভাব ও উত্তেজনা-প্রবণ থাকে। এই দুই ঔষধ এবং সিলিসিয়া ও ক্যালক্সে-রিল্লার “অরা” সোলার প্রেক্সাস হইতে উখিত হয়।’ স্টেনামের মৃগীও কুমি আদির প্রতিক্রিয়া এবং জননেক্রিয় সংশ্লিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়।

বাহ্যিক চিকিৎসা অস্ত্রাণ্ড রোগমধ্যে মারাত্মক (Malignant) কৃত এবং তৎসংশ্লিষ্ট লসীকাপ্রণালীর নীলবর্ণ স্ফীতি, স্তনের দড়কচড়া ভাবের স্ফীতি বা ককট রোগ সংশ্লিষ্ট স্ফীতি ও মস্তিষ্ককোমলতা প্রধান।

লেখক্কার ৬৯ (LECTURE LXIX.)

মেলাস্কা শ্রেণীর জাস্তব ঔষধ ।

মুরেক্স (Murex.) ।

কোমল শরীরবিশিষ্ট সামুদ্রিক জন্তুবিশেষের রক্তক পদার্থের থলির রস ।
স্বাস্থ্যের ক্রিয়া :—মুরেক্স সিপিয়ার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত
বস্তু । বিশেষ যত্নপূর্বক পরীক্ষিত না হইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার
ক্রিয়াবিষয়ে যতদূর স্থিরীভূত হইয়াছে তাহাতে নিশ্চিতরূপে জ্ঞদয়ঙ্গম হয় যে
সিপিয়ার তায় ইহা ও জরায়ুর রক্তাধিকা উৎপন্ন করে এবং সিপিয়ার ক্রিয়া
সহ ইহার ক্রিয়ার লক্ষণগত অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ।
আমাশয় স্থানে “দমিয়া যাওয়া” বা “কিছু নাই নাই ভাব” এবং অভ্যন্ত-
রীণ সন্ত্রানিচয়ের মৌনিপথে তৈলিয়া বাতির
হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে উপবেশন ও আড়া-
আড়িভাবে উরুদয় সবলে সংলগ্ন করিয়া
তাহার বাধা দেওয়ার চেষ্টা উভয় ঔষধেই বিজ্ঞমান আছে ।
প্রভেদ এই যে মুরেক্সরোগীর অতিশয় ও প্রায় অদমা সঙ্গমেচ্ছা এবং
সিপিয়াতে তাহার অভাব অথবা তাহাতে ঘৃণা বর্তমান থাকে । জননে-
ক্রিয় সংস্পর্শে মুরেক্সের সঙ্গমেচ্ছা প্রবলতর হয় । ইহার শ্রাবাদি সিপিয়ার
শ্রাবাপেক্ষা অধিকতর থাকে । ইহার ঋতুশ্রাব অধিকতর প্রচুর । রজনীতে
রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয় এবং তাহার প্রচণ্ড মূত্রবেগ হইলে প্রভূত
পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্যাগ করে । সিপিয়াতে এরূপ দৃষ্ট হয় না । উভয়
ঔষধেই থাকিয়া থাকিয়া ঋতুশ্রাব হয়, এবং উভয়ই জরায়ুর গ্রীবার রোগে
উপকার করে ।

চিকিৎসা ।

মুক্তমেহ বা শলি স্ক্রিন্স :—আমরা উপরে **মুরেকসেস**র যে মূত্রাধিকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে রোগী রজনীতে প্রভূত পরিমাণ ফেব্রুয়ে মূত্র ত্যাগ করে। ডাং এলেন অল্প প্রকার মূত্রাধিকার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে কোন রোগী রজনীতে **ভ্যালেরিয়ানা**র পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ করিয়াছিল। তবে বিদিত থাকা উচিত যে প্রচুর মূত্রশ্রাবই **মুরেকসেস**র নিয়মিত ক্রিয়া এবং তাহারই অনেক রোগী ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

স্তনার্ধুদ বা ম্যামারি টিউমার :—ডাং জসেট্ **মুরেকসেস** দ্বারা বহুতর রোগীর ম্যামারি টিউমারের বেদনা, বিশেষতঃ তাহা ঋতুশ্রাবকালে বদ্ধিত হইলে, উপশম করিয়াছেন।

স্ত্রীজননেত্রিস্বরোগ-মেনেরেজিয়া ; **শ্বেত-প্রদর বা লুকরিয়া** ; **জন্ডিস** বা **প্রিন্সিপালস্** ; **স্ক্রুটারাই** ; **প্রসবান্তিক অসংযত জন্ডিস** বা **সাব ইন্ডলুশন্** অব্ **স্ক্রুটারাস** ; এবং **কামোস্যাদ** প্রভৃতি :—**মুরেকসেস**র রজাধিক্য বা মেনেরেজিয়ার বিষয় আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং **সিপিহা** সহ তাহার প্রভেদও বলিয়াছি।

ফলতঃ **জন্ডিস** রোগেই **মুরেকসেস্** বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহা তাহার সর্বপ্রধান বা প্রায় এক মাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি ঘোষ ঘটে না। ইহাতে বস্তিকোটরমধ্যে গুরুত্বানুভূতি জন্মে এবং বোধ হয় যেন উদরবস্ত্রাদির যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে; রোগী তাহার বাধা জন্মাইবার জন্ত বসিয়া আড়াআড়ি ভাবে উরুদ্বয়

কঠিনরূপে সংবদ্ধ করে ; আমাশয়স্থানে খালি বোধ হয় এবং তীক্ষ্ণ বেদনা উর্দ্ধে স্তন পর্য্যন্ত যায় ; কোন কোন রোগীর বেদনা শয়নে বৃদ্ধি হয় এবং সেক্রাম বা বস্তুপশ্চাতের অস্থি কনকন করে ; কাহার বা প্রচুর ও সবুজ অথবা রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর দৃষ্ট হয়, রোগী অস্বাভাবিক-রূপে কামাতুর থাকে এবং তাহার জরায়ু বিবৃদ্ধ, কঠিন ও দড় কচড়া ভাবযুক্ত হয় ; অধিকাংশ রোগীরই উপবেশনাবস্থায় জরায়ুতে টাটানি বোধ হওয়ায় বাস্তকোটরমধ্যে তাহার জরায়ুর অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। জরায়ুদ্রংশ হইলে রক্তোচ্ছ, বা বাপ্রক বেদনা হয়। গর্ভশ্রাব অথবা কৃচ্ছসাধা প্রসবের পর জরায়ুর পুরাতন প্রদাহে জরায়ুতে স্পর্শসাহিষ্ণু বেদনা থাকিলে এবং দক্ষিণ অণ্ডাধার প্রদেশের টাটানি দক্ষিণ বক্ষে বিস্তৃত হইলে মুরেক্স উপকারী।

প্রসবান্তে জরায়ু সংকুচিত হইয়া স্বাভাবিক আকারাদিতে পরিণত বা সংযত না হওয়ান্ন (Sub involution) সরলান্নোপরি গুরু চাপ, অর্শের স্ফীতি, ঈষৎ সবুজাভ-পীতবর্ণ, কখন কখন রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর, কখন বা মলত্যাগকালে যোনিদ্বার হইতে রক্তশ্রাব এবং কতিদেশে অত্যন্ত ক্লান্তি, নিম্নাঙ্গে বেদনা ও জরায়ুতে ছুরিকাঘাতবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি, জন্মিলে মুরেক্স দ্বারা মহত্বপকার হয়। ইহাতে জরায়ুগ্রীবা দপদপ করে।

জরায়ুরোগে মুরেক্সের সিপিহা, লিলিহাম, প্ল্যাটিনাম এবং ক্রিস্টিয়াজেট সহ তুলনার আবশ্যিক। সিপিহা অনেকাংশে মুরেক্সের তুল্য হইলেও শ্রাবের আপেক্ষিক স্বল্পতা ও কামেচ্ছার অভাব স্পষ্ট প্রভেদক থাকে। জরায়ুগ্রীবারোগেও উভয় ঔষধমধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু রুগ্ন স্থানের টাটানির অথবা বাস্তকোটরের ক্ষত স্থানের উপরিভাগে কোন বস্তুর চাপ লাগার অনুভূতি থাকার, তাহা হইতে

ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা উদরে ও বক্ষে ধাবিত হওয়ায় পূর্বকথিত রূপ ঘন পীত অথবা রক্তযুক্ত শ্বেতপ্রদরের বর্তমানতায় **মুরেকস** সিপিহ্লা হইতে প্রভেদিত হয়।

মূত্রাধিক্যে **মুরেকস** ক্রিস্টিজোলাটেইর সমকক্ষ; উভয়েই রজনীতে পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণ মূত্রত্যাগ হয়; প্রথম ঔষধে মূত্রের প্রচণ্ড বেগ হইলে রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয়, শেষোক্তে তাড়াতাড়ির সহিত প্রচুব ও দুর্গন্ধ মূত্রত্যাগ হয়।

মুরেকস, সিপিহ্লা এবং ক্রিস্টিজোলাটেই, তিন ঔষধেই সবিরাম ঋতুশ্রাব হয় এবং উদরবস্ত্রের ঠেলমাঝাও ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ থাকে; সিপিহ্লা এবং ক্রিস্টিজোলাটেইর সঙ্গম কষ্টপ্রদ, **মুরেকস**ে তাহা অদম্য; **মুরেকস** এবং ক্রিস্টিজোলাটেই আক্ষেপক ঋতুশ্রাবের প্রচুরতা থাকে। ক্রিস্টিজোলাটেইর শ্বেত-প্রদর উভয়াপেক্ষাই উগ্রতর ও ক্ষতকর থাকে, এবং সংস্পৃষ্ট স্থানে তাহা হাজা উৎপন্ন করে।

কামোন্মত্ততায় ইহা লিলিহ্লাম এবং প্লাউটিনামের সহিত তুলনা করা যায়।



লেখকচার ৭০ (LECTURE LXX.)

রেডিযেটা জাতিয় জালুব ঔষধ ।

১। করেলিয়াম্ রুড্রাম্ । ২। মেডুসা । ৩।
ব্যাড়িয়াগা ।

১। করেলিয়াম্ (Corallium Rubrum) ।

সাধারণ নাম ।—রেড করাল, রক্ত প্রবাল ।

ভুলনীয়া ঔষধ ।—বেল, ককাস ক্যাক্টরি, ডুসিরা, মার্ক, নাই
এসি, নাক্‌স্‌ভ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—করেলিয়াম গ্রন্থির স্নায়ুগুণল আক্রমণ
করিয়া স্বাস্থ্যপথের প্রতিশায়িক অবস্থা উৎপন্ন করিলে অত্যন্ত স্বাস-
কৃচ্ছ উপস্থিত হয় এবং বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইতে থাকে ।

ইহা ত্বকে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাগতে সরা ও সিফিলিস বা
উপদংশ বিষ-বাস্পের মিশ্রিত ক্রিম্বার আভাস পাওয়া যায় ; প্রকৃত পক্ষেও
কার্য্য ক্ষেত্রে ইহা তৎ বিষয়ক পরিচয় প্রদান করিয়াছে ।

লক্ষণ ।

নাসিকা ।—শুষ্ক সন্ধিতে নাসিকা রুদ্ধ থাকে ; নাসারন্ধ্র ক্ষত-
যুক্ত । স্রাবযুক্ত প্রচণ্ড সন্ধিতে গলিত মোমের তায় গন্ধহীন শ্লেষ্মাস্রাব ।
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রজনীতেই অধিক ।

পুং জলনেত্রিয় ।—লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টন্যকের অভ্য-
ন্তর প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণু, লোহিতবর্ণ ও ক্ষীত ; তাহা হইতে ঈষৎ

পীতাম্বুজ ও দুর্গন্ধ শ্রাব । লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টকের অভ্যন্তর প্রদেশে লোহিত ও সমতল ক্ষত জন্মিলে ঈষৎ পীত রস নিঃসৃত হইতে থাকে ।

শ্বাসযন্ত্র :—প্রাতঃকালে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে বোধ হয় যেন বায়ুনলীপথে বরফবৎ শীতল বায়ুর স্রোত বহিতেছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ কাসির উদ্বেক হইলে শ্বাসনলী হইতে অনেক কষ্টে গম্মার তোলা যায় । কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসপ্রশ্বাস । থাকিয়া থাকিয়া প্রবল আক্ষেপিক কাসি ।

অরুচি :—অল্পপাণি, বিশেষতঃ করতলোপরি মস্থন কলঙ্ক । প্রথমে তাহা প্রবালবৎ লোহিত বর্ণ থাকে এবং ক্রমে কৃষ্ণাভা হইলে তাহা উপদংশের ছায় বিশেষ পরিচিত তাব্রবর্ণ ধারণ করে (ফ্যারিংটন) ।

চিকিৎসা ।

নাসিকা সর্দি :—ডাঃ হ্যাস বলেন—“আমি বহুদশিতা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি যে, কক্সাল পশ্চাৎ নাসিকারন্ধুর সন্ধিরোগের অগ্রতম উৎকৃষ্ট ঔষধ ; পশ্চাৎ নাসাপথ হইতে বিন্দু বিন্দু স্লেষ্মা গলমধ্যে পতিত হয় । অত্র কোন ঔষধের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না পাইলে আমি অধিকাংশ রোগীকেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করি । ইহা নিষ্ফল হওয়ার সংবাদ আমি কচিৎ পাইয়া থাকি ।” এস্থলে **নেত্রাম কার্ল** তুলনীয় ঔষধ ।

হৃৎপিণ্ড কাসি বা হৃৎপিণ্ড কফ :—কঠিন হৃৎপিণ্ডকাসির পক্ষে কক্সাল উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য । কাসির আক্রমণ হইবার পূর্বে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে । শিশু খাবি খাওয়ার ছায় করিলে তাহার মুখ কাল হইয়া যায় । ইহাতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী ও ঘণ্টাধরানবৎ কাসি অতি শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে তাহাকে

“মিনিট গান্” কাসি বলে। খাবি খাওয়ার ছায় ও কর্কশ শব্দের স্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা ইহার স্বাসরোধের অবস্থা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় কাসির আক্রমণের পর শিশু নিস্তেজ হওয়ার চলিয়া পড়ে। সম্ভবতঃ ইহা অনেক সময়েই রোগের শেষাবস্থায় উপযোগী, কিন্তু রোগে স্নায়বিক লক্ষণের বর্তমানতা এবং রোগাক্রমণের পূর্বে বক্ষের সংকোচন ইহার অতি আবশ্যিকীয় নির্দেশক লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার কাকরববৎ নিঃশ্বাসশব্দ বা হৃৎ স্পন্দিত্বের ছায় সুস্পষ্ট নহে। ডাং টিষ্ট কোরেলিয়াম্ এবং চেলিডনিয়ামকে ছপ শব্দক কাসির চিকিৎসার পক্ষে অত্যাবশ্যিকীয় ঔষধ বলিয়া উপদেশ দিতেন এবং ডাং ডান্‌হাম কল্লানকে প্রচণ্ড রোগের ঔষধ বলিয়া প্রশংসা করিতেন।

শ্রাঙ্কার বা উপদংশজ ক্ষতঃ—প্রবালের ছায় নোহিতবর্ণ, সমতল এবং অতিশয় জড়ভাববিশিষ্ট ও কখন কখন বেদনাযুক্ত উপদংশের ক্ষত চিকিৎসায় কল্লান অতি উপকারী ঔষধমধ্যে ধর্তব্য। উপদংশজ কোমল ক্ষত বা শ্রাঙ্ক ইড কিম্বা সফট শ্রাঙ্কার ইহা অতি শীঘ্র ও নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া থাকে।

২। মেডুসা বা জেলিফিস (Medusa or Jellyfish.)।

চিকিৎসাঃ—মেডুসা আটিকা স্কুরেন্সের ছায় আমবাত আরোগ্যকারী ঔষধ। কিড্নিতেও ইহা কিঞ্চিৎ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

৩। ব্যাডিয়াগা (Badiaga.)

সাম্ভারন নামঃ—ফ্রেশ ওয়াটার স্পঞ্জ।

ভুলনীল ঔষধঃ—ব্যারা কা, আয়ডি, কেলি আয়, মার্ক, ফাইটল, মিলিক, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্‌ফার।

সাম্ভ্রাণ ক্রিয়া :—কশিয়াদেশের নির্মূল জলমধ্যস্থ স্পঞ্জ ব্যাডিয়াগা নামে খ্যাত । ইহার উপাদান বিশ্লেষণ করিলে লাইম (চূর্ণ), সিলিকা (বালুকা) ও এলুমিনা (কর্দম) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সকল বস্তুর উপরেই ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে বলিয়া হানিমান ইহাকে এটিসোরিক ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন । ইহা শোণিতে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা যে শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা গাণ্ডমালা ঘটিত শারীরিক অবস্থার সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ইহার ক্রিয়ায় মুখ-মণ্ডলে যে তাব্রণ উদ্ভেদ উঠে তাহা এবং ইহার উপদংশজ বাঘি আরোগ্যের ক্ষমতা ইহাকে এটিসিফিটিক বা উপদংশবিষ প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়াও প্রতিপন্ন করে । ইহা অনেকাংশে স্পঞ্জিয়ার সমক্রিয়া ঔষধ ।

লক্ষণ ।

স্নানু :—সম্পূর্ণ শরীরের পেশীর এবং স্বকের ঘৃষ্টবৎ বেদনা ; স্পর্শে এমন কি বস্ত্র স্পর্শেও পেশী টাটায় ; আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার স্থায় টাটানি ।

হৃৎপিণ্ড :—হৃৎপিণ্ডের কঠিন থর থর কম্প ; উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায়, বিশেষতঃ হঠাৎ মানসিক উল্লাস বা ভাবোত্তেজনা জন্মিলে, শঙ্কিত ভাবের হৃৎকম্প ।

চিকিৎসা :—আমরা ইতিপূর্বে ব্যাডিয়াগার হৃৎপিণ্ড লক্ষণ বিবৃত করিয়াছি । কার্যক্ষেত্রেও হঠাৎ উল্লাস প্রভৃতি মানসিক ভাবোত্তেজনা বশতঃ হৃৎকম্প হইলে কফিহা এবং ফসফরা-সের স্থায় ইহা দ্বারাও উপকার হইয়া থাকে । উপদংশ অথবা পূয়-মেহ নিবন্ধন বাগী বা বিউবোর কুচিকিৎসা হওয়ায় তাহা দড়কচড়া ভাব ধারণ করিলে কার্ব্ব এনিয়ালিনেলের স্থায় কার্য্য করিয়া ব্যাডিয়াগাও তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

লেকচার ৭১. (LECTURE LXXI).

কীট ও পতঙ্গ পর্যায়ের জান্তব ঔষধশ্রেণী।

- ১। ককাস্ ক্যাক্টাই। ২। সিমেক্‌স্।
৩। ভেস্পা। ৪। ফর্সিকা। ৫। ডরিফরা।
৬। র্যাটা।

১। ককাস্ ক্যাক্টাই (Coccus Cacti.)।

তুলনীয় ঔষধ :- ক্যাচারিস, আয়ডি, কেলি বাই, কেলি আয়।

সাধারণ ক্রিয়া :- মস্তক-মেরুজ্জের স্নায়ুগুণ্ডল আক্রমণ দ্বারা ককাস কিডনি এবং পরিপাকবন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়াফলে আক্রান্ত যন্ত্রাংশের উত্তেজনা এবং প্রদাহ হইলে তাহা হইতে, বিশেষতঃ গলগহ্বর ও স্বরযন্ত্র হইতে, প্রভূত পরিমাণ আটা এবং দড়ি দড়ি শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

লক্ষণ।

নাসিকা :- পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি। নাসিকা হইতে অত্যধিক শ্লেষ্মার নিঃসরণ। নাসিকার শুষ্কতা। নাসারন্ধ্রের পার্শ্বে পীতবর্ণ মামড়ি।

শ্বাসযন্ত্র :- বায়ুনলীমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। বায়ুনলীতে অবদারণ-ভাব বশতঃ কাসি। স্বরযন্ত্রপশ্চাতে আথুরোট ফলের ত্রায় বস্তু ঋণ্ড আবদ্ধ থাকি বোধ হওয়ায় বারম্বার রোগী তাহা গলাধঃকরণ চেষ্টা করিতে বাধ্য। স্বরযন্ত্রে প্রচণ্ড শুড়শুড়ি হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগী কাসিয়া অনেক আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করে। শুড়শুড়িযুক্ত কাসির

আক্রমণ শ্লেষ্মা উঠিলে শেষ হয় । দস্ত মাজিলে অথবা মুখ ধৌত করিলে কাসি পায় । কাসিলে অনেক আটা ও শ্বেতলালাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে । কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস । বক্ষ কষ্ট ও টাটানি । বক্ষপার্শ্বে স্থিচিবেধার ও খোঁচালাগার ঠায় বেদনা ।

পানমথ্য :—গলমধ্যে ও গলগহ্বরে শুষ্কতা ও জ্বালা । গলমধ্যে কাঁচা ও ছাঁচা বোধ হইলে শ্লেষ্মা নির্দ্যুত হয় । উপজিহ্বা প্রলম্বিত বোধ হওয়ায় অবিশ্রান্ত গলাখাঁকর । অবিরত গলাগুড়গুড়ি । গলমধ্যের রোগ লক্ষণ তাপে, বিশেষতঃ শয্যাতাপে, বদ্ধিত । গেলার কষ্ট ।

মূত্রযন্ত্র :—উভয় কিডনিপ্রদেশে মূত্র চাপবৎ ও টাটানি বেদনা । মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীতে জ্বালা, মূত্রনলীতে স্থিচিবেধবৎ বেদনা ও চুলকনা । পুনঃ পুনঃ ও অত্যধিক মূত্রবেগ । বারম্বার ও প্রচুর পরিষ্কার মূত্রস্রাব করিলে সত্ত্বর তাহা আবিল যুক্ত ও অপরিষ্কার হইয়া যায় । মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে ।

চিকিৎসা ।

শ্বাসযন্ত্র রোগ—নাসিকাসর্দি ; হৃৎ শব্দক কাসি ; স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস ; বায়ু-নলীর প্রতিশ্লেষ বা ক্যাটার ; যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্ :—শ্বাসযন্ত্র রোগ, বিশেষতঃ হৃৎকাসির চিকিৎসাতেই কঙ্কাস্ ক্যাঙ্কাইর অধিকতর প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই সকল রোগের বিশেষ লক্ষণমধ্যে প্রভূত আটা ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা উঠা প্রধান স্থানীয় । শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করিতে তাহা সূত্রাকার ধারণ করিলে তাহার এক সীমা মুখসংলগ্ন থাকে ও অপর সীমা মূত্রিকা স্পর্শ করে ।

কক্কাসেন্ন—হুপিং কাসির আবেশে রোগী কাসিয়া পন্নিফ্কার, দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করিলে পূর্ববৎ স্থূল ও দীর্ঘ সূত্রের স্ফায় মুখ হইতে গৃহতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সহজে মুখ হইতে স্থগিত হয় না। শিশুদিগের এইরূপ কাসি হইলে দেখা যায় যে শিশু কাসিয়া কাসিয়া আটা ও সূত্রবৎ শ্লেষ্মা ভুলিলে নাসিকা ও মুখ হইতে স্থূল সূত্রের আকারে মেজে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে ও কিছুকাল দোহুল্যমান থাকিয়া পরে ছিন্ন হইয়া যায়। শেব রজনী বা প্রাতঃকালে কাসির আক্রমণ হইলে অনেক সময়েই স্বচ্ছ ও দড়িদড়ি শ্লেষ্মার বমন হইয়া থাকে।

কাসির পরে উদ্‌গার উভা এন্‌য়া প্রিসিফ্কার প্রদর্শক। হুপিং কাসির পরে যে ব্রঙ্কাইর ক্যাটার বা খাসনীর প্রতিশ্ফায় অনেকদিন থাকিয়া যায় তাহাতেও কক্কাস্ উপকারী। কক্কাস্ কাসিতে অত্যধিক শ্লেষ্মার স্রাব হওয়ার শিশুর খাসরোধ ঘটে।

প্রতিশ্ফায়িক বা ক্যাটারেল শক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস্ রোগেও দড়ি দড়ি গয়ার নিষ্ঠূত হইলে এবং কঠাঙ্কিত অভ্যস্তরপার্শ্বে তীক্ষ্ণ স্ফিবেধবৎ বেদনা থাকিলে কক্কাস্ প্রযোজ্য।

২। সিমেক্‌স্‌ ল্যাক্টুলেরিয়াস্ (Cemex Lectularius)।

চিকিৎসা।

সিমেক্‌স্‌ ল্যাক্টুলেরিয়াস্‌ রোগ চিকিৎসার বিবরণ অতীব বিরল। তবে ইহার একটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ এই যে, অনুভূতি জন্মে যেন কণ্ডারনিচর ধর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই প্রদর্শক লক্ষণ থাকতেই ইহার রোগ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া অনুমিত হয়। উপরি উক্ত কণ্ডারলক্ষণ (সঙ্কোচনের অনুভূতি অথবা প্রকৃত সঙ্কোচন) নেট্‌ মিউ, কণ্টিকান্ এবং গুয়েইল্যাকামেও নূনাধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকায় সিমেক্‌স্‌ প্রয়োগ করিতে হইলে ইহাকে যে নেট্‌মিউ প্রভৃতি ঔষধ হইতে যত্নপূর্বক প্রভেদ করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কখন কখন উপরি উক্ত রোগীর (সিমেক্‌স্‌ নেট্‌ মিউ প্রভৃতি) অঙ্গাদির সঙ্কোচন পার্শ্বের কণ্ডার (flexor side) স্থূল দড়ির স্থায় কণ্ডারনিচয়ের বেদনামুক্ত আততভাব উপস্থিত হয়; এবং তাহাতে রোগী প্রকৃত পক্ষেই নূনাধিক প্রঞ্জতা প্রাপ্ত হইতে পারে।

সিরাকুসের ডাং ক্রুটার উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকায় হৃষ্ট ক্ষত ও অঙ্গাদির মচ্কান প্রভৃতি ইহা দ্বারা অতি সত্বর আরোগ্য করিয়াছেন। কণ্ডারের ধর্মতার অনুভূতি মুক্ত সবিব্রাম জ্বর সিমেক্‌স্‌ দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ তাদৃশ বিরল নহে।

৩। ভেস্পা (Vespa)।

৪। ফর্মিকা রুফা (Formica Rufa)।

ভেস্পা এবং ফর্মিকা কীটোৎপন্ন ঔষধ। ইহাদিগের বিষ ত্বক সংস্পর্শে আসিলে ত্বকস্থান ক্ষত ও লোহিত বর্ণ হয়, জ্বালা করে এবং তাহাতে গলিত ক্ষতও জন্মিতে পারে। অধিক পরিমাণ বিষ শোষিত হইয়া শরীরাত্মক প্রবেশ লাভ করিলে মূর্ছার ভাব, দুর্বলতা, শীত, শরীরের শীতলতা, অত্যন্ত অস্থিরতা অথবা অচেতনতা এবং অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

চিকিৎসা ।

জন্মানুগ্রীবীর চতুর্দিকস্থ ক্ষত ভেঙ্গা আরোগ্য করিয়াছে বদিয়া বর্ণিত আছে ।

লালামেহরোগে মূত্র শোণিতযুক্ত হইলে এবং অত্যধিক মূত্রবেগ থাকিলে ফর্স্বিকা উপকারী ।

ভ্রুকরোগে হৃকের প্রদাহিক লোহিতবর্ণ, চুলকনা ও জ্বালা থাকিলে এবং অতি সামান্য নির্যাস (Exudation) ক্ষরিত হইলে ফর্স্বিকা ফলপ্রদ । আক্রান্ত দ্বকস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উপভুক্ত স্থলিত হইয়া থাকে ।

৫ । ডরিফরা (Doryphora).

চিকিৎসা :—অগস্তক কারণ ঘটিত স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদিগের মূত্রনালীপ্রদাহ উৎপন্ন হইলে ডরিফরা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম । এখানে ইহা হাল্লাসা সহ তুলনীয় ।

৬ । ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্টেলিস্ (Blatta Orientalis).

চিকিৎসা :—পুরাতন হাঁপানি বা এজ্জমারোগে ব্ল্যাটা কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । কুচ্ছু, সাধ্য পুরাতন হাঁপরোগে ইহার বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যিক । ইহার প্রদর্শক লক্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই ।

লেকচার ৭২ (LECTURE LXXII.)।

মাকড়সা শ্রেণীর জান্তব ঔষধাবলী।

১। ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা এবং ট্যারেণ্টুলা কুবেন্সিস।

২। মাইগেল। ৩। থিরিডিয়ন। ৪। এরানিয়া।

উপরি উক্ত ঔষধনিচয় শোণিত এবং স্নায়ুমণ্ডল উভয়েই ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহারা শোণিত বিষাক্ত করে এবং স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণকারী তাণ্ডব ও গুল্মবায়ু প্রভৃতি রোগলক্ষণবৎ শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে। ইহাদিগের অত্যাশ্রয় স্নায়বিক লক্ষণ মধ্যে উৎকর্ষা, কম্প, অত্যন্ত অস্থিরতা, অতিশয় স্পর্শসহিষ্ণুতা এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রধান। ইহাদিগের ক্রিয়া যে ধাতুদোষ উৎপন্ন করে তাহাতে ইহারা অনেকানেক গভীরতাবিশিষ্ট পুরাতন রোগ চিকিৎসায় উপকারী।

১। ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা (Tarentula Hispanica.)।

প্রতিনাম *f*—লাইকসা ট্যারেণ্টুলা।

সাধারণ নাম *f*—ট্যারেণ্টুলা।

ভুলনীয় ঔষধ *f*—এগারি, সিমিসি, মাইগেল, ট্র্যাম।

সাধারণ ক্রিয়া *f*—লক্ষণের স্থায়িত্ব এবং প্রবলতার কিঞ্চিৎ তারতম্য ব্যতীত সর্বপ্রকার মাকড়সার বিষই প্রায় সমক্রিয়া। ট্যারেণ্টুলাক্রিমার প্রভেদ এই যে অত্যাশ্রয় ইহা অধিকতর স্থায়ী। ট্যারেণ্টুলা মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে রোগীর অস্থিরতা ও মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে; অপরঞ্চ ইহার ১৫ ঔষধরোগবৎ লক্ষণ এতাদৃশ স্পষ্ট হয় যে কামোন্নততার উত্তেজনা

ঘটিত কম্প অপেক্ষা তাহা অধিকতর কঠিন ও ভয়াবহ দৃশ্য প্রকটিত করে।

ট্যারেন্টুলাক্রিয়ায় প্রধান বিশেষতা এই যে সঙ্গীত বা তানলয় মিলিত সূত্রের ইহার আক্রমণোপরি আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া প্রায়শঃ তাঁহার উপশম, কখন কখন তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য সাধনও করিয়া থাকে। কথিত আছে সঙ্গীতের তালে তালে রোগী অঙ্গ চালনা করে এবং অনেক সময়ে তাহা তাহাকে একপ্রকার নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত করে। ইহা জরায়ু ও অণ্ডাধারের বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

তাণ্ডবরোগ বা করিছিয়া ;—হঠাৎ ভীতি এবং প্রগাঢ় হৃৎ প্রভৃতি মানসিক ভাববৈপরীত্য ট্যারেন্টুলা হিম্পানিকার তাণ্ডবরোগের অঙ্গচালনার উদ্রেক করিয়া থাকে। তাহাতে দক্ষিণ হস্ত ও পদের চালনা হয় এবং রোগাবেশ রজনীতেও চলিতে থাকে। রোগী অস্থির থাকে এবং অবিশ্রান্ত শরীর চালনা করিতে বাধ্য হয়। তাহার মেরুদণ্ড স্পর্শসহিষ্ণু হয় এবং কম্প থাকে। রোগী হাঁটা অপেক্ষা ভাল দৌড়াইতে পারে। স্বহৎ করিছারোগে (grand petit) অক্ষাদিন কাঠিন্য থাকিলে, সঙ্গীত যদি অন্তমনস্কতা, বিশেষতঃ ফিটের উপশম আনয়ন করে তাহাতে ট্যারেন্টুলা অব্যর্থ ঔষধ।

কোমল ও উত্তেজনাপ্রবণ যুবতীদিগের ভাবুকতা প্রণোদিত তাণ্ডব-বেশ নিবারণে ইপ্সেসিছিয়া ঔষধ; কঠিন এবং অনিবার্য্য রোগপ্রশমনে আর্সেনিক উপকার করিয়া থাকে; রোগী তাহার পদে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করায় শান্তি মানসে শরীরাবস্থাপনের পরিবর্তন করিতে ও চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য; ড্রকল বালকবালিকাদিগের মধ্যেই ইহার রোগ অধিকতর দেখা যায়। জিজিছিয়া রোগের অস্থিরতা

সহ শরীর চালনা নিদ্রাবস্থায়। সিপিহাতেও তাণ্ডবরোগের
স্তায় লক্ষণের উপশম হইয়াছে। হঠাৎ ভীতি নিবন্ধন ভাবাবেশোৎপন্ন
রোগে লনকাসি ফলপ্রদ; জাগ্রত অবস্থায় অঙ্গাদির ভয়াবহ বক্রতা
হইতে থাকে; অশান্তিপ্রদ নিদ্রায় অবিশ্রান্ত অঙ্গচালনা নিবন্ধন রোগী
শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া কিম্বা দণ্ডায়মান হইয়া কিছুতেই শান্তি
পায় না। কথা অস্পষ্ট থাকে।

ফ্রকাস—ইহার তাণ্ডবরোগ সহ গুল্মবায়ু লক্ষণ উপস্থিত থাকে
এবং ইহাতে একৈক পেশীর আনর্জন হয়। ইহার লক্ষণের গুল্মবায়ুর
লক্ষণ সহ বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

গুল্মবায়ু বা ত্রিষ্টিরিহা।—জাস্তব ঔষধ মাত্রই প্রায় স্নায়বিক
লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে মাকড়সা শ্রেণীর **ট্যারেন্টুলনা**
হিস্পানিকা গুল্মবায়ু সদৃশ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপাদনে সকলের
শীর্ষস্থান অধিকার করে। কার্যক্ষেত্রেও ইহা অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে
উপকারী। অনেক সময়ে রোগীর গুল্মবায়ু আবেশের ভাণ করার ইচ্ছা
জন্মে, এক্ষণে মনুষ্য নিকটে না থাকিলে অথবা রোগের বিষয় স্মরণ না
হইলে রোগাবেশ হয় না; রোগীর অসম্মিত ও অদ্ভুত হাস্য
হয়। অস্থিরতা এবং অঙ্গাদির কম্পই ইহার প্রধান লক্ষণ; রোগী বাধ্য
হইয়া অবিরতভাবে অঙ্গচালনা করিতে থাকে। ইহার রোগে স্নায়বিক
বোধাধিক্য, মেরুদণ্ডে ও অণ্ডাধারে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা এবং কামোন্মত্ততা
বর্তমান থাকে। মাকড়সা শ্রেণীর **খিল্লিডিল্লন** এবং **মাইপেলেস**
গুল্মবায়ুরোগে উপকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চ শব্দে রোগের অসহিষ্ণুতা
লক্ষণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে **খিল্লিডিল্লন** এবং তাহাতে তাণ্ডবৎ
পেশী আনর্জন থাকিলে **মাইপেলেস** প্রদর্শন করে। অবিশ্রান্ত হস্তপদ-
চালনা, সম্ভবতঃ সঙ্গীতে রোগের উপশম, সমুচিত করার স্তায় শিরঃশূল
এবং অপরিমিত ও অদম্য কৃষ্ণিম হাস্যভাবের আক্রমণ **ট্যারেন্টুলনা**-

রোগের অতি সহজ পরিচায়ক হয়। অত্যধিক পদচালনা (Fidgetiness) জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানায়ে প্রদর্শন করে; গুণ্ণবায়ুরোগের অবস্থায় পুরাতন জরায়ুবিকার থাকিলে এই লক্ষণ সাধারণতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

স্পাইন্ডাল ইরিটেশন বা পৃষ্ঠবেদনা :—ট্যারেন্টুলায়োগে মেরুমজ্জার রক্তহীনতা ও আক্ষেপক বেদনা জন্মে। অঙ্গাদির সংকোচন থাকে। সম্পূর্ণ শরীরের শীতভাব সহ জালা এবং সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্ডালসন্ হয়।

স্ট্রীক্‌নিয়া ফসফরিকা—মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও স্পর্শসাহসু বেদনা থাকে; অঙ্গাদিতে ক্লাস্তি এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়।

স্ট্রীজনেক্রিয় রোগ—কানোস্মততা; রক্তে-রুচু বা বাধক; অগ্ণাধারবিস্বন্ধি প্রভৃতি।—এই সকল রোগ সহ ট্যারেন্টুলা হিম্পানিকার বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা হারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও রোগী যথেষ্ট উপশম পায়। কানোস্মততারোগে ক্ষিপ্তপ্রায় রোগীর নর্জনবৎ অঙ্গচালনা থাকিলে ট্যারেন্টুলা তাহার উপশম করে। ইহা জ্বরাসু ও অগ্ণাধারের বিস্বন্ধি নিবন্ধন কষ্টের ভ্রাস উৎপন্ন করে। এই সকল রোগে জরায়ুপ্রদেশে বেদনা এবং সঙ্কুচিতবৎ শিরঃশূল থাকে। নিম্নোদরে ও হিপ বা বঙ্কণসন্ধিতে জালাযুক্ত বেদনা এবং বস্তিকোটরে অত্যন্ত গুরুত্বের অনুভূতি হয়। প্রচুর ঋতুস্রাবের পর ঘোনিকপাটের উপরে চুলকনা থাকে। রোগী সম্পূর্ণ শরীরে বিশেষতঃ শরীর চালনা করিলে, টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ নিজার ব্যাঘাত জন্মে।

২। মাইগেল ল্যাসিয়ডরা (Mygale Lasiodora)

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ :—মাইগেলও ইহার সমশ্রেণীর ঔষধের ছায় মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুগুণল আক্রমণ করার প্রলাপ ও স্নায়বিক দুর্বলতামূলক আক্ষেপিক লক্ষণাদি উৎপন্ন হয় ।

রোগী কার্য কন্মবিষয়ক প্রলাপ কথা কহে ; সম্পূর্ণ রজনী অস্থির থাকে ; উৎকর্ষাজনক দৃশ্য দেখে, মৃত্যুভীতি হয় এবং নৈরাশ্র জন্মে ; বিবমিষাকালে প্রবল হৃৎকম্প, দৃষ্টিমালিন্য এবং সর্কাস্ট্রীন দৌর্ভল্য ঘটে ; সন্ধ্যাকালে আশঙ্কা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে কম্পের ছায় ভাব জন্মে ; ৩০ মিনিটের জন্ত প্রবল শীত, পরে জ্বরতাপ সহ কম্প দেখা দেয় ; প্রাতঃকালের শিরঃশূল চক্ষুতে এবং ললাটের একপার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত স্থানে অধিকতর থাকে ।

স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ডন হয়, মুখ এবং চক্ষু শীঘ্র শীঘ্র উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হইতে থাকে ; রোগী মুখের উপরে হস্ত লইতে পারে না, অর্ধ পথ হইতে হস্ত ঝাঁকির সহিত নিম্নে আইসে । রোগী চলিতে টলে ; সম্পূর্ণ শরীরের অবিশ্রান্ত চালনা । আক্ষেপিক উত্থান হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায় ।

চিকিৎসা :—উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে মাইগেল তাণ্ডব প্রভৃতি কতিপয় স্নায়বিক রোগে এবং লিঙ্কোপ্তান বা কর্ডিতে ব্যবহৃত হইয়া ফল প্রদান করিয়াছে ।

তাণ্ডবনোপ বা কর্নিয়া :—মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ডন, শরীরের অগ্রতর পার্শ্বের আক্ষেপ, ঝাঁকির সহিত কথা বলা, নিদ্রাকালে শরীর চালনার বিরতি এবং প্রাতঃকালে নিদ্রান্তর্ভে তাহার পুনরাবর্তন প্রভৃতি নিবন্ধন মাইগেলনোপ থ্যাত হইয়াছে ।

৩। থিরিডিয়ন কুরেসাভিকাম্ (Theridion Curassavicum)।

সম্ভবতঃ ১—থিরিডিয়নের কার্যপ্রতিষেধক—শব্দে অসহিষ্ণুতা ও বিষলক্ষণের আতিশয্যে, একন ; বিবমিষায়, মস্কাস্, গ্রাফা। লাইক এবং ক্যাক্কেরিয়ার পরে থিরিডিয়ন স্ফুলপ্রদ ।

ভুলনীল ত্রৈশ্রয় ১—একন, এরানি, বেল, ক্যাক্কে কা, গ্রাফা, ইয়ে, লাইক, স্পিজি, সিপি ।

সাম্প্রদায়িক ত্রিভা ১—মস্তক-মেরুমজ্জের স্নায়ুশূল আক্রমণ দ্বারা থিরিডিয়ন শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং স্নায়ুশূল, উৎপন্ন করিলে তাহার সহানুভূতিক ক্রিয়া বশতঃ আশায়বিকার উপস্থিত হইতে পারে। ইহা একটি গভীর ক্রিয়াবিশিষ্ট সরিক ঔষধ। পুনরুৎপাদিকা শক্তির বিকৃতি জন্মাইয়া পুষ্টিবিভ্রাটের ফল স্বরূপ ইহা গ্রাহ্য গণ্ডমালীয়া পরিবর্তন এবং অস্থিকোমলতা, অস্থিকত ও অস্থির ধ্বংস উৎপন্ন করে। ইহার “এন্টিসরিক বা সরানাশক ক্রিয়া” রোগের মূলে প্রবেশ করিয়া তাহার কারণের অপনয়ন করিয়া থাকে।”

লক্ষণ ।

অন্ন ১—সময় যেন অধিকতর দ্রুতগামী হয়। সহজেই রোগী চমকিয়া উঠে। কার্যে যুগা জন্মে।

মস্তক ১—শিরোঘূর্ণন বশতঃ বিবমিষা বমনও হইতে পারে, শীতল ঘর্ষ থাকে এবং শরীর নত করিলে, সামান্য চালনাতে, চক্ষু নিমিলিত করিলে এবং নৌকারোহণে রোগ বর্দ্ধিত। মস্তকের স্ফুল্ভ বোধ, রোগী মনে করে মস্তক যেন অস্থ ব্যক্তির, সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে না। মস্তক চালনার আরম্ভে শিরঃশূল। ললাটপ্রদেশে প্রচণ্ড শিরঃশূলের মস্তকের দপদপানি তাহার পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোগিণী তাহার শিরঃশূলের প্রকৃতি নিজেও বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া

বলিতেও তাহা তাহার বোধগম্য হয় না । বামচক্ষুর উর্দ্ধের ও পাশাপাশি ভাবে ললাটের দপদপানি শয়নাবস্থা হইতে উখিত হইলে, কোন ব্যক্তি গৃহতলে ভ্রমণ করিলে এবং সামান্য উচ্চ শব্দে বঞ্চিত । চক্ষুর পশ্চাতে শিরঃশূল এবং কঠিন, গুরু ও মূহ্ চাপবৎ বেদনা ।

স্নায়ু ।—হ্রস্বতা ; অঙ্গের কম্প ; ঘর্ম্ম । প্রত্যেক পরিশ্রমের পরই মুচ্ছা । শব্দ এবং প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ শরীরমধ্যে, বিশেষতঃ দস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিলে শিরোঘূর্ণন হওয়ায় বিবিধা জন্মে । নিদ্রাকালে দস্ত্রাগ্রে দস্ত্রাগ্র চাপিত হয় ।

নাসিকা ।—পুরাতন প্রতিশ্রায় ; হ্রস্বতা, ঘন, পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতভঙ্গবৃদ্ধ শ্রাব ।

শ্রাসযন্ত্র ।—দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা । প্রচণ্ড সূচিবোধবৎ বেদনা বক্ষের উর্দ্ধতম প্রদেশে হয় এবং বাম স্বক্ষের নিম্নে হইলে তাহা স্বক্ষ ভেদ করিয়া গলমধ্যে যায় । প্রচণ্ড কাসি হইলে আক্ষেপিক কাঁকি সহ মস্তক সম্মুখদিকে এবং জাহ্নু উর্দ্ধদিকে যায় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—সামান্য উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা ; শিরোঘূর্ণন, শিরঃশূল এবং আশঙ্ক-বিকার থিরিডিয়নের সর্ববিধ রোগই যুগপৎ উপস্থিত থাকিয়া প্রভেদক বলিয়া গণ্য হয় । প্রত্যেক শব্দই যেন সম্পূর্ণ শরীর ও দস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল, বমনযুক্ত শিরঃশূল বা সিক্-হেডেক ।—দপদপানিশিরঃশূল, অর্ধশিরঃশূল, বিশেষতঃ বমনযুক্ত শিরঃশূলাদি সামান্য উচ্চ শব্দে, এমন কি কেহ গৃহতলে ভ্রমণ করিলে তাহার শব্দে এবং মস্তক চালনা বঞ্চিত হইলে থিরিডিয়ন তাহা আরোগ্য করিতে

সক্ষম। শিরঃশূল হইলে মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ার বমন হইতে থাকে। উপরিউক্ত শিরঃশূলের এবং তাহার আম্বলিক স্নায়বিক লক্ষণের সহিত মাকড়সা পর্যায়ের অন্যান্য ঔষধের, বিশেষতঃ ট্যারেন্টুলার রোগের, বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা ইহাকে অন্যান্য ঔষধ, বিশেষতঃ ট্যারেন্টুলা হইতে অতি স্পষ্টতঃ প্রভেদ করিয়া থাকে।

শিরোগূর্ণন বা ভার্টিগো,—সামান্য উচ্চ শব্দে, শরীর চালনা এবং চক্ষু মুদ্রিত করার শিরোগূর্ণন বন্ধিত হইলে এবং শিরোগূর্ণনকালে যে বিবমিষার উদ্বেক হয় তাহারও উপরিউক্ত কারণে বৃদ্ধি হইলে থ্রিনিডিয়ন আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহার শিরঃশূল, শিরোগূর্ণন এবং প্রায় সর্ববিধ রোগেই দুৰ্বলতা, কম্প, শীতলতা এবং উৎকর্ষা বর্তমান থাকে।

অার্ণব বমন বা সি-সিকনেস্,—বাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকাদেগের সামুদ্রিক বিবমিষায় থ্রিনিডিয়ন উপকারী। স্ত্রীলোক-গণ জাহাজের ভয়াবহ দোলায়মান অবস্থায় ভীতি প্রযুক্ত চক্ষু নিমিলিত করিলেই মৃত্যুকল্প বিবমিষাক্রান্ত হয়।

এসমফ্রিক্সা,—সামুদ্রিক বিবমিষা নিবারণে ইহা বিলক্ষণ সুখ্যাতি-লাভ করিয়াছে। ফলতঃ মস্তিস্কীয় বিকারঘটিত বমন উৎপন্ন করা ভিন্ন অন্য কোন রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

মস্কাকাস বা থাইসিস্,—থাইসিস রোগে বাম বক্ষের অতিউদ্ধ অংশ ভেদ করিয়া প্রচণ্ড বেদনা পৃষ্ঠে যাওয়া থ্রিনিডিয়নের প্রদর্শক। ডাঃ বেক্চ এই লক্ষণের উপরে নির্ভর করিয়া উক্ত ঔষধে রোগারোগ্য করিয়াছেন এবং ডাঃ ফ্যারিংটনও সফলকাম হইয়াছেন। থ্রিনিডিয়ন উপরি উক্ত লক্ষণের নিরাকরণ দ্বারা রোগের গতিরোধ অথবা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

বাম বক্ষোর্ধ্বের বেদনায় মার্ভুটাস্, কমুনিস এবং শিক্স্ সিকুইডা শিরিডিস্থনের তুল্য ঔষধ। প্রথমেই বেদনা বন্ধ ভেদ করিয়া অংশফলকাহিতে যায় এবং তাহা যক্ষাকাস সংশ্লিষ্ট হইলেও ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে। শিক্সেসের বেদনা বামবক্ষের তৃতীয় পর্দ্বকা সহ তাহার উপস্থির সংযোগ স্থানে হয়, ইহা নিফল হইলে এনি-সাম স্টিলেটাম্ বক্ষের বিপরীত পার্শ্বের তৃতীয় পর্দ্বকাক্রমণের ঔষধ হইলেও নির্ভর যোগ্য।

অস্থির ক্ষত প্রভৃতি রোগ বা ডিজিজেস্ অব দি বোনস্—গণ্ডমালীয়া অস্থিরোগ, বিশেষতঃ সাল্ফার ৩ ক্যালকেরিয়া, লাইকোপোডিয়ারাম্ এবং অছাণ্ড প্রচলিত ঔষধ নিফল হইলে, ডাং বেকুচ্ শিরিডিস্থন প্রয়োগে ফল পাইয়াছেন। ডাং ফ্যারিংটন বলেন, “পিনস বা অজিনারোগের নাসিকাস্থি ক্ষতও সম্ভব ইহা আরোগ্য করিতে পারে”—নাসিকা-স্রাব ঈষৎ পীত অথবা ঈষৎ পীতাত্ত স্বেদ, ঘন এবং উর্গন্ধ।

৪। এরানিয়া ডায়াডেমা (Aranea Diadema)।

ভুলনীয়া ঔষধ—আর্নি, আর্স, আর্জে মেট, সিড্রন, যুকেলি, যুপে পার্ফো, সিকেলি, ট্যারেন্টু।

সাধারণ ত্রিফলা—মহামুশরীরে এরানিয়ার বিষক্রিয়া জনিত যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা ম্যালেরিয়া বিষক্রিয়ালক্ষণের তুল্য হওয়ায় হোমিওপ্যাথিকিংসাজগতে ইহা ম্যালেরিয়ার ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শীতাবস্থার প্রাধান্য এবং প্রত্যেক দিবস নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরলক্ষণের পুনরাবর্তন ইহার জরের বিশেষত্ব প্রকটিত করে। ডাং ভন গ্রাভেন্ এরানিয়াধাতুকে তাঁহার “হাইড্রজিনইড বা রস জনক” ধাতুর আদর্শ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদেগের শরীরে জলের অত্যধিক্য এবং তাপের অত্যল্পতা থাকে । ইহারা আর্দ্রতা ও সিক্তবায়ু অথবা স্থানাদিতে অসহিষ্ণু এবং এবিধ ধাতু বিশিষ্ট শরীর সহজেই ম্যালেরিয়ার ক্রিয়াক্ষেত্র হয় । অসক্যালসিস্ অস্থিকৃত আরোগ্য করায় ইহার এন্টিসরিক এবং পোষণ বৈকারিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় ।

লক্ষণ ।—অত্যন্ত অবসাদ ও আলস্য । সুনিদ্রার অভাবে পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ । সিক্ত স্থানে অথবা আর্দ্র আব হাওয়ার রোগের বৃদ্ধি । আর্দ্র বাতাস বহিলেই বা আর্দ্র স্থানে যাইলেই শীতের আক্রমণ হওয়ার অস্থিতে পর্য্যন্ত শৈত্যানুভূতি জন্মে । শীতেরই প্রাধান্য থাকে, তাপ হয় না । সাময়িক রোগ, প্রত্যেক আক্রমণ নির্দিষ্ট একই সময়ে প্রত্যাবর্তন করে ।

রজনীতে শয়নের অব্যবহিত পরেই হঠাৎ সমস্ত দস্তেরই প্রচণ্ড বেদনা ।

উদরে বেদনা হইলে জলবৎ তরল মলত্যাগ হয় এবং উদরের ডাক থাকে । প্লীহা বর্ধিত হয় ।

অস্থিতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ জঙ্ঘার বৃহৎ বা টিবিয়াস্থি, গুল্ফাস্থি বা অসক্যালসিস্ এবং দক্ষিণ প্রগণ্ড ও প্রকোষ্ঠাস্থিতে, ছিদ্র করা এবং খনন করার স্থায় বেদনা ।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—আর্দ্রতা অথবা আর্দ্র আবহাওয়া বা স্থানের অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগাক্রমণ কিম্বা রোগের বৃদ্ধি এরানিয়ার সম্পূর্ণ নিজস্ব লক্ষণ না হইলেও নেট্রাম্ সাল্ফ, ডাক্সা, নাক্‌স্‌ম, রাস্‌ এবং রডডেণ্ড্ প্রভৃতি যে অল্প সংখ্যক ঔষধে এই লক্ষণের বিद्यমানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাদিগের সহিত তুলনা দ্বারা এরানিয়ার প্রযোগিতা নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলিয়া অনুমিত ।

টিকিৎসা।

দস্তশূল :—রজনীতে শয়ন মাত্রই, বিশেষতঃ সিক্ত বায়ু বহিলে অথবা সিক্ত দিনে যে দস্তশূলের বৃদ্ধি হয় তাহাতে **এরানিহা** উপকারী। এস্থলে ইহা **মাক্কুরিহাসের** তুল্য।

উদরাময় বা ডায়ারিহা :—**এরানিহা**রোগীর উদরাময় সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য। জলবৎ তরল বিষ্ঠার উদরাময়ের আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে অন্ত্রমধ্যে বায়ু বা গ্যাসের উচ্ছলনবৎ শব্দ (পেট ভূট ভাট করা) থাকিলে **এরানিহা** তাহার ঔষধ।

অস্থিরোগ—**এরানিহা** প্রধানতঃ অস্ক্যাল্‌সিস্ বা গুল্‌ফস্‌ক্‌স্‌ অস্থি-আবরক ঝিল্লি বা পেরিঅস্টিয়মের প্রদাহ, অথবা তন্নিবন্ধন অস্থিকৃত বা কেবিরজরোগে প্রযোজ্য। কখন কখন রোগী পীড়িত অস্থি বরফের স্থায় শীতল বোধ করে।

লেক্চার ৭৩ (LECTURE LXXIII.)

নসোডস্ (Nosodes) বা রোগবীজোৎপন্ন জাস্তব

ঔষধাবলী ।

- ১। এম্ব্রাগ্রিসিয়া । ২। এম্ব্রাসিনাম । ৩।
টুবাকুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম । ৪। মেডরাইনাম ।
৫। সিফিলিনাম । ৬। হাইড্রফবাইনাম ।

১। এম্ব্রাগ্রিসিয়া (Ambra grisia) .

উপচয়ঃ—উষ্ণ পানীয় পানে ; উষ্ণ গৃহে ; সন্ধ্যাতে ; শয়নে ;
পাঠ কালে অথবা উচ্চস্বরে কথা বলায় ; বহু লোকসমাগমে ; ভ্রমণে ।

উপশমঃ—আহারান্তে ; শীতল বায়ুতে ; শীতল খাঞ্চে ও পানীয়ে ;
শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে ।

সম্বন্ধঃ—এম্ব্রাগ্রিসিয়ার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যান্ফর, কফিয়া,
নাক্‌স্‌ভ, পাল্‌স্‌, ষ্ট্যাফি । এম্ব্রা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—নাক্‌স্‌ভ,
ষ্ট্যাফি ।

ভুলেনীহ্ন ঔষধঃ—এগারি, আস্‌, এসাফি, ক্যান্ফর, সিন্ধ-
না, ককুল, কফিয়া, ইথের, লাইক, মস্ক, ফস, ষ্ট্যাফি, ভ্যালেরি, জিক ।

সাম্ভারণ ক্রিয়াঃ—এম্ব্রাগ্রিসিয়া সাক্ষাৎ ভাবে ন্নায়ুমণ্ডলে
ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া গভীরতাহীন বাস্তবিক ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করে ।
তাহাতে প্রধানতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অংশ পরম্পরায় উত্তেজনা উপস্থিত হও-
য়ায় নানাবিধ স্নায়বিক এবং গুণ্ণবায়ু রোগলক্ষণ উপস্থিত হয় । ইহা স্নায়-
বিক দৌর্ভল্য এবং অবসন্নতা উৎপন্ন করে ; এজন্ত স্নায়বিক দুর্ভলতা বশতঃ

প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হওয়ার নির্ধারিত ঔষধের ক্রিয়া না হইলে ইহা তাহা পরিষ্কৃত করিতে সক্ষম। এছাড়াগিসিয়া প্রধানতঃ পাতলা, একহারা এবং স্পষ্টতঃ বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের স্নায়বিক উত্তেজনা শারীরিক পোষণের বিনিময়ে অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধিত হয়, তাহাদিগের এবং বায়ুরোগগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী। ফলতঃ রোগীর কোন প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ বর্তমান না থাকিলে রোগ চিকিৎসার ইহা দ্বারা ফলাশা সূদ্রপরাহত বলিয়া জানিতে হইবে।

লক্ষণ ।

মনঃ—সন্ধ্যাকালে অবস্তব্য মানসিক যন্ত্রণা।

মস্তকঃ—রোগী শিরোধূর্নন বশতঃ শয়ন করিতে বাধ্য হয় এবং আমাশয়ে দুর্বলতা বোধ করে। ললাটের বাম পার্শ্বের ছিন্নবৎ বেদনা মূর্দ্ধা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; এই বেদনা ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বের উচ্চ স্থানে এবং বাম কর্ণপশ্চাতেও থাকে। মস্তকের উপরিভাগের অত্যন্ত বেদনাবুক্ত ছিন্নভাব মস্তিষ্কের উপরিভাগের সম্পূর্ণ স্থানে বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয় এবং মুখ পাণ্ডুর ও বাম হস্ত শীতল থাকে। মস্তকপশ্চাতে জড়-ভাব ও বিশৃঙ্খলা। কেশ স্থলিত হয়।

নিদ্রাঃ—রোগী রজনীতে নিদ্রা বাইতে পারে না, কিন্তু কেন তাহা বুঝিতে পারে না। অশান্তি প্রদ নিদ্রায় রোগী উৎকর্ষাজনক স্বপ্ন দেখে। বিরক্তিকর ও উৎকর্ষাজনক স্বপ্ন; রোগী নিদ্রাবস্থায় কথা কহে।

স্নায়ুঃ—মাংসল শরীর্যাংশে আক্ষেপ ও আনর্জন স্নায়বিক রোগেই অধিকতর দেখা যায়। বাহু এবং অঙ্গনিচয়ের সহজেই ঝিনুঝিনি ধরে। অত্যন্ত অবসন্নতা। বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত। সম্পূর্ণ শরীরের দৌর্বল্য। জাহুর দৌর্বল্যে বোধ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে; পদের দৌর্বল্যে

তাহাতে অসাড়তা জন্মে; আমাশয়ের দৌর্বল্যে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য।

শ্রাসসঙ্কল্প।—প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসির সময় পুনঃ পুনঃ উদগার এবং স্বরভঙ্গ। গলদেশের উত্তেজনা বশতঃ কেবল রজনীতে কাসি। বাম পঞ্জরাস্থির অভ্যন্তর পার্শ্বে বেদনায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে কাসিতে বোধ যেন তথায় কিছু ছিন্ন হইয়া আল্গা হইয়াছে। পাকিয়া থাকিয়া হৃৎশব্দক কাসি, কিন্তু তাহাতে কাকরবৎ শব্দ হয় না। নিষ্ঠূত গয়ার অভ্যন্ত লবণাক্ত। বক্ষে চাপবৎ অল্পভূতির স্থায় কিম্বা বাধ বাধ বোধ। বক্ষে অবদারণ ভাব। বক্ষাভ্যন্তরে শাই শাই শব্দ। বামবক্ষে ছিন্নবৎ বেদনা।

মল ও মূত্র।—অত্যন্ত বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট (nervous) স্ত্রীলোক, কোন ব্যক্তি গৃহে থাকিলে মল মূত্রত্যাগে অক্ষম।

স্ত্রীজন্মনেন্দ্রিয়।—স্ত্রীজন্মের প্রচণ্ড চুলকনা তাহা ঘর্ষণ করিতে হয়। শ্ফীত স্ত্রীজন্ম চুলকায় ও টাটায়। উদর অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট করিলে অথবা চাপিলে অণ্ডাধারপ্রদেশে সূচিবোধবৎ বেদনা। ঋতুর ব্যবধানকালে সামান্য কারণেই, যেমন, কঠিন মলত্যাগে বেগ দিলে বা অভ্যাসের কিছু অধিক ভ্রমণ করিলে, জরাযু হইতে রক্তশ্রাব। ঋতুশ্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্ক এবং মেরুসমজ্জার কোমলতা বা সফলিত্তে অব দি ব্রেন এণ্ড স্পাইন।—রোগ বৃদ্ধ বয়সের হটক আর অল্প প্রকার হটক স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে উপরি উক্ত রূপ কঠিন ও সাংঘাতিক রোগেও এন্ট্রাগ্রিসিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো :—অত্যন্ত বাতপ্রকৃতি-
বিশিষ্ট ও স্মরণশক্তিহীন বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোঘূর্ণনরোগে **এম্‌স্‌**
প্রিসিল্লা উপকারী। রোগী শরীর চালনা করিলে মাথা ঘোরে, পদ
অস্থির হয় এবং চলিতে টলে।

হাঁপানিরোগ বা এজ্‌না :—হাঁপরোগে হৃৎপিণ্ডবিকার,
শ্বাসকষ্ট, বাম বক্ষে গুরুত্ব অথবা পিণ্ডাকার বস্তুর বর্তমানতার এবং
হৃৎপিণ্ড প্রদেশে খরখর কম্পতাবের অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে
এম্‌স্‌ **প্রিসিল্লা** উপযোগী। রোগ সহ সাধারণতঃ হৃৎকম্প
উপস্থিত থাকে।

কাসি বা কফ ; হৃৎশব্দক কাসি :—সাধারণ অথবা
হৃৎপিণ্ড কাসিতে, কাসির পর উদগারে যদি আমাশয় হইতে প্রচুর
বায়ু উখিত হয় তাহাতে **এম্‌স্‌** প্রযোজ্য। এরূপ কাসির ঔষধ বড়
অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার, এ যাবৎ আবিষ্কৃত **এম্‌স্‌**
প্রিসিল্লা, **সালফুরিক এসিড** এবং **ভেরেট্রাম**
এল্‌মান, এই তিনটি মাত্র ঔষধের মধ্যে **এম্‌স্‌** শীর্ষস্থান অধিকার
করে।

**স্ত্রীজননেক্রিয়রোগ—রজোবাহুল্য বা মেন-
রেজিয়া ; শ্লেতপ্রদর বা নিউকরিয়া ; সূতিকার
রোগ—কোষ্ঠবন্ধ :**—**এম্‌স্‌** **প্রিসিল্লা**র রজোবাহুল্যরোগ
কখন কখন শীঘ্রাগত হইলেও সাধারণতঃ ঋতুর নিয়মিত কালের ব্যতিক্রম
হয় না। কিন্তু প্রচুর রক্ত স্রাব হয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ
স্বরূপ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও অবস্থান্তসারে পদের শিরার ক্ষীণতা
(পদের ভেরিকোজ ভেইন রোগ বর্তমান থাকিলে) উপস্থিত হয়।
ঋতুস্রাবের নিয়মিত ব্যবধান কালেও শোণিত স্রাব দৃষ্টিগোচর হয়।
ফলতঃ ইহা জরায়ুর নির্জীবতা ও শিথিলতা উৎপন্ন করে। সামান্য

উস্তেজনা কিম্বা মলত্যাগে কিঞ্চিদধিকতর বেগ দেওয়ার আবশ্যক হইলেই নিজ্জীব, শিথিল ও শোণিতপূর্ণ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হওয়ায় তাহা যোনিদ্বারমুখে নিঃসৃত হইতে থাকে। এম্ব্রার শ্বেত-প্রদররোগে প্রধানতঃ ঈষৎ-নীল অথবা ঈষৎ সবুজাভ ধূসর শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

সূতিকা গ্রহস্থ পাতলা, শীর্ণকায় এবং বাত প্রকৃতির প্রসূতিদিগের কোষ্ঠবদ্ধ রোগে, রোগিনী উৎকর্ষা-যুক্ত ও অস্থির থাকিলে, এবং ধাত্রী অথবা কোন ব্যক্তি সূতিকাগৃহে উপস্থিত হইলে, তাহার সাফাতে, মলত্যাগ যদি বিশেষ কষ্টকর হয় তাহাতে এম্ব্রা উপবোগী ঔষধ।

২। এম্ব্রাসিনাম্ (Anthracinum).

সম্ভব ১—সমক্রিয় ঔষধ—আর্স, কার্বল এন্ডি, ল্যাকেসি, সিকেলি, পাইরোজি—দূষিত এবং পচা রক্তযুক্ত রোগ।

ভুলনীল ওষধ ১—ককট বা ক্যান্সারের ভয়াবহ বেদনায়, দগ্ধ ব্রণরোগ বা কার্বাঙ্কন অথবা বিসর্প বা ইরিসিপেলাসে আর্স অথবা এম্ব্রাসিন ফলপ্রদ না হইলে ইউফরাসিয়াম প্রযোজ্য।

সাম্প্রদায়িক ত্রিফলা ১—এম্ব্রাসিন মনুষ্যশরীরে (গো, অশ্ব এবং ছাগলেও ইহা ভয়াবহ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।) অতি ভয়াবহ বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। পুনরুৎপাদিকাশক্তির গভীরতম বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় পুষ্টিহানি চরম দশা প্রাপ্ত হয়। শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাব ও নিঃসরণ প্রভৃতি তরলোপাদান এবং পেশী, শৈল্পিক বিহীন, তন্তুবিহীন প্রভৃতি অধিকাংশ কঠিনতর দৈহিক পদার্থের বিশ্লেষণ ও পাচ্যতাবস্থা হয়। দ্রুত পচ্যমান শোণিত কাল, ঘন এবং আলকাতরাবৎ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে তাহা মুখ, নাসিকা, মলদ্বার অথবা

জননেক্রিয় প্রভৃতি বহির্দ্বার হইতে ক্ষরিত হইতে থাকে। শরীরের স্থান স্থানে পচা, শড়া, কাল ও নীলবর্ণ ফোকা ও ক্ষত প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে ক্লেদবৎ দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়। এই সকল ক্ষতের অগ্নিদাহবৎ অতি ভয়াবহ জ্বালানুস্ত বেদনা ইহার অতি প্রকৃষ্ট ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকে। উপরি উক্ত দুর্দশাগ্রস্ত শোণিতের বর্তমানতা এবং বিগলিত ক্ষতাদি হইতে ক্লেদের শোষণ, রোগীর পুয়জর ও সেপ্টিসিমিয়ার কারণ।

চিকিৎসা।

পুষ্টিভ্রণ, দাহিকা বা কার্বাঙ্কল; মারাত্মক (Malignant) ক্ষত; পচা, শড়া (Gangrenous) ক্ষত; আঙ্কল হাঁড়া বা ছইটলো; মারাত্মক পুয় ভ্রণ, ডিসেক্টিং উণ্ডস্ বা শবচ্ছেদোৎপন্ন ক্ষত এবং বিষধর কীট দংশনের ফল প্রভৃতি কঠিন, ও অনেক সময়ে সাজ্বাতিক অবস্থায়িত রোগে অতি ভয়াবহ জ্বালানুস্ত বেদনা হইলে এন্ট্রাসিন প্রযোজ্য। ফলতঃ উপরি উক্ত অসহনীয় ও ভয়াবহ জ্বালানুস্ত বেদনাই এন্ট্রাসিনের অতি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক। অতি কঠিন অবস্থার ক্ষতাদির বর্ণ কাল অথবা নীলাভ। তাহা হইতে পচা ও পুষ্টিগন্ধ ক্লেদবৎ নিঃসরণ নির্গত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে ক্ষতস্থান হইতে পচা রস, রক্ত ও বিগলিত মাংসাদি শোষিত হইয়া এবং শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া পুয়জর ও পচা জাত্বব বিষজর বা সেপ্টিসিমিয়া ও তদানুঘটিক লক্ষণাদি উৎপন্ন করে। এই সকল রোগের ভয়াবহ অগ্নিদাহবৎ জ্বালা নিবারণে আর্সেনিক্ আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বিদিত ছিল। কিন্তু তাহা বিফল হইলে এক্ষণে আমরা

তাহার পরিবর্তে এন্ট্রাসিনিন দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সফলকাম হইতে পারি। অনেক বহুদর্শী চিকিৎসক ট্যাবের্ণেটুলাকে ইহার অমোষ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। পচা ক্ষতাদি হইতে পুষ্কর বা সেপ্টিক ফিবার উৎপন্ন হইলে আস ও শাইরোজিন, বিষধর কীট দংশনে ল্যাকেসি ও শাইরোজিন, এবং পচা বা টাইফইড্ প্রভৃতি সাংঘাতিক জ্বরে অথবা শব্ছেদ গৃহের কিম্বা পচনশীল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রশ্বাস বায়ুর দুর্গন্ধ আত্মাণের কুফল সংশোধনে শাইরোজিন, এবং আঙ্কুলহাঁড়া রোগের অতি ভয়বাহ অবস্থায় পচন, বিগলন ও অসহনীয় জালাযুক্ত বেদনা নিবারণে আস, কার্বলিক এসি এবং ল্যাকেসি শ্রেষ্ঠতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

শোণিতশ্রাবঃ—কাল, পচা, ঘন ও আল্কাভরাবৎ রক্ত, মুখ, নাসিকা, মলদ্বার এবং জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি শরীরের বাহির্দ্বার হইতে নিঃসরণে এন্ট্রাক্সস্ মহৌষধ; কাল, তরল ও অসংযমিত শোণিতশ্রাবে ক্রোটেলাস্ উপকার করিয়া থাকে।

৩। টুবাকুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম্ ।

(Tuberculinum, Bacilinum.)

সম্বন্ধঃ—কার্যাপূরক—সোরি, মাল্ফ ।

যে স্থলে সোরিনাম, সাল্ফার অথবা বিশেষ যন্ত্রপূরক নির্ধারিত অথ কোন ঔষধ দ্বারা রোগের উপশম অথবা আরোগ্য না হয়, তাহাতে টুবাকুল্ প্রযোজ্য; হে-ফিবার এবং এজ্‌মারোগে সোরিনামের পরে ইহা ধাতু সংশোধনকারী ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য। ইহার চিকিৎসা গুটিকোৎপত্তি রোগের রক্তাধিকার অথবা তরুণ ও প্রবল প্রদাহের অবস্থায় বেল কার্যকারী। টুবাকুলিনাম দ্বারা আরোগ্য রোগীর মেদবৃদ্ধি হইলে হাইড্রাষ্টিস্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—টুবাকুলিনাম, ব্যাসিলিনাম এবং ডাং কোশের লিম্ফ এই তিন প্রকার ঔষধই মূলতঃ একই বস্তু হইতে উৎপন্ন এবং সাধারণতঃ ইহার সমক্রিয় বলিয়াই বিবেচিত। ইহাদিগের পরস্পরের ক্রিয়ার যদি কিছু প্রভেদ থাকে তাহা বোধগম্য করা সূদূর পরাহত বলিলেও অতুক্তি দোষ ঘটে না। ডাং স্লাম্বেল সোয়ান ফুসফুসের টুবাকুল রোগের শুষ্কীকৃত গম্বীরের ট্রিটুরেশনকে “টুবাকুলিন,” ডাং জে কমটন বার্ণেট টুবাকুল রোগগ্রস্ত ফুসফুসের শুষ্কীকৃত অংশের ট্রিটুরেশনকে “বাসিলিনাম” বলিয়াছেন এবং ডাং কোশ গোমাংস-প্রস্তুত লেই বা জেলিমধ্যে টুবাকুলকীটাণুর (রোগ বীজ) কৰ্ষণ করিয়া ঐ কীটাণু সম্বলিত রসকে “টুবাকুল লিম্ফ” বলিয়াছেন। সাধারণে ইতাকে “কোশেজ্ লিম্ফ” বলে। ইহা অতি স্থূল প্রয়োগরূপ ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় না।

টুবাকুলরোগবীজ পুনরুৎপাদিকা শক্তির অতি শোচনীয় ছয়বস্থা উৎপন্ন করিলে পুষ্টিহানি তাহার চরম সীমায় উপনীত হয়। ইহার পুষ্টি-হানিক্রিয়া কোন শরীরোপাদানে সীমাবদ্ধ থাকে না। শরীরস্থ রস, রক্ত প্রভৃতি তরলোপাদান, সম্পূর্ণ কোমলোপাদান, এমন কি অতীব কঠিন এবং স্থায়ী অস্থি পর্যাস্ত ইহার ক্রিয়াধীন হইলে তাহারও পুষ্টিহানি বশতঃ তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উপরি উক্ত টুবাকুলাস্ রোগবিষাক্রান্ত শরীরে অবস্থাবিশেষে যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথির নিয়মে তাহারই অনুসরণ করিয়া টুবাকুলিনাদির প্রয়োগ দ্বারা রোগারোগ্য করিয়া থাকেন। এরূপ ঔষধ “নসোড” শ্রেণীভুক্ত হইলেও যে ইহাদিগকে “আইসপ্যাথিক ঔষধ” বলা হইয়া থাকে তাহা সোরিনাম বর্ণনে আমরা বিবৃত করিয়াছি। আমরা নিম্নে টুবাকুলিনাম বা ব্যাসিলিনামের কতিপয় সাধারণ ও প্রদর্শক লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংক্ষেপে তাহার রোগের বিষয় উল্লেখ করিব।

পাতলা বর্ণের মনুষ্য ; নীল চক্ষু, সুন্দরী স্ত্রীলোক ; দীর্ঘাকার, কৃশ, চেপ্টা শরীর ও অপ্রশস্ত বক্ষ ব্যক্তি ; এবং বয়সানুপাতে অধিকতর বুদ্ধি সম্পন্ন এবং শারীরিক দুর্বলতা বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের ধাতু টুবার্কুলরোগ-প্রবণ তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। রোগ যাহাই হউক, বংশে টুবার্কুলরোগ সংশ্রব থাকার বিবরণ থাকিলে যদি যত্নপূর্বক নির্ধারিত ঔষধের ক্রিয়া না হয় সে স্থলে ইহা প্রযোজ্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ :-

রোগ লক্ষণ সর্বদা পরিবর্তনশীল—ক্রমাগত যত্ন হইতে যত্নান্তরে যায় ; রোগ হঠাৎই আরম্ভ হয়, হঠাৎই অন্তর্দান করে।

সামান্য সৈভ্যসংস্পর্শেই সন্দি—এবং তাহার এক আক্রমণের শেষ না হইতেই পুনরাক্রমণ যে কি প্রকারে হয় তাহা রোগী জানিতেও পারে না।

অতি ত্বরিত গতিতে অতি স্পষ্টতর শীর্ণতা জন্মে—রোগী যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার করে, তথাপি শরীর শুষ্ক হইতে থাকে।

রোগী এক স্থানে অধিক কাল থাকিতে ভালবাসে না ; স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে চাহে।

অঙ্গে এবং সন্ধিতে স্থানপরিবর্তনশীল বেদনা ; চলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে অঙ্গাদি অনমনীয় থাকে, চলিতে চলিতে পরে তাহা প্রকৃতিস্থ হয়।

মুক্ত বায়ুর জন্ম প্রবল ইচ্ছা হয়, গৃহঘর ও বাতায়ন খুলিয়া দিতে বলে, অথবা অস্বাভাবিক প্রবল বায়ুতে ভ্রমণ করিতে চাহে।

বেদনা বাম ফুসফুসের উচ্চাংশে ভেদ করিলে পুঠে যায় ; ঐস্থানের ফুসফুসে গুটিকার (Tubercle) সংস্থিতি হয়।

রোগীর বংশে গুটিকোৎপত্তি রোগের বা টুবাকুলোসিসের বিবরণ পাওয়া যায়।

রোগচিকিৎসায় টুবাকুলিনাম এপর্যন্তও সাধারণ ও প্রচলিত ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় না, চিকিৎসকমণ্ডলীতে অগ্ৰাণ্ত ঔষধের হ্রাস ইহার লক্ষণাদি এবং প্রয়োগ বিষয়ক জ্ঞানের অভাবই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। ফলতঃ গভীর সোরা-বিষ-বাষ্প দূষিত ব্যক্তিতে ঐ বিষ-বাষ্প গুটিকোৎপাদনোগ্রুথ হইলে অথবা গুটিকা বিষদূষিত ধাতুর ব্যক্তি যে সকল বিশেষ বিশেষ মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ প্রকাশিত করে তাহাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। টুবাকুল যেরূপ কোন বিশেষ যন্ত্র বা উপাদান আক্রমণ করে না, ইহার রোগও তদ্রূপ কোন যন্ত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকে না।

শিরঃশূল।—টুবাকুলিন শিরঃশূলে চক্ষুর উর্দ্ধপ্রদেশ হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্যন্ত বিস্তৃত তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ এবং মস্তক বেড়িয়া লৌহপতর আটা থাকার হ্রাস বেদনা, পাঠ অথবা সান্নাৎ শ্রমে তাণ বৃদ্ধি পায় এবং চক্ষুর ব্যবহারে বৃদ্ধি পাইলে চসমাতেও তাহার উপশম হয় না। এই প্রকার শিরঃশূল গুটিকারোগ বিষগুষ্ঠ ধাতুর স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কবেষ্টবিম্বিপ্রদাহ বা মিনিগ্গাইটিস।—মস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কতলবেষ্টবিম্বির তরুণ প্রদাহে রসস্রাবের উপক্রমে রজনীতে ভ্রমদর্শন এবং ভীতিপ্রযুক্ত চীৎকারসহ নিদ্রোথিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে অতি যত্ন পূর্বক নির্কাচিত এম্পিস্ হেলিবো অথবা সাল্ফারের যদি উপকার না হয় তাহাতে টুবাকুল প্রযোজ্য।

উদ্ভাবনাম্—যথেষ্ট আহার স্বেপ শীর্ণতা প্রাপ্ত রোগী প্রভূষকালে হঠাৎ অদম্য মলবেগ হইয়া সবলে কৃষ্ণবর্ণ, কটা, জলবৎ এবং দুর্গন্ধ মল পরিত্যাগ করিলে টুবাকুলিন তস্যার ঔষধ । রোগী দুর্বল হইয়া যায় ও তাহার রজনীষ্ম হয় ।

বজ্জোবাহুল্য বা বাধক—অতি শীঘ্রাগত, অতি প্রচুর এবং অত্যধিক কালস্থায়ী প্লতুশোণিত ভয়াবহ বেদনা সহ মস্তুর গতিতে নির্গত হয় এবং রোগিনী গুটিকোৎপত্তি রোগপ্রবণ থাকে ।

স্ককরোপ—পামা বা এক্জিমা—টুবাকুলার পামারোগে টুবাকুলিনাম উপকারী । ইহার প্রচণ্ড চুলকানি রজনীতে গাত্রবস্ত্র নোচনে এবং স্নানে বদ্ধিত । নামড়ি হইতে প্রভূত পরিমাণ শুভ্র ভূষির হ্রাস শব্দ স্থানিত হইতে থাকে । কর্ণপৃষ্ঠে, কেশযুক্ত শরীরাংশে এবং ঘোঁচযুক্ত স্বকস্থানে অবদারণভাব ও টাটানি জন্মে এবং তাহা হইতে রস ঝরিতে থাকে ; স্বক অগ্নিবর্ণবৎ লোহিত । টুবাকুল-বিষজ্ঞে রোগীর দক্ষ ইণ্ডি দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে ।

সক্ষ্মাকাশ ও নিউমনিয়া রোপে টুবাকুলিনামের প্রযোগিতা স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে ।

টুবাকুলিনাম সাধারণতঃ নিম্নক্রমে ফলপ্রদ নহে, বরং তাহাতে কুফলেরই আশঙ্কা করা যায় । কোন কোন রোগে চিকৎসক-বিশেষ ৩০ ক্রমের ব্যবহার করিতে উপদেশ কারিয়াছেন, আমরা তাহা ইতিপূর্বে বলিয়াছি । ফলতঃ ইহার ১০০০ (m) হইতে ১০০০০ (cm) পর্যন্ত ক্রমই প্রায় সবজন অশুশোধিত ।

মেডরাইনাম্ । (Medorrhinum.)

উপচয়—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলনি, অকজ্যাল এগি) ; তাপে ; গাত্র আবৃত করিলে ; গাত্র বিস্তার করিলে ; বিদ্যাৎযুক্ত

ঝটিকায় ; সামান্য চালনায় ; মিষ্ট ভক্ষণে ; সকাল হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত ।

উপশম্য।—সমুদ্রতীরে (নেটামের বিপরীত) ; আমাশয় চাপিয়া শয়নে ; সিক্ত বায়ুতে (কষ্টি, নাকস ভ) ।

সম্ভব।—সালফারের পদতলের জ্বালা এবং জিঙ্কামের জ্ববার অস্থিরতা ও চঞ্চলতা মেডরাইনামে যুগপৎ উপস্থিত থাকে ।

ভুলনীয় ঔষধ।—ইপিকা (শুষ্ক কাসি), ক্যাম্ফর, সিকেলি, টেবেকাম, ভেরেট এ, (পতন লক্ষণ বা কল্যাপ্) ; পিক্রিক এসি, জেল্‌স (ভ্রমণের অপারগতা) ; এলোজ, সাক (প্রাতঃকালীন উদরাময়) ।

সাধারণ ক্রিয়া। মেডরাইনাম পূয়-মেহ বা গণোরিয়ার আঁব বা রোগবীজ হইতে প্রচলিত হোমিওপ্যাথিক প্রথানুসারে প্রস্তুত । পূয়-মেহরোগবিষবাষ্পই যে সাইকোসিসরূপ পুরাতন রোগপর্যায়ের মূলীভূত কারণ তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । অত্যাশ্চর্য পুরাতন রোগবিষবাষ্পের দ্বারা গণোরিয়া বিষবাষ্পও শরীরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরুৎপাদিকা শক্তির অতি গভীর রোগজ পরিবর্তন সাধিত করে এবং পুষ্টিক্রিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায় । এবিধ অবস্থায় রসবাত, ক্ষুদ্রবাত, স্নায়ুশূল, চক্ষুরোগ, চর্ম্মকীল, শ্লেষ্মাশুটিকা এবং অত্যাশ্চর্য নানা প্রকার কঠিন রোগের ইহা যে আঁকর স্বরূপ তাহা আমরা ইতিপূর্বে রোগ চিকিৎসা প্রসঙ্গতঃ উপযুক্ত স্থলে উল্লেখ করিয়াছি । এস্থলে আমরা স্থূলভাবে ইহার কতিপয় অত্যাশ্চর্যকীয় লক্ষণ এবং রোগের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব । ফলতঃ শরীরে ইহার ক্রিয়া এতই বহু বিস্তৃত এবং ইহার রোগ এতই বহুবিধ ও বিচিত্র যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত করা অসম্ভব বলিয়াই জানিতে হইবে । পৃথকাত্ম নিবন্ধন পুরুষানুক্রেমিক ধাতুগত পুরাতন শিশুরোগে ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে । এই সকল শিশুরোগ

অত্যন্ত কঠিনসাধা । শিশুর ক্ষয়রোগ জন্মে, শরীর শীর্ণ হইয়া যায় । তাহার হাঁপানি অথবা নাসিকার, কখন চক্ষুপত্রের কদর্যা প্রতিগ্রায় এবং কখন বা মস্তকত্বকে অথবা মুখমণ্ডলে দ্রু জন্মে এবং শিশু খর্বীকৃতি হয় ।

কুচিকিৎসিত এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট পুয়মেহ নিবন্ধন ধাতুগত বিকার বশতঃ রোগের বহুপূর্বক নির্বাচিত ঔষধে উপশম অথবা আরোগ্যের স্থায়িত্ব না হইলে ইহা ফলপ্রদ ।

সোরিনাম যেরূপ গভীর সোরিক্ ত্বক্রোগ ও শ্লেষ্মিককিল্লিবিকার সহ সম্বন্ধযুক্ত, মেডরাইনাম ত্রুপ গভীর সাইকোটিক মেরুদণ্ডরোগ ও সহানুভূতিক স্নায়ুবিকার সহ সম্বন্ধযুক্ত ।

লক্ষণ ।

মন ।—মানসিক দুর্কলতা ; নাম, কথা অথবা তাহার আদি অক্ষর স্মরণ থাকে না; অতি নিগূঢ় বন্ধুরও নাম জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; আত্ম নামেরও বিস্মৃতি জন্মে । রোগী স্তব্ধ বানান করিতে পারে না ; বিশেষরূপে জ্ঞাত নামও কি করিয়া বানান করিবে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয় । প্রায়ই গল্পের খেই হারায় । রোগলক্ষণ বলা অত্যন্ত কঠিন, প্রশ্ন ভুলিয়া যায় বলিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ বলিতে হয় । কথা কহিতে না কাঁদিয়াই পারে না । মৃত্যুর আশঙ্কা করে ; সর্বদাই আশঙ্কাদিত, কোন ঘটনা ঘটবার পূর্বে কষ্টের সহিত তদ্বিষয়ক অন্তর্ভূতি জন্মে এবং সাধারণতঃ তদনুরূপই কার্য্য হয় ।

সামাঞ্জ্যেই উত্তেজিত হয় ; দিবসে খিট্ খিটে থাকে, রজনীতে উল্লাস জন্মে । অত্যন্ত অসহিষ্ণু ; খিট্খিটে ; উৎকণ্ঠান্বিত, বাত-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অসহিষ্ণু ; সামাঞ্জ্য শব্দেই চমকিয়া উঠে ।

সময় যেন কাটিতে চাহে না । রোগী সর্বদাই ত্রস্ত থাকে ; কোন কার্য্য করিতে এত তাড়াতাড়ি করে যে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে ।

অনেক রোগই তৎসম্বন্ধে চিন্তায় বদ্ধিত (বেদনার বিষয় চিন্তা করিলেই তাহার পুনরাবৃত্তি, অক্জ্যালিক এসিড) ।

মস্তক।—মস্তিকে তাঁক্ষ ও জ্বালাকর বেদনা, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা সেরিবেলামে অধিকতর থাকে এবং মেরুদণ্ড বাহিয়া বিস্তৃত হয় । মস্তকে গুরুত্বানুভূতি এবং মস্তক পশ্চাৎ পার্শ্বে আকৃষ্ট ।

মস্তকের কশাভাব এবং সংকোচন বোধ, সম্পূর্ণ মেরুদণ্ড বাহিয়া নিম্নে যায় । গাড়ির ঝাঁকিতে শিরঃশূল ও উদরাময় জন্মে ।

শ্বাস-স্বস্ত্র।—হাঁপানি ; উপজিহ্বার দুর্বলতা ও আক্ষেপ বশতঃ গলরোধ ; স্বরযন্ত্র একরূপভাবে রুদ্ধ যে, তন্মধ্যে বায়ু এককালীন প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল মুখ চাপিয়া (উবুড় হইয়া) শয়নে এবং জিহ্বা বহিরানয়নে তাহার উপশম । স্বরযন্ত্রের টাটানিতে বোধ যেন তাহাতে ক্ষত হইয়াছে । শ্বাসকৃচ্ছ ও বক্ষের সঙ্কোচ বোধ ; সহজে শ্বাস টানিতে পারে কিন্তু শ্বাস নিঃসেপের ক্ষমতা থাকে না । অবিশ্রান্ত, কঠিন, শুষ্ক এবং কখন কখন বেদনায়ুক্ত কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের শ্লেষ্মিকঝিল্লি ছিন্ন হইয়াছে ; হাঁড়ির মধ্যে কাসার ত্রায় গভীর ও ফাঁপা শব্দের কাসি রজনীতে, মিষ্টহারে এবং শয়নে বদ্ধিত ও আমাশয় চাপিয়া শয়নে হ্রাস । ষ্বেতলালাবৎ, বৃদ্ধবৃদ্ধবৃক্ষ ; ক্ষুদ্র, সবুজ ও তিক্ত, গোলা বস্ত্রখণ্ডের ত্রায় ; আটা এবং তুলিতে কষ্টকর গয়ার ।

দুর্গোন্মুখ যক্ষ্মাকাস ; ফুসফুসের অংশবিশেষে কঠিন বেদনা ।

পল্লাভ্যস্ত্র।—গলদেশে অত্যন্ত শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার অনুভূতি এবং কষ্টদায়ক অস্থি কনকনানি হইলে গলদেশ টাটায় এবং ক্ষীতি থাকে এবং তাহাতে তরল বিষ্ণা কঠিন যে কোন প্রকার বস্ত্র

গলাধঃ করা অসাধা। নাসিকার পশ্চাৎ চইতে নিঃসৃত ঘন, ধূসর অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মায় গলাভাস্তর সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে (হাইড্রাষ্ট)।

ক্ষুধা ।—আহারের অব্যবহিত পরেই কাকবৎ ক্ষুধা (সিনা, লাইক, দোরি)।

অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা, স্বপ্নেও জলপান করে। রোগিনী পূর্বে যে মগ্ন ঘৃণা করিত (এসেরাম) তাহা, লবণ (ক্যাল, নেট্রাম), মিষ্টদ্রব্য (সাক্র), এলমগ, বরফ, অম্লবস্তু, কমলালেবু ও কাঁচাকলের জগ্ন অতৃপ্তব্য আকাজ্জা প্রকাশ করে।

অন্ত্র ও বিষ্ঠা ।—আটা এবং কন্দমবৎ বিষ্ঠার অন্ত্রে অন্ত্রে ত্যাগ, সরলাস্ত্রংশের অগ্ন্যভূতি হওয়ায় রোগী কোঁথ দিতে পারে না (এলাম্)। অন্ত্রের সংকোচন এবং জড়ভাব হওয়ায় গোল গোল বলের ছায় মল ত্যাগ (ল্যাকেসি)। মলত্যাগ করিতে পশ্চাৎপার্শ্বে অনেক বক্র হইতে হয়; মলত্যাগ অতিশয় বেদনায়ুক্ত, বোধ যেন মলদ্বারের পশ্চাৎ প্রদেশে কোন বস্তুখণ্ড আছে; এতই কষ্ট যে রোগী ক্রন্দন করে।

সরলাস্ত্রে তীব্র ও সূচিবোধবৎ বেদনা। মলদ্বার হইতে লোনা মাছের জ্বলের ছায় চূর্ণক রসের নিঃসরণ।

মূত্রবস্ত্র ।—দ্রুতক প্রদেশে কঠিন বেদনা (পৃষ্ঠশূল), প্রচুর মূত্রস্রাবে উপশমিত (লাইকো)। মূত্রশূলে মূত্রপথের তীক্ষ্ণ বেদনায় বোধ যেন পাথরী নির্গত হইতেছে (বার্কে, লাইকঅক্সি); রোগী বরকের আকাজ্জা করে। মূত্রত্যাগকালে মূত্রশূলী এবং অন্ত্রের বেদনায়ুক্ত কুস্থন।

স্ত্রীজননেদ্রিয় ।—অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, জমাট ও প্রচুর ঋতু-স্রাব; দ্বৌত করিলেও তাহার কলক দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে (ম্যাগ্নে

কা)। ঋতুকালে স্তন, বিশেষতঃ স্তনাগ্র, স্পর্শে বরফের ত্রায় শীতল এবং অবশিষ্ট শরীর উষ্ণ ।

যোনি এবং ভগোষ্ঠের তীব্র চুলকনা, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বদ্ধিত । স্তন এবং স্তনাগ্রের টাটানি এবং স্পর্শে বেদনা ।

পৃষ্ঠ এবং অক্ষপ্রত্যক্ষ :—অংশফলকাস্থিহৃয়ের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠ দেশে বেদনা ; সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদণ্ড স্পর্শে টাটানিযুক্ত (সিংকো সা) ; গ্রীবা পশ্চাৎ হইতে মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীব্র জ্বালাযুক্ত তাপ সহ আকৃষ্টবৎ কাঠিষ্ঠ, গাত্র বিস্তার করিলে বদ্ধিত ।

কটিস্থ কশেরুকা স্পর্শে বেদনাযুক্ত । সেকরাম, কক্‌সিক্‌স্ এবং হিপ-সন্ধিপশ্চাতের বেদনা দ্রুতগতিতে চতুর্দিকে বিকীরিত হয় এবং অঙ্গ বাহিয়া নিম্নে যায় । ভ্রমণকালে কেবল জজ্বায় এবং হিপ্ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানে বেদনা । জজ্বায় গুরুত্ব, তাহা সিনকের ত্রায় বোধ ; জজ্বা এতাদৃশ ভারি যে, চলিতে কষ্ট ; পদ ভাঙ্গিয়া পড়ে । নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ রক্তনী কনকন করায় নিদ্রার ব্যাঘাত । **জজ্বা এবং পদ অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল (জিঙ্ক)** । বিভ্রাটিকার সময় জজ্বা এবং বাহুতে ভরাবহ কষ্ট ।

জজ্বার বেদনায় তাহা শয্যায় স্থির রাখা যায় না এবং আয়ত্তাধীন না রাখিলে, শিথিল করিয়া দিলে এবং নিদ্রা বাইবার চেষ্টা করিলে বৃদ্ধি হয় ।

জজ্বা ও পদের এবং প্রকোষ্ঠ ও করের শীতলতা । উষ্ণ ও গুল্ফ-পশ্চাতের রজ্জুবৎ পেশীতে আকৃষ্টতা ও সংকোচনের অনুলভূতি ; জজ্বা পশ্চাতে ও পদতলে খল্লী । ভ্রমণকালে গুল্ফ সহজেই বাঁকিয়া যায় (কার্ব এ, লিডাম) ।

হস্তপদের জ্বালা ; হস্ত-পদের জ্বালায় তাহা অনাবৃত করার এবং তাহাতে বাতাস দেওয়ার প্রয়োজন হয় (ল্যাকেসি, সাল্ফ) । জজ্বা এবং

বাহুতে স্নায়ুশক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অভাব; সামান্য শ্রমেই বলহানি ঘটে ।

শরীরের প্রত্যেক সন্ধিরই বেদনায়ুক্ত কাঠিগ্র। হস্তাঙ্গুলিসন্ধির বৈকল্য, বিবৃদ্ধি ও ক্ষীতি; গুল্ফসন্ধির ক্ষীতি ও বেদনায়ুক্ত কাঠিগ্র; গুল্ফ এবং পদতল উচ্চ স্থান স্পর্শ করাইলে বেদনা করে ।

চিকিৎসা ।

উপরে মেডরাইনামের সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে ও তাহার বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণবিষয়ে যাগ লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, রোগ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার মূলে পূষ্ম-মেহের কুচিকিৎসার ও তাহা অন্তশুঁখী হওয়ার বা দসিয়া যাওয়ার বিবরণ থাকিলে এবং রোগের স্মৃত অবস্থায় ন্যূনাধিক পূর্কোন্নিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে মেডরাইনাম তথায় উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । ফলতঃ “সাইকোটিক” রোগের বহু বিস্তৃতি, গভীরতা, বংশানুক্রমিকতা এবং তাহার রূপের বিচিত্রতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিলে অনায়াসেই বোধগম্য হইবে যে, রোগের নামাপেক্ষা তাহার পূর্ক বিবরণ, বর্তমান লক্ষণ এবং রোগীর বংশগত রোগ বিষয়ক বিবরণই ঔষধ নিৰ্বাচন পক্ষে অধিকতর সাহায্যকারী । রোগীর স্নকে চর্ম্মকীলের এবং জননেদ্রিয় ও গুহ্যদ্বার প্রভৃতি শরীর-বহির্দ্বারের শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে শ্লেষ্মাশুটিকার (Condylomata) বর্তমানতা ইহার নিশ্চয়ান্তরক প্রদর্শক ; ইহাও টুবাকুলিনামের তায় উচ্চ ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

শিক্ষার্থীদের স্মরণের কথঞ্চিৎ সাহায্যার্থে এস্থলে মেডরাইনাম চিকিৎস কতিপয় রোগের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং অপ্রকাশিত পুয়মেহ নিবন্ধন রসবাত ক্ষুদ্র-বাত বা গাউট, প্রায়শুশূল এবং মেরুমজ্জা ও তাদ্-বেষ্ট বিক্লিরোগ যাহা মেরুমজ্জার উপাদানগত পরিবর্তন সাধিত করিয়া পক্ষাঘাতও উৎপন্ন করিতে পারে তাহা মেডরাইনাম আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

রোগমূলে সাইকসিস্ বা অন্তঃপ্রবিষ্ট পুয়মেহ থাকিলে পুরাতন অণ্ডাধারপ্রদাহ, বস্তিকোটরস্থ কোষময় বিক্লির প্রদাহ বা পেল্ভিক সেলুলাইটিস্, জরায়ুর এবং অণ্ডাধারের সূত্র-বৎ পদার্থ গঠিত অর্ধুদ বা ফাইব্রইডস্, কোষ-গর্ভ অর্ধুদ বা দিষ্টস্ এবং উপরিউক্ত রূপ অত্যাধি রোগে মেডরাই উপযোগী ।

লক্ষণসাদৃশ্য থাকিলে এবং পূর্ববৎ পুয়মেহবিষ রোগের কারণ হইলে কিরাস্, কাসিনামা অথবা ক্যান্সার বা কর্কট প্রভৃতি হারোগ্য ও সাজ্বাতিক রোগেও মেডরাইর প্রয়োগ দ্বারা রোগের উপশম এবং অবস্থানুসারে আরোগ্যের প্রত্যাশা করা বাইতে পারে ।

বংশগত পুয়মেহতৃষিত ব্যক্তিদিগের শিশু সন্তানের শিশু ক্ষয়রোগ; রোগমূলে পুয়মেহবিষদোষ অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলে লসীকা গ্রন্থি বিরুদ্ধি; বক্ষ্যাকাশরোগীর ক্লান্তি, দৌর্বল্য এবং জীবনীশক্তির অবসাদ প্রভৃতি; সন্ধিবাতিক ও রসবাতিক বেদনা; কশিয়া বাধায় শায় শরীরের সঙ্কুচিতভাব; এবং সম্পূর্ণ শরীরে ছুটবৎ টাটানি প্রভৃতিতে মেডরাই উপকার করিয়া থাকে ।

উপরি উক্ত ধাতুদোষযুক্ত ব্যক্তিদিগের কোন সাজ্বাতিক রোগের চরমাবস্থায় শরীরের শীতলতা, প্রচুর শীতল ঘর্ম (গাভ্রাবরণ দূরে

নিষ্কেপ—ক্যান্ধ, সিকেলিন) প্রভৃতি পতন বা কোল্যাপ্‌স লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় রোগী সর্বদা পাখীর বাতাস चाहিলে (কার্ব ভে) এবং পরিষ্কার বায়ুর আকাঙ্ক্ষা করিলে মেডরাইনাম উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া গণ্য ।

শয্যানুভ্রাসাবরোপে রোগী রজনীতে শয্যায় এমনিয়ার গন্ধবৃদ্ধ প্রভূত পরিমাণ এবং অতিরঞ্জিত মূত্রত্যাগ যদি অপরিমিত কার্যাদি অথবা খেলা এবং দৈনিক তাপ অথবা শৈত্যের অত্যধিক বদ্ধিত অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং রোগের মূলে সাইকসিস্‌ ধাতুদোষ থাকায় যত্ন-পূর্বক নির্ধাচিত ঔষধ নিষ্ফল হয় তাহাতে মেডরাইনাম উপকার করিয়া থাকে ।

পৃষধাতুর পুরাতন বিকারগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের ঋতুরোপে, বিশেষতঃ জ্বরায়ুর রক্তস্রাবে এবং বয়ঃসন্ধির ঋতুরোধকালে সপ্তাহ হইতে সপ্তাহান্তর পর্য্যন্ত প্রচুর কৃকবর্ণ, চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধ শোণিতের হড়্‌ হড়্‌ করিয়া স্রাব যদি শরীর চালনায় বদ্ধিত হয় তাহাতে মেডরাইনাম ফলপ্রদ ; রোগীর জরায়ু মারাত্মক (Malignant) রোগগ্রস্ত থাকে ।

এস্থলে বক্তব্য যে, রোগীতে পুরাতন ও অন্তঃপ্রবিষ্ট পৃষধাতুর বিবরণ থাকুক বা না থাকুক রোগলক্ষণ সহ ঔষধলক্ষণের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেই মেডরাইনাম দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আছে। প্রভেদ এই যে পৃষধাতুদোষের অবর্তমানে ঔষধ হোমিওপ্যাথিক মূল ও সাধারণ ক্রিমার এবং তাহার বর্তমানে আইসপ্যাথির ক্রিমার বশবর্তী হইয়া রোগারোগ্য করে ।

৫। সিফিলিনাম (Syphilitinum.) ।

উপচয় ১—গোধূলি হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রজনীতে ।

তুলনীয়া ঔষধ :—অরাম, এসাকি, কেলি আয়, মার্ক, কাইটল (অস্থি রোগে ও উপদংশ)।

সাধারণ ক্রিয়া :—মেডরাইনাম যেকোন পৃথকাতুর এবং টুবাকুলিনাম যেমন টুবাকুলার যক্ষাকাসের রোগবীজোৎপন্ন ঔষধ, সিফিলিনামও সেইরূপ উপদংশরোগবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যশরীরে ইহাদিগের ক্রিয়ার এবং উৎপন্ন রোগলক্ষণের বিভিন্নতা থাকিলেও ক্রিয়ার ও রোগের গভীরতা, ব্যাপকতা, এবং গুরুত্ব প্রায় তুল্য। এলোপ্যাথি এবং হাতুড়িয়া মতে অপরিমিত পারদ এবং আয়ডাইড্ অব পটাসিয়ামের প্রয়োগ এবং অল্প প্রকার কুচিকিৎসা বশতঃ তরুণ উপদংশ রোগের স্থানিক ক্ষত এবং তত্ত্বভেদ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাবাদি, পেশী, ঝিল্লি ইত্যাদি ও অস্থি, উপস্থি প্রভৃতি সর্বপ্রকার তরল ও কঠিন উপাদান পর্যন্ত রোগবিষ-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। উপরি উক্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট উপদংশ এবং পারদো-পদংশ ঘটত যৌগিক বিষের ক্রিয়া বশতঃ পুনরুৎপাদিকা শক্তি ও পোষণ-ক্রিয়া বিধ্বস্ত হইলে জীর্ণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপাদানে ও যন্ত্রে যে ক্ষত ইত্যাদি পুরাতন রোগ ও রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা এবং পুরুষানুক্রমিক উপদংশরোগজীর্ণ শিশুর শৈশবোপদংশ বা ইন্ফ্যান্টাইল সিফিলিস ঘটত যে রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। পূর্ষবর্ণিত মেডরাইনাম ইত্যাদি ঔষধের জ্বায় ইচ্ছাও উপদংশজ রোগচিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির শাখা স্বরূপ “আইসপ্যাথি” মতে রোগারোগ্য করে; এবং উপদংশ রোগকারণ না হইলে, অপিচ রোগলক্ষণের পুরাতন উপদংশরোগলক্ষণ সহ সাদৃশ্য থাকিলে ইহা সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতানুসারে প্রযুক্ত ও ফলপ্রদ হয়। কিন্তু ডাং গ্রাস উপরিউক্ত নসোড বা রোগবীজোৎপন্ন ঔষধ-নিচয়ের আইসপ্যাথিক ক্রিয়া হওয়া বিষয়ে বিশেষ সন্দেহই করিয়াছেন।

তিনি বলেন “আমি নসোড ঔষধ আইসপ্যাথি মতে ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন ফল পাই নাই। কিন্তু যে সকল রোগীর গণরিয়া, সিকিলিস প্রভৃতির কোন বিবরণ নাই, তাহাদিগের রোগে লক্ষণসাদৃশ্য থাকায়, সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছি”। প্রচলিত মতে উপদংশরোগে অতি যত্নপূর্বক নির্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হইলে সে স্থলেও ইহা দ্বারা ফললাভ করা যাইতে পারে। এই পর্যায়ের অন্ত্য ঔষধের ঝায় সিকিলিনামও অতি উচ্চ ক্রমে প্রায়শঃ ১০০০ (m) ১০০০০০ (cm), ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—অন্ধকারের আরম্ভ হইতে সূর্যালোকের প্রকাশ পর্য্যন্ত বেদনার স্বন্ধি ; সকল লক্ষণেরই রজনীতে স্বন্ধি (মার্ক) ; কেশের স্থানন ; যে কোন প্রকার মতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ; ইহা রোগীর বংশগত ধর্ম (এসেরাম, সরি, টুবাকু, মালফ, মাল্ফ এ)।

রোগ এবং বিশেষ রোগলক্ষণ ।

বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং তক্রপেই হ্রাস (ষ্টেনাম) ; বেদনা স্থান পরিবর্তন করায় পুনঃ পুনঃ শরীরাবস্থানের পরিবর্তন করিতে হয়।

তাম্রবর্ণ ও লাল স্বপ্তভেদ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে নীলবর্ণ হইয়া যায়। সম্পূর্ণ শরীরের চরম শীর্ণতা (এব্রটে, আয়ডি)।

রজনীতে জ্বংপিণ্ডের মূল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা (চূড়া হইতে মূল পর্য্যন্ত, মেডরাই ; জ্বংপিণ্ড মূল হইতে ক্র্যাভিকল অস্থি অথবা স্বন্ধ পর্য্যন্ত, স্পিজি)।

অরণশক্তির হানি ; পুস্তকের, ব্যক্তিবিশেষের অথবা স্থানের নাম অরণ রাখা যায় না ; সংখ্যা গণনা করা কঠিন। রোগী বোধ করে যে

উন্মাদ ; যেন তাহার অর্কান্স হওয়ার উপক্রম হইয়াছে ; ঔদাস্ত এবং অমনোযোগ। রোগী রজনীকে অত্যন্ত ভয় করে কেননা জাগিলেই শারীরিক এবং মানসিক বলহানি অসহনীয় হওয়ায় মৃত্যুই তাহার নিকট বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। জাগ্রত হইলে বলক্ষয়ের ভয়াবহ যন্ত্রণা বশতঃ যে কষ্ট পায়, তজ্জগ্ৰ ভীতি (ল্যাকেসিস্)।

স্নায়বিক শিরঃশূল রজনীতে নিদ্রার ব্যাঘাত করে এবং প্রলাপ হয় ; ও অপরাহ্ন ৪টার সময় আরম্ভ হইলে রজনী ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি, এবং রজনী প্রভাতে নিবৃত্তি।

নবজাত শিশুর তরুণ চক্ষুপ্রদাহ (Acute ophthalmia neonatorum) ; চক্ষুপত্র স্ফীত হয় ও নিদ্রাকালে জুড়িয়া থাকে ; রজনীতে তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে ২টা হইতে ৫টা রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি ; প্রচুর পুষ্ক্সাব ; এবং শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে রোগের উপশম। “সুপিরিয়র অল্লিক পেশীর” পক্ষাঘাত বশতঃ চক্ষুপটপতনরোগে চক্ষুপট বুলিয়া পড়ায় রোগীর নিদ্রালু দৃশ্য জন্মে। দ্বিত্বদৃষ্টিতে একটা পুতুলির নিয়ে অল্পপুতুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তমাড়ির কিনারায় দন্তের ক্ষয় জন্মে ও তাহা ভাঙ্গিয়া যায় ; দন্তের সম্মুখদেশ কোটরবৎ (cupped) এবং পার্শ্ব করাতের স্থায় কাটা কাটা। দন্ত খর্ব্বাকৃতি ও তাহাদিগের অগ্রভাগ পরস্পর নিকটতর থাকে।

বহুকালব্যাপী অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ ; সরলান্ন উপাদানগত (organic) সংকোচনে আবদ্ধ বলিয়া বোধ ; পিচকারি ব্যবহার করায় মল নির্গত হইতে প্রসবের স্থায় কষ্ট (ল্যাক ডি, টুবাকু')।

মলদ্বার ও সরলান্ত্রের বিদারণ (Fissure—থুঞ্জা) ; সরলান্ত্রের হারিস বা গুল্ম্রংশরোগ ; উপদংশের সংশ্রব থাকায় রোগ কষ্টসাধ্য।

স্কন্ধের অথবা ডেন্টাইডপেশীর সংযোগস্থলের রসবাতরোগের বেদনা পার্শ্বের দিকে হাত উঠাইলে বৃদ্ধি পায়।

অনিদ্রা ; অস্থিকৃত ; মেরুদণ্ডবক্রতা বা কার্ভেচার অব স্পাইন ; অস্থিবেষ্টিকিল্লি, স্নায়ু এবং সন্ধিতে বেদনা ; ব্রণশোথ ; অঙ্গের পক্ষাঘাত ; অস্থিবেষ্টিকিল্লির অর্কুদ বা গামেটা ; অস্থির অর্কুদ ; মুখ, গলমধ্য, তালু, চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়া এবং পদের ক্ষত ; বিষাদবায়ু, উন্মাদরোগ এবং মানসিক জড়ত্ব ; জরায়ুগ্রীবা ও জরায়ুযুথের ক্ষত এবং পীতবর্ণ এদর ; স্বরযন্ত্রের ক্ষত ও স্বরলোপ প্রভৃতি ।

৬। হাইড্রফবাইনাম বা লাইসিন ।

(Hydrophobinum or Lyssin)

চিকিৎসা :—হাইড্রফবাইনামের শিরঃশূলরোগী জলশোতের শব্দ সহ করিতে পারে না, তাহাতে তাহার বেদনার বৃদ্ধি হয় । জ্বলের শব্দে গর্ভবতী রমণীর সর্কাস্ট্রীন আক্ষেপ বা কনভাল্‌সন হইলে হাইড্রফবাইনাম উপকার করিয়া থাকে ।

লেখক্চার ৭৪ (LECTURE LXXIV.)

ম্যাগ্নিসিয়া সল্টস্ ।

১। ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা । ২। ম্যাগ্নিসিয়া
ফস্ফরিকা । ৩। ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়টিকা ।

১। ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা (Magnesia Carbonica.) ।

উপশম্ — শরীরচালনায় ; মুক্ত বায়ুতে ।

সম্ভব্ — ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, পাল্‌স্,
মার্কুরিয়াস, নাক্‌স্ ভ, রিয়াম্ ।

কার্যপূরক—ক্যামমিলার ।

তুলনীয় ঔষধ্ — আস, এলো, ক্যাক্‌স্ কা, ক্যাম, গ্র্যাফা,
লাইক, নাই এসি, নাক্‌স্ ভ, ফস্, সিপি, সিলিক ।

সাধারণ ক্রিয়া্ — ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা প্রধানতঃ অন্ত্রনালীর
শৈথিল্যক বিলি আক্রমণ করায় তাহার উত্তেজনা ও প্রাতিশ্চায়িক প্রদাহ এবং
স্বীজননেদ্রিয় আক্রমণ করিলে ঋতুপ্রাব সম্বন্ধীয় বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয় ।
ইহার রোগী বাতপ্রকৃতি এবং উত্তেজনাপ্রবণ । শিশু রোগেই ইহার
অধিকতর ব্যবহার দেখা যায় ।

লক্ষণ ।

মস্তক্ — চাপিত করার গায় শিরঃশূল । মস্তকান্তিমুখে শোণিত-
ধাবন । কেশের স্থলন । মস্তকের উপরি তন্তুস্তেদে জন্মিলে বর্ষাকালীন
সিক্ত প্রাব হাওয়ায় চুলকায় ।

শ্রাস্তু ১—বিদ্যৎকলকবৎ শ্রাস্তুশূল। মৃগীবৎ আবেশ হইলে সজ্ঞানা-
বস্থায় পুনঃ পুনঃ অকস্মাৎ পতন। দুর্বলতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে
অধিকতর। দুর্বলতা ও ক্লান্তি, বিশেষতঃ পাদে অধিকতর এবং উপবে-
শনাবস্থায় বদ্ধিত। সন্ধ্যাকালে অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিলে অঙ্গের
অস্থিরতা জন্মে।

চক্ষু ১—প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুসম্মুখে কাল কাল
বিন্দু। কালক্ষেত্র বা কণিয়ার অস্বচ্ছতা। চক্ষুগোলকের স্ফীতি। চক্ষুর
শুকতা অথবা অশ্রুশ্রাব। চক্ষুর প্রদাহ ঘটিত লোহিতবর্ণ, জালা ও
ছলবেধবৎ বেদনা এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব।

মুখপাহুবর ১—রজনীতে দন্তশূল হইলে রোগী গাত্রোথান করিতে
ও ভ্রমণ করিতে বাধা; স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা অসহনীয় হইয়া
উঠে; শৈত্যে বৃদ্ধি হয় এবং গর্ভাবস্থায় উপস্থিত থাকে। মুখলালা
রক্ত মিশ্রিত। মুখাঘাত তিক্ত অথবা অম্ল।

আমাশয় ১—ফল এবং অম্ল বস্তুতে ইচ্ছা; মাংস খাইতে চাহে;
শাকসজীতে ঘৃণা জন্মে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।
আমাশয়ে কসিয়া ধরার ঞায় বেদনা। আমাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা হইলে
চাপে অত্যন্ত অসহিষ্ণু থাকে।

উদর ১—আমাশয়ের স্ফীতি প্রচুর বায়ু নিঃসরণে উপশম।
সম্পূর্ণ উদরে কামড়ানি ও কর্তনবৎ বেদনা এবং গড় গড় ডাক হইলে
পাতলা ও সবুজবর্ণ মলত্যাগ, কুস্থন থাকে না।

মল ও মলদ্বার ১—সরলাস্ত্রে স্থচিবেধবৎ বেদনা। ভেকের
আবাস পুষ্করিণীর উপরিভাগে ভাসমান সবুজ এবং বৃদবৃদযুক্ত ময়লা বা
গাঁজলা অথবা ভাসমান মোমখণ্ডের ঞায় পদার্থযুক্ত বিষ্ঠা প্রত্যেক বার
ত্যাগের পূর্বেই উদরের কামড়ানি তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে।
কোষ্ঠবদ্ধ।

স্ট্রীজেননেক্রিয়া ;—অতি দিলম্বে অত্যন্ন পরিমাণ ঋতুস্রাব । ঋতুস্রাব দিবসাপেক্ষা রজনীতে প্রচুরতর হয় এবং আনুসঙ্গিক আকুষ্ঠবৎ জরায়ু বেদনা উদরোপরি চাপে এবং নত হইলে উপশম থাকে । বেদনার সময় ঋতুস্রাব হয় না তাহার পরে হয় । ঋতু শোণিত, গর্দের স্থায়, ঘন, উগ্র, কাল এবং আলকাতরার স্থায় ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;—স্বন্ধে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে রসবাতিক বেদনা ।

চিকিৎসা ।

চক্ষুরোগ ;—মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট ;—ডাঃ ফ্যারিংটন অ্যাগ্নিসিয়া কার্ভ দ্বারা দুইটি মতিয়াবিন্দু রোগীর আরোগ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার মধ্যে একটি রোগীর পূর্বে হইতে শিরঃশূল প্রবণতা ছিল এবং তাহার স্ফোটক হইত । এস্থলে ইহা সিলিসিয়া, কনাসাম্, নেট্রিউ এবং কপ্টিকাম সহ তুলনীয় ।

দন্তশূল ;—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূলরোগে অ্যাগ্নিসিয়া কার্ভ উপকারী । বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি হইলে রোগিণী-শয্যাভ্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য ।

অজীর্ণরোগ বা ডিসপেপ্টিসিয়া ;—শিশু ও যুবক উভয়ের অজীর্ণরোগেই অবস্থাবিশেষে অ্যাগ্নিসিয়া কার্ভ প্রযোজ্য । শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহা পরিপাকও করিতে পারে না । দুগ্ধ পান করিলেই আমাশয়ের বেদনা হয় এবং অজীর্ণবস্থায় তাহা মলসহ নির্গত হইয়া যায় । উদরাময় জন্মিলে শিশু অন্নভ্রাণ, সবুজ ও ক্লেদযুক্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করে । উদরাময় না হইলে বিষ্ঠাসহ থানা থানা জিউলিয় আটার স্থায় আম থাকে । উদরাময়ের পূর্বে পেট কামড়ানি হইলে

মলত্যাগান্তে তাহার উপশম হয়। পুষ্টিহানি বশতঃ শিশু ক্রমে রোগজীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া যায়।

যুবা ব্যক্তদিগের অম্লাজীর্ণরোগে (Acid dyspepsia) ষড়্বিকার প্রধান লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকে। রোগী সাধারণতঃ কফিশাক, গোল আলু এবং শ্বেতসারময় বস্তু পরিপাক করিতে পারে না। আহারকালে রোগী উৎকর্ষায়ুক্ত এবং গরম বোধ করে ও গরম হওয়ায় নিদ্রা যাইতে পারে না, তথাপি ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া শরীর অনাচ্ছাদিত করিতে ভীত হয়।

উদরশূল বা কলিক।—পূর্বে কথিত উচ্ছ্বাজীর্ণরোগগ্রস্ত শিশুর বারম্বার উদরশূল। বয়স্কদিগের ফল এবং শাকসজ্জি আহারে অজীর্ণ জন্ম উদরশূল জন্মে। শিশুর উদরে কামড়ানি হয় এবং শিশু হস্তপদ উর্দ্ধদিকে তুলিয়া বেদনার উপশম পাইতে চেষ্টা করে। ফলতঃ ম্যাগ্নিসি-সিলিকা কার্বের উদরশূল অনেকাংশে কলসিন্থ রোগসহ তুলনীয়। বিশেষ প্রকারের অম্লাক্ত সবুজ এবং ক্লেদমিশ্রিত মল ত্যাগ হইলে উদরশূলের উপশম হয় অথবা উপরি উক্ত উদরাময়ের পূর্বের পেট-কামড়ানি বেদনার উপশম জন্ম শিশু বিভাঁজ হইতে থাকে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—ম্যাগ্নিসিলা কার্বের উদরাময়ের বিষ্ঠার বিলক্ষণ বিশেষতা দৃষ্ট হয়। ইহার বিষ্ঠা অম্লাক্ত, সবুজবর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত থাকায় ব্লিয়ার্ম ও ক্যানামিনার বিষ্ঠার সহিত সাদৃশ্য প্রকাশ করে। যে পুষ্করীণীতে বহুতর ভেক বাস করে তাহার জলোপরি ভাসমান বৃদবৃদযুক্ত ময়লা বা “ব্যাজ পুকুরের” জলের উপরের গাঁজলার স্থায় বিষ্ঠা ইহার উদরাময়ের প্রদর্শক। মলত্যাগের পূর্বে অত্যন্ত পেটকামড়ানি এবং পেটের ডাক উপস্থিত হয়। শিশু ক্রমে ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্ঠিপেশন ৷—উপরি উক্ত অঙ্গীর্ণরোগ-
গ্রস্ত এবং জাঁর্ণ, শীর্ণ শিশুর কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয় । অত্যন্ত
উদরশূল হইলে শিশু দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং অবশেষে কিঞ্চিৎ
কঠিন বিষ্ঠা সহ জিউলির আটার ন্যায় চাপ
চাপ আম নিৰ্গত হইলে উদরশূলের নিবৃত্তি হয় ।

স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগ—ঋতুবিকার ৷ গর্ভাব-
স্থার রোগ ৷—ম্যাগ্রিসিয়া সল্ট মাত্রেরই ঋতু শোণিত
কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রায় আলকাতরার ন্যায় কাল । ম্যাগ্রিসিয়া
কার্বের ঋতুস্রাব সাধারণতঃ বিলম্বাগত এবং অত্যন্ত । ইহার বিশেষতা-
এই যে, শোণিতস্রাব রজনীতে, শয়নাবস্থায়
অথবা প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিবামাত্রই
অধিকতর হয় এবং ভ্রমণকালে রক্ত-
স্রোত বন্ধ হইয়া যায় ৷ ঋতুস্রাব স্বরাসিক যাহাই
হউক স্রাবকালে বেদনা থাকে না অথবা বেদনার বিরতিকালে
অধিকতর স্রাব হয় । শোণিত পূর্ককথিত রূপ কৃষ্ণবর্ণ থাকে এবং
তাহা উগ্রতা বিশিষ্ট হয় ।

গর্ভাবস্থায় দস্তশূল রোগের পক্ষে ম্যাগ্রি-
সিয়া কার্ব অত্যন্ত প্রধান ঔষধ । এই দস্তশূলের রজনীতে বৃদ্ধি
হইলে রোগিনী শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া গৃহের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ
করিতে বাধ্য হয় । রেট্যানিয়াতেও রজনীতে দস্তশূলের বৃদ্ধি
হইলে রোগী গৃহের চতুঃপার্শ্বে অস্থির ভাবে ভ্রমণ করে । ম্যাগ্রিসিয়া
কার্বের কার্যপূরক ক্যানামিনার কথাও এস্থলে আমাদের
স্মরণ পথে আইসে ।

নাক্স ভানিকা—বিষাদগ্রস্ত ও খিটখিটে স্ত্রীলোকদিগের
দস্তশূলে উপকারী ।

সিপিছা—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। অধিকাংশ সময়ে ২০০ ক্রমে ইহা কার্য্য করিয়া থাকে।
সিপিছা নিষ্ফল হইলে **ওপিছাম** প্রযোজ্য।

হেমায়েলিস—ইহ “মিক্সেলগ” বা গর্ভাবস্থার পদক্ষীতির পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুক্করোগ বা **ম্যারেস্‌মাস্**—ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব শিশুক্করোগের পক্ষে **ক্যাঙ্কেরিয়ার** ত্রায় অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। দুর্বল ও পুষ্টিহীন এবং রোগজীর্ণ শিশুদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না, করিলেও আমাশয়ে বেদনা হওয়ায় সে তাহা সহ করিতে পারে না এবং আচরাৎ অজীর্ণ ও অল্পগন্ধ দুগ্ধের বমন করিয়া ফেলে; দুগ্ধের পানের নূনাধিক কাল পরে কামড়ানি প্রকৃতির উদরশূল জন্মে; এবং অস্বাস্ত ও ঘাসের ত্রায় সবুজ বর্ণের মল ত্যাগ হয়। শিশুর আকৃতি জাজ্জল্যমান পুষ্টিহীনতার লক্ষণ প্রকটিত করে। শিশুর সম্পূর্ণ মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয়, গ্রন্থির ক্ষীতি জন্মে এবং উদর বৃহদায়তন থাকে।

ম্যাক্কুরিহাস্—রোগী শীর্ণ হইয়া যায়, গ্রন্থিনিচয় ক্ষীত হয় ও পাকে এবং শরীরাকৃতি ত্রাবারোগবৎ পীত বর্ণ ধারণ করে। **কুহ্নন** সহ **সনুজবর্ণ** অল্প অথবা **জলবৎ** মল-ত্যাগ হওয়ায় ইহা ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব হইতে প্রভেদিত হয়।

২। **ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা (Magnesia phosphorica.)**।

উপচয়—শীতল বায়ুতে; দমকা ও ঠাণ্ডা বাতাস অথবা প্রবহমান শীতল বায়ু সংস্পর্শে; শীতল জলে স্নান অথবা গাত্র ধোত করিলে; স্পর্শে।

উপশম—**দ্বিভাঁজ হইলে**; তাপে; চাপে।

তুলনীয় ঔষধ :—বেল, ফলফা, কলসি, লাইক, ল্যাক
কেনি, পালস, ক্যাম ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ ভাণ্ডারের আধুনিক সংগৃহীত রত্নবিশেষ । ইহার ঔষধগুণ পরী-
ক্ষার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া না যাইলেও রোগ চিকিৎসায় ইহা
যে গুণবস্তুর নিদর্শন প্রদান করিয়াছে তাহাতে প্রকৃত পক্ষেই ইহার
হোমিওপেথির অগ্রতম শ্রেষ্ঠ রত্ন নামে অভিহিত করিলে অত্যাতি দোষ
ঘটে না । ইহা স্নায়বিক উপাদানের একটি প্রধান উপকরণ । এ কারণ
ডাঃ স্মুলারের গৃহীত মতানুসারে ম্যাগ্নি ফসের অভাব নিবন্ধন স্নায়ু-
পদার্থের পুষ্টিহানি বশতঃ রোগাৎপন্ন হইলে ইহা তাহার পুষ্টিসাধন
পূর্বক রোগারোগ্য করে । ফলতঃ স্মুলারের উপরি উক্ত মতের প্রতি
দৃষ্টি না করিয়াও হোমিওপ্যাথি মতানুসারে ইহার ক্রিয়ার বিষয়ে যাহা
জানিতে পারা গিয়াছে নিম্নে আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত
করিলাম ।

একহারা, শীর্ণকায়, কৃষ্ণ বর্ণ এবং অত্যন্ত বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের
পক্ষে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা বিশেষ উপযোগী ঔষধ । ইহার রোগী
অবসন্ন, ক্লান্ত এবং হৃতশক্তি থাকায় ঋজুভাবে উপবেশন করিতে অক্ষম
হয় ।

স্নায়বিক বিকার জন্ত বেদনাদি নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি ও
আরোগ্য দ্বারা ইহার প্রধানতম ক্রিয়া প্রকটিত হয় । ফলতঃ ভৈষজ্য
ভাণ্ডারের কোন ঔষধই ইহার ছায় বহুধা স্নায়ুশূল এবং স্নায়বিক
লক্ষণ উৎপন্ন করে না । বেদনার প্রকৃতি তীক্ষ্ণ, কর্তনবৎ, ছুরিকা-
ঘাতের ছায় এবং তীর ও সূচিবোধবৎ ; বেদনার আক্রমণ এবং
তিরোধান বিদ্যাৎ বলকের ছায় আসা যাওয়া করে ; বেদনার অসহনীয়
সবিরাম আক্রমণে রোগী ক্ষিপ্তপ্রায় হয় ; সংকুচিতবৎ অল্পভূতি

উৎপাদক বেদনা ত্বরিত স্থান পরিবর্তন করে ; আমাশয়, উদর এবং বস্তিকোটরের শ্মারশূলরোগে খল্লীবৎ বেদনা থাকে ।

উপরি উক্ত উপচয় ও উপশমের কারণ, রোগীর ধাতুর ও শরীর-কারের বিশেষতা এবং বেদনার প্রকৃতি প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে যে যে রোগে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ প্রদত্ত হইয়া থাকে নিম্নে আমরা তন্মুখা হইতে কতিপয় রোগের বিষয় উল্লেখ করিলাম । শিক্ষার্থীদের স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে, অতি যত্নপ্রদ, অনেকানেক, প্রায় নিত্য ঘটনীয় রোগ চিকিৎসায় আশু ফলপ্রদ হোমিওপ্যাথি ঔষধমধ্যে ইহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক :—বিভাগলের ছাত্রীদের শিরঃশূল রোগে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা উপকারী ঔষধ । মানসিক ভাবোচ্ছাস, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা কঠিন পাঠাভ্যাস এই শিরঃশূলের কারণ, ; ইহা স্যাঙ্কু, ও সিলিকনের স্থায় মস্তক পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ মস্তকে বিস্তৃত হয় ; রোগীর মুখ লোহিতবর্ণ ও শোণিতোচ্ছাসযুক্ত থাকে এবং পূর্কায় ১০ হইতে ১১টা অথবা অপরাহ্ন ৪ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি এবং চাপে ও —বাহ্যতাপ প্রয়োগে তাহার হ্রাস হয় ।

ধনুষ্ঠকার বা ডিটেনাস :—ডাঃ সি, এম্ ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফের ৩×ক্রম প্রয়োগে অতি সহজ একটি ধনুষ্ঠকার-রোগে ফললাভ করিয়াছিলেন ।

ষ্ট্র্যাননিহান্স—ধনুষ্ঠকারের সর্কাল্পীণ আক্ষেপকালে স্বাসনলী-দ্বারের ও বক্ষের আক্ষেপ হইলে এবং আক্ষেপ আনলোক ও স্পর্শে বৃদ্ধি পাইলে ইহা দ্বারা উপকার হয় ।

হাইপেরিকাম্—স্নায়বিক অভিব্যাত জন্ম হনুস্তম্ভের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ ; করতল ও পদতলের ক্ষতের প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করিয়া ইহা ধনুষ্ঠকারের বাধা জন্মাইয়া থাকে ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিন্জিয়া :—স্নায়ুশূলরোগারোগ্যে অ্যাগ্রিসিন্জিয়া ফস্ বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে । ইহার সবিরাম, তীরবেধ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা মুখ এবং চক্ষুকোটরের নিম্ন অথবা উর্দ্ধাংশ আক্রমণ করে ; স্পর্শে, শীতল বায়ুতে এবং চাপে তাহার বৃদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস হয় । যে কোন মস্তক পার্শ্ব ও গ্রীবার পার্শ্বের স্নায়ু-শূলেও ইহা উপকারী ।

এলিহান্ সেপা ও হাইপেরিকাম্—অঙ্গচ্ছেদাস্তর ছিন্ন অঙ্গের অগ্রভাগের স্নায়ুশূলে ফলপ্রসূ ।

ছপ্পশব্দক কাসি বা ছপিংকফ :—ডাং-সুস্কারের টিসু রেমিডির মধ্যে ছপিং কাসির পক্ষে অ্যাগ্রিসিন্জিয়া ফস্ প্রধানতম ঔষধ ; রোগ সাধারণ সর্দির স্থায় আরম্ভ হয় । স্নায়বিক কাসি আক্ষেপ সহ আরম্ভ হইয়া ছপ্প শব্দে শেষ হয় । কোন কোন দেশব্যাপক রোগে ইহা ৩০ ক্রমে কার্য্যকরী হইয়াছে । কঠিন ছপ্পশব্দ সহ কঠিন কাসির আক্রমণ জন্ম মুখের স্ফীতি ও নীল বর্ণ ইহার প্রদর্শক ।

কেলিসালফুরিকাম—ছপিংকাসির স্বরভঙ্গে কখন কখন ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।

সালফুইনেরিয়া নাইট্রেট—ছপিংকাসির স্বরভঙ্গে, গলমধ্যে ও স্বরযন্ত্রে কাঁচাভাব এবং শিরঃশূল থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয় ।

পরিপাকযন্ত্ররোগ—দস্তোদগ্নারোগ ; **দস্ত-শূলে** ; **আমাশয়শূলে** ; **উদরশূলে** :—শিশুদিগের দস্তোদগ্ন-

কালের অরহীন আক্ষেপ ম্যাগ্নিসি ফসেসের প্রদর্শক। বেলা-ডনার দস্তোদগমকালীন আক্ষেপে অর, মস্তক ও গাত্রের তাপ এবং মুখের রক্তমা থাকে।

ম্যাগ্নি ফসেসের দস্তশূল বা টুথেক রক্তনীতে হ্রস্ব এবং স্থিরিত স্থান পরিবর্তন করে; আহারে ও পানে, বিশেষতঃ শীতল বস্তু ভক্ষণ করিলে, তাহার রুদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস হয়।

ম্যাগ্নি ফসেসের আমাশয়শূলে আক্ষেপিক অথবা খল্লীবৎ বেদনা হয়; তাহাতে রোগী বোধ করে যেন শরীরের চতুঃপার্শ্বে কশাভাবে বা কঠিন চাপের সহিত হস্ত টানিয়া লওয়া হইতেছে; জিহ্বা পরিষ্কার থাকে।

ম্যাগ্নিসিয়া ফসেসের বাতজ উদরশূলের বেদনা সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে; তাহাতে রোগী কলসিস্থের ঠায় দ্বিভাঁজ হইলে এবং কলসি ও প্লাস্মামের উদর কঠিনরূপে চাপিত করিলে, ঘর্ষণে, বিশেষতঃ উদরে তাপ সেক করিলে উপশম পায়। বাতজ উদরশূলে শিশু পদ টানিয়া উর্দ্ধাভিমুখে উত্তোলন করিলে ইহা তাহার মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ভূমিষ্ঠ শিশুর উদরশূল আরোগ্যে ড্যাং মর্গ্যান ইহার ৩০ ক্রমকে অকাটা ও স্থিরিত ফলপ্রদ অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। যে উদরশূলে শিশু দিনের অর্ধেক সময় কান্দিয়া কাটার ইহা দ্বারা তাহার উপকার হইতে পারে, "তাপ প্রয়োগে উপশম" ইহার প্রদর্শক।

রক্তেক্কচ্ছ, বাশক বা ডিস্‌মেনরিয়া।—বাধকের চিকিৎসায় ম্যাগ্নি ফস প্রায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঋতুস্রাবের পূর্বে জরায়ুতে স্নায়ুশূল ও খল্লীবৎ বেদনা হয় এবং তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম ও শরীর চালনায়

তাহার রক্তিক ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে । জরায়ুর মায়ুশূলে অ্যাপ্লি ফস সিমিসিসুপার প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ । জরায়ুর রক্তপূর্ণাবস্থায় খল্লীবৎ বেদনা অ্যাপ্লি ফসের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য । পর্দা বিশিষ্ট (Membranous) রজেক্কচ্ছুরোগেও ইহা দ্বারা ফল পাওয়া গিয়াছে । এবস্থধ রোগ চিকিৎসার উপযুক্ত ঔষধের সংখ্যা অতীব সঙ্কীর্ণ । বলাকস্ কোন কোন রোগীকে আরোগ্য করিলেও অনেক স্থলেই তাহা নিফল হইয়া থাকে এবং কোন কোন রোগীর অবরোধ প্রভৃতি জন্ম “নিম্নাভিমুখে শরীর চালনায় ভীতি”, বাতীত ইহার অন্য উৎকৃষ্টতর প্রদর্শকও দৃষ্টিগোচর হয় না । কিল্লি-যুক্ত রজেক্কচ্ছুর চিকিৎসা জন্য ডাঃ হেল্ ভাই-বার্ণাম্, গুয়েইয়াকাম্ এবং আষ্টিলেপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । তাহাদিগের বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্ট হয় না । রজেক্কচ্ছুরোগে কলসিস সহ ইহার তুলনা করা যাইতে পারে । তাহাতে বাম অণ্ডাধারে কঠিন বেদনা হওয়ায় রোগী দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং বেদনা নাভি হইতে জননেন্দ্রিয়ে যায় ।

ইহার ঋতু শোণিত কৃষ্ণবর্ণ সূত্রবৎ পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং স্রাব শীঘ্রাগত হয় । অ্যাপ্লিসিসিয়া ফস খল্লীপ্রদান ঔষধ বলিয়া ইহা যোনির আক্ষেপ বা ভ্যাজ্জাইনিস্মাসরোগও অবস্থা বিশেষে আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

ক্যাথিটার দ্বারা মূত্রস্রাব করাইবার পর মায়বিক উত্তেজনা প্রযুক্ত মূত্রাশ্রিক্য জন্মিলে এবং রক্তনৌমূত্রস্রাব-দোষ সংশোধনে ইহা স্থলবিশেষ উপকার করিয়া থাকে । অন্যান্য রোগ মধ্যে পদের এবং গর্ভবতীর, লেখকের এবং পিয়নো ও ভায়লিন বাদকদিগের খল্লীতে ইহা উপকারী ।

৩ । ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়োটিকা । (Magnesia Muriatica.) ।

সম্বন্ধঃ—ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়োটিকার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম।

তুলনীয় ঔষধঃ—ব্যারা কা, ব্রায়, ক্যাঙ্কে কা, ক্যাম, কনায়, গ্র্যাফা, কেলি কা, লাইক, ম্যাগ্নি কা, মিউ এসি, নেট্ কা, নেট্ মিউ, নাই এসি, নাক্‌স্ ভ, পাল্‌স্, সিলিক, মাল্‌ফ ।

সাপ্রবরণ ক্রিয়াঃ—ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়োটিকা গ্রন্থিল স্নায়ুশুল আক্রমণ করিয়া স্নৈমিক ঝিল্লিপথে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে । ইহা স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ বহুকালের গুল্মবায়ু ও জরায়ুরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের এবং শিশুগণের, বিশেষতঃ তাহাদিগের দস্তোদগমকালীন রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ ।

লক্ষণ ।

মস্তকঃ—ললাটদেশে কশাভাব ও চাপ । সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে উভয় ললাটপার্শ্বে নিম্পোষিতবৎ ও কামড়ানি বেদনায় বোধ যেন অচিরাত্‌ শিরোগূর্ণন ও জ্ঞানের অভাব হইবে ; হস্ত দ্বারা প্রবল চাপ প্রয়োগ করিলে তাহার উপশম । ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বের ছিন্ন ও হৃচিবেদবৎ বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং চক্ষুদ্বয় এক সঙ্গে চাপিত করিবার আবশ্যিকতা জন্মে । মস্তক আবৃত করিলে শিরঃশূলের উপশম হইয়া থাকে ।

স্নায়ুঃ—গুল্মবায়ুবৎ ও আক্কেপিক রোগ । অত্যন্ত অনিদ্রাবস্থায় দিবা ও রজনীতে অনেক বার আক্কেপ হয় । সমুদ্রজলে স্নান করিলে অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে । শরীরের দুর্বলতা যেন আশ্রয় হইতে বিস্তৃত হওয়ার আশ বোধ হয় । মধ্যাহ্নের আহার কালে মুচ্ছার আক্রমণ, বিবমিষা এবং কম্পের উদ্‌গারে উপশম ।

নাসিকা ।—হৃগন্ধ, পুয়বৎ শ্লেছাস্রাব । নাসিকার অথবা নাসাপুটের লোহিতাভা ও স্ফীত স্পর্শে বেদনায়ুক্ত । নাসারন্ধ্রে টাটানি বেদনা ও জ্বালা । নাসারন্ধ্রের মামড়ি স্পর্শে বেদনায়ুক্ত থাকে, নাসারন্ধ্রে ক্ষত দৃষ্ট হয় ।

হৃৎশিঙ ।—উপবেশন করিলে হৃৎকম্প হয় ; শরীর চালনায় তাহা নিবৃত্তি পায় ।

উদর ।—যকৃতপ্রদেশে তীক্ষ্ণ আকৃষ্টতা এবং আততভাব সহ জ্বালায়ুক্ত সূচিবোধবৎ বেদনার চাপে বৃদ্ধি । ভ্রমণকালে অথবা স্পর্শ করিলে যকৃতে চাপযুক্ত বেদনা ও দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি ; যকৃত কঠিন ও বিবদ্ধিত । অবিশ্রান্ত বায়ু নিঃসরণ ।

মল ও মলদ্বার ।—অতি কষ্টে এবং ধীরে কঠিন ও অপ্রচুর মলত্যাগ—বিষ্ঠা ছাগলের নাদির ছায় গিট গিট ; দন্ধবৎ বিষ্ঠা ছড়াইয়া পড়ে এবং কঠিন বিষ্ঠা আম ও শোণিতরেখা জড়িত থাকে । বিষ্ঠা মলদ্বার পার্শ্ব হইতে ছড়াইয়া পড়ে । মধ্যে মধ্যে পুরাতন উদরাময় দেখা দেয় ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রিয় ।—ঋতু অতি শীত্ৰাগত এবং অতি প্রচুর ; কাল ও চাপ চাপ রক্তস্রাব উপবেশনাবস্থায় অধিক এবং ভ্রমণকালে স্বল্পতর । ঋতুকালে মুখ পাণ্ডুর ও কুচকি বেদনায়ুক্ত থাকে এবং মানসিক অবসাদ জন্মে । জরায়ুর খল্লী উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় । খেতপ্রদর হইলে উদরে খল্লী থাকে ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক ।—স্নায়বিক এবং শোণিতসঞ্চয়ী উভয় প্রকার শিরঃশূলেই অবস্থাবিশেষে অ্যাগ্রিসিন্ধা মিউ দ্বারা উপকার হইয়া থাকে । শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে বোধ হয় যেন মস্তক

মধ্যে জল কুটিতেছে অথবা ললাট দেশ অসাড় হইয়া গিয়াছে। ইহার শিরঃশূল কখন কখন ছয় সপ্তাহ পর পর পুনরাবর্তন করে এবং তাহাতে ললাট ও চক্ষুচতুষ্পার্শ্ব বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা বিদীর্ণ হইবে। চালনায় এবং মুক্ত বায়ুতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শয়নে, কঠিন চাপে ও বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক উষ্ণ রাখিলে তাহার হ্রাস, ম্যাগ্নি মিউ শিরঃশূলের বিশেষ প্রকৃতি। রোগীর শুষ্কবায়ু প্রকৃতি এবং পূর্ববর্ণিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া জানিতে হইবে। কঠিন চাপে স্পাল্ডসের এবং বস্ত্রাবরণে মস্তক উষ্ণ রাখিলে সিলিসিক ও ট্রিনসিলিয়ানার শিরঃশূলের উপশম হয়।

পিনসরোপ বা অভিজিনা।—অস্থিবিকার ও যকৃৎরোগ-গ্রস্ত পুষ্টিহীন এবং খর্বীকৃতি শিশুদিগের পিন্তদোষ বশতঃ শরীরে বিশেষতঃ অক্ষিপুট, মস্তকত্বক প্রভৃতি কেশমুক্ত শরীরংশের কেশমূলে শঙ্কযুক্ত উদ্ভেদ জন্মিলে নামারক্ক হইতে তীব্র শ্রাব নির্গত হইতে থাকে। ম্যাগ্নি মিউ পিনসরোগে নামিকা লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং শঙ্কাচ্ছাদিত হয়। শিশুর পদঘন্থ হয় কিন্তু ঘর্মে সিলিসিয়ার গ্রাম দুর্গন্ধ থাকে না।

যকৃৎরোপ—যকৃৎবিব্রন্ধি বা এন্লাজর্জমেন্ট অব দি লিভার।—যকৃৎরোগচিকিৎসায় ম্যাগ্নিসিয়া মিউ অগ্রতম প্রধান ঔষধমধ্যে গণ্য হইয়াছে। যকৃৎ বিব্রন্ধ এবং উদর স্ফীত হয়। যকৃৎ বেদনা করে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ও যকৃৎ স্পর্শে তাহার বৃদ্ধি হয়। জিহ্বা বৃহত্তর ও পীতবর্ণ লেপযুক্ত এবং তাহার পার্শ্ব দন্তের ছাপ লাগে। জিহ্বার আয়তনের বৃদ্ধি ও তাহার পার্শ্ব দন্তাগ্রের ছাপের বর্তমানতায় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বেদনার বৃদ্ধিতে ইহা মার্কারিয়াসের তুল্য হইলেও বিষ্ঠার প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। ম্যাগ্নিসিয়ার

বিলম্বিত মলদ্বারপার্শ্ব হইতে ছড়াইয়া পড়ে ; পুরাতন যকৃৎরোগে ম্যাগ্নি সিউ এবং তরুণে মার্কারি উপযোগী । ডিলি-
ছার (ptelea) যকৃৎবেদনা বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয় ।
যকৃচ্ছিরার শোণিতগতির মন্থরতা বশতঃ কখন কখন পদের শোথ জন্মে ।
যকৃৎরোগ সহ বিশ্রামাবস্থায় হ্রৎকম্পের উপস্থিতি
এবং শরীরচালনার তাহার উপশম একটি বিশেষ পরি-
চিত লক্ষণ । যকৃৎরোগ বশতঃ আমাশয়ে সঞ্চিত বায়ুর উদ্ধাভিমুখে চাপ
জন্ম উপরি উক্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

বভেজাকুচ্ছ, বা ডিস্‌মেনরিয়া ;—রোগিণীর জরায়ু-
দেশে ঠেল মারা এবং জরায়ুতে আক্ষেপিক বেদনা থাকে । স্নতুশোণিত
কাল এবং প্রায় আলকাতরার গায় হয় এবং হাঁটলে পৃষ্ঠ ও বদিলে উরু
বেদনা করে । জরায়ুর আক্ষেপ এবং মলত্যাগে কষ্ট হইলে শ্বেতপ্রদ-
রের স্রাব দেখা দেয় । কোষ্ঠবদ্ধ ও নূনাধিক গুণ্ডাবায়ু লক্ষণ উপস্থিত
থাকে । কোন কোন রোগীর যকৃৎবিকার দৃষ্ট হয় ।

শিশুর দন্তোদগমকালীন রোগ ;—পুষ্টিহীন, অস্থি-
বিকারযুক্ত এবং খর্সাকৃতি শিশু কষ্টকর দন্তোদগমকালে দুগ্ধ পরি-
পাকের অক্ষম হয় ; দুগ্ধপানে তাহাদিগের আমাশয় বেদনা করে ও
অপরিপক্ক দুগ্ধ মল সহ নির্গত হইয়া যায় ।

লেকচার ৭৫ (LECTURE LXXV).

ফাঙ্গাস্ (ব্যাঙ্গের ছাতা) শ্রেণীর ঔষধ ।

১। এগারিকাস্ মাস্কেরিয়াম্ । ২। বভিফা ।

৩। আষ্টিলাগা । ৪। সিকেলি কর্ণুয়েটাম্ ।

১। এগারিকাস্ মাস্কেরিয়াম্ (Agaricus Muscarius) ।

উপচয় ঃ—আহারাস্তে ; সঙ্গমাস্তে ; শীতল বায়ুতে ; একাগ্রচিত্ত হইলে ; বিভ্রাৎময় ঝটিকার পূর্বে (ফস্, সরি) ।

সম্বন্ধ ঃ—এগারিকাসের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যান্ফর, কফিয়া, পাল্‌স্, ভাইনাম্, চার্কোল, রাস্, বসা অথবা তৈল ।

তুলনীয়া ঔষধ ঃ—ক্যানা ইণ্ড্, সিকু, সিমিসি, কনায়, হায়সা, ল্যাকেসি, জ্যাবরেণ্ড, নাক্‌স্ ভ, ফস্, ফাইজ্, সিকে ক, পাল্‌স্, ট্যারেণ্টু, জিক্ ।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—এগারিকাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা এস্থলে ডাং টি, এফ্, এলেন্ লিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি । “শোণিত, শ্বাসপ্রশ্বাস, আন্ত্রিক গতিক্রিয়া এবং শ্রাব-ক্রিয়া এগারিকাস্ দ্বারা প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে । ইহা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর ধ্বংসপণ্ড-সূত্রনিচয়ের উত্তেজনা ও ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধি করে, কৈশিক ধমনীনিচয়ের প্রবল সংকোচন উপস্থিত করে, এবং অস্ত্র, মূত্রস্থলী ও উপতারার পেশীসূত্রনিচয়ের ঋজুভাব এবং মন্থনতা উৎপন্ন করে । লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, প্যানক্রিয়াজ্ এবং আন্ত্রিক লৈঙ্গিক ঝিল্লির শ্রাব ইহা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহা কণীনিকার

সংকোচন ও স্বাভাবিক দৃষ্টি উৎপাদনোপযুক্ত সামঞ্জস্যভূত পেশীক্রিয়ার আক্ষেপ উৎপন্ন করে। অধিককাল স্থায়ী আক্ষেপের প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ অথবা অধিক মাত্রায় সেবনের সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। ইহাতে শোণিতবহা নাড়ীর স্থায়ী আক্ষেপ বশতঃ স্বায়ুকেন্দ্রের রক্তহীনতা জন্মিলে গতিদ ও অনুভূতিদ স্নায়ু সম্বন্ধীয় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়।”

ইহার ক্রিয়ায় শোণিত তরলতর এবং শিলা বা ভেইনস্ স্ফীত হয়; শরীর শীতল থাকে। পেশীনিচয় ঘুট বোধ হইলে ক্রমে তাহার উপশম হয়। শরীর চালনা করিলে দার্বাস্থ, বাম উজ্বার বৃহত্তর আস্থ ও বাম-কনুইয়ের আস্থপ্রবন্ধন (condyle) চুটকৎ বেদনা করে; এই বেদনা উপদংশ ঘটিত রোগের বেদনার হ্রায় হইলেও তাহার হ্রায় শয্যাতাপে ইহার বৃদ্ধি না হইয়া বরং উপশম হইয়া থাকে। সন্ধির আস্থ স্থানদ্রষ্ট হওয়ার হ্রায় বোধ হয়। রোগীর বেদবৃদ্ধি জন্মে। গতিদ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ায় পেশীর আনর্ডন, তাণ্ডুলক্ষণ এবং সর্কাজীম আক্ষেপ প্রভৃতি এবং অনুভূতিদ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ায় মেধমজ্জা ও তর্জিত স্নায়ুতে বেদনা এবং স্পর্শে নেক্রদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার কটিদেশাংশের বেদনা উৎপন্ন হয়।

বিরলকেশ এবং শিথিলত্বক ও পেশীযুক্ত বাক্তি এবং ঢুর্কল ও মস্তুর-গতির শোণিতসঞ্চালনবিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ। মস্ত-পায়াদিগের রোগে, বিশেষতঃ তাহাদিগের শিরঃশূন, এবং মস্ত-মাংসাদি সহযোগে আনোন্দের পরে যে অসুস্থতা জন্মে তাহাতেও স্থলবিশেষে ইহা উপকারী (লোবে, নাক্‌স্, বেণা)। ইহার রোগ একই সময়ে শরীরোদ্ভেদের বাম এবং শরীরাম্বুদদেশের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে।

লক্ষণ।

অন্ন ১—ওদাশ্য; প্রথমে উত্তর দিতে প্রবৃত্তিহীন। উপযুক্ত কথা স্বরণ হয় না, রোগী ভ্রান্ত কথা ব্যবহার করে; রজনীতে নিদ্রা না হইলে ও শ্রমে হাঁহর বৃদ্ধি হয়। প্রলাপে রোগী বাতুলের ছায় অবিরত ভুল কথা বলে; শয্যা হইতে পলায়নের চেষ্টা এবং অত্যন্ত বল প্রকাশ করে। অত্যন্ত বাকপ্রিয়তা জন্মে এবং মুখ ও গ্রীবাপেশীর আক্ষিপক গতি দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকায় মস্তক দক্ষিণ স্বক্ক পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়; রোগী আমোদজনক অসংলগ্ন কথা বলে; পরে শারীরিক অবসন্নতা জন্মে। রোগী বদমেজাজী, একগুঁয়ে, ছঃখিত, দুর্দান্ত ও অদমনীয়।

অস্তক ১—ললাটাস্থির উভয় পার্শ্ব হইতে নাসিকামূল পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা। জ্বর অথবা বেদনা হইলে রোগী সহজেই প্রলাপ বলে এবং মেরুদণ্ডের উত্তেজনা বশতঃ তাণ্ডবৎ লক্ষণ, পেশীর আনর্ডন অথবা পেশীর আক্ষেপ নিবন্ধন মুখের নানাবিধ ভঙ্গি হয় এবং শিরঃশূল থাকে।

স্নায়ু ১—সঙ্গমাস্তে ঢুর্কলতা। সম্পূর্ণ শরীরের কম্প। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে বাহুর সামান্য আক্ষেপ। শরীরের আক্ষিপক গতি, সামান্য অনৈচ্ছিক শরীর চালনা এবং একটি মাত্র পেশীর ঝাঁক হইতে সম্পূর্ণ শরীরের নৃত্যবৎ চালনা জন্মিয়া থাকে। চক্ষুপুট এবং চক্ষুগোলকের আনর্ডন; ঢুর্কলতা-প্রবৃত্ত জঙ্ঘা এবং হস্তের কম্প; মেরুদণ্ডে টাটানি; এই সকল লক্ষণ বিভ্রাৎবৃত্ত ঝটিকা নিকটবর্তী হইলে অধিকতর হয়। জাগ্রতাবস্থার অনৈচ্ছিক শরীর চালনা নিদ্রাবস্থায় নিবৃত্তি পায়। দস্তোদগম-জরের উত্তেজনায় পরে অজ্ঞানতা বশতঃ চক্ষু অর্দ্ধনির্মলিত থাকিলে তাহার স্ত্রাংশ দৃষ্ট হয়; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয় না কিন্তু অনেক সময়েই

প্রশ্বাস গভীর হইলে পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং অঙ্গের অত্যন্ত আক্ষেপিক আনন্দন হয়। হস্ত এবং পদের থলী ; সর্বাঙ্গীন আক্ষেপে বোধ যেন মেরুদণ্ডে গ্যালভানিক ব্যাটারি প্রয়োগ করা হইতেছে।

কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হস্ত এবং পদ প্রভৃতি নানাস্থানে জ্বালা, চুলকনা ও রক্তমাভা ; শরীরংশনিচয় লোহিতবর্ণ, শ্ফীত এবং তপ্ত। অহুভূতি জন্মে যেন ত্বকে বরফের সংস্পর্শ অথবা বরফের স্থায় শীতল সৃষ্টি এবং তপ্ত সৃষ্টি বিদ্ধ হইতেছে। ত্বকে কীটবিচরণের স্থায় বোধ।

মেরুদণ্ড ও মেরুদণ্ডজ্ঞান।—মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনায়ুক্ত, প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি। অপারমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত মেরুদণ্ডজ্ঞান উভেজনা। শরীরের প্রত্যেক চালনা এবং প্রত্যেক বার পার্শ্বপারিবর্তন মেরুদণ্ডের বেদনা উৎপন্ন করে। স্পর্শে মেরুদণ্ড বেদনায়ুক্ত। রোগী চলিতে স্থির থাকিতে পারে না, কোনরূপ বাধা পাইলেই হেঁচট থাইয়া পড়িয়া যায় ; দণ্ডায়মান হইলে গুল্ফে আঘাত লাগার স্থায় বেদনা। শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা।

চক্ষুঃ।—জ্বালা এবং চুলকনা। কণীনিকা বিস্তৃত। চক্ষুগুটির ও চক্ষুগোলকের আনন্দন। বাম চক্ষুগোলকে আক্ষেপ এবং কনকনানি। চক্ষুর শ্রম ব্যতীতই তাহাতে দুর্বলতা বোধ। আটা ও পীতবর্ণ পিচুটিতে চক্ষুকোণ জুড়িয়া থাকে। পাঠকালে, কোন বস্তুর দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুকোণে জ্বালা এবং চুলকনা ; সূচিবোধবৎ বেদনা ; কোয়াসার মধ্যে দেখার স্থায় ঘোর দৃষ্টি। নিকট দৃষ্টি। পাঠের সময় অক্ষর যেন সরিয়া যায় এবং চক্ষু চুলকায় ও জ্বালা করে। লিখিবার সময় কখন কখন চক্ষুসম্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃশ্যের দৃষ্টি। শিরোধ্বনি হইলে চক্ষুসম্মুখে উড্ডায়মান মক্ষিকাবৎ পদার্থের দৃষ্টি ; এবং কম্পমান ও বিবিধবর্ণের ছত্রাকার পদার্থের দৃষ্টি। চক্ষুসম্মুখে কাল কলঙ্ক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু অথবা কোয়াসার স্থায় দৃষ্টি।

চিকিৎসা।

প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম :- টাইফইড্ বা সন্নিপাত জ্বর-বিকারের প্রলাপাবস্থায় রোগী অবিরত শয্যাভ্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে এবং সম্পূর্ণ শরীরের কম্প থাকিলে, ডাং বেজ এগারিকাসের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। রোগীর বাকপ্রিয়তা জন্মে।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইন্ড্যাল ইরিটেশন :- এ রোগে মেরুদণ্ডে বরফ সংস্পর্শ হওয়ার স্থায় চন্‌চনি ও জ্বালা এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের, বিশেষতঃ চক্ষুপুটে পেশীর আনর্জন এগারিকাসের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। রোগী বোধ করে যেন শরীরে বরফের সূচি বিদ্ধ হইতেছে। মেরুমজ্জের স্নায়ু যে সকল শরীরস্থানে বিস্তৃত তাহাতে মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বেদনা প্রভৃতি, স্নায়ুলক্ষণে লিখিত, এই প্রকৃতির প্রায় সম্পূর্ণ লক্ষণই উপস্থিত হওয়ার তাহারা মেরুমজ্জার উত্তেজনা প্রকাশ করে। মেরুদণ্ডের বেদনা স্পর্শে এবং কটির স্নায়ুশূল লমণে বদ্ধিত।

তাণ্ডবরোগ বা ক্রিজিস :- এ রোগ চিকিৎসায় এগারিকাস্ অত্যন্ত ঔষধের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। চক্ষুগোলক এবং চক্ষুপুট প্রভৃতি শরীরের বহুতর স্থানে ইহা পেশী-আনর্জন উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার ক্রিয়ায় অঙ্গনিচয়ের তাণ্ডববৎ সঞ্চালনে অঙ্গ-সন্ধিস্থানে যে কোণের ন্যায় আকৃতি এবং অঙ্গাদির যে আক্ষেপিক গতি উপস্থিত হয় তাহা শরীরের এক পার্শ্বে সীমাবদ্ধ থাকে না; তাহাতে শরীরের এক পার্শ্বের উর্দ্ধার্দ্ধ এবং অপর পার্শ্বের নিম্নার্দ্ধ আক্রান্ত হয়। ট্যারেন্টুলার তাণ্ডবরোগ দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা আক্রমণ করে। এগারিকাসের তাণ্ডবরোগে

মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার কটিস্থ অংশ, চাপে বেদনায়ুক্ত থাকে ; অঙ্গাদি শীতল ও দুর্বল হয় এবং রোগী স্থির ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারে না ; রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগী শীর্ণ হইতে থাকে এবং তাহার মুখের ভাব জড়ত্ব বাঞ্জক হয় । বামপার্শ্বের তাণ্ডুরোগ সহ রসবাত ও পেশীশুলের সংস্রব থাকিলে অথবা জরায়ুর প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া রোগের কারণ হইলে সিমিসিসফুপা প্রযোজ্য ।

এপারিকাসের পেশী-আনর্জন নিদ্রাবস্থায় হওয়া সম্ভব হইলেও জাগ্রতাবস্থাতেই তাহার অতি কঠিন আক্রমণ হয় । ইহার রোগে মস্তক বিলক্ষণ বন্ধাধিকায়ুক্ত, কণীনিকা বিস্তৃত এবং মুখ শোণিতাভ-বিশিষ্ট থাকে এবং কথিত আছে প্ৰজনাদযুক্ত ঝটিকার সময় পেশীর আনর্জন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ডাং বাটলেট এ রোগে এপারিসিন (ক্রিয়াবাহু ২x) প্রয়োগের উপদেশ করিয়াছেন ; তাঁহার মতে এপারিকাস কাষ্যাতঃ ফলপ্রদ নহে । চক্ষু এবং চক্ষুপুটের আফে-পিক আনর্জন অনেক সময়েই এপারিকাস দ্বারা উপকার পাওয়া যায় । অন্ত্রাদন পূর্বে আমার নিকট একটা শিক্কার রোগী আসিয়াছিল । সে এ স্থানের কোন বন্ধু প্রতিষ্ঠা চিকিৎসকের চিকিৎসাদীনে সিন্ফুটা প্রভৃতি শিক্কার প্রচলিত ঔষধ সেবন করায় কিঞ্চিৎকাল করিয়া ভাল থাকিত । অবশেষে আমার চিকিৎসাদীনে আসায় মধো মধো তাহার ঘাড়ের ও বাহুর অল্প ঝাঁকিও দৃষ্ট হয় । শ্রমণ করিয়া আমি রোগ স্থানিক তাণ্ডব বনিয়া স্থির করিলাম । এপারিকাস ৩০ ব্যবস্থা করায় রোগী অচিরে স্থায়ী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ত্রুপরি পঁকুই বা শীতক্ষোটকের (chilblain) চায় চুলকনায়ুক্ত স্থান থাকিলে অথবা শিশুর মুখ জড়ত্ব বাঞ্জক হলে এপারিকাসের উপযোগতা অধিকতর নিশ্চয়াঙ্ক ।

এপারিকাস মুহু ও দেশব্যাপক (Epidemic) রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ ।

দস্তোদগমবিকারঃ ১—শিশুদিগের দস্তোদগমকালীন সহজ উত্তেজনা প্রবণতা, খিটখিটে ভাব এবং অস্থিরতা প্রভৃতি উপশম পক্ষে এগারিকাস্ $1 \times$ ও $2 \times$ বিশেষ উপকারী ঔষধ; চুলকনা ইহার অগ্রতম লক্ষণ ।

২ । বভিষ্টা (Bovista) ।

সম্বন্ধঃ ১—বভিষ্টার কার্য প্রতিষেধক—ক্যাফর ।

আমবাতে রাস প্রদর্শিত হইয়া নিষ্ফল হইলে বভিষ্টা প্রয়োজ্য ।

বভিষ্টা আল্‌কাতরার বাহ্য প্রয়োগের কুফল নষ্ট করে ।

ক্যাফর বভিষ্টাক্রিয়ার বিশ্ব্জালা উৎপন্ন করে ।

হাঁপের পরের রনবাতিক বেদনায় বভিষ্টা প্রয়োগের পর এলাম সুফল প্রদ ।

ভুলনীলা ঔষধঃ ১—এলো, কার্ক ভে, ক্যাঙ্কে কা, সিকু. ম্যাগ্নি কা, ম র্ক, ফস রাস্, পালম্, সিকেলি, ষ্ট্যাফি, মালফ, ভেবেট এ, আষ্টিলেগ ।

সাধারণ ক্রিষ্টাঃ ১—বভিষ্টা মাস্কমেরুমজ্জেষ শ্রায়ুশূল আক্রমণ করিলেও প্রধানতঃ ছক এবং স্ত্রীজননক্রিয়েত বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করে । ডাং এডেনের মতে ইহা দ্বাৰা শোণিত সঞ্চালনের বিকার সাধিত হওয়ায় রোগীর শোণিতস্রাব প্রবণতা জন্মে । ডাং কাউপার থোরেন্ট বলেন “সম্ভবতঃ কৈশিক শিরামগুলোর শিথিলতাই শোণিত স্রাবের কারণ ।

বৃদ্ধা ও কুমারীদিগের হৃৎকম্প এবং বালকদিগের ত্রোতলামরোগে ইহা উপযোগী ।

লক্ষণ ।

মনঃ ১—অগ্রমনস্কতা, কোন বিষয়ে মন নির্বিষ্ট করা কঠিন ।
কিস্তৃত কিমাকার ভাব, তজ্জগ্র হস্ত হইতে বস্ত্র স্থানিত হইয়া পড়িয়া

যায়। উদ্ভেজনা প্ররগতা, কিছুতেই সঙ্ঘটি হয় না। দুঃখিত, বদমেজাজ, সকল বিষয়েই ঘৃণা, পাঠকালে তোতলা কথা হয়।

স্রাস্থু—বাতজ খঞ্জতা। সর্কাদ্বীন অবসাদ, দ্বায়বিক বলক্ষয়, বিশেষতঃ সন্ধিতে এক্রুপ ঘটে। কশিয়া বস্ত্র পরিধানে অশক্ততা।

নাসিক্কা—প্রাতঃকালীন রক্তস্রাব; হাঁচিলে অথবা নাক ঝাড়িলে ফোটায় ফোটায় রক্ত পড়ে। মামড়িয়ুক্ত নাসারন্ধ্র।

শ্রাসস্বস্ত্র—হস্তের যে কোন শ্রমে শ্বাস শ্রমস্বাসের খর্বতা। বক্ষে কষ্ট হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ শিথিল করিতে চাহে। হাঁপরোগে মুখ লাল থাকে এবং আক্ষেপিক হাসি ও কার্না হয়।

উদর—কর্তনবৎ উদরশূলে শীত এবং দস্তের ঠক ঠক শব্দ ও অঙ্গের কম্পের অপরাহ্নে বৃদ্ধি। উজ্জল লোহিত মূত্র সহ উদরশূলের আহার করিলে উপশম। নাভির চতুর্পার্শ্বে কর্তনবৎ বেদনা।

স্রীজ্ঞননেক্রিস—ঋতুকালে ও তৎপূর্বে পুনঃ পুনঃ উদরাময়। ঋতু অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর। কেবলই প্রাতঃকালে অথবা কেবলই রক্তনীতে রক্তস্রোত নির্গত হইয়া থাকে; স্রী-অঙ্গাভিমুখে বেগ এবং কটি পশ্চাতে গুরুত্ব। ঋতুর বাবধান কালে মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব। ঋতুর কতিপয় দিবস পূর্বে ও পরে ভ্রমণ কালে ঈষৎ পীত, সবুজ এবং উগ্র ও অগুনালার স্রায় ষ্ঠেতপ্রদর।

স্রুক—প্রায় সম্পূর্ণ শরীরে আমবাতের উদ্ভেদ, তাহার কোন কোনটির বিস্তার প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ; আলকাতরার সংস্পর্শ বশতঃ আমবাত সহ উদরাময়। হস্তপৃষ্ঠের চুলকনা; উজ্জল লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মিলে কর্কশ, কাল্চে লোহিত ও সিক্ত স্থান থাকিয়া যায়।

চিকিৎসা।

উদরশূল বা কলিক।—আহারান্তে ও রোগী দ্বিভাঁজ হইলে বভিষ্টার উদরশূল উপশমিত হয় এবং তাহার সহিত লোহিত-বর্ণ মূত্র থাকে।

স্ত্রীজননেফ্রিয়ারোগ—রক্তপ্লাবিত্ব বা মেন-রেজিফ্রা।—বভিষ্টার প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর পর ঋতুস্রাব হয় এবং সামান্য শ্রমেই জরায়ু হইতে শোণিত স্রোত বহে। জরায়ুর শোণিত-স্রাবে সিকেলিন, স্যাবাইনা, ট্রিলিফ্রাম, আণ্ডিলেপ, মিলিফ্রলিফ্রাম, ফেরাম, ইন্ডিজিফ্রল এবং কার্ব-ভেজ-বভিষ্টা সহ তুলনায় এবং অধিকাংশ স্থলে ইহারাই রোগ নিবারণে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত। উভয় ঋতুস্রাবের ব্যবধানের ঠিক মধ্য সময়ে জরায়ুর বেদনা অথবা রক্তস্রাবে হেমায়েলিন্স উপকারী। প্রসবাস্তিক জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে সিকেলিনের অল্প প্রয়োগতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহা জরায়ুর অর্ধুদ বা টিউমাররোগে প্রয়োগোপযুক্ত।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ—নাসিকারক্তস্রাব বা এপিষ্ট্যাকসিস; জরায়ুরক্তস্রাব বা মেট্র-রেজিফ্রা।—সম্পূর্ণ কৈশিক শিরামণ্ডলীর শিথিলতা বশতঃ বভিষ্টার রক্তস্রাবের সংঘটন হয়। ইহা নাসিকা এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে। ঋতুর ব্যবধান কালে সামান্য শ্রমেই রক্তপূর্ণ জরায়ু হইতে রক্তের স্রোত বহে। ইহাতে “প্রধানতঃ অথবা কেবলই রজনীতে অথবা প্রত্যুষকালে রক্তস্রাব হওয়া” ডাং ফ্যারিংটনের মতে বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। শরীর বাহ্যের শোথ ভাব থাকে।

৭—ইহাতে আংশিক তরল ও আংশিক চাপ বাধা উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ঘটে। জরায়ুর পরীক্ষাকালে অঙ্গুলির স্পর্শেও রক্ত পড়ে। ঔষধের ৬ ক্রম উপকারী বলিয়া বিবেচিত।

থুয়াল্পিস বাসী প্যাষ্টরিস—ইহা দ্বারাও জরায়ুর রক্তস্রাবে উপকার হইয়াছে।

মিচেল্লা—মূত্ররুদ্ধ সহ জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব হইলে।

প্লাতিনাম্—বেদনাগীন কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; আলকাতরার পিণ্ডের ত্রায় আকারে কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ চাপ ও তরল রক্ত নির্গত হয়। ইহাতে শরীরায়তন বৃদ্ধির হওয়ার অনুভূতি জন্মিতে পারে।

আমবাত, শীত-পিত্ত বা আর্টিকেরিয়াঃ—আমবাত রোগকালে উদরানয় উপস্থিত থাকিলে ঐতিষ্ঠ্য উপকারী। মল-ত্যাগান্তে কৃষ্ণ ও জালা।

৩। আষ্টিলেগ (Astilago.)।

উপচয়ঃ—শরীর চালনায়। উপশম।—বিশ্রামে।

তুলনীয় ঔষধ। কলফা, সিঙ্ক, ফ্রকাস্, সাইক্লে, হেণামেল, ইথে, শ্রাবাই।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুগুণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া অষ্টিলেগ সাক্ষাৎ ভাবে শোণিত সঞ্চালন যন্ত্রগুণ্ডলে আক্রমণ করিলে ধমনী ও কৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর কালস্থায়ী সংকোচন, এবং শিরাকৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর প্রসারণ বশতঃ ধমনী-শোণিত-সঞ্চালনের বাধা, এবং শিরা-শোণিতাধিকা উৎপন্ন হয়। স্ত্রীজননেক্রিয়গুণ্ডলেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; ইহা জরায়ুর সংকোচন, শোণিত-স্রাব ও গর্ভপাত এবং স্ত্রীজননেক্রিয়নিচয়ের সজীবতার হানি উৎপন্ন করে। ইহা

পরিষ্কার, গোরান্দী, দীর্ঘচ্ছন্দ এবং এক হারা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধিকালীন রোগে বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুস্থে অবিশ্রান্ত কনকনানি। আর্ন্ত-বাধিক্য এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ুগ্রীবা ক্ষীত; তাহার স্পর্শে রক্তস্রাব। বিবদ্ধিত জরায়ুর ক্ষীত অথবা প্রশস্ত গ্রীবা হইতে অনেক দিন ধরিয়া কৃষ্ণ বর্ণ রক্ত সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তচাপ পড়ে। অত্যন্ত ঋতুস্রাব হইলে অণ্ডাধারের উত্তেজনা হয়। তাহাতে ঠেল মারা থাকিলে বোধ হয় যেন সকলই জননেন্দ্রিয় পথে বাহির হইয়া যাইবে। তীক্ষ্ণ বেদনা ক্ষীত বাম অণ্ডাধারে অধিক থাকে; বেদনা সবিরাম প্রকৃতির হয় এবং তাঁরবেগে পদ বাহিয়া দ্রুত তাহার নিম্নদিকে যায়। অণ্ডাধারে জালাময় বরণা। ঋতুস্রাব প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়, রক্তচাপ পড়ে। দুই ঋতুস্রাবের ব্যবধান কালে বামস্তনের নিম্নে এবং পঞ্জরাস্থিপার্শ্ব স্থানে অবিশ্রান্ত বরণার অনুভূতি।

চিকিৎসা।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—ঋতুসন্ধিবিকার; শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া; অর্কুদ বা টিউমার; জরায়ু রক্তস্রাব, অণ্ডাধারশূল এবং অণ্ডাধারের রক্তাধিক্যে।—ঋতুসন্ধিকালীন শোণিতস্রাবে আষ্টিলেগ ল্যাকে-সিসের প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ। শোণিতস্রাব কালে শিরো-দূর্ভান ইহার প্রদর্শক। ইহার পীত বর্ণ ও দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর সহ অণ্ডাধারশূল থাকে। জরায়ুর তন্তুময় অর্কুদ বা ফাই-লেইড্ টিউমার-রোগের শোণিতস্রাব নিবারণার্থ কিয়দ্দিবস আষ্টিলেগ ব্যবহারে অর্কুদ অন্তর্দান করিয়াছিল। প্রচুর ঋতুস্রাব এবং পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর থাকিলে বাম অণ্ডাধারের

স্নায়ুশূলরোগে আষ্টিলেগ উপকারী ঔষধ। অণ্ডা-
ধারের স্রু রক্তাধিক্যও অবস্থাবিশেষে ইহা আরোগ্য
করিয়া থাকে।

আষ্টিলেগ শোণিতস্রাবে, বিশেষতঃ জরায়ুর নানাপ্রকার
শোণিতস্রাবেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। সিকেলিনের রক্তস্রাব
হইতে ইহার রক্তস্রাবের প্রভেদ এই যে, ইহাতে স্রাব উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ,
কিয়দংশ তরল এবং কিয়দংশ চাপ চাপ থাকে। রক্তের উপরিউক্ত
প্রকৃতি থাকিলে ঋতুসঙ্কীর্ণকালীন এবং প্রসব কালীন বেদনা, গর্ভপাত
অথবা ঋতুকালীন ও প্রসবাণ্ডিক রক্তস্রাবে আষ্টিলেগ ফলপ্রদ
হয়। ফলতঃ এইরূপ রক্তস্রাব থাকিলে জরায়ুর অর্ধদ প্রভৃতি যে কোন
রোগসংস্রবে তাহা হউক না কেন আষ্টিলেগ তাহার ঔষধ বলিয়া
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। জরায়ুর স্রু শোণিতাধিক্য ইহার রক্তস্রাবের
কারণ, সিকেলিনের রক্তস্রাব রক্তের বিশিষ্টাবস্থা এবং জমাট বাঁধার
শক্তিস্থান প্রযুক্ত হয়। পরীক্ষা জন্ত জরায়ুমধ্যে অতি কোমলতার সহিত
হস্তাঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেও যদি রক্তস্রাব হয় তাহা আষ্টিলেগের
প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। জন্মান্তর পশ্চাদ্রক্রতা বা রিট্রো-
ভার্সান রক্তস্রাবের কারণ হইলে ইহা তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার
ক্রিয়ায় জরায়ুর সজীবতা ও শক্তি স্থাপিত হইলে পরীক্ষার্থ অঙ্গুলীস্পর্শে
জরায়ুর পূর্বতন অস্বাভাবিক কোমলতা এবং স্পঞ্জের গ্রায়্য ভাব অমুভূত
হয় না। জরায়ুর শোণিত সঞ্চালনের সুশৃঙ্খলা বশতঃ রক্তস্রাবের উপশম
হয়। ফুস্ফুসের স্রু রক্তস্রাবেও ইহা উপকার
করিয়াছে।

৪। সিকেলি কর্নুয়েটাম (Secale cornuatum.) ।

প্রতিদোষ।—আর্গট।

উপচয় ।—ঋতুশ্রাবকালে ; তাপে ; যে কোন শরীরাত্মে তাপ প্রয়োগ করিলে ।

উপশমন ।—শীতল বায়ুতে ; শৈত্য সংস্পর্শে ; আক্রান্ত শরীরাত্মে অনারত করিলে ; ঘর্ষণ করিলে ; ঘর্ম হইলে ।

সম্বন্ধ ।—সিকেলির কার্য্য-প্রতিষেধক—ক্যান্ধ, ওপি । সাংঘাতিক কলেরা রোগে সিকেলি কল্চিকামের তুল্য । সিকেলি আর্সেনিকের তুল্য, কিন্তু শৈত্য ও তাপের ক্রিয়া বিষয়ে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট । সিকেলির পরে সিংকনা সফলপ্রদ । সিনামমাই প্রসব বেদনা বন্ধিত করে, প্রচুর রক্তশ্রাব নিবারণ করে, এজ্ঞ সিকেলির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় ।

তুলনীয় ঔষধ ।—আর্স, বেল, কাম, কার্ক ভে, কলফা, কল্চি, লাইক, ফন্, প্লাথ, পাল্‌স্, রাস্, শ্রাবাই, সাল্‌ফ, টেবেক্, অষ্ট্লেগ, ভেরেট্ এ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—সিকেলি সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জের স্নায়ুগুলিতে আত প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করায় সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ ও পেশী আনর্ভন প্ৰভৃতি নানাবিধ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয় । স্নায়ুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ বিষক্রিয়া অথবা কৈশিক রক্তবহা নাড়ীর আক্ষেপিক সংকোচন বশতঃ কৈল্লিক রক্তহীনতা প্রযুক্ত উপরি উক্ত আক্ষেপাদি স্নায়বিক লক্ষণ জন্মিতে পারে । ফলতঃ আন্‌ট্রাইপ্‌ড্ বা আডাআড়ি ভাবে রেখাক্ষহীন ও চক্রাকারে বিচ্ছিন্ন পেশীশৃঙ্গে, বিশেষতঃ কৈশিক ধমনীর এবং জরায়ুর উপরি উক্ত রূপ পেশীশৃঙ্গে, আর্গট অর রাইর বিশেষ আক্ষেপিক সংকোচনক্রিয়া প্রকাশিত হয় । ইহার গৌণ ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লিষ্টতা উৎপন্ন হইলে রক্ত-কণিকা গলিতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় শোণিত তরলতর এবং কাল্‌চে বর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায় । ইউরোপ খণ্ডের, বিশেষতঃ জর্ম্মণি প্রদেশের কৃষকগণ রাই নামক শস্ত বিশেষের বহুল রূপে বপনাদি কৃষি কার্য্য করার তাহাদিগের মধ্যে

প্রায়শঃ ইহার অতি পরিষ্কৃত বিষক্রিয়ালক্ষণ বা “আর্গটিজম্” দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । অধিক পরিমাণ বিষের তরুণ ক্রিমার ফলস্বরূপ তাহাদিগের বিশেষ প্রকারের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হয় । ফলতঃ ইহার পুরাতন বিষলক্ষণই অতি পরিষ্কৃত রূপ ধারণ করে । তাহাতে মধ্যে মধ্যে রোগীর কন্ভালশন হয় এবং প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে পেশী আনর্ডন, ক্ষুদ্রাক্ষেপ ও নৃত্যরোগবৎ লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে । কৈশিক ধমনী মণ্ডলীর চক্রাকার পেশীর স্থায়ী সংকোচন বশতঃ শরীরংশ বিশেষে, বিশেষতঃ অঙ্গসাম্য শোণিতের অভাব বশতঃ পুষ্টিহানি ঘটিলে অথবা বিপ্লষ্ট ও পোষণক্রিয়া রক্ষায় অল্পপযুক্ত শোণিত দ্বারা পুষ্টি রক্ষা না হইলে কিম্বা উভয় কারণের সমবায় তাহাতে বিজাতীয় ক্ষত, অবশেষে টিসুধ্বংস বা গ্যাংগ্রিওন পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় । ইহা জরায়ুর চক্রাকারে ও তীর্থাক ভাবে সন্নিবিষ্ট আন্ট্রাইপুড পেশীস্থিত সংকোচন ক্রিয়া প্রকাশিত করিলে তাহাতে আক্ষেপিক বেদনাদি উপস্থিত হয় ।

ইহা একহারা, কঙ্কালবশিষ্ট, দুর্বল, উত্তেজনাপ্রবণ, পাণ্ডুর এবং রোগজীর্ণ ত্র্যলোকদিগের পক্ষে এবং অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ও ক্ষীণ বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী ।

লক্ষণ ।

অস্ত্রিক্রমঃ—বুদ্ধিহীন, নিদ্রানু অবস্থা । সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই অবসন্নতাবা । অস্পষ্ট কৈকানি । মূহু অথবা উন্মাদবৎ প্রলাপ । অত্যন্ত উৎকর্ষা এবং মৃত্যুভীতি ।

স্বাস্থ্যঃ—আক্ষেপিক পেশীআনর্ডন । সম্পূর্ণ শরীরের বিশৃঙ্খল চালনা । আক্ষেপে হস্তাঙ্গুলিনিচয় বহির্দিকে আকৃষ্ট ও বিস্তৃত । পক্ষাবাতযুক্ত অঙ্গে আক্ষেপিক ঝাঁকি ও চমক । আকৃষ্টক পেশীর বেদনায়ুক্ত সংকোচন । সম্পূর্ণ সজ্ঞানাবস্থায় ধলুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপ হইলে

অত্যন্ত বলহীনতা জন্মে। হঠাৎ অত্যধিক শক্তিলোপ ঘটে। ত্রৈচ্ছিক গতিশক্তির অভাব। রোগী বোধ করে ঘেন সে মকমলের গদির উপরে হাঁটিতেছে; মেরু মজ্জার নিয়ন্ত্রণের রোগ নিবন্ধন প্রথমে অনুভূতিদ পরে গতিদ স্নায়ুর পক্ষাঘাত হয়। রজনী ৩টার সময় শরীর দমিয়া যাওয়ার অথবা অবসন্ন হওয়ার ভাব।

ত্বগধঃদেশে কাঁটবিচরণবৎ অনুভূতি। দেহের সর্ব্বাংশেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হওয়ার ঞায় আনা।

চক্ষুঃ—চক্ষু কোটির প্রবিষ্ট এবং নীলবর্ণ রেখাবেষ্টিত। চক্ষু দেহিতে স্থির, প্রচণ্ড এবং কট মট দৃষ্টিযুক্ত। দৃষ্টিমালিন্য। কণীনিকা সাধারণতঃ বিস্তৃত। শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং কর্ণরব সহ কঠিন এবং কোমল মতিয়া বিন্দ্ জন্মে।

নাসিকাঃ—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মুখমণ্ডলঃ—পাণ্ডুর, বসিয়া যাওয়া, মুতের ঞায় এবং উৎকর্ষার ভাবযুক্ত। ওষ্ঠ ঈষৎ নীল অথবা মুতের ঞায় পাণ্ডুর। গিথ্যা হান্তভাবব্যঞ্জক।

পলমপ্র্যঃ—শুকতাযুক্ত। আনামাশয়ঃ—অতি ক্ষুধা। প্রচণ্ড, অতর্পণীয় তৃষ্ণা। হিক্কা। বিবমিষা। পিত্তময় বস্ত্র, শ্লেমা, ঘোর কটা ও কাফির গুঁড়ার বর্ণযুক্ত তরল পদার্থ এবং ভুক্ত বস্ত্র ও জলের বমন। রক্ত বমন। মল ও মলদ্বারঃ—সরলাত্র এবং মলদ্বারের পক্ষাঘাত। মলদ্বার সম্পূর্ণ ফাঁক। কটা ও ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলপাইর ঞায় সবুজ, অনৈচ্ছিক, অত্যন্ত শক্তি হানিকর এবং দূষিত উদরাময়ে বারম্বার মলত্যাগ হয়। অত্র হইতে রক্তস্রাব। কোষ্ঠবদ্ধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—ঋতুস্রাব অতি প্রচুর এবং অধিক কাল স্থায়ী। জরায়ু হইতে কাল, তরল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ রক্তস্রাবের সামান্য শরীর চালনায় বৃদ্ধি। জরায়ুতে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা। জরায়ুর ভয়ানক

বিশৃঙ্খল সংকোচন। জরায়ু এবং দক্ষিণ অণ্ডাধার রক্তাধিক্যযুক্ত এবং স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট। জরায়ু এবং অণ্ডাধারে বেদনা। অধিকাংশ সময়ে তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম। গর্ভস্রাবান্তে জরায়ুর সংকোচন হয় না এবং পাতলা, কাল ও দুর্গন্ধ স্রাব হয়। যোনির শৈথিল্যে বিল্লিতে প্লেটের স্রাব কৃষ্ণবর্ণ পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিগ। প্রসবাস্তিক স্রাবের রোধ হওয়ার জর ও জরায়ুর প্রদাহ। স্তনের রোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

১। গাত্র স্পর্শে অত্যন্ত শীতল বোধ হইলেও গাত্রাবরণ সহ্য করিতে পারে না (আর্সের বিপরীত)।

২। অসাড়তা, কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং পক্ষাঘাত ; শরীরের সর্ব্বাংশেই ইন্দুর বিচরণের ন্যায় অনুভূতি ! সর্ব্বাঙ্গই জ্বালা করে এবং বোধ হয় যেন তাহাতে অগ্নিশ্ফুলিঙ্গ পতিত হইতেছে।

চিকিৎসা।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইনেল ইরিটেশন।—
পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাকেকৃ ; সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্-
ভাল্শন ; মৃগী রোগ বা এপিলেপ্সি ; কশেরুকামজ্জের
ক্ষয় বা লোকোমোটর এটাক্সিস ; পক্ষাঘাত বা প্যারা-
লিসিস্।—সিন্কেলিনট্রিন্সালস্ যে, মেরুমজ্জের উত্তেজনা
উৎপন্ন হয় আমরা ইতিপূর্বে তৎবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। ফলতঃ
এই উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ও ক্রমবৃদ্ধি
মেরুমজ্জের ক্ষয়বশতঃ উপরিউক্ত বিবিধ প্রকার রোগলক্ষণ অথবা

রোগ উৎপন্ন হয়। মেরুমজ্জের উত্তেজনার মেরুমজ্জের, বিশেষতঃ কটিঅংশে, অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা হয় এবং হঠাৎ “কট” করিয়া উঠে।

সিকেলির সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ বা কন্-ভালশনে কখন শরীর কঠিন অথবা অনমনীয় হইয়া উঠে, কখন বা শরীরের কাঠিঞ্জ এবং শিথিলতা পর্যায়ক্রমে হইতে পারে; উপরিউক্ত অবস্থা হস্তাঙ্গুলিতেই অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে। হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হয় অথবা হস্তাঙ্গুলিপরিম্পরা প্রসারিত হইয়া অত্যন্ত ফাঁক হইয়া যায়। মুখমণ্ডলপেশীর আনর্জন হইতে থাকে। পেশী-আনর্জন মুখে আরম্ভ হইয়া সর্কশরীরে বিস্তৃত হয়। উদরের পেশীর সংকোচনবশতঃ উদর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে। মূত্রস্থলীগ্রীবীর সংকোচন হওয়ায় মূত্ররোধ ঘটে। বমনের বিলক্ষণ বেগ হয় কিন্তু অধিক বমন হয় না। আনাশয়ের প্রচণ্ড সংকোচন।

সিকেলির মূত্ররোধের আক্ষেপ হঠাৎ আরম্ভ হইয়া অতি ত্বরিত গতিতে আবর্তন করিতে থাকে। তাহাতে অতি শীঘ্র রোগীর শক্তির ক্ষয় ও মেরুমজ্জের স্নায়ুর পক্ষাঘাত ঘটে।

আর্গট অব রাইর বিষক্রিয়ালক্ষণে লোকোমোটার এডাক্সিরোধের অতি স্পষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগের প্রধান তিন লক্ষণ “১। জানু সন্ধিতে বাঁকির অভাব; ২। বেদনাকালে অঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ার ছায় জালা; ৩। অনৈচ্ছিক অঙ্গচালনা” প্রভৃতি ইহার বিবলক্ষণেও উপস্থিত হইয়া থাকে।

সিকেলিরোগী টলিতে টলিতে চলে অথবা হস্তপদের লঘুতা না থাকায় সে চলিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়। নিম্নাঙ্গ সংকুচিত থাকায় রোগী চলিতে টলে। গতিক্রিয়া রোগীর আয়ত্তাধীন থাকে না। অঙ্গের কম্প হয়, কখন বা কম্পসহ বেদনাও থাকে। হস্তপদে কীটবিচরণবৎ

অনুভূতি জন্মে । অঙ্গসীমায় অসাড়তা হয় । শরীরে অত্যধিক তাপের অনুভূতি হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ রাখিতে চাহে না । উপরিউক্ত লক্ষণ-নিচয় সর্কীসীণ ক্ষয়রোগেও দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে সিকেলিন মেরুমজ্জার শীর্ণতা নিবারণ দ্বারা রোগ আরোগ্যক্ষম হয় ।

উপরে আমরা মেরুমজ্জের উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে সকল লক্ষণ বিবৃত করিলাম, মেরুমজ্জার সম্পূর্ণ ক্ষয়ে তাহারা পক্ষাঘাতে, বিশেষতঃ মূত্রস্থানী এবং সরলান্ত্রের পক্ষাঘাতে, পর্যাবসিত হয় ; এই অবস্থায় শরীরের শীর্ণতা (Tabse) ঘটে এবং তাহার স্থানবিশেষে পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ উপস্থিত হয় ।

কলেরা বা ওলাউঠা রোগ ;—কলেরা রোগের পতন বা কোল্যাপ্স অবস্থায় সিকেলিনের প্রয়োগতা উপস্থিত হয় । রোগীর শারীরিক শীতলতা থাকিলেও শৈত্যব্যবহারে অদম্য ইচ্ছা জন্মে এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি পায় ; আর্সেনিকরোগীর তাপ উপশমপ্রদ । শিশু-কলেরায় রোগী জলবৎ, প্রচুর, দুর্গন্ধ এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্তুযুক্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ; প্রভূত পরিমাণ মল ফিন্কি দিয়া বা সরু ধারে বেগে নির্গত হয় ; স্বক্ সঙ্কুচিত, শুষ্ক এবং শীতল থাকে ; রোগীর নাড়ী থাকে না, গাত্র শীতল হয়, কিন্তু সে গাত্রবস্ত্র রাখিতে চাহে না ; আক্ষেপিক পেশীঅানর্জন, হস্তাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁক হইয়া যাওয়া, চক্ষুর কোটরপ্রবেশ এবং মুখাকৃতির বস ও সঙ্কুচিতভাবে প্রভৃতি এ রোগে সিকেলিনের প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য ।

স্ত্রীজননেদ্রিস্ররোগ—জরায়ুর শোণিতস্রাব বা ইউটেরাইন হিমরেজ ; শ্বেতপ্রদর বা ক্লোরিয়া ;—জরায়ুর শোণিতস্রাবের ঔষধনিচয়মধ্যে সিকেলিন স্কপুল্লেটাম শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত । ইহার বেদনাহীন, কৃষ্ণবর্ণ,

তরল রক্তের মূহ (passive) শ্রাব শরীর চালনায় বর্ধিত হয় ; কিন্তু রোগিণী পূর্বকথিতরূপ সমুচিতত্বক ও শীর্ণকায় হইলে এবং সহজে শীতল হইয়া যাইলে ও ত্বকে কীটবিচরণবৎ অমুভূতি থাকিলে ইহার অধিকতর উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

উপরিউক্ত শরীরাকৃতি এবং ধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রজাধিক্য ও জরায়ুদ্রংশরোগ থাকিলে যদি কটাসে, দুর্গন্ধ এবং রক্তশ্রাবযুক্ত শ্বেতপ্রদর জন্মে তাহাতে সিকেলি উপকারী ।

আর্সেনিক—দুর্বল এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের দুর্বলতাজনক পুরাতন শ্বেত প্রদর রোগের শ্রাব উগ্র, হাজাকর এবং পীতবর্ণ থাকিলে আর্সেনিক উপযোগী । কর্কট বা ক্যানসার প্রভৃতি রোগ জন্ম বলাপহারক শ্বেতপ্রদর ।

ডিষ্টেন্সাস—ইহা লুকরিয়া রোগের হানিম্যানবাবহৃত অগ্রতম ঔষধ । ইহার আঠা ও শ্লেষ্মায়ুক্ত শ্রাব স্ত্রীঅঙ্গে বেদনায়ুক্ত ক্ষত এবং মলদ্বারে চুলকনা উৎপন্ন করে ।

গর্ভাবস্থার ও প্রসবান্তিক বিকার—গর্ভপাত বা মিস্ক্যারেজ ; প্রসব বেদনা বা লেবর ; ভ্রাবন্ধ জরায়ুকুসুম বা রিটেণ্ড প্ল্যাসেন্টা ;—ক্ষীণ এবং রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার প্রথমার্শে গর্ভশ্রাবের উপক্রম হইলে সিকেলি দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে । জরায়ুপেশীর অত্যধিক বৃদ্ধিজন্ম গর্ভের শেষাবস্থায় গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা তাহার বাধা জন্মাইতে সক্ষম । শীঘ্র শীঘ্র প্রসব বেদনার আক্রমণ, প্রভূত পরিমাণ কাল ও তরল রক্তশ্রাব, রোগিণীর ফেকাসে ও বসিয়া যাওয়া মুখশ্রী, অঙ্গসীমায় চনচনি ও কীটবিচরণবৎ অমুভূতি এবং বায়ুর আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এ স্থলে সিকেলির প্রদর্শক ।

হর্সেল, রক্তহীন ও রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের অতি ক্ষীণ প্রসবে-
বেদনাবশতঃ অথবা তাহার অভাবে প্রসবের
বাধা জন্মিলে সিকেলি প্রসবের সাহায্য করিয়া থাকে ।
ইহাদিগের জরায়ু অত্যন্ত শিথিল, থসথসে ও শৈথিল্যে ঝিল্লিৎ পাতলা
প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেক বেদনাকালে মুচ্ছার ভাব ও নাড়ীর
হর্সেলতা বা লোপ ঘটে ।

জরায়ুর আউয়ার গ্লাস্ কন্ট্রাকশন (Hourglass contraction,
ডামরিক সংকোচন) বশতঃ জরায়ু-কুসুম নির্গমনের বাধা জন্মিলে
সংকোচন প্রকৃতিস্থ করিয়া সিকেলি দুর্নির্গমনের সাহায্য করে ।

রক্তস্রাব বা হিমরৈজঃ—রোগজীর্ণ, শির্ণ এবং সংক্ৰান্ত-
ত্বক বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু অথবা যে কোন শরীরগহ্বর হইতে
রক্তস্রাব, পাতলা ও হৃৎক শোণিতের মুছ স্রাব হইলে সিকেলি তাহার
ঔষধ । ইহাদিগের অঙ্গ চন্ চন্ করে, তাহাতে কীটবিচরণৎ অল্পভূতি
থাকে এবং গাত্র শীতল থাকিলেও ইহারা গাত্রাবরণ মোচন করিতে
চাহে । রক্তস্রাব, পাতলা শোণিত অনবরত চুয়াইয়া পড়ে ।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়াঃ—সিকেলির পুরাতন
বিষক্রিয়ায় ক্রমবদ্ধিষ্ণু রক্তহীনতা জন্মে । ইহার বিশেষ প্রকারের
রোগজীর্ণ অবস্থায় রক্তহীনতা, পাণ্ডুরতা এবং শরীরে ছাবার ছায় বর্ণ
দৃষ্ট হয় । সিকেলির রক্তকণিকার অবস্থা নিবন্ধন বিপ্লষ্ট ও গলিত
রোগীর রক্তহীনতায় শরীরাংশবিশেষের মৃত্যু বা প্যাথপ্রিণ হইতে
পারে এবং সম্পূর্ণ শারীরিক জীবনীশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ।

ক্ষত বা আলসারঃ—সিকেলির আণায়ুক্ত ক্ষত
শৈত্যে এবং আর্সের তাপে উপশমিত হয় ।

লেক্চার ৭৬ (LECTURE LXXVI.)

বার্বেরিডেসি শ্রেণীর ঔষধ।

১। বার্বেরিস্। ২। কলফাইলাম।

৩। পডফাইলাম।

১। বার্বেরিস ভল্লারিস (Berberis vulgaris)

সম্বন্ধ ।—বার্বেরিস্ যাহার কাষ্যপ্রতিষেধক—একন। বার্বেরিসের কাষ্যপ্রতিষেধক—কাম্ফর।

ভুলনীয়া ঔষধ ।—এলো, আর্স, ব্রায়, ক্যাপ্‌সি, চেলিড, সিমিসি, সিক, ক্রিমাট, ডাইয়ঙ্ক, আইরিস্, নাক্স ভ, পাল্‌স্, পড, সিলিক, জিক্‌।

সাধারণ ক্রিয়া ।—বার্বেরিস্ গ্রীষ্ম ঋতুতে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার সাফাৎ ফলস্বরূপ কৈশিক শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ হইলে কিড্‌নি বা বৃক্ক ও মূত্রস্থলী, পরে যকৃৎ এবং অবশেষে ইহাদিগের ও অন্যান্য শরীরান্তের শৈল্পিক বিল্লি এবং পেশীমণ্ডলী বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নলিখিত রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয়। কিড্‌নিপ্রদেশে বেদনার উৎপত্তি ইহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ; ইহা পিত্তপ্রাবের বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ ।

চক্ষু ।—চক্ষুতে জ্বালাযুক্ত বেদনা, রক্তমা এবং শুষ্কতা; চক্ষু কামড়াইয়া উঠে।

উদর ।—পিত্তকোষস্থানে ভয়ঙ্কর খোঁচানি এবং চাপযুক্ত বেদনা। উদরের বাম পার্শ্বে খোঁচানি বেদনা হইলে প্রায়শঃ

কটিদেশ, অথবা কুচকি, যক্ষ্ম, গ্ৰীহা, কিম্বা আমাশয় পর্য্যন্ত, বিস্তৃত হয়। গভীর দেশে খোঁচানি অথবা ছিন্নবৎ বেদনা হইলে মেকদণ্ডের নিকটস্থ কটির অস্থি অথবা ইলিয়াম হইতে তির্য্যকভাবে অভ্যন্তরান্তিমুখে তৃকাশ্চি বা সেক্রাম্ পর্য্যন্ত যায়। বাম কটিদেশে স্থচিবেধবৎ বেদনা হইলে কটি বাহিয়া যাইয়া অধাভিমুখে তীরবেগে বহির্দিকে স্ত্রীমূত্রনলী-পার্শ্বে যায়।

মল ও মলদ্বার ।—ছাগলের নাতির অন্তর্ভূতি কঠিন ও অত্যন্ত বিষ্ঠা। জলবৎ উদরাময়। মলদ্বারের চতুর্পার্শ্বে স্থানে ক্ষত থাকার হ্রায় প্রচণ্ড জালাযুক্ত বেদনা। অর্শ থাকিলে মলত্যাগের পূর্বে, সময়ে ও পরে জালাযুক্ত বেদনা।

মূত্রশস্ত্র ।—অগ্রতর কিড্‌নিতে খোঁচা ও খননের অন্তর্ভূতি এবং ছিন্ন করার হ্রায় অথবা দপদপানি বেদনা। মূত্রস্থলীতে জালাকর বেদনা। কিড্‌নি হইতে মূত্রস্থলী ও মূত্রপথ (urethra) পর্য্যন্ত প্রচণ্ড খোঁচানি ও কর্তনবৎ বেদনা। মূত্রত্যাগকালে ও পরে মূত্রপথে কর্তনবৎ বেদনা এবং জালা। মূত্রত্যাগান্তে কিঞ্চৎ মূত্র থাকিয়া যাওয়ার অন্তর্ভূতি। স্ত্রীমূত্রপথের স্থচিবেধবৎ বেদনা মূত্রস্থলীতে আরম্ভ। মূত্রত্যাগ করিতে কোমর ও হিপসন্ধিস্থানে বেদনা। ফেকাসে ও হরিদ্রাবর্ণ মূত্রে ঈষৎ স্বচ্ছ জিউলির আঠার হ্রায় তলানি, তলানি-হীন অথবা ঘোলা, স্তরে স্তরে সংলগ্ন, কর্দমবৎ, প্রচুর, শ্লেষ্মাময় তলানিযুক্ত মূত্র, অথবা মূত্রে সাদাটে ধূসর এবং কিছুকাল পরে ঈষৎ লাল ময়দার হ্রায় তলানি। মূত্র উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ; রক্তের হ্রায় লোহিত এবং প্রচুর শ্লেষ্মাময় তলানিযুক্ত মূত্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—যোনিতে জালা এবং টাটানি বেদনা ও তাহা স্পর্শে বেদনাযুক্ত। অত্যন্ত ঋতুস্রাবে বেদনা থাকে এবং তাহা শ্লেষ্মা অথবা রক্তসংযুক্ত হয়।

পৃষ্ঠ ১—অধঃ পৃষ্ঠে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, কাঠিগ্র এবং খঞ্জতা জন্মে ; রোগী আসন হইতে কষ্টে উখিত হয় । উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার বৃদ্ধি ।

অক্ষ ১—দক্ষিণ স্কন্ধের বাতজ, অবশ্যকর বেদনাকালে বাম অক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা । নিম্নাঙ্গে ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ অথবা দপদপানি কিম্বা ঘৃষ্টবৎ বেদনা ।

চিকিৎসা ।

হৃৎরোগ—পিত্তশিলা ১—দক্ষিণ পার্শ্বের উপসর্গকার কিনারা হইতে বিশেষ প্রকারের বিদ্ধ করার দ্বায় বেদনা তীরবেগে উদর-মধ্যে যাইলে পিত্তশিলা বা গলষ্টোনরোগে **বার্বেরিস্** উপযোগী । রোগসহ পূর্ককথিত কিডলি ও মূত্রপথের বেদনা এবং মূত্রত্যাগে জালা ও মূত্রের তলানি প্রভৃতি থাকা **বার্বেরিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক ।

ভগন্দর বা ফিষ্টুলা ইন্ এনো ১—পুনঃ পুনঃ অথবা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছাসহ মলত্যাগে মলদ্বার চতুর্পার্শ্বে ক্ষত থাকার দ্বায় প্রচণ্ড জালা হইলে ভগন্দর রোগে **বার্বেরিস্** দ্বারা উপকার হইতে পারে ।

মূত্রবন্ত্ররোগ—মূত্রবন্ধু ও মূত্রশিলা অথবা **ইউরিনারি গ্রেভেল ও ষ্টোন** ১—মূত্রবন্ত্রলক্ষণ ব্যতীত অল্প কোন যন্ত্রের রোগে **বার্বেরিসের** প্রয়োগ অতীব বিরল বলিয়াই অনুমিত হয় । ফলতঃ অল্প কোন রোগেও উপসর্গরূপে মূত্রবন্ত্র-রোগলক্ষণের বর্তমানতাই প্রায় স্থলেই **বার্বেরিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । ইহার উপরিউক্ত মূত্রবন্ত্ররোগে পৃষ্ঠে এবং কিডনির গভীরদেশে স্পষ্ট কনকনানি ও কঠিন ছিন্নবৎ

বেদনা হইলে পৃষ্ঠ এবং মূত্রনালী বা যুরেটার বাহিয়া নিম্নাভিমুখে মূত্রস্থলীতে যায় এবং মূত্রস্থলীতেই আবদ্ধ না থাকিয়া তথা হইতে কর্তনবৎ বেদনা বিস্তৃত হইয়া মূত্রপথ বা যুরিথাতে উপস্থিত হয়। পৃষ্ঠ হইতে মূত্রনালীবাহিত বেদনা অতি প্রচণ্ড হইয়া থাকে এবং রোগী নত হইলে ও শয়ন অথবা উপবেশন করিলে তাহার বৃদ্ধি এবং দণ্ডায়মান হইলে উপশম হয়। বেদনা প্রযুক্ত মূত্রস্থলীতে মূত্রবেগ হওয়ায় রোগী অনবরত মূত্রত্যাগ করে, কিন্তু তথাপি মূত্রস্থলী সম্পূর্ণ খালি বোধ হয় না। মূত্রস্থলী কনকন করে। মূত্র ঈষৎ লোহিতবর্ণ থাকে এবং তাছাতে শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মিক ঝিল্লির উপত্যক বা এপিথ্যালিয়াম এবং লিখেট সণ্টের ঈষৎ লাল তলানি পড়ে। শ্যার্লো ল্যাভার মূত্র অপেক্ষা ইহার মূত্র অধিকতর ক্ষেদযুক্ত। মূত্রত্যাগকালে হিম্পস্ক্রিপ্রেদেশে বেদনা হওয়াও বাবে'রিসের একটি বিশেষ লক্ষণ। কক্লাস্ ক্যান্টাইর কতিপয় লক্ষণ, বিশেষতঃ কিড্‌নি প্রদেশ হইতে বিস্তৃত ছিন্নবৎ বেদনা, বারম্বার মূত্রবেগ, মূত্রে যূরিক এসিডের তলানি এবং কৃষ্ণবর্ণ মূত্র প্রভৃতি বাবে'রিস-লক্ষণসহ তুলনীয়। জননেঞ্জিয়রোগের ও মূত্রযন্ত্ররোগের অনেক ঔষধের লক্ষণ পরস্পর অতীব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রকাশ করায় অতি যত্ন পূর্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরূপণ করা আবশ্যিক। বাবে'রিসের পৃষ্ঠবেদনা যেন অত্যাশ্রিত ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর এবং কিড্‌নির গভীরতর দেশ আক্রমণ করে বলিয়া অনুমিত হয়। যান্ত্রিক নির্জীবতা বা "এটনি" ইহার রোগের কারণ।

লিথিমিয়া বা মূত্রেণুরোগ (Lithæmia)—অনেকানেক মূত্রেণু রোগগ্রস্ত রোগীর মূত্রাকৃতি বাবে'রিসের মূত্রতুল্য হইলেও পূর্ববর্ণিত কর্তন এবং ছিন্নবৎ ও বিশেষতায়ুক্ত পৃষ্ঠবেদনা বর্তমান না থাকিলে ইহা কদাচিৎ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বেদনা কিড্‌নি প্রদেশে

জন্মে এবং তথা হইতে ক্ষুত্রনলী বাহিয়া মূত্রস্থলী অথবা বস্তিকোটর এবং ত্রিপসন্ধিতে বিস্তৃত হয় । ইহাতে মূত্র তপ্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ অথবা উজ্জ্বল পীত কিম্বা শোণিতের বর্ণাবিশিষ্ট থাকে এবং তাহাতে শুভ্র, স্ফৈয়ং ধূসর-বর্ণ, অথবা উজ্জ্বল লোহিত ময়দার ঞায় তলানি, কিম্বা লোহিতবর্ণ রেণু বা স্ফৈয়ং পীত-লোহিত দানা পড়ে ।

পেরিটনাইটিস্ বা অন্ত্রবেষ্টবিম্বি প্রদাহঃ ; অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্ ; জন্মায়ুপ্রদাহ বা মেট্রাইটিস্ ; শ্লেত প্রদরঃ—ডিজিট্যালিসের আদি ও বিশেষ ক্রিয়া ছৎপিণ্ড প্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্রমণ্ডলে হওয়ায় তৎকলস্বরূপ অথবা তৎসংসৃষ্ট কতিপয় রোগে ডিজিট্যালিস্ প্রযুক্ত হইয়া উপকার করিয়া থাকে । বার্বেরিসেরও মৌলিক আক্রমণ কিড্‌নি এবং মূত্রস্থলীতে হওয়ায় ইহা তৎসংসৃষ্ট উপরি উক্ত রোগনিচয় আরোগ্য করিতে সক্ষম । ছৎপিণ্ড প্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্ররোগের বিশেষ লক্ষণ যেরূপ ডিজিট্যালিস্ চিকিৎসা রোগের প্রদর্শক, বার্বেরিস্ চিকিৎসা রোগে তদ্রূপ মূত্রযন্ত্রের বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শক হইয়া থাকে ।

স্ফোটিক বা বইল্‌স্—বার্বেরিসের ক্রিয়ায় স্ফোটিকে স্বপ্রিত পূয় উৎপন্ন হওয়ায় তাহা সত্বর আরোগ্য হয় । ইহাতে স্ফোটকের পুনরাবর্তন হয় না ।

সাল্‌ফারঃ—ইহা গণ্ডমালাদোষগুক্ত রোগীর স্ফোটকের ঔষধ ।

ফাইটল্যাঙ্কা—স্ফোটকের অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রশংসিত ।

লাইকম্পোডিয়াম—ডাঃ আইভ্যানসের মতে বেল, আর্শিকা ও লাইকা স্ফোটকের প্রধান ঔষধ ।

এস্কুসিনিয়াম—ডাঃ ক্লার্কের মতে ইহা ধারাবাহিক স্ফোটক উৎপত্তি নিবারণের ঔষধ ।

২। কলফাইলাম থ্যালিকট্রাইডিস ।

(*Caulopyllum Thalictroides*) ।

ভুলনীর তম্বু :—এটি ঠাণ্ডা স্পাই, সিমিসি, পাল্‌স্‌, স্যাঁবাডি, সিকেলি ।

সাপ্রারণত্রিহ্না :—কলফাইলাম স্ত্রীজনেনক্রিয়ের পেশী-উপাদানে, বিশেষতঃ তাহার গতিদ স্নায়ুতে, এবং তদ্ব্যতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী এবং সন্ধিতে ক্রিয়া প্রকাশ করে । ইহা স্ত্রীলোকদিগের রোগেই বিশেষ উপযোগী ।

লক্ষণ ।

স্রাবু :—যৌবনকালীন তাণ্ডব রোগ । স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থার ঋতুস্রাব-সম্বন্ধীয় অনিয়ম বাটলে গুল্মবায়ু অথবা মূগীর ত্রায় আক্ষেপ হয় । প্রসবের পর জরায়ুর রক্তাধিক্য এবং পশ্চাৎপার্শ্বে স্থলন বা রিট্রভার্সন নিবন্ধন শরীরনিয়ন্ত্রকের অর্দ্ধাঙ্গ হইলে তাহাতে আংশিক অসাড়তা জন্মে, এবং রোগীর শীর্ণতা, রক্তহীনতা ও সর্বস্বাঙ্গীণ দুর্বলতা, উৎপন্ন হয় ।

স্ত্রীজনেনক্রিয় :—বোধ হয় যেন জরায়ুতে রক্তাধিক্য জন্মিয়াছে, তন্নিবন্ধন আমাশয়নিয়ম উদরপ্রদেশে পূর্ণতা এবং আততভাব থাকে । জরায়ু এবং আমাশয়ের নিম্নপ্রদেশের নানা অংশে আক্ষেপিক বেদনা হয় । জরায়ুর পশ্চাৎপার্শ্বে স্থলন বা রিট্রভার্সন হইলে ঋতুকালীন উদরশূল জন্মে । ঋতুস্রাবের রোধ হইলে জরায়ুর আক্ষেপ অথবা নিজ্জীবিতা জন্মে । গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকের বাধক বা রক্তকচ্ছ, থাকিলে আক্ষেপ এবং যোনিতে উপক্ষত হয় । আশঙ্কিত গর্ভশাতে জরায়ুতে মূত্র, অনিয়মিত এবং আক্ষেপিক বেদনা জন্মে । অসম্পূর্ণ ও আক্ষেপিক প্রসববেদনা

সর্বদিকেই ছুটিয়া যায়, কিন্তু নিম্নাভিমুখীন চাপ হয় না। জরায়ুগ্রীবাবার আক্ষেপিক কাঠিন্যবশতঃ অসম্পূর্ণ প্রসববেদনায় সামান্যচিমটান প্রকৃতির বেদনা হয়। গর্ভস্রাবের পরে অথবা স্মৃতিকাবস্থায় মৃদু শোণিতস্রাব হইতে থাকে। জরায়ুর নিজ্জীবিতাবশতঃ প্রসবাস্তিক স্রাব অধিক-কালস্থায়ী হয়। জরায়ুর সবিরাম সঙ্কোচন। দুর্বল ও প্রলম্বিত প্রসব বেদনার পর ভাদালির ব্যথা। গর্ভস্রাব অথবা প্রসবের পর জরায়ুর স্বাভাবিক পূর্নাবস্থা হয় না।

অঙ্কুঃ ১—মণিবন্ধে এবং অঙ্গুলিসন্ধিতে কঠিন বেদনা। অঙ্গুলি-নিচয় অত্যন্ত অনমা থাকে, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে অঙ্গুলিসন্ধিতে কর্ভনবৎ বেদনা জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। বাহু এবং জঙ্ঘায় অবিশ্রান্ত ভাবের চঞ্চল বেদনা, কতিপয় মুহূর্ত্তে মাত্র কোন এক স্থানে স্থির থাকে। বাহু, জঙ্ঘা, হস্ত এবং পদের সন্ধিতে আকুষ্টবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

আমরা স্থানান্তরে অত্রাণ ঔষধ উপলক্ষে কলফাইলামের রোগসম্বন্ধে বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া তৎবিষয়ের অবশিষ্টাংশের উল্লেখ করিলাম। অত্রাণ ঔষধ সম্বন্ধেও আমরা অনেকাংশে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি এবং করিব।

রক্তকৃচ্ছ, বাধক বা ডিসমেনরিয়া ১—কলফাইলামের আক্ষেপিক রক্তকৃচ্ছ বা বাধকে ঠেলমারা প্রকৃতির বেদনা হয়। প্রসববেদনার প্রথমাবস্থার ছায় ইহা জরায়ুর অবিশ্রান্ত আক্ষেপ উৎপন্ন করে; ঋতুর স্রাবের পরিমাণ প্রায়শঃ স্বাভাবিক থাকে। কলফাইলামের সবিরাম আক্ষেপিক বেদনা কুচকিতে, তল্লিকটস্থ স্থানে অথবা বক্ষে এবং সময়ে অঙ্গনিচয়ে যায়। উভয় ঋতুস্রাবের ব্যবধানকালে প্রদত্ত হইলে ইহা উপরিউক্ত আক্ষেপিক বেদনার

উপকার করিয়া থাকে । রজঃকৃচ্ছ্র নিবন্ধন জ্বরায়ুরোগে শরীরের নানা-
দিকে বেদনা তীব্রবেগে ছুটিয়া যায় ।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা—ইহাও জ্বরায়ু-আক্ষেপের
অন্ততম ঔষধ ।

অস্ত্রঙ্গসত্তাবস্থার বিকারঃ—গর্ভাবস্থায় কষ্টদায়ক ও
বিরক্তিকর বেদনার উপশমে এবং জরায়ুর অসহিষ্ণুতাব্যঞ্জক আক্ষেপাদির
দূরীকরণ দ্বারা কষ্টনিবারণে এবং ভাবী প্রসবের সৌকর্যার্থে পাল্‌সু ও
সিমিসির গায় কলফাইলানামও আমাদিগের বিশেষ
সাহায্যকারী ঔষধ । সবিরাম বেদনা নিবারণে ইহা উপযোগী ।
জ্বরায়ুরোগের প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ স্নায়ুশূল যদি সবিরাম প্রকৃতি ধারণ
করে তাহাতে আমরা কলফাইলানাম হইতে উপকার প্রত্যাশা
করিতে পারি । ইহার তীক্ষ্ণ ও খল্লীবৎ বেদনা মূত্রস্থলী, কুচকি এবং
নিম্নাঙ্গে উপস্থিত হয় । প্রসবের কিয়দ্বিবস পূর্ন হইতে গর্ভিণী
ফল্‌সু পেইনস্ অথবা পালোটি কিম্বা অলীক
প্রসববেদনায় অস্থিত ও অনিদ্রাদির ক্লেশ সহ নিম্নোদর হইতে
নিম্নাভিমুখে বেদনাবৃত্ত ঠেলমারা থাকিলে কলফাই তাহাতে ফল প্রদ ।
কলতঃ ফল্‌সু পেইনের পক্ষে ইহা অমোঘ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়াই
জানিতে হইবে ।

প্রসববেদনা বা লেবর এবং প্রসবান্তিক
বেদনা, ভাদালির ব্যথা বা আফ্টার পেইনস্ ।
—বেদনার সবিরাম প্রকৃতিবশতঃ প্রসবের বিরক্তিকর এবং অস্বাভাবিক
বিলম্ব কলফাইলানাম সংশোধন করিয়া থাকে । ইহার বেদনা তীব্র
ও খল্লীবৎ এবং মূত্রস্থলী, কুচকি ও দেহের নিম্নসীমা আক্রমণ করে । বাত-
প্রকৃতির অসহিষ্ণু স্ত্রীলোক বেদনায় নিতান্তই অধৈর্য হইয়া উঠিলে
এবং জরায়ুর অত্যধিক নিষ্কর্জীবতা বশতঃ মোটেই প্রসববেগ না

হইলে ইহা উপযোগী । ইহার আক্ষেপিক বেদনা শীঘ্র শীঘ্র স্থানপরিবর্তন করে এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে ।

৩ । পডফাইলাম পেণ্টেটাম (Podophyllum Peltatum)

উপচয় :—আমাশয়প্রদেশের দুর্বলতা ব্যতীত সকল লক্ষণেরই শেষ রজনী ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি । **উপশাসন** :—সন্ধ্যাকালে ।

সম্বন্ধ :—পডফাইলাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক । পডফাইলামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ল্যাক্টিক এসি, নাক্স ড । সল্ট বা লবণ ইহার কার্য্য বৃদ্ধি করে ।

সাম্ভারণ ক্রিয়া :—যকুৎ এবং পরিপাকযন্ত্রই পডফাইলামের বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র । শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে, বিশেষতঃ ডুয়ডিনাম এবং সরলাস্ত্রের শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে এবং গ্রন্থিল উপাদানেই ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে । ইহা দ্বারা উপরি উক্ত শরীরোপাদানের উত্তেজনা, স্রাবাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয় । এই উত্তেজনা ও প্রদাহের শেষফলস্বরূপ অক্রান্ত টিসুতে পুয় এবং ক্ষত পর্য্যন্তও জন্মিতে পারে । ইহার ক্রিয়ায় শরীরবহিস্ শিরার পূর্ণতা জন্মে, শিশু দুর্বল ও কোমলশরীর হয় এবং শরীর-বাহুদ্বাররক্ষক সংকোচক পেশী শিথিল হইয়া যায় । পৈত্তিক ধাতুর, বিশেষতঃ পারদ সেবন প্রযুক্ত পিত্তবিকারগ্রস্তধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ।

লক্ষণ ।

স্নান্ন :—শরীরের সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের ঈষৎ অবশভাব । বাঁকিয়ুক্ত বেদনার হঠাৎ আক্রমণ । দক্ষিণ অংশফলকাস্থির অভ্যন্তরদেশে বেদনা । প্রাতঃকালে উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্তী প্রদেশে বেদনা ।

সুখপাছবর :—রজনীতে, বিশেষতঃ দস্তোদগমকালে দন্তঘর্ষণ মুখ হইতে দুর্গন্ধের নির্গমন । শুভ্রলেপযুক্ত জিহ্বা এবং বিষাদ মুখ । মুখে

অনেক আটা শ্লেষ্মা থাকে। তিক্ত ও অম্ল আশ্বাদ। শুভ্র ও মিল্ক জিহ্বার পার্শ্বে দস্তের ছাপ। পীতবর্ণ জিহ্বা।

উদরঃ—দক্ষিণ কক্ষিতে পূর্ণতাসহ টাটানি ও বেদনা। ওটা রজনীর সময় উদরের আড়াআড়িভাবে স্থিত কোলনাস্ট্রাভ্যন্তরে (Transverse colon) গড় গড় শব্দ ও বেদনা, পরে উদরাময়। উদরের খল্লীৎ বেদনায় উদরপেশীর আকৃষ্টতা। উদর গরম বোধ করার সহিত মলত্যাগেচ্ছা।

অম্ল ও মলদ্বারঃ—মলত্যাগান্তে উদর শূন্য বোধ হওয়ায় মুচ্ছার ভাব। প্রত্যুষকালের সবুজ অম্লগুণবিশিষ্ট বিষ্ঠার উদরাময়ে অত্যন্ত বায়ু থাকে, এবং অপরিমিত আহার ও পান নিবন্ধন উদরাময়। বিষ্ঠা স্বাভাবিক, কিন্তু দিবসে অনেকবার মলত্যাগ হওয়ায় শারীরিক ওর্ষলতা জন্মে। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। উদরাময় পৌনঃপুনিক, বেদনাহীন, জলবৎ, প্রভূত পরিমাণ বেগে নির্গত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, হরিদ্রাবর্ণ এবং তরল; বিষ্ঠা ময়দার ছায় তলানিবৃত্ত; সবুজ, অম্লাক্ত ও জলবৎ; পীতবর্ণ ও অজীর্ণময়ঃসমৃক্ত; শ্লেষ্মামিশ্রিত এবং দুর্গন্ধ; শোণিতরেখাযুক্ত ও কুহ্ননযুক্ত; কেবল প্রাতঃকালে কাল রক্তের মলত্যাগের পূর্বে উদরে কামড়ানি এবং উদরশূল ও তৎকালে মলদ্বারে তাপ ও বেদনা। বিষ্ঠা কর্দমবর্ণ এবং চা খড়ির ছায়। অর্শ থাকিলে মলত্যাগ করিতে অথবা সামান্ত শরীরচালনায় হালিশের নির্গমন। মলত্যাগের পরে অথবা হাঁচি, এবং মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি প্রযুক্ত হঠাৎ শরীরচালনায়ও সরলাস্ত্রের স্থলন হইলে কখন কখন তাহা রক্তপূর্ণ ও ক্ষীত হওয়ায় কতিপয় দিবস তদবস্থাতেই থাকে।

মূত্রস্রবঃ—অসাড়ে মূত্রত্যাগ, পুনঃ পুনঃ রজনীমূত্রস্রাব। মূত্রাঘাত।

স্ত্রীজননেত্রিস্রঃ—অণ্ডাধারপ্রদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডাধারপ্রদেশে বেদনা, তাহার সহিত জরায়ুও বেদনায়ুক্ত। কখন কখন

বোধ যেন মলত্যাগকালে জননেন্দ্রিয় বাহির হইয়া আসিবে। কনকনানি ও ঠেলমায়া বেদনা হইলে জরায়ুভ্রংশ সংঘটিত হয়। ঘন এবং স্বচ্ছ আমযুক্ত স্বেতপ্রদর।

চিকিৎসা ।

দন্তোদগমকালীন রোগ ১—স্থলবিশেষে দন্তোদগমবিকার চিকিৎসায় পডফাইলাম বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধমধ্যে গণ্য। মস্তিষ্কে ইহার কোন কার্য না থাকিলেও দন্তোদগমের অথবা উদরের কিম্বা উভয়েরই বিকারের গর্হিত সহানুভূতিপ্রযুক্ত নিদ্রিতাবস্থায় বিলাপবৎ স্বরে কেঁকানি এবং আবদারের স্বরে মুহূ ক্রন্দন প্রভৃতি মস্তিষ্কীয় উত্তেজনার লক্ষণ পডফাইলাম প্রদর্শন করে। বিশেষ প্রকৃতির উদরাময় ইহার অগ্ন্যতম প্রদর্শক; রোগী দস্ত কিড়িমিড়ি করে এবং পশ্চাদিকে নির্ক্ষপ্ত মস্তক লুণ্ঠিত হইতে থাকে। উপরি উক্ত প্রতিক্রিয়া-ক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনার ফলস্বরূপ সর্বাঙ্গীণ আক্সেশ বা কন্মভাল্শন এবং ক্লেশযুক্ত ও চিত্রাৎচিত্র উদরাময়ে পডফাইলাম কল্চি সহ তুলনীয় হয়।

যক্লৎ-রোগ ১—যক্লৎরোগচিকিৎসায় পডফাইলাম অগ্ন্যতম মহৌষধ। ইহার ক্রিয়ায় প্রথমতঃ যক্লৎ উত্তেজিত হইলে প্রভূত পিত্তস্রাব হয় এবং শেযাবস্থায় প্রতিক্রিয়াবশতঃ যক্লতের জড়ত্ব এবং তদানুসঙ্গিক শ্রাবালক্ষণ জন্মে। উপরি উক্ত পৌণক্রিয়ানিবন্ধন ক্রিয়াবসাদ অথবা পুরাতন রক্তাধিক্যাবিশিষ্ট, বিবৃদ্ধ যক্লৎ ও উদরাময়-রোগে পডফাইলাম উপযোগী। ক্ষীত, স্পর্শে বেদনায়ুক্ত যক্লৎ, পীতবর্ণ মুখমণ্ডল ও চক্ষু এবং বিশ্বাদ মুখ ইহার প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত। জিহ্বা শুভ্র অথবা পীতবর্ণ লেপযুক্ত থাকে এবং পিত্ত জমাট বাধায় পিত্তশিলা উৎপন্ন হইতে পারে। উদরাময় হয় কিন্তু

কখন কখন বোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিষ্ঠা কর্দমবর্ণ থাকে। অনেক বিষয়ে **মান্‌কু'ন্নিফ্রাস্** সহ ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্ত ইহা "উদ্ভিদপারদ বা ভেজিটেবল মার্কারি" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে **মার্কারি**, **সাক্কা**, **ষ্ট্র্যাম**, **ব্লাস্** এবং **আসেনিকের** ঝায় জিহ্বাপার্শ্বে দস্তের ছাপ লাগে। ইহার রোগী হস্ত দ্বারা অনবরত যকৃৎদেশ ঘর্ষণ করে। ফলতঃ পোর্টালশিরা সংযুক্ত উদরঘন্ত্রমণ্ডলের ও শিরার জড়ত্বনিবন্ধন রোগনিচয়ে **শডফাইলান্** প্রদর্শিত হয়। ইহার লক্ষণমধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ, কর্দমবর্ণ বিষ্ঠা, শ্রাবা এবং আলস্ত প্রধান বলিয়া গণ্য।

উদরাময় :—**শডফাইলান্** প্রাত্যহিক উদরাময়ের অন্ততম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার জলবৎ, পীতবর্ণ, প্রচুর এবং বেদনাহীন উদরাময় রজনী **৩টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা পর্যন্ত** সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে রোগের সহিত হড়্ হড়্ করিয়া নির্গত হয় এবং দিবসের অবশিষ্টাংশ রোগী স্বাভাবিক মলত্যাগ করে। আহাৰাস্তেই মলত্যাগ হওয়ায় ইহা **সিংকনা** এবং **কলসিস্** সহ তুলনীয়; এবং উদরশূল থাকিলে তাহা তাপে ও সন্মুখে বৃদ্ধ হইলে উপশম হওয়াতেও ইহা **কলসিস্**ের সমকক্ষতা প্রকাশ করে। উদরাময়ের ফলস্বরূপ উদর ও সরলাস্তের, বিশেষতঃ **সরলাস্তের দুর্হ-লতার অনুভূতি** ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। **হালিশ** বাহির বা **গুন্দ্রুশ** হওয়ায় ইহা **ইগ্নেসিয়া কার্ব** **ভেজ** এবং **হেমানেলিস** সহ তুলনীয় হইলেও ইহাতে মলত্যাগের পূর্বে তাহার সংঘটন প্রভেদক রূপে বর্তমান থাকে। **শডফাইলান্** এবং **এলোন্** উদরাময় কখন কখন শিরঃশূলসহ পর্যায়ক্রমে হয়। অনেক সময়ে উদরাময়ে অজীর্ণভুক্তবস্তুর মলত্যাগ হওয়ায় ইহা তাহার সর্কশ্রেষ্ঠ ঔষধ **চাক্সনা** এবং **ফেনামের** অহুকরণ করে।

শিশুদিগের উদরাময়ে মলশাস্ত্রের অপ্রোদেক্ষে মলদ্বার
স্থান পদার্থ স্থিতিয়া পড়াও ইহার অগ্রতম প্রদর্শক লক্ষণ
মধ্যে পরিগণিত ।

পডফাইলাম কোন কোন বিষয়ে, যেমন যকৃৎ বিকারে ও
জিহ্বায় দন্তছাপের বর্তমানতায় মাল্কু রিহাসের সহিত তুলনীয়
হইলেও শেষোক্তের মলত্যাগে কুস্থনের উপস্থিতি,
এবং প্রথমোক্তের উদরাময়ের প্রত্যয়ে রন্ধি, জল-
বৎ, লেইর স্থান হরিদ্রাত অথবা অজীর্ণ মলের
বেগে নিঃসরণ, বেদনাহীনতা এবং মলত্যাগান্তে
সরলাস্ত্রের দুর্বলতা উভয়কে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে ।

পডফাইলাম শিশুউদরাময়ে বিশেষরূপে উপযোগী; কিন্তু
তাহার অগ্রতর শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যাক্কেরিয়া কার্বনিকার ধাতু
এবং শরীরের নির্দিষ্ট আকারাদি, ও ফসফরিক এসিড রোগে
পডর স্থায় স্থিরিত দুর্বলতার অভাব ইহাদিগের প্রভেদ জ্ঞাপন করে ।

কলেরা বা ওলাউটা।—কলেরা মর্কাস বা সাংঘাতিক
কলেরা রোগে, বিশেষতঃ শিশুকলেরারোগে অনেক সময়ে আমরা পড-
ফাইলাম দ্বারা বিশেষ উপকার পাই। ইহাতে বেদনাহীন
জলবৎ মল বেগের সহিত হড়্ হড়্ করিয়া নির্গত হয় এবং আহাৰ্য্যে
স্বগা জন্মে। ইহাতে প্রত্যবে অজীর্ণভুক্তবস্তুর মলত্যাগ হইতে পারে।
শিশুকলেরার পতনাবস্থায় রোগীর ঘর্ম্মসিক্ত দেহের পেশীর শিথিলতা এবং
রোগের আনুষঙ্গিক মস্তিষ্কলক্ষণে শিরঃস্রুনাি হইতে পারে ।

আইরিস ভার্সি—শেষ রজনী ২টা হইতে ৩টার মধ্যে
জলবৎ, ঈষৎ পীতভ সবুজ মলত্যাগ হয় এবং রোগী ভুক্তবস্ত ও অন্ন
পদার্থ বমন করে। মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত জালা ইহার অগ্রতর
প্রদর্শক ।

ইলেভেরিফ্ল্যাম্—শিশুকলেরায় জলপাইর তায় সবুজ রঙের জলবৎ উদরাময় স্বরিতবেগে নির্গত হয় ।

ক্রটন টি—প্রচুর, পীতবর্ণ অথবা জলবৎ উদরাময় আহার অথবা পানে বদ্ধিত ।

ইসিকা—বমন ইহার সর্বপ্রধান লক্ষণ । জলবৎ, ঈষৎ পীত উদরাময়ে উদরশূল থাকে এবং বমন ও উদরাময় পর্যায়ক্রমে হয় ।

কোষ্ঠবন্ধ বা কনষ্ট্রিশেশন।—শিশুদগের পূর্ববর্ণিত যকৃৎকারনিবন্ধন কোষ্ঠবন্ধ রোগে ১২ ক্রমের পডফাইলাম উপকার করিয়াছে । কোষ্ঠবন্ধ রোগে ইহা **ভেরেট এ, ওপি** এবং **ব্রাল্ল সহ তুলনার উপযুক্ত** ।

জ্বর—পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার ।

—জ্বর রোগে সাধারণতঃ পডফাইলামের প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না । তবে স্বল্পবিরাম জ্বরে পিত্ত লক্ষণের প্রাধান্যসহ উদরাময়াদি লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহাদ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় । শীতের পূর্বে পৃষ্ঠশূল ও তাপাবস্থায় ঘন্থ এবং বহুভাষিতাবৃত্ত প্রলাপের জ্বরাশ্লেষ ও বিস্মৃতি, প্রচণ্ড শিরঃশূলসহ অত্যাদিক তৃষ্ণা এবং পাণ্ডুরতা, পর্যায়ক্রমিক শিরঃশূল ও উদরাময়, পচাটে আশ্বাদ, যকৃৎস্থানে পূর্ণতা ও মোচড়ানি বেদনা এবং পিত্তসংযুক্ত উদরাময় ইহার সাধারণ লক্ষণ । আমি এইরূপ একটি রোগীকে পডফাইলাম দ্বারা অতি সহজে আরোগ্য করিয়াছি ।

লেকচার ৭৭ (LECTURE LXXVII.)

ইরিডেসি জাতীয় ঔষধ শ্রেণী ।

১। ক্রকাস । ২। আইরিস ভার্ভিকোলার ।

১। ক্রকাস্ স্যাটিভাস (Crocus sativus) ।

উপচয় ।—প্রাতঃকালে । উপশয় ।—মুক্ত বায়ুতে ।

সম্বন্ধ—ক্রকাসের কার্যপ্রতিষেধক—একন, বেল, ওপি ।

ভুলনীয় ঔষধ ।—একন, বেল, ক্যাঙ্কে কা, ইয়ে, ইপিকা, নাক্‌স্ ড, ওপি, প্লাটি, পাল্‌স্, রাম্ রুটা, স্যাভাডি, সিপি, সাল্‌ফ, জিক ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ক্রকাস্ মস্তিষ্কমেরুর্নজ্জের স্নায়ুশৃঙ্খলের আক্রমণদ্বারা মস্তিষ্কে উত্তেজনা এবং রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে গুল্ম-বায়ুলক্ষণযুক্ত উন্মাদরোগ জন্মে । ইহার অত্যন্ত ক্রিয়ার জরাবৃতে শিরা-শোণিতাধিক্য জন্মিলে যে শোণিতস্রাব হয় তাহার কৃষ্ণবর্ণ এবং তন্তু-জানোৎপন্নসূত্র পূর্ণতা ও জমাট বাঁধার প্রকৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত । শরীরের বহু স্থান হইতে কাল, আটা ও চাপ চাপ রক্তস্রাব হয় ।

।

মন ।—দোলাহমান মানসিক ভাব ; রোগী ক্রোধাক্র, তখনই অহুতাপগ্রস্ত ; অবসাদ এবং আনন্দ ; খিটখিটে এবং উৎসাহ-পূর্ণ । শাস্তিহীন, উৎকর্ষাপূর্ণ এবং দুঃখিত । আমোদ এবং উল্লাসসহ উন্নততা, গীত গাহিবার প্রবল ইচ্ছা, অসাধারণ হাশুপরিহাস, প্রত্যেক

ব্যক্তিকেই চূষন করিতে চাহে। লিখিতে চেষ্টা করিলে ভাবের অভাব হয়।

স্নায়ু—অনুভূতি জন্মে যেন কোন জলীবন্ত পদার্থ শরীরের নানাস্থানে লক্ষ প্রদান করিতেছে। কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার স্থায় সন্ধ্যাকালে অত্যধিক বলক্ষয় এবং আলস্য হইলে অত্যন্ত নিদ্রালুতাসহ বোধ যেন চক্ষুপত্র ক্ষীত হইয়াছে; সাহিত্য সম্বন্ধীয় কার্যে লিপ্ত হইলে তাহার উপশম হয়। পেশীনিচয়ে ঝাঁকি; এটেকক পেশীগুচ্ছে ঝাঁকি।

চক্ষু—চক্ষুপরি শ্লেষ্মার জাল থাকার স্থায় বোধ হওয়ায় রোগী পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও মুছিতে বাধ্য। চক্ষুতারকার অত্যন্ত বিস্তৃতি। বোধ হয় যেন চক্ষুতে কামড়ানকর ধূম রহিয়াছে। পর্দা কর্তৃক চক্ষু আবৃত থাকার স্থায় সচরাচর অপেক্ষা আলোক অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়। অনুভূতি জন্মে যেন চক্ষুতে অবিশ্রান্ত জল আসিতেছে। অনেক ক্রন্দন করিলে যেরূপ হয় চক্ষুতে তক্রপ অনুভূতি। অধিক পাঠের পর চক্ষুতে টাটানিযুক্ত জ্বালা; তাহাতে ঘোর দৃষ্টি জন্মিলে পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে চক্ষুপটব্ধ পরস্পর দৃঢ়রূপে চাপিত করার প্রবৃত্তি। উর্দ্ধ চক্ষুপটের আনর্জন। বেদনা চক্ষু হইতে মস্তকশীর্ষে যায়।

স্রীজননেক্রিয়া—বেদনা এবং জননেক্রিয়াভিমুখে চাপ হওয়ায় বোধ যেন ঋতুশ্রাব হইবে। সামান্য শরীরচালনাতেই জরায়ু হইতে কাল, আটা ও তন্তুযুক্ত রক্তচাপের শ্রাব।

চিকিৎসা

শুষ্কবায়ু বা হিষ্টিরিয়া—ক্রকাস তাণবরোগ-লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়া উৎপন্ন করে অথবা ইহার শুষ্কবায়ুতে উদ্গাদবৎ

মানসিক লক্ষণ ও তাণ্ডবৎ শারীরিক চালনা যুগপৎ উপস্থিত হয় । রোগী তাণ্ডবৎ লক্ষ্যপ্রদান ও নৃত্য করে এবং গুল্মবাস্থ অথবা উন্মাদরোগগ্রস্ত রোগীর স্থায় হস্ত ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে চুষন করিতে ইচ্ছা করে ; একৈকভাবে তাহার পেশীগুল্মনিচয়ের সংকোচন হয় । রোগিণী এক মুহূর্তে রাগত হয়, পর মুহূর্তেই তজ্জন্য অন্ততাপ করে ; অথবা তাহার ক্রোধ, বাগ্মিতা এবং হস্ত পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে । **টেবেরেণ্টুলার** স্থায় ইহার **রোগীতেও সম্বীতের ক্ষমতা প্রকাশ হয়** ; কাহাকেও গান করিতে শুনিলে ইহার রোগীও অজ্ঞাতদ্বারে তাহাতে যোগদান করে ; কিন্তু মাকড়সা-বিষের (tarantula) স্থায় তাহাতে রোগের উপশম হয় না । লক্ষ্য প্রদান করিবার ইচ্ছায় **ক্রোকাস্ টেবেরেণ্টুলা**, **ষ্ট্র্যাগমনিফ্যান**, **এপারিকাস**, **সিকু**, **হালসসা** এবং **নেট্রাম সিউ** সহ তুলনীয় ।

পেশী আনর্তন বা মাস্কুলার টুইচিং—
অক্ষিপুটআনর্তন (চোকনাচা) ক্রোকাস্ দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু কতদিন তদপেক্ষাও অধিকতর নিশ্চয়াত্মক ঔষধ ।

চক্ষুরোগ—অস্ত্রচিকিৎসান্তর চক্ষুবিকার—**ক্রোকাসে**র কতিপয় চক্ষুবিকারের বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে । চক্ষুতে অস্ত্রচিকিৎসান্তে যন্ত্রণাপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত হইলে যে সকল ঔষধ দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে **ক্রোকাস্** অগ্ৰতম । আমরা নিম্নে ঐ সকল ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, যথা :—

একন তাহার প্রধান ঔষধ ; লনটপার্শ্বে প্রচণ্ড বেদনার অন্ততাপাধিক যন্ত্রণায় রোগী অধীর হইলে **ইন্ডেল** ; বেদনা চক্ষু হইতে তীরবেগে মস্তকে যাইলে **ব্রাস্** ; মস্তকবেদনায় বমন হইলে **ব্রাস্** ; ঝাঁকির সহিত বেদনায় বমন ও বিবেচন হইলে **এসে-**

লক্ষণ ।

মস্তক ১—সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বায়ুতে অথবা কাসিলে ললাটের দক্ষিণ পাশ্বে মুহু দপ্দপানি অথবা তীরবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষার বৃদ্ধি, এবং পরিমিত শরীরচালনায় তাহার হ্রাস হয় । মুহু এবং ললাটের গুরুত্ববোধক শিরঃশূলসহ চক্ষুর জড়তা ও জ্বর উর্দ্ধদেশে বেদনা থাকে । ললাট এবং মূর্দ্ধায় কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মস্তকোর্দ্ধভাগ বিচ্ছিন্ন হইবে । ললাটপার্শ্বে, অধিকতররূপে তাহার দক্ষিণ পাশ্বে তীরবেধবৎ বেদনা, এবং মস্তকত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি । মস্তকত্বগুণের সপূয় ফুসকুড়ি ।

আমাশয় ১—ক্ষুধার অভাব । পুনঃ পুনঃ শূণ্য অথবা স্বাদহীন বায়ুর উৎসার । বিবমিষা এবং অত্যন্ত জন্ম ও তরল পদার্থের বমন । শিশুদিগের তৃষ্ণ বস্ত, পিত্ত এবং তৃষ্ণের বমন । আমাশয়স্থানে অত্যন্ত জ্বালাময় কষ্ট ।

উদর ১—অল্পে তীর কর্তনবৎ বেদনা । বায়ুনিঃসরণে উদরবেদনার উপশম । উদরশূলের, উপশম জন্ম রোগীর সম্মুখে বক্র হইতে বাধা ।

মল ও মলদ্বার ১—পাতলা এবং জলবৎ উদরাময় ; কোমল, পীতবর্ণ উদরাময়ের উদর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না ; কুস্থনে শোণিত এবং আমের নিঃসরণ । পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলতাগ হইলে মলদ্বার জ্বালা করে এবং কুস্থন দিতে ও নিম্ন দিকে ঠেল মারিতে প্রবৃত্তি হয় । মলতাগান্তে মলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ । প্রাতঃকালে মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধ্যে কাঁটা ছুটিয়া আছে । মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারদংশ ঘটমাছে । কোষ্ঠবদ্ধ ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক এবং অর্দ্ধশিরঃশূল, ‘আধকপালি’
বিষা বা হেমিক্রেনিয়া ।—আমাশয়, বক্র বা পিত্তের

ব্রাস ; চক্ষুতে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও ঝাঁকি লাগার ছায় বেদনা হইলে ব্রুকাম ; এবং নলাটপার্শ্বে জলবেধবৎ বেদনায় প্লুজ্জা প্রযোজ্য হয় । সেনেগা শোষণ ক্রিয়ার সাহায্যদ্বারা অক্ষিমুকুরের তথাবশেষ করিয়া থাকে এবং দৃষ্ট পদার্থ শোণিতরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলে ঈন্সিয়ামের প্রয়োগ হয় ।

রজক্কচ্ছ, বাধক বা ডিসমেনরিয়া ।—কৃষ্ণ-বর্ণ, তন্তুবুক্ত, চাপ চাপ শোণিতস্রাববিশিষ্ট রজক্কচ্ছরোগে ব্রুকাম প্রযুক্ত হয় । রোগিণীর অনুভূতি জন্মে যেন উদরে জীবন্ত পদার্থ চলিয়া বেড়াই-তেছে ।

২। আইরিস ভাসিকোলর (Iris Versicolor)

সম্বন্ধ ।—আইরিসের কার্যপ্রতিবেধক—নাক্স ভ ।

তুলনীয় ঔষধ ।—এলো, এটি ক্রু, আর্স, ব্রায়, কল্টি, আয়ডি, ইপিকা, মার্ক, পাল্‌স্, পড, ফাইটল, ভেরেট্‌ এ, স্রাস্, সাল্‌ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—গ্রহিমণ্ডল এবং আমাশয়াদ্রপথের স্নায়িক ঝিল্লিতে আইরিস ভাসিকোলরের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা জন্মে । উপরি উক্ত ক্রিয়োত্তেজনায় ফলে তাহাদিগের স্রাব বৃদ্ধি হইলে তাহা উগ্রাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহার যকৃতের উত্তেজনায় পিত্তস্রাবের এবং কিড্‌নির উত্তেজনায় মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি হয় । কেহ কেহ অনুমান করেন প্যানক্রিয়াজে (Pancreas) ইহার জাতিগত সম্বন্ধ জন্ত অতি প্রবল ক্রিয়া হইয়া থাকে । ত্বকে ইহা রসবিধিকার ও পৃথগুটিকার উদ্ভেদ উৎপন্ন করে । আমাশয় ও যকৃতিকার নিবন্ধন “সিক্ হেডেক” বা বমনযুক্ত শিরঃশূল ইহার বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত ।

।

মস্তক :—সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বায়ুতে অথবা কাসিলে ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে মূহ্ দপ্‌দপানি অথবা তীরবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষার বৃদ্ধি। এবং পরিমিত শরীরচালনায় তাহার হ্রাস হয়। মূহ্ এবং ললাটের গুরুত্ববোধক শিরঃশূলসহ চক্ষুর জড়তা ও জ্বর উর্দ্ধদেশে বেদনা থাকে। ললাট এবং মূর্দ্ধায় কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মস্তকোর্দ্ধভাগ বিচ্ছিন্ন হইবে। ললাটপার্শ্বে, অধিকস্তররূপে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীরবেধবৎ বেদনা, এবং মস্তকত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। মস্তকত্বগুণের সপূয় ফুসকুড়ি।

আমাশয় :—ক্ষুধার অভাব। পুনঃ পুনঃ শূণ্ণ অথবা স্বাদহীন বায়ুর উদ্‌গার। বিবমিষা এবং অত্যন্ত অল্প ও তরল পদার্থের বমন। শিশুদিগের ভুক্ত বস্ত, পিত্ত এবং তৃষ্ণের বমন। আমাশয়স্থানে অত্যন্ত জ্বালাময় কষ্ট।

উদর :—অল্পে তীব্র কর্তনবৎ বেদনা। বায়ুনিঃসরণে উদরবেদনার উপশম। উদরশূলের, উপশম জন্ত রোগীর সম্মুখে বক্র হইতে বাধা।

মল ও মলদ্বার :—পাতলা এবং জলবৎ উদরাময় ; কোমল, পীতবর্ণ উদরাময়ের উদর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না ; কুস্থনে শোণিত এবং আমের নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলতাগ হইলে মলদ্বার জ্বালা করে এবং কুস্থন দিতে ও নিম্ন দিকে ঠেল মারিতে প্ররুত্তি হয়। মলত্যাগান্তে মলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। প্রাতঃকালে মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধ্যে কাঁটা ফুটিয়া আছে। মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারভ্রংশ ঘটিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ।
চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক এবং অর্দ্ধশিরঃশূল, ‘আধকপালি’ মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া।—আমাশয়, যক্ষ্ম বা পিত্তের

বিকার আইরিস শিরঃশূলের কারণ। ইহাতে শিরঃশূলের সঙ্গে সঙ্গে আংশিক দৃষ্টিলোপ বা দৃষ্টিমানিহ্ন হওয়া প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য; এই লক্ষণে ইহা জেফলুস শিরঃশূল সহ তুলনার যোগ্য। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কলেজের প্রফেসর বা অধ্যাপকদিগের ছয় দিবসের মানসিক পরিশ্রমের জগ্ন মস্তিস্কীয় শ্রান্তি বশতঃ প্রত্যেক রবিবারের সাময়িক শিরঃশূল রোগে ইহা উপকারী। বেদনা চক্ষুর্দ্বন্দ্বপ্রদেশের উচ্চস্থান বা সুপ্রা অবিটালপ্রদেশে, বিশেষতঃ এক এক সময়ে চক্ষুর এক এক পার্শ্বে এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ চক্ষুর্দ্বন্দ্ব-প্রদেশে হয়। দপদপানি অথবা তীক্ষ্ণপ্রকৃতিবিশিষ্ট বেদনার অতিবৃদ্ধিসময়ে প্রচুর পরিমাণ তিক্ত অথবা অম্ল বমন। ফলতঃ যাহাতে দাঁত টকিহ্না যাহ্ন এক্সপ অম্ল পদার্থের বমনই ইহার বিশেষতা। ইহার শিরঃশূল শরীরচালনা, শীতল বায়ু এবং কাসিতে বদ্ধিত এবং মুক্তবায়ু মধ্যে অম্ল-ব্যায়ামসাধ্য কার্যে উপশমিত হয়। অবিশ্রান্ত বিবমিষায়ুক্ত “সিক্‌হেডেক” বা সৎমন শিরঃশূলের আইরিস অগ্রতম মহৌষধ।

পলিমিহ্না—সৎমন শিরঃশূল সম্পূর্ণ মস্তক আক্রমণ করে এবং তাহার সহিত বিবমিষা অথবা বমন থাকিতে পারে।

বমনরোগ বা ভমিটিং।—দস্তের অম্লতাকারক অতিশয় অম্ল পদার্থের বমনের সাময়িক আক্রমণে আইরিস ভাস উপকারী।

যক্ষ্ম রোগঃ—যক্ষ্মদেশে টাটানি, পিত্তবমন, চক্ষু এবং স্বকের পীতবর্ণ বা শ্ৰাবা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যক্ষ্ম রোগে আইরিস উপকারী। অপরিমিত আহার বশতঃ রোগ জন্মিলে ইহা নাকসুভ, পালস এবং চালনা সহ তুলনীয়।

লেখক ৭৮ (LECTURE LXXVIII.)

স্পিজিলিয়া (Spigelia) ।

প্রতিনাম :—স্পিজিলিয়া এম্বেলুমিয়া ?

জাতি :—লোগ্যানেসি ।

উপচয় :—শরীরচালনায় ; উচ্চ শব্দে ; শ্বাস টানিলে ; স্পর্শে ; চক্ষু গুণিত করিলে ; পূর্নাক্ষ ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ।

উপশম :—অপরাক্ত ৩টা অথবা ৪টার সময় ।

সম্বন্ধ :—স্পিজিলিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—অরাম, ককুল, ক্যান্থ, পাল্‌স্‌। স্পিজিলিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক ।

ভুলনীয় ঔষধ :—একন, আর্নি, বেল, ব্রায়, ক্যান্টাস, ক্যান্কে কা, সিমিসি, সিক্‌, সিনা, ডিজিট, কেলি কা, ক্যান্থিয়া, লরসি, লাইক, মার্ক, নাক্‌স্‌ ভ, ফস্‌, পাল্‌স্‌, রাস, সিপি, সাল্‌ফ, জিক্‌। স্পিজির পরে প্রযোজ্য—আর্স, ডিজি, কেলি কা। (হৃৎপিণ্ডরোগে) সিমিসি, জিক্‌। একনের পরে (এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌) স্পিজি ।

সাধারণ ক্রিয়া :—জৈবকার্য্যবিধায়িনীশক্তিপ্রদ (Nerves of animal life) এবং অন্তর্ভূতিদ্নায়ু এবং চক্ষু ও হৃৎপিণ্ডের তাণ্ডব এবং পৈশিক উপাদানে স্পিজিলিয়ার প্রধান ক্রিয়া । ইহা স্নায়বিক উত্তেজনা উৎপন্ন করায় গতিদ্নায়ুর কার্য্যক্ষেত্রে মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপিক গতি, পেশীকম্পন বা "সাবসল্টাস্‌ টেণ্ডনাম্‌" এবং সর্কাস্কীণ আক্ষেপ এবং অন্তর্ভূতিদ্নায়ুরাজ্যে বিশেষতঃ পঞ্চম স্নায়ুতে স্নায়ুশূল জন্মে । উপরি উক্ত স্নায়বিক আক্ষেপিক গতি, স্নায়ুশূল এবং চক্ষুতে ও হৃৎপিণ্ডে

ইহা দ্বারা উৎপাদিত রসবাতিক অবস্থা ইহার প্রধান ক্রিয়ামধ্যে পরি-
গণিত।

লক্ষণ।

মস্তক ১—ললাটদেশের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ বেদনা হওয়ায় সম্পূর্ণ মস্তকের জড়তা। মস্তকের চতুর্পার্শ্বে, বিশেষতঃ সম্মুখে, নত হইলে কশিয়া ফিতা বাঁধা থাকার অনুভূতি। ললাটে, মস্তকের পশ্চাতে এবং মূর্ধার বাম পার্শ্বে গর্ত্ত করার ঞায় বেদনা শরীর-চালনায় ও উচ্চ শব্দে বদ্ধিত এবং শয়নে উপশমিত হয়। ললাট-পার্শ্বের ও ললাটের ছিন্নবৎ বেদনা চক্ষুরাভিমুখে বিস্তৃত এবং শরীর-চালনায়, বিশেষতঃ পদস্থগন হইলে বদ্ধিত হয়। মস্তক ঘূর্ণিত করিলে মস্তিষ্ক আলগা বোধ হয়। চাপিতবৎ শিরঃশূল ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে, চক্ষু পর্য্যাস্ত আক্রমণ করে, এবং শরীরচালনা, গোল-মাল শব্দ, বাঁকি অথবা মলত্যাগের কৌথানিতে বদ্ধিত হয়। ললাটের দক্ষিণের উচ্চ প্রদেশের অভ্যন্তরে ও উর্দ্ধে ললাটগহ্বর ভেদ করিয়া তীর বেঁধার ঞায় বেদনা। ঞায় শূলের বেদনা মস্তকের অংশ হইতে অংশান্তরে যায়। বোধ হয় যেন মস্তক বেগে ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। সাময়িক শিরঃশূল। মস্তিষ্কের কম্প চালনায় ও সবল পদনিষ্ক্ষেপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; জল পতনের অনুভূতি। মস্তকত্বকের টাটানি ও চালনায় স্পর্শসহিষ্ণুতার বৃদ্ধি।

স্নায়ু ১—অস্থির; রজনীতে রোগী অঙ্গনিচয় স্থির রাখিতে পারে না। স্পর্শে শরীরে বেদনার অনুভূতি; শরীর্যাংশ স্পর্শ করিলে শীতল বোধ; অথবা শরীরের মধ্য দিয়া চন্‌চন্‌ করিতে থাকে। গাত্রোথান করিতে শরীর ভারী বোধ হয় ও টাটায়।

চক্ষু ১—চক্ষুর চালনায় তাহাতে বেদনার অনুভূতি যেন

তাহা চক্ষুকোটরাপেক্ষা বৃহত্তর। চক্ষু হইতে তীব্র, তীরবেধবৎ এবং কর্তনবৎ বেদনা প্রত্যেক পার্শ্বে বিকীর্ণ হয়। দক্ষিণ চক্ষুগোলকের চুলকনা ঐ চক্ষু ঘর্ষণ করিলে পুনরাবর্তন করে। চক্ষুগোলে, বিশেষতঃ তাহা ঘূর্ণিত করিলে, তীক্ষ্ণ চাপবৎ বেদনা। চক্ষুকোটরের গভীর দেশে চক্ষুশূল। ঘোর দৃষ্টি।

নাসিকা :—পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা বহিয়া পড়ায় রজনীতে শ্বাসরোধ হয় ; শ্লেষ্মা কখন শুভ্র কখন বা হরিদ্রাভ থাকে। নাসিকার পশ্চাতে শুভ্রশুভ্রি হওয়ার বোধ হয় যেন তাহা কেশ দ্বারা স্পর্শ করা হইতেছে, অথবা তাহার পাশাপাশি ভাবে মূহ বাতাস বহিতেছে।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী :—সম্মুখে নত হইতে, উপবেশন করিতে, অথবা প্রাতঃকালে শয্যাভাগ করার পরে, গভীর শ্বাসগ্রহণে, অথবা শ্বাসরোধ করিলে হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড, দ্রষ্টব্য, এবং শ্রবণযোগ্য স্পন্দন হইলে মানসিক উৎকর্ষাবাজক বক্ষঃকম্প হয়। হৃৎকম্প। কুস্কুস্কু-চূড়া-প্রদেশে গুরুত্বসহ কনকন করিলে বোধ হয় যেন তাহা ভেদ করিয়া ধারে স্থলাগ্র ছুরিকা বসান হইতেছে। কখন কখন হৃৎপিণ্ডে নাড়ীস্পন্দনের সমসাময়িকরূপে স্থচিবেধবৎ বেদনা হয়। নাড়ী দুর্বল, অনিয়মিত এবং কম্পানিত থাকে।

উদর :—উদরে সংকুচিত হওয়ার শ্রায় কামড়ানি হইলে উৎকর্ষ ও শ্বাসকষ্ট। উদরে তীক্ষ্ণ স্থচিবেধবৎ বেদনা। বিদীর্ণ হওয়ার শ্রায় উদরবেদনার সন্ধ্যাকালে মলত্যাগের পূর্বে বৃদ্ধি ; তাহার পরে কিঞ্চিৎ হ্রাস।

মলদ্বার :—মলদ্বার ও সরলাঙ্গে চুলকনা এবং শুভ্রশুভ্রি। মলদ্বার ও জননেস্ত্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বা পেরিনিয়ামে গর্ভ করার শ্রায় ও স্থচিবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা ।

শিরশুশূল বা হেডেক্—মস্তকের স্নায়ুশূলরোগে স্পিজিফিক লিফ্রা এবং স্যাক্সুইনেলিফ্রা প্রধান স্থান অধিকার করে। প্রথমোক্ত মস্তকের বাম এবং শেষোক্ত তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ জন্ম প্রসিদ্ধ। ইহার স্নায়ুশূল বামচক্ষুর্দ্বন্দ্বদেশ আক্রমণ করে এবং সূর্যের গতির অনুগামী হয় অর্থাৎ সূর্যোদয়ে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে সর্বোচ্চ তীক্ষ্ণতায় উদ্ভিত এবং সূর্যাস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে অল্পভূতি জন্মে যেন মস্তকের শীর্ষ মুক্ত বা ফাঁক রহিয়াছে; বেলাড-নার্জ গ্রায় ইহাতেও উচ্চ শব্দে ও শয্যার ঝাঁকিতে বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং তদ্ব্যতীতও সম্মুখে নত হওয়া ও বায়ুর পরিবর্তন (change of weather) ইহার বেদনারুদ্ধির কারণরূপে বর্তমান থাকে। বেদনার সম্পূর্ণ স্নায়ুশূল প্রকৃতি এবং বামপার্শ্ব আক্রমণ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। সূর্যের গতিসহ সঞ্চক থাকায় ইহা নেট মিউ, জেলস্ এবং প্লনইন সহ তুলনীয়।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিফ্রা—ডাঃ বেয়ার মুখ-মণ্ডল স্নায়ুশূলের (প্রসপলজিফ্রার) চিকিৎসায় স্পিজিফিকলিফ্রাকে শীর্ষস্থান প্রদান করেন। ইহার রসবাতিক স্নায়ু-শূল হেঁচকাটানের গ্রায় ও ছিন্নবৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট; এবং সিক্ততা, চাপ, চালনা এবং সংস্পর্শ প্রভৃতিতে বর্দ্ধিত হইলে শরীরভাস্তুর দিয়া ভৌতিকম্পের ন্যায় ধরধর ভাব প্রেরিত হয়। ইহার আক্রমণ সাময়িক এবং তাহাতে স্বপ্নিগুস্থানে ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা জন্মে, অথবা আক্রমণের পূর্বে স্বপ্ন জন্ম হয়। ললাটের, চক্ষুকোটরের এবং উর্দ্ধ চুম্বালের ও দস্তের স্নায়ু বেদনার আক্রমণস্থান থাকে। অনেক সময়েই অল্পভূতি জন্মে যেন চক্ষু অতি বৃহৎ হইয়াছে। ক্র-স্নায়ুশূল অথবা বামপার্শ্ব মুখমণ্ডল-

স্নায়ুশুলের, বিশেষতঃ প্রসপেলজিয়ায় বেদনা মস্তকপশ্চাৎ হইতে মস্তকোর্ধ্ব বাহিয়া আসিলে ও বেদনার প্রকৃতি জ্বালাযুক্ত ও খোঁচার ছায় হইলে এবং তাহা বায়ুর পরিবর্তনে বৃদ্ধি পাইলে স্পাইজিফি দ্বারা উপকার হইতে পারে । সাধারণতঃ পুরাতন রোগে ইহার প্রয়োগ হয় না ।

কলুচিকাম্—ইহার বেদনাও বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং তাহাতে এক প্রকার পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা জন্মে, কিন্তু স্পাইজিফি লিয়ার ছায় উগ্রতা থাকে না ।

সিমিসিফিউপা—জরায়ুরোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া নিবন্ধন চক্ষুর্দ্ব-স্নায়ুশূল ; রজনীতে বেদনার বৃদ্ধির প্রকৃতিবিশিষ্ট পেশীশূলে এবং রসবাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের মুখমণ্ডলস্নায়ুশূল বা প্রসপেলজিয়াতে (যাহা অপরাঙ্কে উপস্থিত হয় ও রজনীতে অন্তর্দান করে) সিমিসি দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় । বাম স্তন্যধঃ বেদনা অধিকাংশ সময় অণ্ডাধাররোগ বশতঃ জন্মে এবং সিমিসি তাহার উপকার করে ।

হৃদ্রোগ—হৃদহির্বেষ্টপ্রদাহ ; হৃদস্তরবেষ্ট প্রদাহ ; হৃদ্বিরুদ্ধি ; হৃৎকম্প প্রভৃতি—হৃৎপিণ্ডের নানা-প্রকার রোগঘটনার উপশমনার্থ স্পাইজিফি উপযোগী । প্রবল হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ বা একিউট কার্ডাইটিস্ এবং হৃদহির্বেষ্টপ্রদাহ বা পেরিকার্ডা-ইটিস্‌রোগের ঔষধমধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ । হৃৎপিণ্ড হইতে তীব্র বেদনা তীব্র-বেধবৎ ছুটিয়া পৃষ্ঠে এবং হৃৎপিণ্ড হইতে বিকীর্ণ বেদনা হস্ত ও মেরুদণ্ড বাহিয়া নিম্নাভিমুখে এবং বক্ষোপরি যায় । হস্ত কিম্বা শরীরের কোন প্রকার চালনা হইলেই হৃৎকম্প । হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে করতল স্থাপনে রণৎকার বা পারিং শব্দের উপলব্ধি । নাড়ীস্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং হৃৎস্পন্দনের সমসাময়িক ; হৃৎস্তর ঘৎসামান্য গতি হইলেই রোগের বৃদ্ধি । স্নায়ুশূলের উপসর্গরূপে হৃৎপিণ্ডলক্ষণ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণেও স্পাইজিফির আবশ্যিকতা জন্মে । অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার

শাস্তিবিধানেও ইহা উপযোগী। কখন কখন ইহার হৃৎস্পন্দন শ্রবণগোচর হয়; দীর্ঘকাল ব্যাপী পর্কতাদি উচ্চ স্থানে আরোহণ নিবন্ধন হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফিতে স্পন্দনের উচ্চশব্দ শ্রুতিগোচর হইলে আর্স তাহার ঔষধ। হৃৎরোগের তরুণাবস্থায় স্পাইজি প্রদত্ত হয়।

রসবাতজ হৃদস্তরবেষ্টপ্রদাহে অনেক সময়েই স্পাইজি কার্য্য করিয়া থাকে। হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেট্টরিসরোগেরও ইহা উপশমকারী। হৃৎপিণ্ডপ্রদাহে একর পর ইহা প্রয়োজ্য। হৃৎপিণ্ডরোগের, বিশেষতঃ তাহার কপাটের যান্ত্রিক রোগের (Valvular disease), এবং হৃদ্বিবৃদ্ধির পুরাতন অবস্থায় ইহা ফলপ্রদ।

কুমিরোপা—উদরে কুমির বর্তমানতাপ্রযুক্ত উত্তেজনাঘটিত বক্রদৃষ্টি, শরীরের ঝাঁকি, মুখের পাণ্ডুরতা, চক্ষু বেড়িয়া নীল বর্ণমণ্ডল এবং নাভির চতুর্দিকস্থ উদরশূল জন্ম মুছার ও বিবমিষার ভাব প্রভৃতি কুমিরোগলক্ষণে স্পাইজি উপকারী। ইহার মলে আম, বিষ্ঠা ও কুমি থাকে। ইহার মূল আরকে নেকড়া ভিজাইয়া তাহার আত্মাণ দিলে কুমি জন্ম সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর হইতে পারে।

ইগ্নেসিন্সা—মলদ্বারে কীটবিচরণের অন্তর্ভুক্তি ও বিড় বিড়ির জন্ম শিশু অস্থির হইলে প্রয়োজ্য।

ইপিগো—সূত্রবৎ কুমি থাকায় শিশু বিষাদবায়ুগ্রস্ত হইলে এবং নাভিদেবে তীব্র বেদনা থাকিলে যদি শিশুর কনভাল্‌সন হয়।

স্ফাবাডিনা—বিবমিষা, বমন এবং উদরশূলযুক্ত কুমিরোগে।

লেকচার ৭৯ (LECTURE LXXIX.)

জাতি—ভার্কিনেসি ।

এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্ (Agnus Castus.)

সাধারণ ক্রিয়াঃ—এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্ জননেন্দ্রিয় সহ বিশেষ সঙ্গক্রযুক্ত বস্তু । প্রাথমিক উত্তেজনা ব্যতীতই ইহা জননেন্দ্রিয়-ক্রিয়ার অবসাদ ঘটায় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা বশতঃ ধ্বজভঙ্গ ঘটে । এজন্ত পূর্বকালে কামেচ্ছার দমন জন্ত স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ইহা ব্যবহৃত হইত ।

লক্ষণ ।

মনঃ—অশ্রমনস্কতা ; কিছুই মনে থাকে না । পাঠে মনঃযোগ হয় না । উদাসিন্য ; উঃখ ; মৃত্যু নিকট বলিয়া ভীতি ; সাহসহীনতা ।
স্নায়ুঃ—বিষাদবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির আক্ষেপিক রোগ । যন্ত্রণাঘটিত দুর্বলতাবৎ প্রচণ্ড দৌর্বল্যে মানসিক অবসাদবশতঃ স্তনের রোধ । শরীর ঘৃষ্ট-বৎ বোধ ।
পুংজননেন্দ্রিয়ঃ—কামেচ্ছার হ্রাস, প্রায় অভাব । লিঙ্গ এতাদৃশ শিথিল যে কামবিষয়ক চিন্তার উত্তেজনায় তাহা উত্তিত হয় না । অণুকোষ শীতল, স্ফীত, কঠিন এবং বেদনায়ুক্ত । লিঙ্গ ক্ষুদ্র ও খসখসে । কামেচ্ছা ব্যতীতই লিঙ্গের ক্ষীণ উত্থান । রজনীতে স্ত্রীসঙ্গের পরে অত্যন্ত ও প্রায় গন্ধহীন স্তত্র শ্রোত বহিয়া পড়ে ; তাহা বলে নিষ্কিন্ত হয় না । পুরাতন পুয়মেহ বশতঃ ধ্বজভঙ্গ । পীত বর্ণ মূত্রনালীস্রাব । পুরাতন পুয়মেহ থাকায় কামেচ্ছা অথবা লিঙ্গোত্থান হয় না । মলবেগের সহিত প্রেটেট গ্রন্থির স্রাবের নির্গমন ।
স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—স্বচ্ছ ষেতপ্রদর হইলে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়াংশনিচয় শিথিল থাকে । সঙ্গমে অনিচ্ছা । স্তনের অত্যন্ততা ; অথবা তাহার রোধ ।

চিকিৎসা—পুংজননেন্দ্রিয়রোগ—নাতি

প্রবল এবং পুরাতন পুয়মেহ,

ধ্বজভঙ্গ—বৃদ্ধ এবং অপরিমিত কামসেবা বশতঃ অকালবৃদ্ধ ব্যক্তি (যাহারা অতিরিক্ত কামসেবার রত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে) গ্রন্থাস ক্যাষ্টাস রোগের কার্যক্ষেত্র । পুনঃ পুনঃ পুয়মেহ বা গণরিয়ার আক্রমণও ইহাদিগের শুক্রমেহরোগের অন্ততর কারণ । পুয়মেহরোগের প্রবল ও তরুণাবস্থায় ইহা উপকারী নহে । তাহার কথঞ্চিৎ পুরাতন বা নাতিপ্রবল অবস্থায় শ্রাব পীতবর্ণ পুয়বৎ আকার ধারণ করিলে এবং ক্যাষ্টাসিস্ সদৃশ কামোত্তেজনার অভাব হইলে গ্রন্থাস ক্যাষ্টাস উপযোগী ।

সিপিছা—ঐন্দ্রলোকদিগের পুয়মেহ রোগের প্রবল লক্ষণ প্রশমিত হইলে ডাঃ হিউজ্ সিপিছা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন । ডাঃ র'র মতে ইহা অনেক স্থলেই প্রদর্শিত ।

টুসিলেনগো—পুয়মেহ রোগে ইহা বিশেষ প্রশংসালভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না ।

অপরিমিত কামসেবা এবং তদানুসঙ্গিক আমোদাদির উপভোগ নিবন্ধন অকালবৃদ্ধ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি শুক্রমেহরোগগ্রস্ত হইলে অত্যন্ত বিঘ্নচিত্ত, উদাসীন, অনন্যোগী এবং আত্মসম্মানহীন হইয়া পড়ে ও অতিরিক্ত রেতঃক্ষয় হেতু দুর্বলতা জন্মে । এই সকল ব্যক্তির কামেচ্ছা ১৮ বৎসরে যজ্ঞপ প্রবল, ৬০ বৎসর বয়সেও তজ্ঞপই থাকে ; কিন্তু তখন শক্তির অভাব হইয়া যায় । গ্রন্থাসের পক্ষাচ্ছাতিক ধ্বজভঙ্গ সঙ্গের ইচ্ছা এবং শক্তি উভয়েরই অভাব হয় এবং জননেন্দ্রিয় শীতল হইয়া যায় ।

নাকার কুটিয়া—ইহাতে কামেচ্ছার অভাব থাকে ; কাম বিবন্ধের চিন্তা করিলেও লিঙ্গোথান হয় না । নিদ্রাবস্থায় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা বশতঃ শুক্রক্ষরণ ।

লেখক্কার ৮০ (LECTURE LXXX.)

রুটেসি জাতীয় ঔষধ নিচয়।

১। রুটা। ২। টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা।

৩। জ্যান্থক্সাইলাম্। ৪। জ্যাবরেণ্ডাই।

১। রুটা গ্র্যাভিয়লেন্স্ (Ruta Graveolens.)

উপচয়ঃ—শীতল এবং সিক্ত বায়ুতে সাধারণতঃ বেদনার বৃদ্ধি।

উপশমনঃ—শরীরচালনায়।

সম্বন্ধঃ—রুটার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাফর। রুটা যাহার কার্য-প্রতিষেধক—মার্ক।

ভুলনীর ঔষধঃ—এমন কার্ক, আর্গি, ব্রায়, ক্যান্ডে কা, ইউফ্রে, লাইক, মার্ক, মেজি, ফস্ এসি, ফাইটল, পাল্‌স, রাস্, সিপি, সিলিক্, সাল্‌ফ।

সাধারণ. ক্রিস্‌সাঃ—অস্থিবেষ্ট, অস্থি, সন্ধি এবং উপস্থিতে রুটার প্রধান ক্রিয়া হওয়ায় ইহা উপরি উক্ত দেহোপাদানে রসবাতসদৃশ রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে। চক্ষু সহও ইহার বিশেষ ক্রিয়াসম্বন্ধ থাকায় ইহা তাহাতেও রসবাতিক পরিবর্তন আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা জরায়ুও অতি গভীররূপে আক্রমণ করায় তাহাতে শোণিতগতির বৃদ্ধি ও পেশীর সংকোচন হইলে জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব হয়। উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ইহা গর্ভপাত উৎপন্ন করিতে পারে।

লক্ষণ।

চক্ষুঃ—চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে এবং নিম্ন চক্ষুপত্রের উপরিভাগে চুলকনা; চক্ষু ঘর্ষণ করিলে চন্‌চন্‌ করে; চক্ষু জলপূর্ণ। চক্ষুর

উপস্থিতে স্বেষ্টবৎ বেদনা। চক্ষুকেটরের গভীর প্রদেশে চাপ। নিম্ন চক্ষুপুটে থলী হওয়ার পর প্রচুর জলস্রাব। সূক্ষ্ম সূচিকর্ষ অথবা অত্যধিক পাঠ করিলে, কিম্বা অল্প প্রকারে চক্ষুর অপরিমিত পরিশ্রম হইলে চক্ষু জ্বালা করে, কনকন করে, তাহার ক্রান্তিবোধ হয় এবং দৃষ্টির মালিঞ্চ ঘটে; সন্ধ্যাকালে চক্ষুর ব্যবহার করিলে রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি। বাম চক্ষু-নিম্নে শীতলতা।

স্নায়ু ;—উরু দুর্বল থাকার হ্রায় রোগী চলিতে টলে; ভ্রমণকালে অঙ্গাদি বেদনা করে। আছাড় পড়া অথবা আঘাত লাগার হ্রায় সম্পূর্ণ শরীর স্বেষ্ট বোধ হয় এবং তাহা অঙ্গসন্ধিতে অধিক থাকে। স্থির থাকিলেও জ্বালাযুক্ত এবং চর্কণবৎ অস্থিবেদনা সিক্ত বায়ু বহিলে বদ্ধিত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ;—গ্রীবা এবং স্বক্কে মোচড় লাগা বা স্বেষ্ট হওয়ার হ্রায় বেদনা। মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়ার হ্রায় বেদনা এবং তাহার খঞ্জতা; কটিবাতের হ্রায় বেদনা। মেরুদণ্ডের সন্নিহিত সীমায় বা কক্‌সিক্‌স্ অস্থিতে স্বেষ্ট হওয়ার হ্রায় বেদনা কটিপশ্চাৎ বা তৃকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অধিক ভ্রমণের পর উপবেশন করিতে পশ্চাৎ কটির উর্দ্ধে খননবৎ বেদনায় বোধ যেন তাহা স্বেষ্ট হইয়াছে; ভ্রমণ করিতে থাকিলে ভাল বোধ, দণ্ডায়মান এবং উপবেশনাবস্থায় পুনরাবর্তন। মেরুদণ্ড বাহিয়া তাহার নিম্ন পর্য্যন্ত শীতল।

অঙ্গনিচয়ে ;—অঙ্গনিচয়ে, সন্ধিতে এবং অস্থিতে বেদনা হওয়ার আঘাত পাওয়ার হ্রায় অথবা আছাড় পড়ার হ্রায় বোধ। ভ্রমণ করিতে একবার এপাশে একবার ওপাশে পড়িয়া যায়; জঙ্ঘা ভার বহিতে পারে না, উরুতে স্থিরতা বা শক্তি থাকে না। সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বা নামিতে পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার হ্রায়, কিম্বা তাহার অস্থির স্থানচ্যুতিবৎ (Dislocation)

অথবা তাহাতে ক্ষত হওয়ার স্থায় বেদনা । পদের অস্থিতে বেদনা হওয়ার রোগী সবলে পদক্ষেপ করিতে পারে না ।

চিকিৎসা ।—**চক্ষুরোগ**—**দৃষ্টিদৌর্বল্য** বা **এস্ট্রেনশাইয়া** ।—হৃদয় হৃদিকর্ষ প্রভৃতিতে চক্ষুর অতিপরিশ্রম, বস্ত-বিশেষে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিতে দুর্বল চক্ষু পেশীর সমঞ্জসীভূত ক্রিয়া উৎপাদনে টানাটানি হওয়ায় চক্ষুর জালা, কনকনানি ও তাহার নিম্নপুটে আক্ষেপ এবং দৃষ্টিদৌর্বল্য ও অগ্রাগ্র নানা প্রকার ক্রিয়াবিকারী চক্ষুরোগ আরোগ্যে **ব্রতী** উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

আঘাতজ রোগ বা **ইঞ্জুরী** ।—মোচড় লাগার পুরাতন ফলস্বরূপ অস্থির সন্ধি এবং উপস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা উপশম করিতে **ব্রতী** উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে পরিগণিত । মণিবন্ধ এবং গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার কুফলসংশোধনে ইহার বহিরাভ্যন্তরীণ উভয়বিধ প্রয়োগই উপকারী চিকিৎসা বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছে । **আর্নিকা** যেরূপ পেশী এবং অগ্রাগ্র কোন কোন উপাদানের, **ব্রতী** তদ্রূপ কণ্ডুরা, স্নেহস্রাবী কোষ (Bursa) এবং সন্ধির আঘাতজ রোগের পক্ষে উপকারী । মণিবন্ধসন্ধির উপরিস্থ গ্রন্থির প্রদাহ, কণ্ডুরায় মোচড় লাগায় অঙ্গ বিশেষের দুর্বলতা ও চলৎশক্তির অভাব ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে এবং এই সকল রোগ-লক্ষণের আবহাওয়ার পরিবর্তনে বা তাহার সিজ্তায় বুদ্ধি **ব্রতী** অন্যতম প্রদর্শক হয় ।

২ । **টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা** (*Ptelea Trifoliata.*) ।

উপচর ।—দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (কাউপার থোয়েট) ; শরীরচালনায় ; উষ্ণগৃহমধ্যে ভ্রমণে ; প্রাতঃকালে ; জাগ্রত হইলে ; আহারান্তে । **উপশমন** ।—মুক্তবায়ুমধ্যে ; দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (হেরিং) ।

ভুলনীয়া ত্বন্দ্র ১—বার্বেরিসু, হাইড্রাস্ট, মার্ক, নাক্‌স্‌ভ, পড ।

সাপ্রারণ ক্রিয়া ১—টিলিয়ার প্রধান ও প্রাথমিক ক্রিয়া পরিপাকযন্ত্রপথের শৈল্পিক ক্লিষ্টে হওয়ায় ইহা অজীর্ণ এবং পিত্তলক্ষণ উৎপন্ন করে । যকৃৎ, আমাশয় এবং অন্ত্রপথের রক্তাধিক্য জন্মে । গৌণ ক্রিয়ায় ইহা ফুসফুসের রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে । ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রবলতা নাই । অতীব মন্থর গতিতে ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হইয়া নানা প্রকার পুরাতন রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে ।

লক্ষণ ।

মস্তক ১—মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব ; শিরোপূর্ণন ; মস্তক ফিরাইতে, অথবা হঠাৎ চালনায় উহার বৃদ্ধি । ললাট চূর্ণ করার ন্যায় বেদনার সম্মুখ লোহিতবর্ণ হয় এবং স্বভাব ত্রস্ত ভাব ধারণ করে । অবিশ্রান্ত ও মুহু শিরঃশূল ভ্রমণে বদ্ধিত । মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূল ললাটের চক্ষুর্দ্বীপদেশে যায় । মস্তকমূলে চাপ ও ঘূর্ণন অনুভূতি ।

উদর ১—স্ফীত যকৃৎ চাপিলে টাটায় এবং তাহার মুহু কনকনানি বেদনা । যকৃৎদেশে ভার চাপা বোধ ; কনকনানি, কষ্ট এবং মুহু বেদনা ও গুরুত্বের দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়নে উপশম ; বাম পার্শ্বে ফিরিতে আকৃষ্টতার অনুভূতি । যকৃতে তীব্র কর্তনবৎ বেদনা গভীর শ্বাসগ্রহণে বদ্ধিত । উদরে টাটানি এবং কনকনানি বেদনা । নাভিদেশের স্পন্দন জংস্পন্দনের সমসাময়িক । উদর গড়গড় করে, কামড়ায়, তাহাতে শূল হয় এবং বায়ু সরে ।

অঙ্গ ১—অঙ্গ, কঠিন বিষ্ঠা অত্যন্ত বেগ দ্বারা নির্গত করিতে হয় । উদরাময় পিত্তসংযুক্ত, পাতলা ও কৃষ্ণবর্ণ এবং মলসংযুক্ত ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল ১—ডাঃ কপ্‌ ললাটদেশের শিরঃশূলে তিলি-

হ্রাসকে অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া মনে করেন। এস্থলে ইহা নাক্সস ভমিক্স সহ তুলনীয়। ইহার ললাটবিদীর্ণকরার ঞায় মস্তকবেদনা ইপিফ্রাভেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার প্রভেদকরূপে বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়।

বন্ধুদ্রোগ—রক্তাধিক্য; বিহ্বলি;—যকৃতের রক্তাধিক্য এবং বিবৃদ্ধি রোগে টিলিয়া অতি স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ধাচিত। কিন্তু নবাবিদ্ধত এবং স্বল্পপ্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত হওয়ায় ইহা চিকিৎসকমণ্ডলীর যথাযোগ্য মনযোগ আকর্ষণে অক্ষম হইয়াছে। যকৃতদেশের কনকনানি ও গুরুত্বের বাম পার্শ্ব চামিহা শয়নে অভ্যন্ত বৃদ্ধি এবং বাম পার্শ্বে ফিরিতে গুরুবস্ত টানিয়া নামানের ঞায় বা আকৃষ্টতার অনুভূতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। লাহনিহাতেও বামপার্শ্বে শয়ন করিলে কঠোর বৃদ্ধি ও আকৃষ্টভাবের অনুভূতি হয়; কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগী তাহার উপশম বোধ করে। অ্যাগ্রেসিহা মিউরিহেটিকাতেও যকৃতিকার জগ্ন পিত্তলক্ষণ আছে, কিন্তু রোগী মাকুহিহাসেসে ঞায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহার কঠকর লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অ্যাগ্রেসিহা কোষ্টবদ্ধে, মার্ক উদরাময়ে বিশেষতা লাভ করে। নাক্সস ভর ঞায় টিলিয়াতেও পর্যায়ক্রমিক কোষ্টবদ্ধ এবং উদরাময় থাকিতে পারে।

৩। জ্যাঙ্কসাইলাম (Xanthoxylum.)

ভুলনীয় ঔষধ।—বেল, সিমিসি, জেল্‌স্‌।

সাধারণ ক্রিয়া।—জ্যাঙ্কসাইলাম ঞায়ুগুণে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে অনুভূতিপ্রদ ঞায়ুর উত্তেজনা ও কার্যতৎপরতার বৃদ্ধি

হয়। ইহা গতিপ্রদ স্নায়ুতে স্নন্নতর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার গৌণ-ক্রিয়াফলস্বরূপ গতিপ্রদ এবং অনুভূতিপ্রদ উভয়বিধ স্নায়ুর পক্ষাঘাত অথবা নিশ্চেষ্ট ভাব উপস্থিত হইলে জীবনশক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়। শৈল্পিকবিল্লি, পেশী এবং গ্রন্থিল উপাদান সকলই ইহার বিশেষ ও উত্তেজক কার্য্যধীন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, ইহার ক্রিয়ার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়মধ্যে জ্বীজননেক্রিয়ালক্ষণ স্মরণীয় বলিয়া বিবেচনা করা যায়। কেননা ইহা জ্বীলোকের অতি শীঘ্র এবং অতি প্রচুর ঋতুশ্রাব সহ কঠিন স্নায়ুশূল উপস্থিত করায় রোগ বাধক বা রজোকৃচ্ছ, রোগের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ।

স্নান্নু।—স্বল্প খোঁচার স্নায় বেদনা; শরীরে বৈছাতিক স্নোত প্রবেশের স্নায় কাঁকি বা শক্ (Shock); শরীরের বাম পার্শ্বে অধিকতর অসাড়তা থাকে। অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুতে ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া হইলেও ইহা জীবনশক্তির সুস্পষ্ট অবসাদ উৎপন্ন করায় প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব ঘটে।

জ্বীজননেক্রিয়।—অণ্ডাধারের (ovary) বেদনা জননেক্রিয়ের জুরেল স্নায়ু (genitocrural nerves) বাহিয়া নিম্নাভিমুখীন হয়। স্নায়ুশূল প্রকৃতির রজোকৃচ্ছরোগে ভয়াবহ কষ্ট ও বেদনা সহ ঋতুশ্রাব, অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর, এবং শিরশূল ও উরুর সন্মুখে নিম্নবাহী বেদনা; রোগী গুল্মবায়ুলক্ষণযুক্ত, অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয় এবং সহজেই চমকিয়া উঠে। উপরিউক্ত প্রকারের প্রসবাস্তিক বেদনায় প্রচুর প্রসবাস্তিক বা লোকিয়ার শ্রাব।

চিকিৎসা।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাক্ষেত্রে জ্যাক্বিন্ট সাইলান একমাত্র রজোকৃচ্ছরোগ বা বাধক

বেদনার বিশেষ উপকার প্রদর্শন করিয়াছে। বেদনা অতি ভয়া-
বহরূপে যন্ত্রণাপ্রদ ও জ্বালাযুক্ত এবং তাহা জুরেল স্নায়ু দ্বারা উরু বাহিয়া
নিম্নাভিমুখীন হইলে উরু যেন অবশ হইয়াছে বলিয়া অনুভূতি জন্মে।
সাধারণতঃ ঋতুস্রাব প্রচুর থাকে এবং জরায়ুতে অতি যন্ত্রণাপ্রদ ঠেলমারা
বেদনা হয়। জ্যাঙ্কসাইলামের বেদনা সাধারণতঃ শরীরের
বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলেও ইহা দক্ষিণ অণ্ডাধার আক্রমণ করিয়া থাকে।
বাধকের বেদনা স্নায়ুশূলপ্রকৃতিবিশিষ্ট। ডাং হেল বলেন যে ইহা
দ্বারা উপকার পাইতে হইলে বেদনার স্নায়বিক প্রকৃতি অধিকতর
থাকার প্রয়োজন। ইহার রোগাক্রমণের পূর্বাধিন বামচক্ষু প্রদেশে শিরঃ-
শূল হইতে পারে। একহারা, কোমলাঙ্গী ও বাত প্রকৃতির স্ত্রীলোক-
দিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

৪। জ্যাবরেণ্ডাই (Jaborandi)।

ভুলনীয়া ঔষধ—এগারি, এট্রাপি, এমিল নাই, ফাইজ।

সাধারণ ক্রিয়া—ঔষধপরীক্ষার্থ জ্যাবরেণ্ডাই সেবন করা-
ইলে অচিরে মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং মুখলালার স্রাব ও
ঘর্ম আরম্ভ হইয়া কতিপয় ঘণ্টা থাকিলেও এক ঘণ্টার মধ্যেই স্ত্রের
পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুজলের অতিশয় বৃদ্ধি ও
নাসিকা হইতে প্রচুর স্রাব হয়; এবং গলগহ্বর, শ্বাসনালী এবং বায়ু
নালী বা ব্রঙ্কাইরও স্লেগ্মাস্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কণীনিকা সংকুচিত
এবং দৃষ্টিসামঞ্জস্যকারী পেশী ক্রিয়ার অক্ষিপ। লালাস্রাব ও ঘর্ম নিবৃত্তি
হওয়ার পরে শরীরাত্মশনিচয়, বিশেষতঃ মুখ এবং গলগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক
হওয়ার প্রভূত তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। শোণিতগতির বৃদ্ধি হইলেও ধমনীর
আততভাবে ধর্মতা এবং শরীরতাপের হ্রাস জন্মে।

চিকিৎসা—অনেক সময়ে কলেরা প্রভৃতি তরুণ রোগের

পতনাবস্থার এবং থাইসিস্ প্রভৃতি সাংঘাতিক পুরাতন রোগের ঘর্ষ জ্যাবরেণ্ডাই দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। অন্তঃ সন্তাবস্থায় কষ্টপ্রদ মুখলালাস্রাবের ইহা অত্তম ঔষধ। মর্ফিয়া দ্বারা পিত্তশিলা জনিত উদরশূল নিবারণের পর কোন রোগীর প্রভূত মুখলালার স্রাব জন্ত প্রগাঢ় বিবিম্বা ও ভয়াবহ বমন হওয়ায় তাঁহার অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে এক মাত্রা জ্যাবরেণ্ডাই ৩০ ব্যবস্থা করায় প্রায় ২ নিমিটের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সুনিদ্রাগত হইয়াছিলেন। ঋতু-সন্ধিকালীন শোণিতোচ্ছ্বাস এবং তাহার আনু-ষঙ্গিক প্রচুর ঘর্ষ, শরীরসীমার শীতলতা, বিবিম্বা ও বমন ইহা আরোগ্য করিয়াছে; কর্ণমূলপ্রস্থির ক্ষীতি ও প্রদাহ, বিশেষতঃ তাহা অণুকোষে স্থানান্তরিত হইলে, ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। ফলতঃ নানা প্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট সংশোধনেই ডাং এলেনের মতে ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, যথা—চক্ষুর সিলিয়ারী পেশীর আক্ষেপ; মতিয়াবিন্দুঘটিত দৃষ্টিদৌর্বল্য; চক্ষু গোলকাদির গঠন বিকার জন্ত দৃষ্টিসম্পাদনীয় সামঞ্জস্যের অভাব বশতঃ দৃষ্টিদৌর্বল্য; বক্রদৃষ্টি—যাহাতে সুস্থ চক্ষু দ্বারা বস্তুবিশেষ দর্শনকালে টেরা চক্ষু অভ্যস্তর দিকে ঘূর্ণিত হয়; বিশেষ করিয়া বক্রদৃষ্টির অস্ত্রচিকিৎসার পর।

লেকচার ৮১ (LXXXI.)

ইরিকেসি জাতীয় ঔষধশ্রেণী ।

১। রডডেণ্ড্রন ।

২। চিমাফিলা ।

৩। ক্যাল্মিয়া ।

৪। লিডাম ।

১। রডডেণ্ড্রন (Rhododendron Chrysanthemum.) ।

উপচরন :—প্রাতঃকালে ; বিশ্রামকালে ; বিহ্বলিত ঝটিকার পূর্বে ; মিক্ত এবং শীতল বায়ুতে ; ঝটিকাশিষ্ট এবং শীতল দিবসে ।

উপশম :—শয্যার উর্দ্ধে অঙ্গ আকৃষ্ট রাখিলে ।

সম্বন্ধ :—রডডেণ্ড্রনের কার্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যান্ফ, ক্লিমে, রাস্ ।

ভুলনীয় ঔষধ :—অরাম, ব্রায়, ক্যান্ফ, কা, ক্লিমে, কনা, ক্যাল্মিয়া, লিডাম, লাইক, মার্ক, নাক্ ভ, পাল্, রেনাস্, রাস্, সিপি, সিলিক, সাল্ফ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—তান্তব এবং পৈশিক উপাদানে রডডেণ্ড্রনের ক্রিয়া হওয়ার ইহা শরীরের সন্ধিবাতিক এবং রসবাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে । অণ্ডকোষ এবং উপকোষের (Epididymis) আক্রমণ দ্বারা ইহা তাহাদিগের প্রদাহ, স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব উপস্থিত করে ।

লক্ষণ ।

পুংজননেত্রিয় :—মলদ্বার হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা । অণ্ডকোষ উর্দ্ধে আকৃষ্ট, স্ফীত এবং বেদনাবুক্ত । অণ্ডকোষ, বিশেষতঃ উপকোষ স্পর্শে তীব্র বেদনাবুক্ত । অণ্ডকোষ নিষ্পেষিতবৎ বেদনা সহ পর্যায়ক্রমিক আকৃষ্টতা । অণ্ডকোষের, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডকোষের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব সহ প্রচণ্ড আকৃষ্টবৎ বেদনা উদয়

এবং উর্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত । দক্ষিণ অণ্ডকোষে খোঁচা ও সূচিবোধবৎ বেদনা । অণ্ডকোষবেষ্টককে চুলকনা এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে তাপ ।

গ্রাবা ও পৃষ্ঠ :—প্রত্যুষে শয্যায় থাকিতে অথবা গাত্ৰোত্থান করিলে গ্রীবাংশচাতে রসবাতিক বেদনা এবং কাঠিঞ্জ । কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনার রজনীতে ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি । পৃষ্ঠে মোচড়লাগার ত্রায় অথবা বক্র হইয়া বসিয়া থাকার ত্রায় বা অনেকক্ষণ পৃষ্ঠ চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকার ত্রায় বেদনা । উপবেশনাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার শরীর-চালনায় হ্রাস এবং নত করায় বৃদ্ধি ।

অঙ্ঘ্রাদি :—সমুদয় অঙ্ঘ্রেই রসবাতিক, আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার ত্রায় বেদনার বিশ্রামে এবং ঝটিকা ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি । সন্ধিতে মোচড় লাগার ত্রায় বেদনা এবং ছিন্ন ও আকৃষ্টবৎ বেদনাও হয় । অধিকাংশ সময়ে প্রগণ্ড ও জঙ্ঘার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের অস্থিবেষ্টঝিল্লিতে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনার রজনীতে, বিশ্রামে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি । হস্তের তাপ ; দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলিতে চুলকনা সহ বিসর্পবৎ রক্তিমতা ।

প্রদর্শক লক্ষণ :—রডেডেণ্ডের প্রধান-প্রকৃতি এই যে সিক্ত, শীতল ও ঝটিকানুস্ক দিবসে, বিশেষতঃ ঝটিকার সমস্রাপেক্ষা তাহার অব্যবহিত পূর্বে, যখন বায়ু বিভ্রাৎপূর্ণ বা বিভ্রাৎ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তখন রোগের বৃদ্ধি হয় । বায়ুর বৈদ্যুতিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকায় ইহা ফস, নেট্ কা এবং দিলিসিয়া সহ তুলনীয় । বিশ্রামকালে রোগ-যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং শরীর চালনার অবস্থায় তাহার হ্রাস হওয়ায় ইহা রাস সহ তুলনীয় । কিন্তু রডেডেণ্ডের রোগ গভীরতর উপাদান আক্রমণ করায় ও বিভ্রাৎযুক্ত ঝটিকা সহ তাহার বৃদ্ধির সম্বন্ধ থাকায় রাস হইতে প্রভেদিত হয় ।

চিকিৎসা ।

মুষ্কপ্রদাহ, একশিরা বা অর্কাইটিস্—পুরাতন একশিরা রোগে ক্ষীত ও দড়কচড়াভাবযুক্ত অণ্ডকোষ ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং শীর্ণ হইতে থাকিলে রডডেগুণ দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। অণ্ডকোষে শেম্বিত হওয়ার অথবা ছেঁচা লাগার স্ত্যায় বেদনা ইহার প্রদর্শক লক্ষণ।

অরাম—পুরাতন একশিরা রোগে অণ্ডকোষরজ্জুতে স্নায়ুশূল হইলে এবং রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকিলে ইহা উপযোগী।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিফা—দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জুতে জালাযুক্ত ও সৃচি বেধবৎ বেদনা এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা হইলে ইহা প্রয়োগযোগ্য।

২। চিমাফিলা (Chimaphila Umbellata.) ।

ভুলনীষ ঔষধ—একন, এপিস, এপসাই, ক্যানা, স্টাট, কাস্টা, ইকুইসি।

সাধারণ ক্রিয়া এবং লক্ষণ—চিমাফিলা, মূত্রযন্ত্র আক্রমণ করায় তাহার, বিশেষতঃ মূত্রস্থালীর প্রতিশ্লামিক প্রদাহ উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত প্রদাহ জন্ত মূত্রের বর্ণের অতীব গভীরতা জন্মে এবং দুর্গন্ধ মূত্রে অধিক পরিমাণে দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মার এবং প্রচুর শ্লেষ্মার তলানির বর্তমানতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। মূত্রত্যাগ করিতে জালা হয় ও মূত্রপথ ঝলসিয়া যায় এবং মূত্রত্যাগের পূর্বে ও পরে অত্যন্ত কুহ্নন থাকে।

চিকিৎসা—উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত মূত্রক্লেচ্ছ রোগে চিমাফিলা অত্যন্ত প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মূত্র-রোধ (Retention of urine); শিশুদিগের মূত্রাস্রাত

(Suppression of urine) ; এবং মূত্ররোধকারী প্রোটোগ্রহিপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের ইহা প্রশংসিত ঔষধ ।

৩। ক্যাল্মিয়া ল্যাটিফলিয়া (Kalmia Latifolia.)

সম্ভবতঃ—ক্যাল্মিয়ার কার্ষ্যপ্রতিষেধক—একন, বেল ।

ভুলনীয় ঔষধ—একন, বেল, সিমিসি, ডিজি, হিপার সা, কেলি সল্টস, স্পাইজি, রাস্। হৃৎপিণ্ড রোগে স্পাইজিলিয়ার পর ক্যাল্মিয়া সফলপ্রদ (হেরিং) ।

সাধারণ ক্রিয়া—ক্যাল্মিয়ার প্রধান আক্রমণফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের শক্তির ও সঙ্খ্যার হ্রাস জন্মে এবং নাড়ী ধীর গতি ও দুর্বল হইয়া যায়। শ্বাস্ এবং পেশীমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া হওয়ায় ইহা শ্বাসুশূল এবং রসবাতিক বেদনা, চন্চনি, অসাড়তা ও অস্থিরতা উৎপন্ন করে। ইহার রসবাতিক বেদনার বিশেষতা এই যে তাহা সন্ধি হইতে সন্ধি অন্তরে যায়, অতি তীব্র বেদনা গুল্ফ সন্ধি অধিকতর আক্রমণ করে এবং সামান্ত চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয় ।

লক্ষণ ।

শ্বাস্—পেশীনিচয়ের দুর্বলতা । রোগী সৰ্ব্বপ্রকার শ্রমসাধা-কার্ষ্যই পরিত্যাগ করে, কষ্টে উপর তলায় যাইতে পারে । শ্বাসুশূলে দুর্বলতাই এক মাত্র সাধারণ লক্ষণ থাকে । উদরাময়ে শ্রান্তি ও শিরো-ঘূর্ণন জন্মে । হৃৎকম্প হইলে শরীরের কম্প ও লোমহর্ষণ হয় । বেদনায় দক্ষিণ বাহুর অত্যন্ত কাঠিষ্ঠ জন্মে । খোঁচার শ্বাস, ছিন্নবৎ, চাপিত করার শ্বাস অথবা নিম্নাভিমুখীন তীব্রবেধবৎ বেদনা । বেদনায় আক্রান্ত অংশে অসাড়তা জন্মে অথবা বেদনা অন্তর্হিত হইলে অসাড়তা থাকিয়া যায় ।

চক্ষু—চক্ষু সম্মুখে মিট মিট আলোকের দৃশ্য । অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ।

চক্ষুতে বেদনা, চক্ষু ঘূর্ণিত করিলে, বন্ধিত । চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে এবং চক্ষু-পুটে কাঠিত্বের অনুভূতি । চক্ষুতে স্থচিবেধবৎ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাস্তী ১—হৃৎকম্প হইলে উৎকর্ষা, শ্বাসকষ্ট এবং মুচ্ছার ভাব জন্মে । ধীরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও হৃৎপিণ্ডের খরখর কম্পভাব । হৃৎপিণ্ডদেশে রসবাতিক বেদনা । নাস্তী ধীরগতি এবং ক্ষীণ ; অনিয়মিত ; দ্রুত আঘাতকারী, কিন্তু দুর্বল ।

হৃৎপিণ্ডবিসৃদ্ধি এবং রসবাতের পর হৃৎকম্পাটের অকস্মণ্যতা অথবা ঘনীভূত অবস্থা । হৃৎপিণ্ডের রসবাত নিবন্ধন তীরবেধ ও ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ড হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া বাম অংসফলকাঙ্কি পর্য্যন্ত যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত হইতে থাকে ।

পৃষ্ঠ ১—রজনীতে শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠে বেদনা । মেরুদণ্ডে অতি-শয় তাপ ও জ্বালাগুরু ও অবিশ্রাস্ত বেদনা, কখন কখন কটিদেশে অধিকতর । শ্রোণিতে তীব্র অথবা আকুঠবৎ বেদনার শরীর চালনায় ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি । সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায় কটিতে পক্ষাঘাতিক বেদনা এবং খঞ্জতা ।

অক্ষনিচয় ।—বাম বাহুতে বেদনা । বাম বাহুতে চাপবোধ । সন্ধিনিচয় তপ্ত, লোহিত এবং স্ফীত । বক্ষণ বা হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত অঙ্গে রসবাতিক বেদনা । স্নায়ুশূলবৎ বেদনা গ্রীবা হইতে দক্ষিণ বাহু বহিয়া কনিষ্ঠা অথবা অনামিকা অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যায় ।

অঙ্গুর । শীত ও তাপের দ্বয়িত পরিবর্তনশীলতা । কম্পে শরীরের শীতলতা কখন থাকে, কখন বা থাকে না ।

চিকিৎসা ।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিফ্রা ১—শৈত্যসংস্পর্শ জনিত স্নায়ুশূলরোগে ক্যান্সিয়া উপকারী । ইহার বিদৌর্গকারী বেদনা

উর্ক চুম্বালের দস্ত পর্যাস্ত আক্রমণ করে এবং তাহা দক্ষিণপার্শ্বে অধিকতর থাকে ; মানসিক শ্রান্তি এবং উত্তেজনায় বর্দ্ধিত। ক্যালুমিসিয়া ও ক্রিস্মোজেনাটের স্নায়ুশূলে জালা থাকে ।

ভাবেঙ্কান্—ইহার গণ্ডাস্থির স্নায়ুশূলে চাপ ও আততাব থাকে এবং চাপে, চর্কণে ও শীতলবায়ুসংশ্ৰবে তাহার বৃদ্ধি হয় ।

রোগী বোধ করে যেন আক্রান্ত শরীরংশ চূর্ণবিচূর্ণ এবং সাঁড়াশির মধ্যে পিষ্ট হইয়াছে ; হাঁচিলে ও কথা বলিলে তাহার বৃদ্ধি ।

হুংরোপ বা **হাউডিজিভ**—**হাইপারট্রফি** অব **দি হাউ** বা **হুদ্রিকি**—হুংপিণ্ডবৃদ্ধিরোগে, বিশেষতঃ তাহা রসবাত ঘটত হইলে ক্যালুমিসিয়া ফলপ্রদ। ইহাতেও হৃদরোগের সাধারণ লক্ষণ, “বাম হস্তের অসাড়তা” বর্তমান থাকে। ক্যালুমিসিয়ারোগে হুংপিণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা ও অবক্রব্য যন্ত্রণা, কথকিৎ স্বাসকষ্ট, হুংকম্প, এবং আমাশয়প্রদেশ হইতে হুংপিণ্ড অভিমুখে চাপ থাকে। হুংপিণ্ডক্রিয়া অনিয়মিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক তৃতীয় অথবা চতুর্থ আঘাতের লোপ ঘটে। বক্ষঃ ভেদ করিয়া অংশফলকাহি পর্যাস্ত তীর বেঁধার স্থায় বেদনা। বক্রিষ্টি-প্রহোপ দ্বারা স্থানিক রসবাত রোপ বসাইয়া দিলে যে হুংরোপ জন্মে তাহার পক্ষে ক্যালুমিসিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ক্যালুমিসিয়ার নাড়ীস্পন্দন মস্থর হইলেও ডিজিট্যালিসের তুল্য নহে।

হাইটল্যাঙ্কার হুংপিণ্ডরোগে দক্ষিণ বাহুর চন্চনি ও অসাড়তা জন্মে, কিন্তু বাম বাহুর ঐরূপ লক্ষণে ক্যালুমিসিয়া, রাস এবং **একনাইট** প্রধান স্থান অধিকার করে।

রসবাত নিবন্ধন তরুণ হুংবেষ্টিক্সিপ্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিসরোগে তীব্র বেদনায় স্বাদাভাব উৎপন্ন করিলে ক্যালুমিসিয়া তাহার ঔষধ।

ডাং হেরিং বলেন, ছৎস্পন্দনের অতি বৃদ্ধি নিবারণে ক্যালমিয়া বিশেষ সাহায্য করে ।

রসবাতরোগ বা ব্রিউম্যাটিজম।—স্থানপরিবর্তন-শীল রসবাতরোগের ঔষধমধ্যে ক্যালমিয়া অগ্রতম। বক্ষের রসবাতরোগের, অথবা সন্ধির রসবাত বা গাউটরোগ, সম্ভবতঃ বহিঃ প্রয়োগের ঔষধ ব্যবহারে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বা বসিয়া বাইয়া ছৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে, ইহা তাহার বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ইহার ছিন্নবৎ জজ্বার বেদনায় ক্ষান্তি ও জ্বর থাকে না, কিন্তু অতিশয় দৌর্ভাগ্য থাকায় ইহাকে কলুচিকাম সহ তুলনা করা যায়। ক্যালমিয়ার বক্ষদেশের বেদনা ভীর বেঁধার ছায় নিম্নাভিমুখী হইয়া আমাশয় ও উদরে প্রবেশ করে। গ্ৰীবাংশী টাটায় এবং পৃষ্ঠ খঞ্জতা প্রাপ্ত হয়। হেরিং বলেন “ক্যালমিয়ার রসবাত শরীরের উর্দ্ধাংশ হইতে নিম্নাংশে যায়,” কিন্তু ডাং ফারিংটনের মতে নিডামের ছায় সর্ভাবস্থাতেই এই বেদনা নিম্ন হইতে উর্দ্ধগামী হয়। যাহাই হউক, ইহার রসবাতিক বেদনা হস্তের উর্দ্ধাংশে ও পদের নিম্নাংশে অধিকতর থাকে এবং নিদ্রার প্রারম্ভে তাহা বর্ধিত হয়। ক্যালমিয়ার প্রদাহিক রসবাতরোগ স্থানপরিবর্তনশীলতা বশতঃ সন্ধি হইতে সন্ধি অন্তরে যায় এবং তাহাতে প্রবল জ্বর, অসহনীয় বেদনা ও ছৎপিণ্ড আক্রমণের প্রবণতা থাকে এবং অঙ্গচালনায় বর্ধিত হয়। ছৎকপাটে সঞ্চিত পদার্থ (deposit) সম্বন্ধে ক্যালমিয়া এবং লিথিয়াম কার্বনিকাম আমাদিগের সর্ভাঙ্গগণা ঔষধ। লিডাম এবং ক্যালমিয়া ব্যতীতও রসবাতরোগে ব্রডডেঞ্জল আমাদিগের অগ্রতম উপকারী ঔষধ। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোগের ছাসবৃদ্ধি ব্রডের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ;

ব্রাসেলের ঋয় ইহারও বেদনার বিশ্রামে বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।
লিডামের ঋয় রক্তের রোগও বিশেষরূপে ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ
করে । ক্যালুমিয়াও ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে, কিন্তু লিডাম
অথবা রক্তের ঋয় তাহার কোন বিশেষ প্রভেদক নাই । ডাল-
কানারাত্ত রসবাতরোগের একটি প্রধান ঔষধ, হঠাৎ বায়ুর পরিবর্তন
ইহার বেদনার বৃদ্ধির কারণ ।

৪ । লিডাম্ (Ledum palustre)

সম্ভব—লিডাম্ যাহার কার্যের প্রতিষেধক—আল্‌কহল, এপিস,
সিংক । লিডামের কার্যের প্রতিষেধক—ক্যাম্‌ফর ।

সাধারণ ব্রিহ্মা—রসঝিল্লি শৈথলঝিল্লি ও তান্তুবোপাদন
এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লি ও ত্বক্ লিডাম্ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় উপরিউক্ত
উপাদানাদির যে প্রদাহ জন্মে, তাহা সন্ধিবাত অথবা রসবাতিক
প্রকৃতি ধারণ করে । তাহাতে স্রাবের বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব জন্মিলে উপাদানে
নিরেট পার্শ্বিববস্ত্তূপের সংস্থাপনা হয় । রুগ্ন শরীরাত্ত শীর্ণতা এবং
সম্পূর্ণ শরীরে শোধবৎ স্ফীতি জন্মে । রসবাত ও ক্ষুদ্রবাত বা গাউটরোগ
প্রবণতাবিশিষ্ট এবং অমিত-মুরাপান-ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা
উপযোগী ।

লক্ষণ ।

স্বাস্থ্য—উৎকর্ষার ভাব এবং মুচ্ছার ফিট । অঙ্গনিচয় এবং
সম্পূর্ণ শরীরে ঘুট বা আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনায়ুক্ত । অঙ্গাদি জালা
করে বলিয়া ও তাহার তাপ জন্ত শস্য্যার তাপ সহ্য হয় না,
রোগা অনাবৃত হইতে চাহে । বেদনা আক্রান্ত শরী-
রাত্ত হঠাৎ পরিবর্তন করে । বেদনার প্রকৃতি
খোঁচান ঋয়, ছিন্ন, এবং দন্দপানিবৎ ।

চক্ষু। আলোকাসহিষ্ণুতা; কণীনিকার বিস্তৃতি। জ্বালাযুক্ত ও হাজার জলস্রাব। কঞ্জাংটাইভা বা যোজক বিল্লিতে কালশিরা।

শ্রাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রের শুড়শুড়ি বশত: ফাঁপা শব্দযুক্ত, যন্ত্রণাকর এবং আক্ষেপিক কাসি; কাসির পূর্বে রোগীর শ্বাসাভাব ঘটে, পরে মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় রোগী টলিতে টলিতে চলে; দুইবারের চেঁচায় সম্পূর্ণ শ্বাস গৃহীত হয়; অপরাহ্ন ১২ টার পরে ও প্রাতঃকালে দুর্গন্ধ, পুয়বৎ অথবা রক্ত ও বুদ্ধযুক্ত রক্ত নিষ্ঠ্যত হয়।

প্রীবা ও পৃষ্ঠ।—উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোথানকালে পৃষ্ঠ এবং কটির বেদনায়ুক্ত অনমনীয়তা; অসফলকাস্ত্রিদেহেও ঐরূপ বেদনা।

উদ্ধ্বাস।—অঙ্গের রসবাতিক ও ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। বৃদ্ধাবস্থায় হস্তচালনায় অথবা কিছু ধারণে যেরূপ কম্প হয়, হস্তের তক্রূপ কম্প। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম সন্ধিতে গর্ত করার স্থায় বেদনা। হস্তাঙ্গুলির পংক্তিঅস্থি (phalanges) বেষ্ঠাবিল্লি বেদনায়ুক্ত।

নিশ্বাস।—বাম হিপসন্ধিপশ্চাতে মোচড় লাগার স্থায় বেদনায় বোধ বেন পেশীনিচয় স্থানচ্যুত; চলিতে অথবা স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। ভ্রমণকালে জাহ্নুসন্ধিতে স্ফীতি এবং টানটান ভাব ও খোঁচা লাগার স্থায় বেদনা। জাহ্নুসন্ধির কড়কড়ানি। টনটনে বেদনা ও স্ফীতি পায়ের ডিমের উর্দ্ধে বিস্তৃত ও সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত প্রাতঃকালে জংঘার কাঠিষ্ঠ। ভ্রমণকালে জাহ্নুর দুর্বলতা ও কম্প। জাহ্নুসন্ধিতে টাটানি ও ছিন্নবৎ বেদনা। গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার বা পদস্বলন হওয়ার স্থায় বেদনা, চালনায় বর্দ্ধিত। পদের এবং তাহা হইতে জাহ্নু পর্যাস্ত স্থানের স্ফীতি। পদ ভারি ও ক্লান্ত এবং অনমনীয় ও কঠিন। ভ্রমণে পদতলের বেদনায় বেন তাহা ঘৃষ্ট হইয়াছে।

পদ নিক্ষেপ করিলে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশ স্ফীত, কোমল ও ঘৃষ্টবৎ বোধ । পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সূচিবোধবৎ বেদনা ।

অঙ্গনিচয় । সন্ধির উপরে বেদনায়ুক্ত ও কঠিন গুটিকা বা নোড ও চূর্ণ কঙ্করবৎ পিণ্ডাকার পদার্থ । জাহু এবং মনিবক্সসন্ধিতে চাপযুক্ত বেদনা । ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত । রসবাত নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হইয়া উঠে যায় । রক্তনীতে শ্যায় গাত্রচালনা করিলে সমস্ত সন্ধিতে পক্ষাঘাতিক বেদনা । অঙ্গাদি অসাড় ও তাহাতে ঝিন্ঝিনি । শরীরের নানা বিধ স্থান ও সন্ধির বেদনার ওয়াইনমত্ৰপানে বৃদ্ধি ।

জ্বক্।—ত্বগুত্তেদে কীটদংশনবৎ জালা ও হল বিদ্ধবৎ বেদনা ।

চিকিৎসা ।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাতিজ্জম এবং গাউট বা ক্ষুদ্র বাত ।—রসবাত ও গাউটরোগের, বিশেষতঃ গাউটের, লিডাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য । শরীরের নিম্ন হইতে বেদনার শরীরেরোর্কে যাওয়া ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক । কলফাইলান্ এবং অত্যাচ্ছ কতিপয় ঔষধের এবং ইহারও ক্ষুদ্র সন্ধি সহ বিশেষ আকর্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় । তাহাতে গুটিকা জন্মে এবং বেদনা উজ্জগামী হয় । শ্যাতাপে বেদনার বৃদ্ধি । সন্ধিমধ্যে অল্প রসক্ষরণ হয় এবং তাহা শুষ্ক ও কঠিন হওয়ায় পূর্ব কথিত বর্ভূল (Nodosities) জন্মে । লিডাম, কলুচিকামের গ্রায়ই, সন্ধিতে প্রবল ও ছিন্নবৎ বেদনা উৎপন্ন করে ; আক্রান্ত অঙ্গের দুর্বলতা এবং উপরিভাগে শীতলতা ও অসাড়তা জন্মে । কোন প্রকার উদ্বেদ কিম্বা স্ফীতি অথবা জ্বর ব্যতীত রসবাতিক রক্তমা (Erythema Nodosum) জন্মিলে লিডাম তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে । পদের এক প্রকার কঠিন ও অদম্য স্ফীতি লিডাম দ্বারা আরোগ্য হয় । কণতঃ নিম্নলিখিত কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা এ রোগে লিডাম

পরিচিত হইয়া থাকে, যথা:—১। বেদনার উর্দ্ধগতি। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে "বর্ধূল" বা নোডের সংস্থাপনা। ৩। শয্যাভাপে রোগের বৃদ্ধি। ৪। চালনায় বেদনার বৃদ্ধি। অধিক মাত্রায় কল্‌চিকাম প্রয়োগ নিবন্ধন কুফল নষ্ট করিতে ইহা সক্ষম।

সন্ধিবাত বা আর্থ্রাইটিস্,—লিডাম্ গাউটের ঞায় নানা প্রকার সন্ধিরোগও আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাতে পদ নিক্ষেপ করিলে পদের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্ফীত হয়, টাটার এবং বেদনা করে ও তাহার আকৃষ্টবৎ বেদনা ভাপে, চাপে ও চালনায় বর্দ্ধিত হয়। ব্রাহ্মনিহ্না সহ ইহার প্রভেদ এই যে তাহাতে সন্ধি অভ্যন্তরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর রসক্ষরণ হয়; হিপ্‌সন্ধির তাপযুক্ত স্ফীতিতে ইহা ব্রাহ্মনি অপেক্ষা অধিকতর উপকারী। লিডাম্‌এর সর্বপ্রকার বেদনারই উর্দ্ধদিকে গতি। পূর্বে বলা হইয়াছে ইহা কল্‌চিল্ল কুফল নষ্টকারী। এজন্ত এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীর প্রথম হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লিডাম্ হওয়া সঙ্গত, কেননা এলপ্যাথগণ কল্‌চিল্ল বহুল ব্যবহার করাই সম্ভব। ইহা স্মরণীয় যে, শীতলতা সহ লিডাম্‌এর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কেননা ইহার সর্ববিধ রোগলক্ষণ-সহই শীতলতা বর্তমান থাকে; গুল্‌লেইহ্না-কামেও সন্ধিতে বর্ধূল জন্মে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গদীমায় ছিন্নবৎ বেদনা এবং পেশীর সংকোচন হয়। জাল্‌সন্ধিতে গাউট প্রকৃতির প্রদাহেও ইহা উপকারী।

মাস্তকপ্রদাহ (শিবানুগু, স্নেহস্রাবী ঝিল্লিপ্রদাহ।) বা সাইনভাইটিস্—অভিঘাত বশত: তরুণ সাইনভাইটিস্‌ রোগে সন্ধিঅভ্যন্তরে রসক্ষরণ হইলে লিডাম্ প্রযুক্ত হয়; আক্রান্ত শরীরংশ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে, তাহাতে কনকনানি ও ছিন্নবৎ বেদনা হয়, কিন্তু জ্বর প্রায় থাকে না। নাতিপ্রবল জাল্‌সন্ধিরোগের ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

কলুচিকাম—চাপে স্পষ্টতর স্থিতিস্থাপক-কোমলতা (Fluctuation) বিশিষ্ট এবং জড় প্রকৃতির সন্ধিস্থিতিতে ইহা উপকারী। সন্ধির কাঠি জন্মে এবং সন্ধিতে জনশোথ (Hydrarthrosis) প্রবণতা থাকে।

রক্তশ্রাব বা হিমরেজ।—জরায়ুর বহুপদার্থ দ বা পলিপাস হইতে রক্তশ্রাব হইলে লিডাম উপকারী। এস্থলে ইহা ভিক্সা মাইনর ও ফস্ সহ তুলনীয়। মণ্ডপায়ী এবং রসবাতধাতুগুস্ত ব্যক্তিদিগের রক্তকাসিতে উজ্জল লোহিত ও সফেন রক্ত নিষ্ঠূত হইলে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। মণ্ডপায়ীর রোগে ওশিফ্রাম ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ।

আম্বাতজ রোগ বা ইঞ্জুরিজ।—স্বস্মাগ্র, অঙ্গবিদ্ধ ক্ষত এবং কোষময় ঝিল্লিহীন শরীরাংশের ক্ষত আরোগ্যে লিডাম উপযোগী। বৃহজ্জাতীয় মশা (Mosquito) এবং অগ্নাচ্ছ কীটপতঙ্গের দংশন ও স্থলবেধ বশতঃ পীড়ার উপশমেও ইহা উপকারী। আর্নি, ক্যালেন্ডুলা, ষ্ট্যান্ডিসেপ্রিয়া এবং হাইপিরিকাম্ প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার অল্পযোগী স্থলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন ছেঁচালাগা ক্ষতে আর্নি, ছিন্ন ক্ষতে হাইপিরিকাম্ এবং ক্যালেন্ডু, ছুরিকাদি ধারাল অস্ত্রের কর্তনে ষ্ট্যান্ডিসেপ্রিয়া, তজ্জপ সড়কি, পেরেক প্রভৃতি স্বস্মাগ্র অস্ত্রের বেধা জগ্ন ক্ষতে লিডাম দ্বারা প্রকৃষ্টতর উপকার হয়। ক্ষুরের ক্ষত এবং তজ্জগ্ন সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। জরের তাপকালেও শীতলতার বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক হইতে পারে। সূচির খোঁচা ও নেকড়ে ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুর দংশন নিবন্ধন কঠিন বিষাক্ত ক্ষত ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ডাং গ্রাস বলেন—“মুঠ্যাঘাত জগ্ন চক্ষুর কালশিরা “ব্ল্যাক আই” আরোগ্যে কোন ঔষধই লিডাম ২০০র সমকক্ষ নহে।”

লেকচার ৮২ (LECTURE LXXXII.)

উফর্কিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধশ্রেণী ।

১। ক্রোটন । ২। উফর্কিয়াম রেজনিফেরা ।

৩। উফর্কিয়া করলেটা । ৪। ষ্টিলিজিয়া ।

৫। এক্যালিফা ইণ্ডিকা ।

১। ক্রোটন টিগলিয়াম (Croton Tiglium) ।

সম্বন্ধ—ক্রোটন কার্যপ্রতিষেধ করে—রাস বিযক্রিয়ার ।

সাধারণ ক্রিয়া—ক্রোটনের সর্বপ্রধান ক্রিয়া অল্পপথে ও ত্বকে লক্ষিত হইয়া থাকে । অল্পপথ হইতে প্রভূত রক্তাধু নিঃসারণ দ্বারা ইহা প্রচুর, জলবৎ উদরাময় এবং ত্বকে ইহা সুস্পষ্ট পামা বা এক্জিমার উদ্ভেদবৎ উদ্ভেদ উৎপন্ন করে ।

উদ্ভেদ, বিষ্টা এবং মলদ্বার—পূর্ণ এবং ক্ষীত উদরের নাভির চতুর্পার্শ্বে কামড়ানি বেদনা । উদরে অস্বস্তিপ্রদ শূন্যতা ও অতি ক্ষুধাবোধ ; উদরের ডাক । অল্পে, বিশেষতঃ উদরের বাম পার্শ্বে, গড়গড় করায় বোধ যেন অল্পে কেবলই জল রহিয়াছে । অল্পমধ্যে জলপতনবৎ শব্দ । অনেক বায়ু সহ হঠাৎ বিষ্ঠার নিঃসরণ । নাভিতে চাপ দিলে নিম্নে মলদ্বার পর্য্যন্ত একরূপ বেদনার অনুভব এবং মলদ্বারে একরূপ অবিশ্রান্ত বহিরাভিমুখীন চাপ । অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকার পরে দুর্গন্ধ ও মলিন সবুজ বর্ণের লেইর ন্যায় মল হঠাৎ বেগের সহিত সরলান্ত্র হইতে দূরে নিষ্কিপ্ত হয় ; অতিশয় পাতলা ও ঈষৎ হরিদ্রাভ বিষ্ঠা বেগে নির্গত । বেদনাহীন জলবৎ উদরাময় ।

স্ত্রীজন্মনেন্দ্রিয়।—কঠিন এবং স্ফীত স্তনাগ্রবেদনা অংশ-ফলকাস্থিতে যায়। স্তনাগ্র স্পর্শে টাটানিযুক্ত স্তনদানকালে স্তনাগ্র ভেদ করিয়া যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা ঐ পার্শ্বেরই অসংফলকাস্থিতে যায়।

হৃৎক।—অণ্ডকোষবেষ্টের বাম পার্শ্বের বিপরীত উরুতে স্পর্শে ও ভ্রমণে বেদনা ও টাটানিযুক্ত, লোহিত বর্ণ এবং সিক্ত ত্বকস্থান হইতে হৃৎক রসের নিঃসরণ। রক্তিমাবিশিষ্ট ত্বকে চুলকনা ও বেদনায়ুক্ত জ্বালা এবং রসবিদ্বিকা ও পুয়গুটিকা জন্মে; পুয়গুটিকা শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহা হইতে উপত্বকস্থলন হয়। কণ্ডুযুক্ত পুয়গুটিকা।

চিকিৎসা।

উদরাময়; **উদরশূল**।—হোমিওপ্যাথি মতে ক্রোটিন উদরাময়ের সজোফনপ্রদ এবং প্রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধমধ্যে গণ্য। ঈষৎ পীতবর্ণ জলবৎ মল কলের মুখ হইতে সবেগে দূরে নিষ্কিপ্ত হওয়ার স্থান সরলান্ত্র হইতে দূরে নিষ্ক্রেপ হওয়া, ইহার বিশেষ প্রকারের উপসর্গ স্বরূপ বিবমিস্রা ও বমনের বর্তমানতা এবং আহারে ও পান্যান্তেই মল-ত্যাগের স্বন্ধি, এ রোগে ক্রোটিনের প্রদর্শক। উদরশূল বর্তমান থাকিলে তাহা কলসির উদরশূল সহ তুলনীয়। উদরাময়ে ইহার প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে হইলে নিত্য প্রয়োজনীয় অস্তান্ত কতিপয় ঔষধ সহ ইহার তুলনা করা আবশ্যিক। তাহাতে প্রথমেই ইলেন্টেরি আমাদিগের স্মরণপথারুঢ় হয়। এই ঔষধের বৃদ্ধয়ুক্ত প্রচুর অতি-সারের বিষ্ঠা অতি বেগের সহিত নির্গত হয় এবং তাহার পূর্বে উদরে কঠনবৎ বেদনা, শীতভাব, অন্ত্যস্ত দুর্বলতা ও উদরশূল উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উদরাময় সর্বদাই বেগে নিঃসরণশীল এবং কখন

কখন জলপাইর বর্ণের ছায় সবুজ। দ্বিতীয় ঔষধ প্র্যাতিহ্যালার বেগে নিঃসরণশীল জলবৎ উদরাময়ের বিষ্ঠা কলের মুখ হইতে জল পড়ার ছায় সরলান্ন হইতে হড়হড় করিয়া পড়ে, বিষ্ঠা পীতাভসবুজ ও বৃদবৃদযুক্ত থাকে এবং আনুঘঙ্গিকরূপে উদরমধ্যে শৈত্যের অনুভূতি জন্মে। তৃতীয় জল্যাট্রিকার জলবৎ উদরাময়ে জলবৎ বিষ্ঠা ও প্রভূত বায়ু বেগে নিঃসরণ হয় এবং তাহার সহিত উদর ক্ষীতি এবং দুর্বলতা থাকে। চতুর্থ স্থানীয় প্যাশ্চোজ্জবিষ্ঠা বেগের সহিত এককালীন বা এক দমে নিঃসরণ হওয়ার পরে রোগীর কষ্টের বিলক্ষণ উপশম বোধ হয়। বিষ্ঠা পাতলা ও জলবৎ।

সংক্ষেপতঃ পীতবর্ণ জলবৎ বিষ্ঠা হঠাৎ দূরে নিষ্কিপ্ত হওয়া এবং আহারে ও পানে রোগের বৃদ্ধি ক্রোটনের; উদরে কর্তনবৎ বেদনা, শীতের অনুভূতি এবং দুর্বলতা ও উদরশূল হওয়ার পর বৃদ-বৃদযুক্ত ও প্রভূত তরল বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণ ইন্লেটের; পীতাভ-সবুজ, জলবৎ ও বৃদবৃদযুক্ত বিষ্ঠা যেন কলের মুখ হইতে বেগে ত্যাগ হওয়া, উদর মধ্যে শীতল বোধ এবং অত্যধিক পরিমাণ, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলপান রোগের কারণরূপে বর্তমান থাকা প্র্যাতিহ্যালার; অতি বেগবান্ জলশ্রোতের ছায় মলনিঃসরণ, জলবৎ ও শেত লালার ছায় প্রভূত পরিমাণ জলবৎ বমন এবং বোতল হইতে উদর মধ্যে জল ঢালার ন্যায় শব্দ জল্যাট্রিকার; এবং কথকিং প্রলম্বিত একমাত্র চেষ্টায় এক যোগে সম্পূর্ণ বিষ্ঠার নিঃসরণ এবং নিঃসরণের পরে উদর হইতে কোন কষ্টদায়ক বস্তু বহিনিষ্কাশ হইয়া যাওয়ার অনুভূতি প্যাশ্চোজ্জের প্রদর্শক।

ছকরোগ-কাউর, পামা বা একজিমা; ছক্কাপীড়কা বা মিলুকক্রাষ্টস্—লোহিত বর্ণ বৃক্কিমির উপরি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা উৎপন্ন হইলে ও তাহাতে ভয়ঙ্কর

চুলকনা থাকিলে ক্রোতিন দ্বারা উপকার হয়। এই সকল উদ্ভেদ অণুকোষবেষ্ট ত্বক ও উরুমধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন হইলে মূত্রসম্বন্ধীয় কষ্ট থাকে। ক্রোতিনের রসবিষিকার কোন কোনটি রুহদায়তন হয়। অপরগুলি গলিয়া যাওয়ায় ত্বকস্থান লোহিতবর্ণ ও আর্দ্র থাকিয়া যায়। ক্কাচিং রসবিষিকা পুয়ণ্ডটিকায় পরিণত হইলে অবশেষে তাহাতে ধূসরবর্ণ মামড়ি জন্মে। ক্রোতিন সদৃশ উদরাময় বর্তমান থাকিলে ঈষৎ পীত মামড়িবুক্ত হৃৎকপীড়কা ইহা আরোগ্য করিতে পারে।

উফর্কিয়াম রেজিনিফেরা ।

(Euphorbium Resinifera)

সাধারণ ক্রিয়া—ইহার সমক্রিয় ক্রোতিন ও জ্যাট্রফা প্রভৃতি প্রভূত অতিসারোৎপাদক বস্তুর ছায় উফর্কিয়াম রেজিনিফেরাও পরিপাকপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বমন ও বিরেচনাদি যাবতীয় কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে প্রবল উন্মাদলক্ষণ উপস্থিত হয়। ডাং হেম্পেলের মতে আমাশয় ও অস্ত্রের যতই উত্তেজনা থাকুক না কেন উপরি উক্ত প্রকৃতির মস্তিষ্ক লক্ষণ এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অথবা উত্তেজনার অভাবে ইহা রোগ-চিকিৎসায় ফলপ্রদ হয় না। ইহা শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে প্রবল উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং ত্বকে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে হাম, বসন্তাদি এবং বিসর্পিকাবৎ উত্তেদ জন্মে।

লক্ষণ ।

অন্য—বিষাদবায়ু; উৎকর্ষা; আশঙ্কা। মস্তিষ্কে প্রচণ্ড রক্তাধিক্য বশতঃ প্রবল উন্মাদবৎ লক্ষণ উৎপন্ন হয় :এবং নাড়ী অনিয়মিত ও দ্রুত থাকে।

নাসিকাাদি শ্বাসযন্ত্র :-পুনঃ পুনঃ হাঁচি ; শ্বাসযুক্ত নাসিকা-

সর্দি । কণ্ঠা অথবা বক্ষের শুড়শুড়ি জন্ত হক্ হক্ করিয়া গুঙ্ক কাসি ।
কষ্টকর শ্বাসগ্রন্থাস । বক্ষের বাম পাশ্বে সৃচিবোধবৎ বেদনা ।

মুখপাহুবরাদি পরিণামকবন্ত্র ;—শুত্গর্ভ দস্তে যেন জ্রু
বসানের ও ঝাঁকির ছায় বেদনায় তাহা উৎপাটিত হওয়ার অন্তুভূতি ।
শীতল জলের তৃষ্ণা । উদগার ; পুনঃ পুনঃ হিক্কা । বিবমিষা ও
বমন । আমাশয়ে জ্বালা । আমাশয়ে আক্ষেপিক সংকোচন এবং
কামড়ানি । উদর বসিয়া যায় । পেট ডাকিলে বায়ুনিঃসরণ । বায়ু
কর্ভুক প্রচণ্ড ও আক্ষেপিক উদরশূল । প্রচুর উদরাময় ও বমন ।
বিষ্ঠা প্রচুর, উদরানয়ের ছায়, আনরক্তরোগের ছায়, উচ্ছলিত এবং
পাতলা ও জলবৎ ; বিষ্ঠা লেইর ছায়, ঈষৎ পীত এবং কর্দমাকার ।

স্রব্ধ ;—বিসর্পবৎ প্রদাহ ; বৃহৎ ফোকা ঈষৎ পীত রসপূর্ণ ।
ত্বক ও তদধঃকোষময় বিল্লির প্রচণ্ড প্রদাহ । ত্বকে পুয়গুটিকা ও পামা
প্রভৃতির ছায় উদ্ভেদ ; তাহাতে পচাক্ত বা গ্যাংগ্রিণ । জালাবুক্ত চুল-
কনা হইতে নিঃসৃত রসে ত্বক খাইয়া যায় ।

চিকিৎসা ;—আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ ; অতি-
সার ও অব্যাপিক (Sporadic) কলেরা প্রভৃতি রোগে
উপসর্গ স্বরূপ মস্তিস্কের উত্তেজনা ও প্রবল রক্তা-
ধিক্য, এবং প্রচণ্ড প্রলাপ ও উন্মাদবৎ লক্ষণ বর্তমান
থাকিলে উর্ফিঁয়াম দ্বারা তাহার উপকার হয় । দেশ-
ব্যাপী সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জারোগে অত্যন্ত হাঁচি, চক্ষুর
জলস্রাব, হাজাকর নাসিকাস্রাব এবং হক্ হক্ শব্দের কাসি হইলে ইহা
তাহার ঔষধ । পূর্বেবিত লক্ষণযুক্ত দন্তশূল ইহা আরোগ্য করি-
য়াছে । গণস্থলের বিসর্পরোগে রসবিশ্লিকা জন্মিলে
ও অত্যন্ত জ্বরতাপ থাকিলে তাহার পক্ষে ইহা উপকারী
বলিয়া কথকিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে । পুষ্কশোথ, বিসর্প-

জাতীয় প্রদাহ, পুরাতন ও জড়ভাবাপন্ন স্ক্রুত এবং পচাস্ক্রুত বা গ্যাংগ্রিনেও ইহা কার্যকারী। কক্কট বা ক্যান্সাররোগে ইহার বহিঃপ্রয়োগ উপকারী। কথিত আছে ইহা বিশেষ প্রকারের এপিথিমিলিয়োসা বা কক্কটরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছে।

৩। উফর্বিয়া করুলেটা (*Euphorbia Corolata*)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং লক্ষণ :—উফর্বিয়া করুলেটা প্রধানতঃ পরিপাক যন্ত্রের শৈথিল্যবিশিষ্ট এবং ত্বকেও নানাদিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রথমে ভুক্ত বস্তু এবং আমাশয়স্থ অগ্নি বস্তু, পরে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মামিশ্রিত জল এবং কলেরার বিষ্ঠার ত্রায় পরিষ্কার (তত্ত্বল ধৌত) জলের ত্রায় পদার্থের প্রবল বমন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অল্প সময় ব্যবধানবিশিষ্ট পর্যায়ক্রমিক প্রভূত উদরাময় ও বমন হইয়া থাকে ; তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণস্বরূপ অল্প বেদনায়ুক্ত আক্ষেপ, প্রভূত উৎকর্ষা এবং মূত্রার অনুভূতিপ্রযুক্ত মুচ্ছা ও দৌর্বল্যের ভার উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা :—উপরি উক্ত লক্ষণ থাকায় উফর্বিয়া অব্যাপক বা স্থানিক ও ব্যক্তিবিশেষের কলেব্রা, বিশেষতঃ শিশু-কলেব্রা আরোগ্য করিয়াছে। ইহা আমাশয়ে খামচানির অনুভূতি এবং শীতল ঘণ্ডযুক্ত ও মূত্বাকল্প বমনোদ্বেগ, এবং বমন আরোগ্য করে। ঈষৎ নীলাভ স্ক্রুত শেখাবস্থায় কাল অথবা পচাস্ক্রুতে পরিণত হইলে লক্ষণানুসারে তাহার উফর্বিয়া করুলেটা, আর্স, সিলিক, সিলিক, প্লাস্ম, এবং কার্ব ভে প্রভৃতির অগ্নতম দ্বারা উপকার হয়।

৪। ষ্টিলিজিয়া সিল্ভ্যাটিকা (*Stilingia Sylvatica*)।

উপচয় :—অপরাহ্নকালে ; সিক্ত বায়ুতে ; শরীর চালনায়।

সাধারণ ক্রিয়া :—অস্থিবেষ্টিক্রিয়া এবং তাণ্ডবোপাদান ষ্টিলি-

জিয়া দ্বারা অতি গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় যে বেদনায়ুক্ত কঠিন গুটিকা (Node), অস্থিবেদনা এবং রসবাত লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা পুরাতন উপদংশ এবং রসবাত সংক্রমণ লক্ষণসহ তুলা এবং এই উভয় প্রকার রোগে ইহা উপকার প্রদান করিয়াছে । স্বরযন্ত্রের উপস্থিতি এবং শ্বাসনালীর শৈথিল্যবিল্লিতেও ইহার ক্রিয়া আছে এবং তৎ ফল স্বরূপ ইহা স্বরযন্ত্র এবং বায়ুনালীর উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করে । ইহা লসীকাগ্রস্থি আক্রমণ করিলে তাহার আকার এবং শ্রাব বর্ধিত হয় ও শ্রাবের গুণের কলুবতা জন্মে । স্বক কাউরবৎ উদ্ভেদযুক্ত হয় এবং তাহাতে যে ক্ষত জন্মে তাহা হইতে প্রভূত শ্রাব নির্গত হয় ।

লক্ষণ ।

শ্বাস্মাঃ—শারীরিক অস্বস্তির ভাব ; নিদ্রালুতা ; সাধারণ কষ্টানুভূতি । শ্বাস্মূল ।

শ্বাস্মশব্দঃ—স্বরযন্ত্রপ্রদেশের সংকোচনে গলগন্ধ্বরে ছল বেধবৎ বেদনা ও জ্বালা । শ্বাসনালীর শুষ্কতা জন্ম সন্ধ্যার প্রাকালে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি । বোধ যেন শ্বাসনালীর উপস্থিতে অকস্মণ্যতার অনুভূতি হইতেছে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, হৃৎ হৃৎ শব্দবিশিষ্ট, গভীর, সরল এবং আক্ষেপিক কাসি ।

শ্বাস্মশব্দঃ—কিডনিপ্রদেশে কঠিন ও অগুরু বেদনা । আমূল মূত্রনালীতে প্রচণ্ড ও তীব্র চন্টনি সহ জ্বালাময় এবং জ্বালাকর বেদনার মূত্রত্যাগে বৃদ্ধি, মূত্র-ত্যাগ কঠিন হইয়া পড়ে এবং কিডনিতে মূত্র বেদনা উপস্থিত হয় ; মূত্রনালীর বেদনা এতাদৃশ কঠিন যে, তাহাতে রোগীর ঘর্ষ বাহির হইয়া পড়ে ।

শ্বাস্মশব্দঃ—সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ কনুইসন্ধিতে এবং দক্ষিণ জজ্বায় কনকনানি এবং দপদপানি প্রকৃতির বেদনা ও টাটানি । হস্তে হস্তাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তারশীল তীব্র তীব্রবেধবৎ বেদনা । প্রগণ্ডের

উপরিভাগে এবং আভ্যন্তরীণ একতৃতীয়াংশে তীরবেধবৎ বদনা । হিপু বা বজ্জনসন্ধি, জজ্বা এবং পদে ও অধিকাংশরূপে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে কনুকনানি বেদনা । জানুসন্ধি নিম্নস্থ জজ্বায় জালা ও চুলকনা । অঙ্গাদিতে উদ্ভেদ, ক্ষত এবং অস্থিবেষ্টিকালি হইতে প্রবর্দ্ধন ।

চিকিৎসা ।—দ্বিতীয়াবস্থায় বা সেকেণ্ডারি উপদংশ জনিত দীর্ঘস্থির রোগের চিকিৎসায় ষ্ট্রিলিঞ্জিফ্লয়া সিন্ভ্যাটিকা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । ইহার বেদনা রক্তনীতে এবং সিন্ধু দিবসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । লক্ষণগত গাদ্গ্ৰানুসারে সেকেণ্ডারি সিফিলিস বা দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশ এবং তৎফল স্বরূপ অস্থিবেষ্টের উপদংশ রসবাত, অস্থিগটিকা বা মোড়, পুরাতন রসবাত, উপদংশরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের গুর্কসী বা সাইন্যাটিকা, স্নরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্, বিশেষতঃ তাহা যদি উপদংশ দোষসংস্থ হইয়, পারদ মাটিত অস্থিবেষ্টপ্রদাহ এবং পুয়মেহ প্রভৃতি রোগ ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম ।

৪ । এক্যালিফা ইণ্ডিকা (Acalypha Indica) ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ এবং চিকিৎসা ।—শ্বাস-যন্ত্রই এক্যালিফার ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষণ । এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ শুষ্ক কাসি হইলে তাহাতে শোণিত নিষ্চ্যুত হয় এবং তাহাই ইহার একমাত্র প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ।

ডাং আর্থার ক্রিফোর্ডের মতে রক্তকাসি বা ফুসফুসের রক্তস্রাবে কোন ঔষধই এক্যালিফা সহ তুলনীয় নহে ; শুষ্ক কাসির আক্রমণের পরে বেগে রক্ত নিষ্চ্যুত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহে এবং রক্ত উজ্জ্বল থাকে । ডাং হেলের মতে প্রাতঃকালে পরিষ্কার এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্ত নিষ্চ্যুত হইলে ইহা উপকারী ।

লেকচার ৮৩ (LECTURE LXXXIII.)

ক্যাপ্রিফলিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধ ।

১। স্যাম্বুকাস । ২। ভাইবার্গাম্ অপুলাস্ ।

১। স্যাম্বুকাস নাইগ্রা (Sambucus Nigra)

উপভোগ :—বিশ্রামকালে । **উপশাসন** :—শরীর চালনায় ; শয্যা হইতে উত্থান করিয়া উপবেশন করিতে ।

সম্বন্ধ :—স্যাম্বুকাসের কার্যপ্রতিষেধক—আর্স, ক্যাম্ফর । স্যাম্বুকাস্ যাহার কার্যপ্রতিষেধক—আর্সেনিকের অপব্যবহারের । স্যাম্বুকাস্ যাহার পরে সফলপ্রদ—ওপিথামের ।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া :—স্যাম্বুকাস বিশেষরূপে শৈল্পিক ঝিল্লি, শ্বাস-যন্ত্র এবং ত্বকে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে শ্বাসযন্ত্রে অবরোধক প্রতিশ্রায় এবং ত্বকে প্রচুর এবং দুর্বলকর ঘর্ম উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ :—শ্বাসযন্ত্র-ক্রিয়াতে স্বরযন্ত্রে অনেক আর্টা ও গঁদের শ্রায় শ্লেষ্মা জন্মিলে স্বরভঙ্গ । আমাশয়ের চাপ, বিবিধা ও দুর্বলতা জন্ম বক্ষের কষ্ট । বাম বক্ষের স্তনাগ্রনিম্নে কষ্ট ও সূচিবোধবৎ বেদনা । মধ্য রজনীর পর শ্বাসরোধের আক্রমণ হইলে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় রোগী উপবেশন করে, নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং খাবিখাওয়ার শ্রায় শ্বাসপ্রশ্বাস হয় । শিশুদিগের ঘন ঘন শাঁই শাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস ও শ্বাসরোধকর কাসি হওয়ায় তাহারা ক্রন্দন করিতে থাকে । স্যাম্বুকাসের মূত্রযন্ত্রক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা হইলে প্রচুর মূত্র-ত্যাগ হয় । মূত্রের অধঃদেশে গুরু তলানি পড়ে ।

চিকিৎসা।—শ্বাসযন্ত্ররোগই স্ফ্রাস্মুকাসের প্রধান কার্য-স্থল। ইহার প্রকৃতিবিশিষ্ট শ্বাসরোধক কাসির মধ্য রক্তনীর পরে এবং মস্তক নত অবস্থায় রক্ষা করিয়া শয়নে বৃদ্ধি। উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত স্ফ্রাস্মুকাসপ্রদাহরোগে আক্ষেপ হইলে স্ফ্রাস্মুকাস উপকারী। কিন্তু রোগে স্ফ্রাস্মুকাসের জলশোথ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ, এমন কি শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে এপিসেমের প্রয়োজনীয়তা জন্মে। ফলতঃ স্বরযন্ত্রে শোথ জন্ম সাংঘাতিক শ্বাসরোধের ক্লোরিণ একমাত্র অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। স্ফ্রাস্মুকাসের সক্ষমারোগে স্বরভঙ্গ, চিমে শ্লেষ্মাস্রাব এবং রক্তনীর শেষভাগে কাসির আক্রমণ থাকিলে ড্রসেরা তাহার ঔষধ। কাসির প্রকৃতি এবং তাহার বৃদ্ধির কাল উপরি লিখিত রূপ থাকিলে ক্রুপ বা স্মুত্রী কাসি ও স্পর্শকক কাসি প্রভৃতি নানাবিধ শ্বাসযন্ত্ররোগে এবং বিশেষ প্রকৃতির মূত্র ও ঘর্ম থাকিলে কিডনি বা বৃক্কের তরুণ প্রদাহ ঘটিত জ্বলশোথ বা ড্রুপসিরোগে স্ফ্রাস্মুকাস ফলপ্রদ।

২। ভাইবার্গাম্ অপুলাস (Viburnum Opulus.)

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে ও রক্তনীতে; উষ্ণ গৃহে; আক্রমণ বাম পার্শ্বে অধিকতর। উপশমন।—মুক্ত বায়ুতে; গাত্র চালনায়; চাপিত করিলে।

সাম্ভারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুগুণ দ্বারা স্ত্রীজননেত্রিয়ে ভাইবার্গাম গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করিলে জরায়ুতে শোণিত সঞ্চয় বশতঃ, অথবা তাহার স্নায়ুশূল জন্ম রক্তকৃচ্ছ বৎ অবস্থা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।—ঋতুস্রাবকালে শিরঃশূল এবং পুনঃপুনঃ প্রচুর ও পরিষ্কার মূত্রত্যাগান্তেও রোগীর বোধ হয় যেন মূত্রশ্রোত বহিতেছে।

ঋতুস্রাবের পূর্বে জরায়ুতে কঠিন ঠেলমারাবেদনা, উরুর সমুখের পেশীতে আকৃষ্টতা ও কটিদেশে এবং জ্বীজননেঞ্জিয়ের কেশযুক্ত স্থানের উর্দ্ধে কনকনানি ; অগ্নাধারে কখন কখন তীর বেঁধার ছায় তীর বেদনা ; বেদনার জন্ত রোগিণী এতদূর উত্তেজিত হয় যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ; নিম্নোদরে এবং জরায়ু ভেদ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাকর, খল্লীবৎ এবং উদরশূলের ছায় বেদনা ; বেদনা পৃষ্ঠে আরম্ভ হইলে পৃষ্ঠ বেড়িয়া যায় ও জরায়ুতে খল্লী হইয়া শেষ হয় ; মক্ষার প্রথম ভাগে এবং শুষ্ক গৃহে বেদনার বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে এবং শরীর চালনাকালে হ্রাস ।

ঋতুস্রাবকালে বিবিধিবা । খল্লীবৎ বেদনা এবং অত্যন্ত স্নায়বিক অস্থিরতা ; বোধ যেন প্রাণবায়ু শরীর পরিত্যাগ করিবে ও হৃৎস্পন্দনের রোধ ঘটিবে ; বেদনায় বোধ যেন পৃষ্ঠ ভগ্ন হইবে ; ঋতুস্রাব অনেক সময় বন্ধ থাকে ও চাপের আকারে পুনরারম্ভ হয় ; অত্যন্ত, পাতলা এবং সাদাটে ঋতুস্রাব হইলে মস্তক শূন্য বোধ । উপবেশন করিবার চেষ্টা করিলে মূচ্ছা । বস্ত্রবস্ত্রে রক্তাধিক্য হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে বোধ যেন ঋতুস্রাব উপস্থিত হইবে । শ্বেতপ্রদর সাধারণতঃ পাতলা, পীতশুভ্র অথবা বর্ণহীন, মলত্যাগকালে নিঃসৃত হইলে ঘন, শুভ্র এবং শোণিত-রেখাযুক্ত ।

চিকিৎসা ।

রক্তপ্ৰস্রব্ধ, বাধকবেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া ।—
ভাইবার্ণামের রোগে ঋতুস্রাবের পূর্বে হঠাৎ জরায়ুপ্রদেশে বেদনা এবং ঋতুস্রাবকালে পৃষ্ঠ বেদনা হয় । স্নায়ুশূলঘটিত এবং আক্ষেপিক বাধকবেদনায় ইহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, একজন্ত চিকিৎসকদিগের মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য । ডাং হেল উপরি উক্ত রক্তপ্ৰস্রব্ধরোগে ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন ।

আক্ষৈপিক প্রকৃতির বেদনাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। গুল্মবায়ুর রোগীর আক্ষৈপিক মূত্রকৃচ্ছ, জন্মিলেও ইহা ফলপ্রদ।

কটিতে এবং কটিসম্মুখে ঠেলমারা এবং কনকনানি বেদনা, আমাশয়ঃপ্রদেশে যন্ত্রণাপ্রদ, খল্লীবৎ এবং উদরশূলের স্থায় বেদনা, অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রাধারে তীরবেধবৎ বেদনার আক্রমণ, এ রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত।

সিপিহ্নার স্থায় ভাইবার্ণামের বেদনাও বস্তিদেপ বেড়িয়া যায়, ইহাতেও আমাশয়ে শূত্র ও খালি খালি বোধ আছে, কিন্তু ইহার ঠেলমারা অধিকতর প্রচণ্ডতায়ুক্ত, এবং তাহার চরম বৃদ্ধিতে জরায়ুর তীব্র খল্লী হইয়া থাকে। রোগচিকিৎসায় বৃদ্ধশিতাই ইহার প্রয়োগ-সম্বন্ধে প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানিতে হইবে।

গর্ভপাত বা মিস্ক্যারেন্জ্—গর্ভস্রাবের উপক্রমে যদি বেদনা পৃষ্ঠ বেড়িয়া ও নিম্নোদর ভেদ করিয়া উরুমধ্যে যায় তাহাতে ভাইবার্ণাম অনেক সময়েই বেদনা নিবারণ করিয়া গর্ভস্রাবের রোধ করে। বাহাদিগের অন্তঃসত্ত্বার প্রথমাবস্থায় পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয় ইহা তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিপিহ্না—রোগিণীর উত্তেজনাপ্রবণ প্রকৃতি, স্ত্রীজননেক্রিয়োপাদানের শিথিলতা এবং মলদ্বারে গুরুত্বের অনুভূতি থাকিলে গর্ভপাত নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

বেনেডনা—গর্ভপাতের উপক্রমে প্রচুর, উজ্জল ও উষ্ণ রক্তস্রাব, পৃষ্ঠবেদনা, শিরঃশূল, শরীরের প্রচণ্ড কনকনানি এবং এই ঔষধিতে জরায়ুর যে, বিশেষ প্রকারের কুহন, তাহার বর্তমানতায় ইহা গর্ভপাতের বাধা জন্মাইতে পারে।

লেকচার ৮৪ (LECTURE LXXXIV.)

পলিগণেশজাতীয় ঔষধ ।

১। রিয়াম । ২। রুমেক্‌স্‌ ।

১। রিয়াম অফিসিনেলিস (Rheum officinalis)

সম্বন্ধ । রিয়ামের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, ক্যাম্‌ফ, কলসি, মার্ক, নাক্‌স্‌ ভ, পাল্‌স্‌ । রিয়াম যাহার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাস্টা, ম্যাগ্‌নে কা ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—রিয়াম প্রধানতঃ যকৃৎ এবং অন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে পিত্তস্রাবের ও অন্ত্রপেশীর ক্রিয়োত্তেজনার বৃদ্ধি হওয়ায় বিঠাসংযুক্ত উদরাময় জন্মে, তাহাতে প্রদাহলক্ষণ উৎপন্ন হয় না । অত্যধিক অন্ত্রপ্রাণস্বস্ত মলের উদরাময় ইহার প্রদর্শক ।

লক্ষণ ।—রোগী বহুবিধ বস্তু চাহে কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিতে পারে না, দেখিলে ঘৃণা জন্মে । প্রচণ্ড উদরশূলে রোগী দ্বিতাঁজ হইতে বাধা । উদরের আতত ভাব । উদরে কামড়ানি বশতঃ অত্যন্ত মলবেগ হইলে মলত্যাগে তাহার নিবৃত্তি এবং আহার করিলে বৃদ্ধি হয় । পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগের শরীরচালনায় ও ভ্রমণে বৃদ্ধি । প্রত্যেকবার মলত্যাগের পূর্বে উদরশূল । আহারের পর মলত্যাগেচ্ছা । পাতলা লেইর ন্যায় এবং অন্ত্রপ্রাণস্বস্ত মলত্যাগের পূর্বে কুস্কন, মলত্যাগকালে কম্প এবং তাহার পরে উদরশূলবৎ এবং সংকোচনস্বস্ত কর্তনবৎ বেদনা ; পুনঃ পুনঃ বেগের সহিত অর্দ্ধতরল বিষ্ঠার নির্গমন ;

কটা মল সহ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে ; মলত্যাগের পরে কুস্থন হয় এবং সরলাস্ত্র ও মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালা করে ।

চিকিৎসা।—উদরাময়ই একমাত্র রোগ যাহাতে আমরা রিহ্নামের প্রয়োগ দেখিতে পাই এবং তাহাতেও ইহার “বিষ্ঠার এবং সম্পূর্ণ শরীরের অত্যন্ত অল্পস্রাণ” এই মাত্র লক্ষণ দ্বারা আমরা পরিচালিত হই। রিহ্নাম উদরাময়ের অত্যন্ত লক্ষণমধ্যে কামড়ানি উদরশূলের পরে কুস্থন ও বুদ্ধবুদ্ধ-স্বস্ত, কটাবর্ণ এবং অল্প বিষ্ঠাত্যাগের শরীর চালনাও আহাৰান্তে বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রধান। মলত্যাগ-কালে শীতবোধ এবং তাহার পরে উদরশূলের নিবৃত্তি না হওয়া ইহার প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। রিহ্নাম বিষ্ঠায় অল্পস্রাণ থাকে, কিন্তু অত্যন্ত কতিপয় ঔষধেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ক্যাঙ্কে কা, ম্যাগ্নে কা এবং হিঙ্গার সালফ উল্লেখযোগ্য। ম্যাগ্নে কা রিহ্নামের পরে সফলপ্রদ। তাহার অল্পবিষ্ঠার উপরে ব্যাঙ্কপুকুরের জলের উপরি ভাসমান বুদ্ধ-বুদ্ধস্বস্ত সম্বন্ধে পাজলার হ্রাস থাকে। দুর্বলতা তাহার অগ্র প্রধান লক্ষণ।

২। রুমেক্স কৃষ্ণাস (Rumex crispus)

উপচয়। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে ; শীতল বায়ুতে ; অপক, শীতল আবহাওয়ায় ।

সাধারণ ক্রিয়া।—শৈল্পিককিল্লি, লসীকাগ্রহি এবং স্বকে রুমেক্সের ক্রিয়া হইলেও স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনলীর শৈল্পিককিল্লির আক্রমণদ্বারাই ইহা পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহা তাহার স্রাবের হ্রাস জন্মায় এবং চৈতন্তের অস্বাভাবিক প্রার্থ্যা উৎপন্ন করিলেও তাহা প্রদাহে পরিণত হয় না ।

লক্ষণ ।

শ্বাসশস্ত্র।—স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে আটা শ্লেষ্মা থাকায় রোগী অবিশ্রান্ত হক্ হক্ করে, কিন্তু তাহাতে উপশম পায় না, রজনীতে তাহার বৃদ্ধি। আহারকালে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা হওয়ায় কাসি পায়। স্বরযন্ত্রে বেদনা ও স্বরভঙ্গ। বারম্বার অহুভব যেন রোগিণী আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না; যেন বক্ষে বায়ু প্রবেশ করে নাই। কণ্ঠার কোটরবৎ স্থানে শুড়শুড়ি হওয়ার অবিশ্রান্ত শুক ও শ্রান্তিজনক কাসির, চাপে শয়নে সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। গলায় শুড়শুড়ি হইলে হৃৎকক্ষক কাসির প্রথমাবস্থার কাসির ত্রায় শুক আক্ষেপিক কাসি। স্বরযন্ত্রে এবং বুকের মধ্যে (Behind the Sternum) টাটানি ও কাঁচা ভাব। বাম ফুসফুসের উপাদানাভ্যন্তরে সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা। উভয় ফুসফুসের সম্মুখেই কনকন করে। জং-পিণ্ডসন্নিহিত বক্ষস্থানে তীব্র সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা অথবা জালা গভীর শ্বাস গ্রহণে এবং রজনীতে শয়নে বর্দ্ধিত।

আমাশয়।—আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়দেশে গুরুত্ব। পুরচার ভোজনের অহুভূতি। আমাশয়যোজী কোটরস্থানে চাপ দিলে পূর্ণতার অহুভূতি কণ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, গলাধঃকরণের চেষ্টায় অধঃ হইলেও তখনই পুনরাবর্তন করে। আমাশয়যোজীর কোটর হইতে বেদনা তীব্র বেগে বক্ষে ধাবিত হয়।

অল।—প্রাতঃকালে উদরের বেদনার সহিত পুনঃপুনঃ বেগের পর কটা ও জলবৎ উদরানয়। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।—গলনলী অধঃ কোটর অথবা সূপ্রাষ্টার্ভাল ফসায় শুড়শুড়ি জন্ম শুক কাসি হইলে কমেক্‌স্‌ ক্‌ম্পাস্‌ উপকার করিয়া থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলী এই কাসির উৎপত্তি স্থান;

ইহা অদমা ভাবের উৎপাতিক কাসি; শীতল বায়ুতে ইহার বৃদ্ধি। গাত্রবস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করায় বায়ু উষ্ণ হইলে কাসির নিবৃত্তি। গভীর শ্বাসগ্রহণেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃকের মধ্যে টাটানি থাকিলে যে অবিশ্রান্ত কাসি হয় এবং যাহাতে স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরীণ আটা স্লেমা গলা খাঁকর দিয়া উঠাইতে পারা যায় না, তাহাতে ইহা উপযোগী। ক্ষয়কালের রোগীর প্রথমাবস্থার ফুস্ফুসভেদকারী সূচিবৈধবৎ বেদনা সহ কাসির ইহা উপযোগী ঔষধ। উপদ্রুত-লক্ষণ থাকিলে ইহা ক্ষয়কাসির রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ বা হ্রাসমানির উপশম করে। সিলিন্ড্রিক-সিলিন্ড্রিক এইরূপ কাসি হয় এবং তাহা কথা কহিলে ও রজনীতে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়।

উপরি লিখিত লক্ষণ সাদৃশ্য থাকিলে আন্মানসিক কাসি, সর্দিজ্বরভঙ্গ এবং আন্মানসিক শূল বেদনা বক্ষ অথবা পৃষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে রুমেক্স তাহা আরোগ্য করিতে পারে।

লেকচার ৮৫ (LECTURE LXXXV.)

লরেসিজাতীয় ঔষধ ।

১। ক্যাম্ফর । ২। সিনামমাম্ ।

১। ক্যাম্ফরা (Camphora.) ।

উপচয়ন ।—রজনীতে ; অক্ষকারে ; শরীর চালনায়ে ; শৈত্যে অথবা শীতল বায়ুতে । **উপশমন** ।—মুক্ত বায়ুতে ; প্রচুর ঘর্ষে ; বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে তাহা অন্তর্দ্বান করে ।

সম্বন্ধ ।—ক্যাম্ফরের কার্যপ্রতিষেধক—ওপ, স্পিরিট অব নাইট্রিক ইথর । ক্যাম্ফর বাহার কার্যপ্রতিষেধ করে—ক্যাঙ্কা, কুপ্রাম্ স্কুইলা, এবং উদ্ভিদ বিষ মাত্রই ।—চা, কাফি এবং লেমনেড ক্যাম্ফরের কার্যের বাধা জন্মায় না ।

ভুলনীর ঔষধ ।—একন, আস, বেল, ক্যাঙ্কা, কুপ্রাম, ককুল, কার্ক ভে, হায়দা, ওপ, টেরিবি, সিকেলি, ষ্ট্র্যাম, ভিরেট এ ।

সাধারণ ক্রিয়া ।—ক্যাম্ফর মস্তিষ্কের মজ্জায় স্নায়ুগুণ্ডে প্রভূত ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং তাহার ফলস্বরূপ গতিপ্রদ স্নায়ুকেন্দ্রে এবং জ্ঞানশক্তির উৎস্বরূপ স্নায়ুগুলির অবনাদ বশতঃ শারীরিক দৌর্বল্য ও দৌর্বল্য ঘটত উত্তেজনা প্রবণতালক্ষণ, শিরোগর্ভন, এবং মস্তিষ্কের কষ্ট প্রভৃতি উপস্থিত হয় । ইহার মস্তিষ্কাদি আক্রমণের সমবায় লক্ষণের ফলস্বরূপ সর্বোচ্চ আক্ষেপ, গুল্মবায়ু ও মূগীবৎ আক্ষেপ এবং অন্ত্রাণ্ড বিষলক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা শৈল্পিককিঙ্কি আক্রমণ করিলে নাসিকা

সর্দি ও সর্দিজ উদরাময় উৎপন্ন হয়। মুখ, আমাশয় এবং অন্ত্রের শৈথিল্যিক ঝিল্লিতে ইহার আক্রমণ হওয়ায় তাহার জড়তা ও শীতলতা জন্মে এবং তাহারই গোণ ফলস্বরূপ ত্বকের বরফবৎ শীতলতা, স্মরবন্ধ এবং নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি পতন বা কোলাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হয়। জন-নেক্রিয় এবং মূত্রবস্ত্রও গোণভাবে ইহার ক্রিয়ার অবশ্যস্বাভাবী ফল প্রকাশ করার জননেক্রিয় শীতল ও শিথিল হইয়া যায় এবং মূত্রবস্ত্র লক্ষণে মূত্র-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। ইহা একটি উদ্ভিগ্ননশীল বস্তু এবং ইহার ক্রিয়াও ক্ষণস্থায়ী। শৈত্য সংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে ও কলেরার ত্রায় উদররোগেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ ।

অন্য ১—অত্যন্ত উৎকর্ষা এবং বাহার পর নাই অস্থিরতা। চৈতন্তের লোপ। একা থাকিতে, বিশেষতঃ রজনীতে অন্ধকারে একা থাকিতে ভীত। বর্ণনার অতীত দুর্বলতা। ত্রাস। কম্পিতভাব। ত্বরান্বিতভাব।

স্নানু ১—আক্ষেপের সহিত চক্রাকার গতি (হস্তের চক্রবৎগতি)। পেশী কম্প। সাধারণ অস্থির ভাব। অস্থিরতা। রোগী নিদ্রাভঙ্গে চমকিয়া উঠে এবং পরে ছৎপিণ্ডের কম্প ও দপদপানি অনুভব করে। অত্যন্ত বলক্ষয়। হঠাৎ অত্যন্ত শক্তিহানি। সম্পূর্ণ শরীর বরফের ত্রায় শীতল। রোগী বোধ করে যেন গাত্রোপরি শীতল বায়ু বহিতেছে। মৃগীবৎ এবং অগ্রাগ্র প্রকারের আক্ষেপ। শারীরিক প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব, স্পর্শে চেতনাহীনতা। শীতল, চটচটে ও দুর্বলকর ঘর্ম। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ খল্লী।

নাসিকা ১—হঠাৎ বায়ুর পরিবর্তনে শ্রাবযুক্ত সর্দি। হাঁচি। নাসিকার বোধ। ভ্রমণকালে গৃহের বায়ু নাসিকায় শীতলতর বোধ হয়।

স্বাসস্থল ১—বায়ুপথে শ্লেষ্মা থাকে। স্বাসপ্রশ্বাসের প্রায়

সম্পূর্ণ বোধ । আমাশয়োর্ক কোটরস্থানে চাপ নিবন্ধন যেন খাসরোধকর খাসরুচ্ছ । কর্থায় টাছা বোধ হওয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি । হক্হক্ করিয়া শুক কাসি এবং ভ্রমণকালে বাম বক্ষে স্ফিচবেধবৎ বেদনা ।

শরিশাকযন্ত্র এবৎ মল ৷—জিহ্বা শীতল । স্বর ক্ষীণ, ভগ্ন ও বসা । আহারাণ্ডে উদগার । গলগহ্বরে ও আমাশয়ে জালা, আমাশয়ে শীতলতা । আমাশয়োর্ক কোটরস্থানে চাপবৎ বেদনা । উর্ক ও নিম্নোদরে শীতলতার পরে জালাযুক্ত তাপ । শৈত্যসংস্পর্শ জন্ম উদরশূল ও উদরাময় । কলেরারোগে বিরেচনের অভাব । সরলাস্ত্রের ক্রিয়াহীনতা বশতঃ কোষ্ঠবন্ধ ।

মূত্রযন্ত্র ৷—মূত্রের হ্রাস । মূত্ররোধ জন্ম মূত্রস্থালী পরিপূর্ণ ; মূত্রকুচ্ছ । জালাযুক্ত মূত্র । অত্যন্ন মূত্র ।

তলনৈন্দ্রিয় ৷—পুংরোগীর কামেচ্ছার অভাব হয় ও অণ্ডকোষ বুলিয়া পড়ে । ধ্বজভঙ্গ । স্ত্রীরোগীর সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধি ।

হৃক ৷—হামের নায় উদ্ভেদ । উদ্ভেদে বেদনাযুক্ত টাটানি ও ছলবেধবৎ বেদনা ।

চিকিৎসা ।

নাসিকা সন্দি বা করাইজতা ৷—সন্দিরোগের পক্ষে ক্যাশ্ফর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য । সন্দির প্রথমাবস্থায় নাসিকা রুদ্ধ ও শুষ্ক থাকিলে এবং খাসগ্রহণে নাসিকায় বায়ু শীতলভন্ন বোধ হইলে ইহা উপযোগী । প্রথমেই শীত বোধ হইলে ইহা সন্দি অক্ষুরেই দূর করিতে পারে । ইহা পুরাতন সন্দি যাহা প্রত্যেক বায়ুর পরিবর্তনেই কাঁচা হইয়া উঠে তাহার ঔষধ ; ক্যাশ্ফরের ঘ্রাণ লইলেও চলিতে পারে । রোগী শীত বোধ করে, তাহার ললাটগহ্বরের আক্রান্ত হওয়ার মূহ শিরঃশূল জন্মে ; হাঁচি থাকুক বা না থাকুক জন্মবৎ

শ্লেষ্মা শ্রাবণেও ইহা উপকারী। ইহা একত্র সমকক্ষ ঔষধ, তাহার পূর্বেও ব্যবহৃত হইতে পারে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শরীর শীতল হইলেও মুখ এবং চক্ষু বসিয়া যাইলে ইহা উপকারী। এস্থলে ইহা কার্ব ভেজ ও মার্ক সান্না সহ তুলনীয়।

কলেরা বা ওল্‌ভাউটা।—অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির বা এসিয়াটিক কলেরার প্রথমাবস্থায় ডাং হানিমান স্বয়ং ক্যাস্ফের ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ও তাহার উপকারও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ক্যাস্ফেরের মূল অরিষ্টের সেবন ও মালিস রূপে বহিঃ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন। ইহার রোগে বমন ও বিরেচন হয় না অথবা কখন কখন অতি অল্প মাত্রায় হয় বলিয়া তাহাকে “ড্রাই কলেরা” বলিয়াও অভিহিত করা হয়। ফলতঃ ইহার কলেরার সাংঘাতিক ও প্রবল বিষঘাতে মায়ুশক্তির অভিজুতি ঘটায় শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। বমন রেচনাদি হয় না, যাহা কিছু শ্রাব হয় তাহা উদরে থাকিয়া যায় এবং চর্ঠাৎ দেহ ও জিহ্বার বরফবৎ শীতলতা, তর্কলতা, পেশীকাঠিন্য এবং স্বর বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি পতন লক্ষণ এবং অন্ননলী ও আমাশয়ে জ্বালা উপস্থিত হয়। ফলতঃ শীতলতা স্রাবাদির শুষ্কতা এবং শরীরের নীলাভা ইহার প্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত। ডাং এলেন ঘর্ষ থাকিলে অথবা ঘর্ষ আরম্ভ হইলে ইহার প্রয়োগ নিষেধ করেন। তাপে উশশন ইহার অন্যতম প্রদর্শক।

হাইড্রুসা এসি—স্পষ্টতর পতন বা কলাপ্সলক্ষণ এবং চর্ঠাৎ বিরেচনের অভাব। কলেরার শেষাবস্থার মুছ্রী ও ধনুইকারবৎ আক্ষেপ।

সাল্‌ফার—কলেরার প্রতিষেধক রূপে ক্লাউহার অব সাল্‌ফার (গুড়িকা) ঔষিকি মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

লক্ষণসাদৃশ্য থাকিলে হাঁসপানি, শুষ্ক কাসি, ফুসফুসের রক্তাধিক্য ও বায়ুক্ষীতি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র রোগে পতন বা কল্যাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হইলে, প্রলাপ, উন্মাদ-রোগ ও সর্বাঙ্গীন আক্ষেপে এবং হামাদি বসিহা স্নাওয়ার কল্যাপ্স লক্ষণে ক্যাস্কর সুফলপ্রদ। কলেরা ও অত্যাণ্ড কারণ ঘটিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্ররোধেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ ক্যাস্কর প্রতিক্রিয়া পুনরানয়নে সক্ষম বলিয়া যে কোন কারণেই হঠাৎ পতন বা কল্যাপ্সলক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় রোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে যদি উপযুক্ত লক্ষণ বর্তমান থাকে তাহাতে ক্যাস্কর প্রয়োগের উপযুক্ত।

২। দিনামমাম্, (Cinnamomum), সিনামন ।

তুলনীয় ঔষধ :- ইরিজিরণ, ইপিকা, মিলিফ, ত্রাবাই ।

সাধারণ ক্রিয়া :- মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ু দ্বারা সিনামন ধমনীপেশীর শিথিলতা উৎপন্ন করায় প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল ও লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব ।

চিকিৎসা :- পদাঙ্গুলন প্রভৃতি সামান্য কারণে জ্বরায়ু হইতে প্রচুর এবং উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ও গর্ভপাত হইলে হোমিওপ্যাথি মতে সিনামন উপকারী; এগপ্যাথি মতে ইহা দ্বারা গর্ভপাত সম্পাদন করা হইয়া থাকে ।

লেকচার ৮৬ (LECTURE LXXXVI.)

আটিকেসি জাতীয় ঔষধ।

১। ক্যানাবিস ইণ্ডিকা। ২। ক্যানাবিস স্যাটিভা।

১। ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (Cannabis Indica)।

উপাচয়্য—কফিয়ায়; আহারকালে; মত্তে এবং তাম্বকুটে।
রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে। উপশয়্য—নিম্নল বায়ুতে;
শীতল জলে; বিশ্রামে।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া—ক্যানাবিস ইণ্ডিকা বা গঞ্জিকা মায়ু-
মণ্ডলের প্রবল উত্তেজনাকারী বস্তু। মস্তিষ্কক্রিয়ার বিভ্রাট ঘটাইয়া ইহা
মানসিক বৃত্তি এবং গতিশক্তি উভয়েরই ক্রিয়োত্তেজনা উৎপন্ন করিলে যে
মানসিক স্ফূর্তি, উল্লাস ও আনন্দানুভূতি জন্মে, তজ্জগুই গঞ্জিকার জন্মভূমি
ভারতবর্ষে অধিকাংশ মত্ততাপ্রিয় ব্যক্তি গঞ্জিকাসেবক হয়। ফলতঃ
মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতানুসারে ইহার ক্রিয়ার তারতম্য এবং অবস্থা-
ভেদ হইয়া থাকে। উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ উল্লাস ভাবের
স্ফূর্তি পাইলে রোগী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমাগরে ভাসমান হয়, অশেষ
সুখস্বপ্ন দেখে এবং দূরত্ব ও সময় বিবেকে তাহার অসীমত্তের অনুভূতি
জন্মে। স্থল বিশেষে রোগীর মানসিক ভাবের অবস্থানুসারে সে অন্তল-
স্পর্শ দুঃখমাগরে নিমজ্জিত হয়। ফলতঃ রোগীর সুস্থাবস্থার সদস্য
মানসিক বৃত্তিরই অস্বাভাবিক স্ফূর্তি জন্মে। কোন ব্যক্তি ভ্রমাবহ
উন্মত্তবৎ প্রচণ্ডতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, কেহ বা দুঃখ এবং অবসাদের
গভীরতমদেশে নিমজ্জিত হয়। কালব্যাপী গঞ্জিকাসেবীদিগের মধ্যে
ইহার প্রতিক্রিয়া বশতঃ বুদ্ধিহীনতা ও জড়তাব উৎপন্ন হয়। কখন
কখন আক্ষেপ হইয়া থাকে।

লক্ষণ ।

মন ১—মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উত্তেজনা, রোগী অত্যধিক কথা বলে। ভ্রমদৃষ্টি এবং বহু বিধ কল্পনা। রোগী কল্পনায় গীতবাণ শ্রবণ করে, চক্ষু মুদ্রিত করে এবং অসীম সুখচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। রোগী মনে করে সে স্থূল হইতেছে। অবক্তব্য যন্ত্রণা ও অত্যন্ত কষ্টের মুক্ত বায়ুতে উপশম। রোগী উন্নত হইবে বলিয়া সর্বদাই ভীত। দূরত্ব ও সময়ের অসীমতা বোধ। স্থির কল্পনা। দূর দৃষ্টি। প্রচণ্ডতা ও উন্মাদবৎ ব্যবহার।

মস্তক ১—মস্তক পশ্চাতে অজ্ঞানকর শিরঃশূলে গাত্রোথান করিতে শিরোবর্ণন বশতঃ রোগী পতিত হয়। মস্তকের পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক কম্প; মস্তকের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড ধাক্কা। ললাটে, বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্বন্দ্বদেশে মৃত ও আকুণ্ঠবৎ বেদনা। ললাটে দপদপানি ও কনকনানি বেদনা। ললাটের উভয় পার্শ্বেই কনকনানি বেদনা থাকিলেও দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর।

শরীর ১—অল্প দূর ভ্রমণেই সম্পূর্ণ দুর্বলতা। রোগী অত্যন্ত দুর্বল বোধ করায় প্রায় কথা কহিতে অশক্তি এবং শীঘ্রই গভীর নিদ্রাগ্রস্ত। নিম্পন্দবায়ুরোগবৎ লক্ষণ (Hysterical catalepsy)। অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপে সন্মুখদিকে শরীরের বক্রতা।

মূত্রশ্রাব ১—হাঁসিতে কিডনিতে বেদনা এবং জ্বালা, কনকনানি ও হৃচিবেধবৎ অল্পভূতি। চাপ দিলে, মূত্রনালী হইতে শুভ্র, চক্চকে প্লেগ্মা নির্গত হইতে পারে। প্রচণ্ড ও বেদনায়ুক্ত লিঙ্গোথান। মূত্রশ্রাবের পূর্বে, সময়ে ও পরে মূত্রনালীতে জ্বালা এবং ঝলসান বোধ অথবা জ্বলবেধবৎ বেদনা। কুহন, কিন্তু এক ফোঁটা মূত্রশ্রাবও হয় না। প্রচুর ও বর্ণহীন মূত্র। কিয়ৎকাল বিলম্বে মূত্রশ্রাব। হস্তের

চাপ দিয়া শেষ কতিপয় ফোঁটা মূত্র বাহির করিতে হয় । মূত্রশ্রোতের শেষ হইলে মূত্র বরিতে থাকে ।

পুস্ত্র ১—স্কন্ধ এবং মেরুদণ্ডের আড়াআড়ি ভাবের বেদনায় রোগী ঋজু ভাবে চলিতে পারে না, সম্মুখে নত হইতে বাধ্য ।

অক্ষনিচয় ১—দক্ষিণ হস্তের ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত ।

চিকিৎসা ১—হোমিওপ্যাথিক মতে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা-কার অধিক ব্যবহার দৃষ্টি হয় না । মানসিক রোগमध्ये কখন কখন উম্মাদ ও মদাত্যররোগে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে । এই সকল রোগের লক্ষণ উপরে বিবৃত হইয়াছে । মদাত্যরোগে অত্যধিক বাগ্মিতা এবং দূরত্ব ও সমস্ত সম্বন্ধে অসীমভাবে অনুভূতিই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ ।

অনিদ্রা বা স্লিপনেসনেস্ ১—অদম্য নিদ্রাহীনতার পক্ষে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । অবস্থা বিশেষে ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট জলের সহিত প্রয়োগ করিলে স্নায়বিক উত্তেজনা এবং স্নায়ুশূল প্রভৃতির উপশম করিয়া ইহা অতি শীঘ্র শান্তিময় নিদ্রা আনয়ন করে । নিদ্রাভঙ্গে কোন অস্বস্তি থাকিয়া যায় না ।

প্যাসিফ্লুরা ইনকার্ণে টা—৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট মানসিক উত্তেজনা অথবা বেদনা নিবারণ করিয়া স্নানিদ্রা আনয়ন করে । প্রয়োজন হইলে ঔষধ পুনঃ প্রদান করা যায় ।

কাম্ফুরা মন ব্রোনেটা—অতিরিক্ত চাপান জ্ঞান অনিদ্রায় ।

কোকা—মানসিক দৌর্ভাগ্য বা রক্তহীনতা নিবন্ধন অনিদ্রা ; অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং রাত্রিজাগরণ বশতঃ অনিদ্রা ।

প্রতিনা স্টিটিভা—বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও দুর্বলীভূত ব্যক্তিদ্বিগের অনিদ্রায় ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রয়োগে শান্তি

জনক ও স্বপ্নহীন নিদ্রা আনয়ন করে। আশিষ্টিকা এবং জেফলু-
সিম্বিহ্যানও নিদ্রাকারক ঔষধ ।

২। ক্যানাবিস স্যাটিভা (Cannabis Sativa.) ।

সম্বন্ধক ১—ক্যানাবিস স্যাটিভার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যানফর ।
অধিক মাত্রায় লেবুর রস ।

সাম্প্রদায়িক ত্রিকল্পা ১—ক্যানাবিস স্যাটিভা প্রধানতঃ মূত্রপথ এবং
লিঙ্গাগ্রপেষ্টভকের শৈথিল্যকবিল্লি আক্রমণ করিলে অত্যধিক উত্তেজনা
বশতঃ তাহাতে প্রদাহ জন্মে ও তাহার সম্পূর্ণ শৈথিল্যকবিল্লিপথ হইতে
শ্লেষ্মাস্রাব হয় । উপরি উক্ত লক্ষণাদি পূয়মেহরোগের অতি নিকট
সাদৃশ্য বলিয়া বিবেচিত । ইহার মস্তিষ্কলক্ষণের ক্যানাবিস ইণ্ডিকার
মস্তিষ্ক লক্ষণের ত্রায় কোন বিশেষতা দৃষ্ট হয় না ।

লক্ষণকোণ—মূত্রবাহক ১—কিডনি বা বৃক্ককপ্রদেশ হইতে কুচকির
গ্রন্থি পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং আগাশয়োর্ককোটরস্থানে বিবিধবার
ভাব সহ উৎকর্ষা বোধ । মূত্রপথের সম্মুখ হইতে পশ্চাদভিমুখে জ্বালা
এবং জ্বালাযুক্ত চনচনি ; মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথের পশ্চাদংশে স্থচিবোধবৎ
বেদনা । সম্পূর্ণ মূত্রপথ প্রদাহিত বোধ হয় এবং তাহা স্পর্শে
বেদনাযুক্ত থাকে ; লিঙ্গোথান হইলে তাহাতে আততভাবে বেদনা ।
মূত্রত্যাগকালে, বিশেষতঃ তাহার অব্যবহিত পরে মূত্রপথে জ্বালা ।
মূত্রত্যাগের প্রথমে এবং শেষে মূত্রপথ বাহিয়া জ্বালা । মূত্র-ত্যাগ
না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনায় রোগী
ক্রমাগত মূত্রত্যাগে বাধ্য । মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে
মূত্রত্যাগেচ্ছার ত্রায় চাপবোধ । মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথ
বাহিয়া স্থচিবোধবৎ বেদনা । দণ্ডায়মানাবস্থায় মূত্রপথের পশ্চাৎভাগে
বাঁকিযুক্ত স্থচিবোধবৎ বেদনা । মূত্রস্রোত ছড়াইয়া পড়ে, ক্লিষ্ট স্ফীত
থাকে, কিন্তু লিঙ্গোথান হওয়া বৃদ্ধিতে পারা যায় না । পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোথান

হওয়ার পর মূত্রপথে সূচিবেদন বেদনা। ভ্রমণকালে লিঙ্গের ক্ষত অথবা দগ্ধবেদ বেদনা, এবং লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টনকের কালচে লোহিতবর্ণ। দণ্ডায়মানাবস্থায় অণুকোষে চাপের ও আকৃষ্টতার অনুভূতি।

চিকিৎসাঃ—পূহনেত্র বা গণারিয়ার চিকিৎসা ক্ষুদ্রই ক্যানাবিস্ স্রাতিভার সুখ্যাতি। কোন কোন চিকিৎসক এ রোগে ইহাকে সর্কোংকুষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। ডাঃ গ্রাস রোগের তরুণাবস্থার প্রথম হইতেই ইহার ব্যবস্থা করেন এবং নূনাধিক ৪ দিবসে রোগের প্রবলতার হ্রাস হওয়ার শ্রাব ঘন ও ঈষৎ সবুজ হইয়া আসিলে মার্ক সল \times টিটু দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ করেন। ব্যবসার প্রথমাবস্থায় তিনি মূল অরিষ্ট ব্যবস্থা করিতেন, এক্ষণে ১০০০০০ (cm.) ক্রমই অধিকতর উপকারী বলিয়া বোধ করেন। ডাঃ ফ্রষ্ট ইহার ৩ হইতে ৬ ক্রম ব্যবস্থা করেন এবং তাহাই অনেকে কার্যোপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। একর পরে ইহা প্রযোজ্য। ক্যানা সাটে শ্রাব স্বল্পতর এবং আর্জেক্ট নাইতে অধিকতর থাকে। রোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় শ্রাবের বর্তমানতা, অত্যন্ত জালা, মূত্রত্যাগান্তে মূত্রপথ বাহিয়া চাপিলে বেদনা এবং লিঙ্গমুণ্ডের কালচে লোহিত বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ ইহার প্রদর্শক।

সেট্রিসিলিনাম—হঠাৎ মূত্রত্যাগেচ্ছা, লিঙ্গমূলে বেদনা এবং মূত্রপথে তীব্র চুলকনা হওয়ায় তাহা ঘর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি।

ইহাতে “মস্তকোপরি এবং মলদ্বার ও হৃৎপিণ্ড হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় শীতল জল পড়ার অনুভূতি” লক্ষণ থাকায় ডাঃ গ্রাস হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে ফোঁটায় ফোঁটায় জলপড়ারূপ বিরক্তিকর লক্ষণ ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।

লেকচার ৮৭ (LECTURE LXXXVII.)।

এপসাইনেসিজাতীয় ঔষধশ্রেণী।

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্। ২। ওলিয়েগার।

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্।

(Apocynum Cannabinum.)

সাধারণ ক্রিয়া :—এপসাইনাম্ কিড্‌নি বা বৃক্ক, রসঝিল্লি এবং ত্বক আক্রমণ করায় নানাবিধ জলশোথরোগ উৎপন্ন হয়। পবি-পাকঘন্ত্রপথের, বিশেষতঃ অস্থির শৈল্পিকঝিল্লিতে ইহার ন্যূনাদিক আক্রমণ বশতঃ তাহার শ্রাবের বৃদ্ধি হইলে জলবৎ উদরাময় জন্মে। ইহা সরলাস্থের ও মূত্রস্থালীর দ্বাররক্ষক চক্রাকার পেশীর দুর্বলতা এবং অর্শ সংক্রমণ রক্তবহানাড়ীর রক্তাধিকা উৎপন্ন করে। হৃৎপিণ্ডে ইহার দুর্বলতা জনক ক্রিয়াফলে নাড়ীস্পন্দনের দুর্বলতা ও অনিয়ম হয়। ইহার ক্রিয়ায় প্রায় শ্রাবমাত্রেরই স্বল্পতা ঘটে।

লক্ষণ।

মস্তক :—মস্তকে জলশোথ—সুপি ; অগ্নতর চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা ও আংশিক দৃষ্টি ; এক হাত ও এক পদের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক চালনা হইতে থাকে ; মস্তকমধ্যে শ্রাব আরম্ভ হইলে ললাটদেশ উচ্চতর হয় এবং মস্তকাস্থি নিচয়ের জোড় ফাঁক হইয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র :—কাসি কখন কখন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক এবং কখন তরল ও ঘড়ঘড়িযুক্ত হইলে শ্বাসকষ্ট হয়। অল্প আহারেও আমাশয়দেশে ও বক্ষে কষ্টানুভূতি জন্মে। ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বস্তি হয় না। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা। নাড়ীর মৃদু গতি।

আমাশয়ঃ—অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপান করিলে আমাশয়ের বেদনা, অথবা জলের তৎক্ষণাত্ বমনঃ নিদ্রাভঙ্গে তৃষ্ণা। আমাশয়োকোটর-স্থানে দমিয়া বা গ্যার ছায় বোধ।

মল ও মূত্রঃ—জলবৎ উদরাময়। অল্প মূত্রত্যাগ, কিন্তু রোগী তাহাতে কষ্ট বোধ করে না। কখন কখন পাতলা রঙ্গের প্রচুর মূত্রত্যাগ, কোন তলানি পড়ে না।

অঙ্গঃ—উভয় জাহ্নসন্ধিতে কঠিন কনকনানি বেদনা।

চিকিৎসাঃ—উদরী, বক্ষঃশোথ, মস্তিষ্কোদক, হৃৎকশোথ বা এনাসার্কী এবং যাত্নিক রোগ ভিন্ন অল্প যে কোন কারণোদ্ভূত এবং শরীরের যে কোন স্থানের জল-শোথে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে এনাসাইনাম দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। লক্ষণ—১। আমাশয়োকোটরস্থানে শূণ্য-ভাবের অনুভূতি ; ২। আতরাস্ত্রে কষ্ট, ভুক্ত বস্তুর বমনও হইতে পারে ; ৩। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে কষ্ট হয় বা বমনে জল উঠিয়া যায় ; ৪। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও অনিয়মিত ক্রিয়া এবং নাড়ীগতির মন্থরতা।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফেলোস্ঃ—রসখিলি হইতে রসের স্রাবাবস্থায় ইহা উপযোগী। মস্তক বৃহত্তর ও ললাট উচ্চ হইয়া উঠে ; শিশুর মস্তকের রক্তাদি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ; বক্রদৃষ্টি, কিন্তু এনিসেসের ছায় কর্কশ চীৎকার থাকে না। ইহা সহজ প্রকারের রোগের ঔষধ ; মূত্রাঘাত (Suppression of urine) থাকে। এক হস্তে ও এক পদের অবিশ্রান্ত অনৈচ্ছিক গতি।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্বল ও অনিয়মিত, এবং নাড়ীর স্পন্দন ধীর থাকায় জলশোথ জন্মিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াপতরোগে ইহা উপকারী। মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব বা স্বল্পতা জন্মে।

কিডনি বা রক্তকের ত্রিস্রান্দৌর্ধ্বল্য বশতঃ মূত্রের ক্রাস হওয়ায় জলশোথ জন্মিলে এপসায় উপকারী। এপসায় ঔষধ পরীক্ষায় প্রথমে মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই মূত্র স্বল্পতর ও তাহার বর্ণ ক্ষুব্ধ পীত বা শেরিমজ্জ-বৎ হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ড দুর্বল ও অনিয়মিত ক্রিয়াবৃত্ত এবং নাড়ী ধীরগতি ও বিশৃঙ্খল থাকে। আমাশ্বোর্দকোটরস্থানের “খালি খালি ভাব” ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। এ রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতে দুই প্রকারে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হল মাত্রায় ব্যবহারে ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়োস্তেজনা দ্বারা মূত্রের বৃদ্ধি করিলে জলশোথের যে উপকার হয় তাহা হোমিওপ্যাথি সম্মত নহে এবং তাহাতে ইহার রোগজ লক্ষণের (Pathogenetic symptoms) প্রতিলক্ষ্য রাখা ও আবশ্যক হয় না। এই প্রণালীরই অনেকে অনুসরণ করিয়া থাকেন বলা বাহুল্য হোমিও নিয়মানুসারে ইহা দ্বারা কল কামনা করিলে ইহার রোগজ লক্ষণানুদরণ করা অপরিহার্য বলিয়াই জানিতে হইবে। ইহাতে অতর্পণীয় তৃষ্ণা থাকে ও রোগী এক দোবে অধিক পরিমাণ জল পান করে; আর্সেনের অতর্পণীয় পিপাসায় রোগী অল্প অল্প জল বারে বারে পান করে। এপিসেস তৃষ্ণা থাকে না।

২। ওলিয়েণ্ডার (Oleander.) ।

সম্বন্ধ—ওলিয়েণ্ডারের কার্য্য প্রতিবেদক—ক্যাফুর ।

সাধারণ ত্রিস্রায়—ওলিয়েণ্ডার মস্তিষ্কদেহনজ্জের অ্যামুনডল আক্রমণ করিলে শারীরিক পক্ষাবাতিক দুর্বলতা এবং দুর্বল ও অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন হয়; কিন্তু ত্বকের, বিশেষতঃ মস্তকত্বকের, রোগ আরোগ্য জন্মই ইহা হোমিওপ্যাথিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে উৎকৃণ থাকার ঠায় চর্কণযুক্ত প্রচণ্ড চুল-কথা; চুলকাইলে প্রথমে স্বস্তি, কিন্তু পরে জালাযুক্ত চন্‌চনি এবং অবদারণবৎ ক্ষতের অনুভূতি হয়। মাথার খোলস উঠিতে থাকে। মস্তকত্বকে সিক্ত ও কামড়ানিযুক্ত শব্দ এবং চুলকনায়ুক্ত উদ্ভেদ; মস্তকপশ্চাতেই উদ্ভেদ অধিকতর জন্মে।

আমাশয়।—কাকের ক্ষুধার ঠায় অস্বাভাবিক ক্ষুধা হইলে আহার কালে হস্তের কম্প। ভুক্ত বস্তু এবং ঈষৎ সবুজ জল বমন করার পর পুনঃ ক্ষুধা এবং হর্ষলতা জন্মে। আমাশয়োর্ককোটর প্রদেশে স্পন্দন হইলে তথায় স্রুপিণ্ডের স্পন্দন হইতেছে বলিয়া বোধ।

বিষ্ঠা এবং মলছার।—মলত্যাগের পূর্বে, পরে ও তদতি-রিক্ত সময়েও মলছার জালা করে। পূর্ষ্দিনের ভুক্তবস্তু পর দিন প্রাতে অজীর্ণাবস্থায় বিষ্ঠা সহ নির্গত হয়।—তরল, নরম এবং পীতবর্ণ বিষ্ঠা। অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। শিশুর বাতকর্ম্ম সহ মলের নিঃসরণ।

ছক।—শরীরের অনেক স্থানে প্রচণ্ড চুলকনা; উদ্ভেদ হইতে রক্ত পড়ে, রস ঝরে এবং তাহাতে মামড়ি জন্মে। অনাবৃত করিলে গাত্র কামড়ায়।

চিকিৎসা।—শিরোবূর্ন সহ স্মরণশক্তির হর্ষ-লতা জন্ত রোগীর কিছুই মনে না থাকিলে এবং সে সহজে প্রশ্নের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে ওলিঙ্কেণ্ডার তাহার উপকার করে। উপরি উক্ত রূপ স্মরণশক্তির বিকার ও শিরোবূর্নলক্ষণযুক্ত পক্ষাঘাতরোগ ইহা আরোগ্য করিতে পারে। পার্শ্বের দিকে তাকাইলে যে শিরঃশুলের উপশমন হয়, একরূপ শিরঃশুলের একটি স্ত্রীরোগীকে ওলিঙ্কেণ্ডার আরোগ্য করিয়াছে।

শিশুকলেরা, উদরাময় এবং শিশুক্ষয়রোগে শিশু পূর্ব দিন যাহা আহার করে পরদিন অজীর্ণাবস্থায় তাহাই যদি মল সহ নির্গত এবং প্রত্যেকবার বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে যদি মল নিঃসরণ হয় তাহাতে ওলিয়েণ্ডার উপযোগী। ফলতঃ রোগ ওলা-উঠাই হটক আর উদরাময় অথবা শিশুক্ষয়রোগই হটক উপরি উক্ত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ওলিয়েণ্ডার তাহার উপকার করিবে। ফেরাম, আর্স, আর্জেন্ট নাই এবং সিলিকতেও বিষ্ঠা সহ অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু ওলিয়েণ্ডারের গ্নায় অধিকতর পূর্বের ভুক্ত বস্তুর মলত্যাগের সিংকোর সহিত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভিন্ন অত্র কোন ঔষধে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

ছকুরোগ—আমবাত বা আর্টিকেরিয়া, ছক্ক-পীড়কা বা ব্রাশ্টা ল্যাক্টিয়া।—আমাশয়ান্ত্রিক বিকার নিবন্ধন আমবাত প্রভৃতি হৃদভেদ আরোগ্যে ওলিয়েণ্ডার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ত্বক অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু থাকে, অন্ন চুল-কাইলেই গরম হইয়া উঠে এবং বেদনা করে। গ্রীবা, অণুকোষবেষ্টক এবং উরু প্রভৃতি স্থানেই ইহার বিশেষ আক্রমণ দৃষ্ট হয়। মস্তকের এবং কর্ণপূত্রের ত্বকে ইহার চঙ্কপীড়কা জন্মে।

ভিক্সা মাইনর—মুখমণ্ডল ও মস্তকত্বকে কাউর বা একজিমা জন্মিলে কেশ জুড়িয়া চাপ বাধে এবং তাহা হইতে হর্গন্ধ নির্গত হয়। মামড়ির নিম্নে স্রাব আটক থাকে, কেশ স্থলিত হয় অথবা তাহাতে চাপ বাধে (Plica polonica)।

ভাল্লনা ট্রিকলর—ডাং হিউজের মতে শিশুদিগের ছক্কপীড়কা এবং চর্মদল বা ইম্পিটিগোর ইহা ঔষধ। ইহার মামড়ি হইতে প্রচুর রস ঝরে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণে রোগী হর্গন্ধ মুক্ত্যাগ করে।

লেক্চার ৮৮ (LECTURE LXXXVIII.)

গ্যামিনেসিজাতিভুক্ত ঔষধ ।

১। এভিনা স্যাটিভা । ২। ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস ।

১। এভিনা স্যাটিভা (Avena Sativa) ।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—এভিনা সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে পুষ্টিক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় স্নায়ুশক্তির উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণ শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। ইহা একটি স্বরিত ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং অত্যন্ত উত্তেজক বস্তু অপেক্ষা ইহার ক্রিয়ার স্থায়িত্ব অধিকতর। স্নায়বিক শক্তির ক্ষয় নিবন্ধন রোগে সাধারণতঃ মূল অরিষ্ট ২ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে ইহার সাক্ষাৎ বা প্রাথমিক ক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা দুঃশান্তা এবং মানসিক ক্লেশ বশতঃ মস্তিষ্কীয় দুর্বলতা (Brain fag) ও অত্যধিক কামসেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রভৃতি হইতে স্নায়বিক দৌর্বল্য অপনয়নে উপরি উক্ত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা অতি আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। বহুদিন স্থায়ী কামবিষয়ক অপরিমিত অভ্যাসের ঘটিত ধ্বজভঙ্গ রোগে ইহা উপকারী; মত্তপায়ীদিগের স্নায়বিক অসহিষ্ণুভাব এবং অনিদ্রা প্রভৃতি আশঙ্কিত মদাত্ময়লক্ষণ নিরাকরণেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মফিয়া, অহিফেন এবং তাম্বাকুটাদির অভ্যাস সেবীদিগের পক্ষেও ইহা উপকারী ঔষধ।

২। ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস (Stigmata Maydis) ।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—মূত্রপথে ষ্টিগ্‌মেটার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহার উত্তেজনা ও প্রতি-

শ্রায়িক প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহা সেবনে মূত্রের অত্যধিক ক্ষারদোষের সমতা জন্মে। মূত্রস্রাবের ইহা পরিমাণাধিক্য জন্মায়। রোগ চিকিৎসায় আমরা ইহার উপরি উক্ত স্থূল ক্রিয়ারই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপে স্থূল মাত্রায় ইহার প্রয়োগ দ্বারা মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি, ক্ষারদোষের প্রশমন এবং তাহার ফলস্বরূপ মূত্রের উগ্রতার দূরীকরণ ও স্নিগ্ধতা আনয়ন করিয়া আমরা স্টিপ্‌মেটা দ্বারা নিম্নলিখিত রোগের শাস্তি করিয়া থাকি, যথা—মূত্রের লিথিক এসিড ও ফস্‌ফেটিক রেণু—সার্থিররোগ ; মূত্রস্থানী প্রদাহ ; মূত্রাঘাত মূত্ররোধ (Retention), মূত্রক্লেচ্ছ, মূত্র শূল এবং পূত্রমেহ প্রভৃতি । জলশোথরোগেরও সাময়িক উপকার প্রত্যাশায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে ।



লেকচার ৮৯ (LECTURE LXXXIX.)।

ব্যাপ্টিসিয়া (Baptisia Tinctoria.)।

(লেগুমিনসি জাতি)

সাধার্মণ ক্রিয়া—শোণিতে ব্যাপ্টিসিয়ার অতি গভীর ও বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এই ক্রিয়াকালে শোণিতের যে বিশ্লেষিত ও পচিত অবস্থা ঘটে, দৌর্কলাপ্রধান ও সাংঘাতিক জরাদি এবং টাইফইড্ অবস্থাপন্ন রোগীদিগের শোণিতে আমরা তদ্রূপ ছরবহুই লক্ষ্য করিয়া থাকি। উপরি উক্ত দুর্দশাগ্রস্ত শোণিত পোষিত শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে, বিশেষতঃ মুখ, গলা এবং অন্ত্রপথের শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে ইহার রোগজ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা দ্বারা গতিদ এবং অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির অপচয় বশতঃ উভয় প্রকার স্নায়ুশক্তিরই দুর্বলতা ও হানি ঘটায়, উভয় প্রকার পক্ষাঘাত জন্মে। ইহাতে পরোক্ষ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ায় অতীব দুর্বল ও বিশেষ প্রকারের প্রলাপলক্ষণ উৎপন্ন হয়।

শরীরস্থ যাবতীয় তরল পদার্থের পচনশীলতা জন্মে এবং অত্যন্ত বলক্ষয় ঘটে। সন্ধিনিচয়ের টানটান ভাব হওয়ার স্থায় কাঠিষ্ঠ জন্মে। সর্ব শরীর টাটায়। শ্রাব এবং শরীরোথিত বাষ্প পৃতিগন্ধযুক্ত। শ্লেষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ মুখগহ্বরস্থ শ্লেষ্মিকঝিল্লিতে, ক্ষত জন্মে এবং তাহার দুর্গন্ধ হইতে থাকে।

লক্ষণ।

অন্ন।—চিন্তায় অপ্রবৃত্তি ও শক্তিহীনতা; মানসিক দৌর্কল্য ও বিশৃঙ্খলভাব; মত্তপানবৎ মানসিক অস্থৈর্য। রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; মনে এক রূপ বৈষম্যের ভাব জন্মে,

মানসিক অসংযত ভাব। শরীর্যাংশাদি ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকার
শ্রায় বোধ হওয়ায় রোগী তাহাদিগকে একত্রিত করিবার জন্ত অস্থির-
ভাবে চতুর্দিকে শরীর চালনা করে ; রোগী শরীর্যাংশগুলি একত্রিত
করিতে পারে না বলিয়া নিদ্রা হয় না ।

নিদ্রা ।—প্রলাপসংযুক্ত স্থপ্তি ; রোগী কোন প্রশ্নের উত্তর
করিতে করিতেই নিদ্রাগ্রস্ত হয়, অথবা তাহাকে কিছু বলিতে বলিতে
নিদ্রিত হইয়া পড়ে । শেষ রজনী ২।৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, পরে সকাল
পর্য্যন্ত অস্থির থাকে । রোগী নিদ্রালু, জড়বৎ ও ক্রান্ত বোধ করে ;
চক্ষু অর্ধনিমিলিতভাবযুক্ত হয় । ভ্রমাবহ স্বপ্ন দেখার অস্থির থাকে ।

স্মাস্কু ।—রোগী অস্থির ও স্থপ্তিহীন থাকে ; কোন বিষয়েই মন
আকৃষ্ট রাখিতে পারে না ; সন্ধ্যাকালে এক স্থান হইতে অত্র স্থানে শরীর
চালনা করিতে চাহে । সম্পূর্ণ শরীরে, অধিকতর নিম্নাঙ্গে, দুর্বলতা
থাকে । অবসাদ, শয়নে প্রবৃত্তি । সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত ;
বাম হস্ত এবং বাহু শক্তিহীন । রোগী শয্যার নিম্নদিকে গড়াইয়া যায়,
বোধ করে যেন শরীরের শক্তি লোপ হইয়া যাইতেছে । সম্পূর্ণ শরীরে
অবজ্ঞাবা রুগ্নভাব ।’

স্নাসস্বস্ত্র ।—দক্ষিণ দুসফুসে টাটানি । বক্ষের সংকোচন ও কষ্ট ।

পাল্লিশাকস্বস্ত্র, মল ও মলদ্বার ।—ওষ্ঠ ও দস্তে মল
(‘sordes’) সঞ্চয় । জিহ্বার মধ্য বাহিয়া হরিদ্রাবর্ণ ; জিহ্বা প্রথমে
গুত্র থাকে এবং গুত্র লেপের মধ্যে মধ্যে লোহিতবর্ণ জিহ্বাকণ্টক
(papillae) দৃষ্ট হয়, পরে তাহার মধ্যভাগে হলদেকটা লেপ জন্মে,
পার্শ্ব লোহিতবর্ণ ও চক্ চকে হয় ; জিহ্বার মধ্য বাহিয়া গুত্র ও কটাবর্ণ ।
কটা, টাটানিযুক্ত ও ক্ষত জিহ্বা । মুখের দুর্গন্ধ । মুখে পচা ক্ষত ও মুখ
হইতে লাল স্রাব । মুখে মামুরকির ঘা এবং মুখ হইতে লালস্রাব ।
মুখ ও জিহ্বা গুত্র । মুখলালার যেন বৃদ্ধি, আটাভাব ও স্বাদহীনতা ।

ক্ষত জগ্ন গলাভ্যন্তরে সংকুচিত বোধ, বারম্বার গেলার চেষ্টা। গলগহ্বর কালচে লাল ; তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ পচা ক্ষত ; টনসিল ও হুইনিয়গ্রাফি স্ফীত ; অসাধারণ বেদনাহীনতা। গলায় শুড়শুড়ি হইলে কাসির উদ্বেক হয় ; উপজিহ্বা প্রলম্বিত থাকে। কেবল তরল বস্তু পান করিতে পারে, কঠিন বস্তু আহ্বারের চেষ্টায় গলরোধ ঘটে। গলমধ্যে অনেক আটা শ্লেষ্মা থাকে, তাহা উঠাইতে বা গিলিতে পারে না। অল্পনালী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত অত্যন্ত সংকুচিত বোধ ; কেবল জল গিলিতে পারে।

আমাশয়স্থলে দমিয়া যাওয়ার ছায় অথবা তদভ্যন্তরে কিছু না থাকার অনুভূতি ; উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে (Iliac region) স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। উদরপেশী চাপে বেদনায়ুক্ত। পুনঃ পুনঃ অল্প, পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং উগ্র মলত্যাগ। অত্যন্ত পুষ্টিগন্ধযুক্ত ও ত্বক্কলকর উদরাময়। বেদনাহীন, লেহর ছায় বিষ্ঠা সহ প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। কৃষ্ণত কটা শ্লেষ্মা ও রক্তসংযুক্ত মলত্যাগে কুস্থন থাকে এবং মলের পচনশীলতা দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালীন উদরানয়।

স্বক।—হুকে অতিশয় তাপ ও জ্বালা। হাম ও আমবাতের ছায় উদ্ভেদ। সম্পূর্ণ শরীর এবং অঙ্গের উপরিভাগে কাল্‌চে লোহিত কলক, শরীরোপরি তাহা স্থলতর থাকে।

চিকিৎসা।

মুখক্ষত, জ্বাড়া ছা বা গ্রফ্‌থি।—শরীরের অতি শোচনীয় ত্বক্কল অবস্থায় এই মুখক্ষত জন্মে। দস্তমাড়ি শিথিল ও তাহার শ্লেষ্মিক বিল্লি রুগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে কৃষ্ণলোহিত ও দুর্গন্ধ রক্ত ক্ষরিত হয় ; মুখে পুষ্টিগন্ধ থাকে এবং মুখ হইতে লাল ঝরে। দস্তমাড়ি ক্ষতযুক্ত ও জিহ্বা ফাটা। উপরি উক্ত রূপ অবস্থান্বিত পায়দ ঘটিত

সাধারণ ও প্রসূতিদিগের এবং যক্ষ্মাকাশ ও মূত্রমেহ প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত রোগীর মুখক্ষত ও ইহাধারা আরোগ্য হয় ।

হাইড্রাষ্টিস্—পৃষ্ঠহীনতা বশতঃ মুখক্ষতের অগ্রতম উৎকৃষ্ট ঔষধ । শ্লেষ্মকবিল্লি উন্নত ও ক্ষতনিচয় দ্বারা খচিত এবং জিহ্বা লেপ-বৃদ্ধ থাকে ; পচা ক্ষত ।

যক্ষ্মাকাশ বা হাইসিস্—যক্ষ্মাকাশের শেষাবস্থায় জ্বরের, বিশেষতঃ তাহার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হইলে এবং তাহাতে অল্প নিদ্রানুভূতি, জড়িত কথা, এবং মানসিক বিহ্বলভাব থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া দ্বারা উপকার হয় ।

টাইফয়েড জ্বর—আমরা ইতিপূর্বে ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, টাইফয়েড জ্বরলক্ষণ সহ ইহার বিশেষ ও ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে । তথাপি এই জ্বর চিকিৎসায় ইহার প্রকৃত স্থান নিরূপণ করিতে হইলে তাহার অশ্রান্ত ঔষধ সহ ইহার অতি পূজানুপূজা তুলনা করার আবশ্যক । ইহার নিদ্রালু ও বুদ্ধির জড়তা আণ্ডিকাল এবং কাল অথবা ঈষৎ কটা জিহ্বালেপ রাসটকসে আছে । আণ্ডিকাল স্থায়ী ইহার রোগী প্রথমে উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগত হয় ও শয্যা অতি কঠিন বোধ করে । ফলতঃ উপরি উক্ত দুই ঔষধ সহই ইহার বিশেষ তুলনার প্রয়োজন । শোণিতের বিষাক্ত ও পচিত অবস্থার ঔষধ হইলেও যথোপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে রোগের প্রথমাবস্থাতেও ব্যাপ্টিসিয়া রোগ অক্ষুরে বিনাশ করিতে সক্ষম । ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ—বুদ্ধির জড়তাব্যঞ্জক এবং অন্তর্দান প্রযুক্ত সন্তবৎ ও ক্রমবর্ণ মুখাকৃতি (ইহাকে ব্যাপ্টিসিয়ারোগীর অতি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে) ; রোগী অতীব ক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ শরীর ঘৃষ্টবৎ অল্পভূত ; আণ্ডিকাল

শ্রায় রোগী অস্থির থাকে এবং কোন কোন স্থানের অনুসন্ধান শয্যার চতুর্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে। চক্ষু নিদ্রার ভাবযুক্ত ও বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। প্রলাপ উপস্থিত থাকিলে তাহার প্রকৃতি বিলক্ষণ স্বাভাবিক জ্ঞাপন করে; তাহাতে রোগী মনে করে যেন তাহার শরীরে অশান্তি নিচল্ল শয্যান্নন্ন ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে তাহা একত্র করিবার জন্য শয্যার চতুর্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে; রোগীর প্রভূত বলক্ষয় হয়; জিহ্বার মধ্য বাহিয়া কটাবর্ণের রেখা থাকিতে পারে ও দন্ত কালচে মল বা "সডিস" আবৃত থাকে; প্রথমে দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং শরীরোপিত সর্বপ্রকার বাষ্প এবং আব পৃতিগন্ধযুক্ত থাকে। অর তাপ অধিক এবং নাড়ী দ্রুত; উদরের দক্ষিণ ও নিম্নতর পার্শ্ব বা "ইলিয়-সিকেল" প্রদেশে চাপ দিলে বেদনা করে। ফলতঃ আবাদির পচা জ্বাণ, রোগীর মত্তভাবে মুখাকৃতি এবং তাহার মানসিক অবসাদ উপস্থিত থাকিলেও অধিকাংশরূপে ইহার প্রলাপলক্ষণের বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি করিলে অ্যাপ্টিসিমিলার রোগ নির্কীচনে ত্রাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর বলিয়াই বোধ হয়।

লেকচার ৯০ (LECTURE XC)

হেমামেলিস ।

(হেমামিলেসি জাতি) ।

হেমামেলিস ভার্জিনিকা (*Hemamelis varginica*) ।

সম্বন্ধ — হেমামেলিস্ যাহার কার্য্য প্রতিষেধ করে — পাল্‌স্ ।

সাধারণ ক্রিয়া — বাবহারে শোণিতবাহী নাড়ী বা শিরাম-গুলে, বিশেষতঃ সরলায় এবং জননেন্দ্রিয়শিরামগুলে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া হেমামেলিস্ শিরার বিস্তৃতি, শিরামশোণিতাধিক্য, শোণিতস্রাব এবং পরোক্ষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে । ডাং হেলের মতে হেমামেলিস্ শিরামগুলের একনাইট স্বরূপ ; অর্থাৎ একনাইট ধমনীমণ্ডলে যে প্রকৃতির ক্রিয়া প্রকাশ করে ইহা দ্বারা শিরামগুলে তজ্জাতীয় ক্রিয়াই হইয়া থাকে । ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় শিরামগুলের গতিদ্রাঘুর আক্ষেপ উপস্থিত হয় । ইহা উপরি উক্ত রক্তবহা নাড়িতে যে উত্তেজনা উপস্থিত করে কার্য্যতঃ তাহা প্রদাহ উৎপন্ন না করিলেও তাহার সাহায্য করিয়া থাকে । ইহার ক্রিয়ায় গৌণ ফলস্বরূপ (প্রতিক্রিয়ায়) উপরি উক্ত গতিদ্রাঘুর পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বশতঃ শিরার বিলিস্তরাতির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত শিথিলতা হওয়ায় শিরামশোণিতাধিক্য, শিরামশোণিতস্রাব এবং তাহার উপাদানগত পরিবর্তন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । শরীরের যে কোন অংশ হইতে শিরামশোণিতস্রাব ইহার প্রদর্শক ।

।

স্বাস্থ্য — শিরা, পেশী ও স্বকে চিমটিকাটা এবং ছল বেঁধার দ্বারা অল্পভুক্তি । ঘৃষ্টবৎ ও টাটানি বেদনা ।

শ্রাসহস্ত্র।—নাসিকোপরি কশাভাব এবং চক্ষুদ্বয়মধ্যস্থ ললাট স্থানে চাপ হইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মূত্র রক্তস্রাব। শুভ্রশুভ্রি যুক্ত কাসিতে শোণিত অথবা গন্ধকের স্বাদ, রক্তের নিষ্টিবনের পূর্বগমী।

পল্লিশাক্ষস্র এবং **বিস্টি**।—কাল রক্ত বমন হইলে রোগী কম্পান্বিত, ঢর্কল, শীতল এবং প্রচুর বর্ষাসিক্ত হয় ; দ্রুত নাড়ীস্পন্দন হইতে থাকে। আমরক্তের বিষ্ঠায় অসাধারণরূপ অধিক পরিমাণ কাল কাল রক্তের চাপ থাকে। অল্প হইতে অত্যধিক পরিমাণ আন্কাতরার ত্রায় কাল রক্ত নির্গত। বেদনায়ুক্ত অর্শ হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। মলদ্বার চুলকায়।

পুংজননেন্দ্রি।—অণ্ডকোষে তীব্র নায়ুশূল। বেদনা দ্রুতবেগে অণ্ডকোষরজ্জু বাহিরা অণ্ডকোষাভ্যন্তরে যায় ; একশিরা জন্মে ; আক্রান্ত অংশ টাটায় ও ফীত হয়। শিরাস্ফীতি জন্মে।

স্ত্রীজননেন্দ্রি। জরায়ু হইতে প্রবল, উজ্জললোহিত শোণিতস্রাব ; শোণিত জমাট বাঁধে না। জরায়ুর রক্তস্রাবে শিরাসোণিতের মূত্র প্রবাহ। যোনির আক্ষেপ হইলে তাগাতে তীব্র টাটানি থাকে এবং যোনিকপাটে চুলকনা জন্মে। অন্ত্ৰকল্প ঝাড়ুস্রাব, অণ্ডাধারে বেদনা ও টাটানি। সূতিকান্তস্ত।

প্রদর্শক লক্ষণ।—দ্রুষ্ট হওয়ার স্থায় টাটানি-বেদনার বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক হওয়ায় ইহা আণ্ডিকা সহ তুলনীয়।

চিকিৎসা।

অর্শরোগ বা পাইলস্।—অত্যধিক রক্তস্রাবযুক্ত অর্শ-রোগে **হেমানমেলিস্** বিশেষ প্রশংসাপাভ করিয়াছে। ডাং হিউজ ইহাকে অর্শের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন ; কার্যক্ষেত্রেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি ইহার দ্বিতীয় ক্রমের ব্যবস্থা

করেন। ফলতঃ তপ্তই হটক আর শীতলই হটক ইহার নির্ঘাসের বহিঃ-
প্রয়োগ অতি শীঘ্র অর্শের প্রদাহ এবং টাটানিবেদনার উপশম করে।
অর্শে অত্যধিক টাটানিবেদনা হেমার সর্বশ্রেষ্ঠ
প্রদর্শক।

সাল্‌ফার—কোষ্ঠবদ্ধলক্ষণযুক্ত অর্শরোগে মলদ্বারের চুলকনা
ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। তাহা রজনীতে বদ্ধিত হয়।

অস্ত্রসস্ত্রাবস্থার এবং প্রসবাস্তিক রোগ—
গর্ভপাত বা এবর্ষণ; প্রসববেদনা; প্রসবা-
স্তিক বেদনা, ভ্যান্ডালির ব্যথা বা আফ্টার
পেইন্স; সূতিকাস্ত্র বা ফ্লেগ্ম্যাশিয়া ডলে-
ন্স;—অণুঃসস্ত্রাবস্থায় উদরে টাটানিবেদনা, অলাক প্রসববেদনায়
(False labour pains) উদরে টাটানি, টাটানি-বেদনায়ুক্ত জরায়ু-
রসবাতরোগে এবং সূতিকাস্ত্ররোগেও উপরিউক্ত প্রকৃতির বেদনা
রোগিনীর বিশেষ কষ্টের কারণ হইলে হেমামেলিস তাহার
শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহার ঈষৎ অরিষ্টের বহিঃপ্রয়োগ অতি
সস্তর বেদনার নিবারণ করে। ফলতঃ আক্রান্ত শরীরাত্মশে
অত্যন্ত টাটানি বেদনার বর্তমানতা এই সকল
স্থলে ইহার প্রকৃষ্টতর প্রদর্শক।

শোণিতশ্রাব বা হিমবৈজ্ঞ :—শিরারক্তের মূত্র স্বাবে
রক্ত শরীরাত্মশে টাটানি ও দৃষ্টবৎ বেদনা
প্রাকিলে এবং রোগীর অত্যন্ত বলহানি ঘটিলে হেমামেলিস
অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ডাং ডাইন্স ব্রাউন জরায়ুর
রক্তশ্রাবে ইহাকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া মনে করেন এবং রোগা-
রোগ্যেও তাহার ভূয়ো নিদর্শন আছে। শীতাদ বা শাপুর্বা
(উপহ্বক অধঃদেশে রক্তশ্রাব জনিত স্বকে ক্ষুদ্র ও লোহিত কলক) এবং

রক্ত-মেহ বা হিমেটুরিয়ারোগে ইহা বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নাসিকার মধ্যাংশে চাপবোধ সহ নাসিকার রক্তস্রাবে ইহা বিশেষ উপকারী। রক্ত সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ।

পাল্‌সেটিল্লা—নাসিকা হইতে গৃহ রক্তস্রাব এবং নাসিকা হইতে অনুকল্প ঋতুস্রাব।

মাকু'রিয়াস—নাসিকারক্তস্রাব; প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ রক্তের চাপ বোধে।

আর্নিকা—আঘাত জন্ম রক্তস্রাব ব্যতীতও ইহা বর্দ্ধমান শিশু-দিগের নাসিকার রক্তস্রাবে উপকারী।

বসন্তরোগ বা স্মলপক্স্—রক্তস্রাবী বসন্তরোগে হেমা উপকারী ঔষধ।

শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকোজ্‌ ভেইনস্‌রোগ ।
—আক্রান্ত শরীরংশ অভ্যন্ত টাটানিবেদনামুক্ত থাকিলে হেমা দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়; এম্বলে ইহার বহিঃ-প্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

লেকচার ৯১ (LECTURE XCI.)

এরাম্ ট্রিফিলাম্ (Arum Triphilum.)

(এরাকেসি জাতি ।)

সম্ভবতঃ—সাখনতোলা চুন্ধ বা ঘোল ইহার বিবক্রিমার প্রতি-
ষেধক ।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—শ্লেষ্মিকঝিলি, বিশেষতঃ মুখ, গলগহ্বর
এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বরযন্ত্র এবং বায়ুনাড়ীর শ্লেষ্মিকঝিলি আক্রমণ
করায় এরাম্ ট্রিফিলাম্ তাহাদিগের প্রদাহ, স্ফীতি এবং ক্ষত জন্মাইয়া
থাকে ।

লক্ষণ ।

অনঃ—প্রণাসের অবস্থায় রোগী নাসারন্ধ্রে অঙ্কুলি
প্রবেশ করায়; এবং কোন শরীরাত্মশ অথবা
নাসিকা খোঁটাইয়া তাহা হইতে রক্তও বাহির হইতে
পারে । উত্তেজনা প্রবণতা ।

নাসিকাঃ—অপরাহে শ্রাবযুক্ত সর্দি হইলে মস্তক এবং মুখের
তাপ,। বাম নাসিকা হইতে অবিশ্রাস্ত সর্দিশ্রাব । প্রাতঃকালের
সর্দিতে শোণিতরেখা এবং শ্লেষ্মার কঠিন চাপ ; দিবসে পীতবর্ণ
ও বন ; জলবৎ অথবা নাসিকার রোধকারী সর্দি প্রাতঃকালে বৃদ্ধি
পায় । আলায়ুক্ত, উগ্র ও তরল নাসিকাস্রাব নাসারন্ধ্রে ও উদ্ধীঠে
ক্ষত উৎপন্ন করে । নাসিকা রুদ্ধ থাকায় মুখদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস চালা-
ইতে হয় । জলপান করিতে তাহা নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায় ।
নাসারন্ধ্রে টাটানিযুক্ত ও ফাটা । রোগী অনবরত নাসিকা খোঁটে ।

স্বরশব্দ ও শ্বাসনলী :—অত্যধিক গীত করায় অথবা কথা বলায় স্বরভঙ্গ ঘটে। স্বরের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন। শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। চিন্মা শ্লেষ্মা উঠে। ফুস্ফুস্ টাটায়।

মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর :—ওষ্ঠ ফাটে। ওষ্ঠ খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বাহির হয়। মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত, ফাটিয়া রক্ত পড়ে। জিহ্বামূল ও তালু অবদারিত বোধ। অবদারণভাব ও টাটানিযুক্ত মুখগহ্বর হঠতে রক্তস্রাব। মুখ জ্বালা করে ও টাটায় বলিয়া শিশু কিছু পান করিতে চাহে না এবং কিছু পান করিতে দিলেও ক্রন্দন করিতে থাকে। প্রচুর ও উগ্র মুখলালাস্রাব। মুখের শুষ্কতা। হস্তনিম্নগ্রাধি, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের গ্রাধি ক্ষীণ। কঠায় সংকোচন বশতঃ ইচ্চি। গলাধঃকরণক্রমকালে তালুর বাম পার্শ্বের ক্ষীণ বোধ। তালু এবং গলমধ্যে টাটানি, শুষ্কভাব, জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং ক্ষত।

ছত্র :—(Exanthema) আরক্তজরবৎ জরসংযুক্ত উদ্ভেদ চুলকায় ; পরে তাহার উপত্যক স্থলন হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ :—নাসিকা অথবা ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে পুনঃ পুনঃ চিমটাইয়া বা খুঁটিয়া অধিকাংশ সময়ে রক্ত বাহির করা ইহার অনেক রোগে দেখা যায় বলিয়া তাহা এরামের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চিকিৎসা ।

মস্তিষ্কপ্রদাহ এবং মূত্রক্ষয় বা উরিনমিহা-রোগ :—এরাম ট্রিফিল্যান এই সকল রোগের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ঔষধ নহে; তবে নাসিকাদিতে চিমটিকাটা প্রভৃতি উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণের স্পষ্ট প্রকাশ থাকিলে ইহা নিশ্চিত উপকার করে।

নাসিকাসর্দি বা করাইজ্ :—এরাম্ ট্রি ফিলাম্ সর্দিতে নাসিকা হইতে উগ্র স্রাব নির্গত হওয়ায় নাসিকারন্ধু ও ওষ্ঠে ক্ষত জন্মে এবং রোগীর সর্সদাই নাসিকারন্ধু মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা হয়। কখন কখন চক্ষু এবং নাসিকা উভয় হইতেই পীতবর্ণ ও উগ্র স্রাব প্রবাহিত হয়। তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু জলপান করিতে বেদনা লাগে। উগ্র ও তরল স্রাব প্রবাহিত হইলেও নাসিকার সম্পূর্ণ রোধ ঘটিতে পারে। আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ নিদ্রালুতা এবং হাঁচি-বার প্রবৃত্তি উপস্থিত থাকে। **লাইকতে** দিবারাত্রি নাসিকার রোধ সহ সামান্য ও হাজাকর স্রাব হয়। নাসারন্ধুর পশ্চাতের শুষ্কতা এবং অগ্রভাগের স্রাব থাকাও **লাইকর** বিশেষ লক্ষণ মনো গণ্য।

স্বরবন্ধরোগ—স্বরভঙ্গ :—গায়ক এবং বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ হইলে **এরাম্ ট্রি** উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হঠাৎ স্বরের পরিবর্তন হওয়ায় তাহা উচ্চ মাত্রায় উঠে। অধিকতর ব্যবহারে স্বর ছিন্ন হয় ও বসিয়া যায়। **সিলিনিব্রামের**ও সর্সদা স্বর পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইয়া থাকে; গীতের আরম্ভেই অথবা বহুক্ষণ স্বরের ব্যবহারের পরেও স্বরভঙ্গ হয়; প্রাতঃকালে স্বরবন্ধ হইতে প্রচুর ও স্বচ্ছ শ্লেষ্মা নিষ্চ্যুত হওয়া **সিলিনিব্র** বিশেষ প্রকৃতি।

প্র্যাক্ফাইটিস্—স্বর আয়ত্তাধীন থাকে না, গান করিতে আরম্ভ করিলেই স্বর ছিন্ন হইয়া ও গলা বসিয়া যায়।

আজের্ণটে মেট :—স্বরবন্ধের জ্বালা ও কাঁচাভাব, কথা কহিলে ও স্বরের অশুবিধ ব্যবহার করিলে বর্দ্ধিত হয়। গায়ক এবং বক্তাদিগের স্বরের পরিবর্তন হইলে ইহা উপকারী। স্বরবন্ধে প্রচুর ও সিক্ক করা শ্বেতসারবৎ নির্যাস থাকে ও তাহা সহজে উঠে।

ব্যাক্রা কার্ভ—কণ্ঠার পেশীউপাদানের শিথিলতা বশতঃ স্বরভঙ্গ।

লেখক্কার ৯২ (LECTURE XCII.)

এলাস্থাস্ (*Ailanthus glandulosa.*)

(সিমারুবেসিজাতি ।)

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের মাগুকেজ্রে এলাস্থাসের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ার ইহা বে, দুর্বল ও সাংঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা অনেকাংশে দুর্বলতামূলক নানাপ্রকার জ্বর ও আরক্ত জ্বরের সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট। ত্বক্ সহও ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তাহাতে ইহা আরক্তজ্বর বা স্থানেটিনাবৎ উদ্ভেদ উৎপন্ন করে।

লক্ষণ।

মনঃ—অর্দ্ধচেতন্যাবস্থা; রোগীকে কিছু বলিলে সে তাহা বুঝিতে পারে না। কষুপ্তি, প্রলাপ এবং চেতনহীনতা। নিদ্রাহীন ও অস্থির রোগীর অবিশ্রান্ত ও অক্ষুট প্রলাপ কথন।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর, পাতলা, উগ্র এবং রক্ত সংযুক্ত শ্রাব। নাসারন্ধ্রে রক্তাধিক্য; শ্রাব বসিয়া যায়।

মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর।—ওষ্ঠ কাল্‌চলোহিত। দন্তে মল বা সডিস সঞ্চয়। ভিহ্বা শুষ্ক, পাচ্মেন্টকাগজের তায় ও ফাটা। গলমধ্য কৃষ্ণাভলোহিত, প্রায় বেগুনে; ক্ষীত; টনসিলগ্রস্থি ক্ষীত এবং বহুতর, গভীর ও উগ্রলোহিত ক্ষত দ্বারা খচিত এবং তাহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসরণ; গলবহির্দেহ ক্ষীত ও স্পর্শে অসহিষ্ণু। গলা খাঁকর দিলে শ্লেষ্মা উঠে।

চিকিৎসা।—সাধারণতঃ অতিশয় দুর্বলতা জনক ও সাংঘাতিক প্রকৃতির তরুণ রোগে রোগী হঠাৎ ভয়াবহ দুর্বল ও চেতনহীন হইয়া

পড়িলে এলাস্থাস্ প্রযুক্ত হইতে পারে ; রোগীর গাত্র কৃষ্ণাভ-
লোহিত । লক্ষণগত মাদৃশ্ব থাকিলে ডাং ফ্যারিংটন ইহা হে-ফিবার বা
ওষধিগন্ধজ্জ জরে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন ।

ফলতঃ অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির আরক্তজ্বরের বা স্ক্যালেন্টে
ফিবারের চিকিৎসা জট্ট ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । অতীব
সাংঘাতিক আরক্তজ্বরের অতি কঠিন অবস্থায় ইহা উপযোগী ।
রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে, উদ্বেদ সম্পূর্ণ বাতির হয় না এবং যাহা
বাতির হয় তাহাও কৃষ্ণবর্ণ অথবা কৃষ্ণাভলোহিত ; গলাভাস্তর শীত
ও কৃষ্ণলোহিত এবং গ্রোবদেশের কোষময় কিল্লি প্রদাহিক রসপূর্ণ ও
স্কাত । নাসিকা হইতে ক্ষতকর স্রাবের নির্গম হয় । চরম দৌর্বল্যগ্রস্ত
এবং নিদ্রালু রোগী পাতলা, রক্তসংযুক্ত ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে এবং
তাহার সর্কবিধ স্রাব নিঃসরণেই পুতিগন্ধ ছাড়ে । উপরি উক্ত রূপ লক্ষণ
থাকিলে ইহা দোষসূক্ত গলক্ষত বা ডিসফিরিয়া
রোগেরও অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত ।

লেকচার ৯৩ (LECTURE XCIII.)

স্বাস্থ্যইনেরিয়া (Sanguinaria Canadensis)

(প্যাপাভিরেসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—স্বাস্থ্যইনেরিয়া যাহার কাণ্ডপ্রতিষেধক—ওপি, রাস্।
সাধারণ ক্রিয়া।—প্রধানতঃ স্বাস্থ্যইনেরিয়া কাণ্ডের আক্রমণ দ্বারা স্বাস্থ্যইনেরিয়া তাহার উত্তেজনা এবং প্রতিশ্যায়িক অবস্থা প্রকাশ করে। নিউমগ্যাষ্ট্রিকল বায়ুতে ইহার স্পষ্ট ক্রিয়া বশতঃ ইহা দ্বারা যকৃৎ ও পরিপাকপথ বিকারগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়াফল স্বরূপ শোণিত গতির মন্থরতা প্রযুক্ত অঙ্গনিচয় শীতল এবং ত্বক রক্তহীন ফেকাসে হইলে তাহা পরিবর্তনশীল বায়ুতে অসহিবু হইয়া থাকে। শিরা প্রসারিত ও ঘুটবৎ অনুভূত হয়।

লক্ষণ।

মন।—উৎকর্ষা এবং ভীতি। ক্রোধ বশতঃ উত্তেজনা প্রবণতা ; বিষাদ।

মস্তক।—প্রাতঃকালে উপবেশন অথবা নত অবস্থা হইতে উত্থান করিতে এবং ত্বরিত মস্তক কিরাইলে অথবা উর্দ্ধে তাকাইলে শিরো-বৃর্নন। মস্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ার কণে হুস্ হুস্ শব্দ এবং শোণিতোচ্ছ্বাস। থাকিয়া থাকিয়া মাথার ব্যথা। শিরঃশূল মস্তকপশ্চাতে আরম্ভ হইলে উর্দ্ধে বিস্তৃত এবং দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে স্থায়ী হয়। অধিকাংশ সময়ে ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় শিরঃশূলের মুক্ত বায়ুতে উপশম। অপরাহ্নকালে মস্তক ও গ্রীবা পশ্চাতে বেদনা। শিরঃশূল, বিবমিষা এবং শীতানুভূতি হওয়ার পর

তাপোচ্চাস হইলে তাহা মস্তক হইতে আমাশয়ে বিস্তার করে। দপ দপানি শিরঃশূলের তিক্ত বমনে, শরীর চালনায় অথবা নত অবস্থায় বৃদ্ধি।

স্নানু ১—দক্ষিণ বাহুর খঞ্জতা। দক্ষিণ পার্শ্বের পক্ষাঘাত। আলস্য, জড়ভাব ও ক্লান্তি; মানসিক অথবা শারীরিক শ্রমবিমুখতা, সিক্ত বায়ুতে বদ্ধিত। মুক্ত বায়ুमध्ये ভ্রমণকালে অঙ্গনিচয়ের দুৰ্বলতায় রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উদরে তপ্ত জল প্রবাহিত হইতেছে।

কর্ণ ১—কর্ণশূলে কর্ণে হুল বেধবৎ বেদনা, শিরঃশূল এবং শিরোগর্ঘন। ঋতুসন্ধিকালে কর্ণে উচ্চ রব ও গুণ গুণ শব্দ এবং আকস্মিক শব্দে কণ অসাড়িষ্ণু।

নাসিকা ১—সদ্বিতে পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাসিকা হইতে জল-বৎ ও তাত্র সদ্বি নিঃসরণ, নাসিকামূলে ভারিবোধ সহ বেদনা এবং নাসিকা রক্তে চনুচান ও হুলবেধবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র ১—সন্ধ্যাকালে শয়নের পর শুষ্ক কণ্ঠায় শুভুগুড়ি হইলে শুষ্ক, খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি এবং কৌটবিচরণবৎ অন্ততৃতি নিম্না-ভিমুখী হইয়া বক্ষাভ্যন্তরে যায়। নিদ্রাভঙ্গের পর শুষ্ক কাসি উঠিয়া না বসিলে এবং উদ্ধাধপথে বায়ু নিঃসরণ না হইলে নিরুক্তি হয় না। সদ্বি সহ কাসি হইলে গণ্ডদেশ লোহিত এবং বক্ষ বেদনায়ুক্ত কঠিন শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং বক্ষের সংকোচনে গভীর শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা। বক্ষের উর্দ্ধভাগে আবিশ্রান্ত চাপ ও গুরুত্ব বশতঃ শ্বাস প্রাশ্বাসের কষ্ট। বুকাস্থি বা ঠোঁর্গাম এবং দক্ষিণ স্তনাগ্রের মধ্যবর্তী স্থানে তীব্র, চিমটিকাটার স্থায় এবং পেশীশূলবৎ বেদনা। মধ্যবক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন বেদনা ও জ্বালা। অপরাহ্ন ৪ টার সময় দক্ষিণ বাহু এবং কণ্ঠাস্থির নিম্ন হইতে জ্বালা নিম্নাভিমুখে শ্বোত বহিয়া

বকুং প্রদেশে যায়। দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্রের নিম্নে তীব্র স্থিবেধবৎ বেদনা। চিমসা গম্বার কণ্ঠে নিষ্ঠূত ; লৌহমরিচার বর্ণযুক্ত গম্বার ও অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ। দক্ষিণ বক্ষ হইতে স্বক্ণ পর্য্যন্ত বেদনায় হস্ত কণ্ঠে মস্তকোপরি লইতে পারা যায় ; অপরাহ্নে উভয় স্তনের ব্যবধানস্থলে জালাযুক্ত বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক। শ্বাস বায়ু ও গম্বার বাহার পর নাই দুর্গন্ধযুক্ত।

পাল্লাভ্যন্তর ।—গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলমধ্য ক্ষাঁত বোধ হওয়ায় যেন শ্বাস রোধের উপক্রম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা অধিকতর থাকে। গর্গলিতে বেদনা লাগে। কণ্ঠদেশ শুষ্ক বোধ হইলে জল পানেও তাহার উপশম হয় না। কণ্ঠার ছাল ওঠা ও অবদারভাব জন্ম তাহাতে টাটানি বেদনা।

অক্ষনিচয় ।—দক্ষিণ বাহু ও স্বক্ণে রসবাতজ বেদনা নিবন্ধন রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি।

স্বক ।—যুবতী স্ত্রীলোকাদিগের, বিশেষতঃ তাহাদিগের ঋতুস্রাব অত্যন্ত হইলে মুখে উদ্ভেদ জন্মে।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক ।—বমনযুক্ত শিরঃশূল বা “সিক্ হেডেকের” স্ফ্রাঙ্কুইনেরিয়া অগতম প্রধান ঔষধ। ইহার বেদনা প্রাতঃকালে মস্তকপশ্চাতে আরম্ভ এবং মস্তকোপরি দেশ বাহিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে স্থায়ী হয়। যে পর্য্যন্ত ভুক্ত বস্তু এবং পিত্তের বমন না হয় বেদনার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বমন হইলে কখন কখন তাহার উপশম হইয়া যায়। গোলমালে ও আলোকে বেদনার বৃদ্ধি এবং নিদ্রায় উপশম। বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে উপশম জন্ম রোগী ক্ষিপ্তের ত্রায় উপাধানমধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করে। যে সকল

দ্রীলোকের অত্যধিক ঋতুস্রাব হয় তাহাদিগের শিরঃশুলের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ।

মস্তকে তাপ ও অধিকতর দপদপানি, মুখের রক্তমা এবং পদের শীতলতা এবং বেদনা, মস্তক পশ্চাৎ হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া চক্ষুতে স্থায়ী হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বেলাডনাতে সুস্পষ্ট না থাকায় তাহা স্রাজ্জু হইতে বিলক্ষণ প্রভেদিত হয়। স্রাজ্জুশিরঃশূল শয়নে এবং বেলেবর তাহা রোগীকে শয্যায় উঠাইয়া বসাইলে উপশমিত হয় : মস্তকে রক্তাধিক্য জন্ত বেলেবর এবং আমাশয়বিকার উক্ত স্রাজ্জুর শিরঃশূল জন্মে। অনেক সময় স্রাজ্জু, জেলস ও ইগোর এবং নানাবিধ রূপে অল্প কতিপয় ঔষধের শিরঃশুলের প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম ।

স্মুল্লিকাসি বা ক্রুপি ;—স্রাজ্জুইনেরিয়ার রূপ রোগে স্তন্যস্থলস্থ অলীক ঝিল্লি (False membrane) জন্মে এবং স্বঃবস্ত্র শুষ্ক জ্বালাযুক্ত ও স্ফীত বোধ হয় এবং তাহাতে সাঁই সাঁই, হৃৎহৃৎ শব্দযুক্ত কাসি থাকে। শুষ্কতা ও জ্বালাই ইহার প্রদর্শক।

নিউমনিয়া ;—জ্বর, বক্ষের উর্দ্ধাংশে জ্বালা এবং পূর্ণতা, শুষ্ককাসি ও বক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র খোঁচানিবেদনা, শ্বাস-রুদ্ধ, এবং ফসফরাসের ঝায় লৌহ মরিচার বর্ণের গম্বীর থাকিলে নিউমনিয়া রোগে স্রাজ্জুইনেরিয়া উপযোগী। ইহাতে, বিশেষতঃ অপরাহ্ন গগুদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে জ্বালাযুক্ত তাপ ও রক্তমা থাকে। হস্তপদ অত্যন্ত তপ্ত অথবা অত্যন্ত শীতল এবং হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্বল ও অনিয়মিত স্পন্দনবিশিষ্ট। ফুস্কুসের স্ফীতি ও রক্তাধিক্যে ইহা ভেরেট্রাম ভিরিডির সমান হইলেও নাড়ীর উত্তেজনা শেযোক্ত ঔষধে অধিকতর থাকে। রোগ সহজে আরোগ্য না হইলে সাল্ফারের ঝায় স্রাজ্জুতেও

পূয়যুক্ত গন্নার নিষ্ঠুরত হয়, কিন্তু ইহার গন্নার অধিকতর দুর্গন্ধ থাকায় রোগী তাহা স্বয়ংও অনুভব করে ।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্ ;—স্লাম্‌ইনেরিয়ার যক্ষ্মাকাসরোগের প্রলেপক বা হেকটিক্ জ্বর অপরায়ু ৪টার সময় বন্ধিত হয় এবং তাহাতে গওদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে রক্তমা, স্বরযন্ত্র ও বক্ষের উর্দ্ধাংশের গুড়গুড়ি জত্র গুড় কাসি এবং ইহার বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ যেন শোণিত পূর্ণতা বশতঃ বক্ষের উর্দ্ধাংশে জ্বালা ও পূর্ণভাব (Phthisis florida) থাকে । দক্ষিণ বক্ষের স্তন্যগ্র সন্নিহিত স্থানে তীব্র, সূচিবোধবৎ বেদনার বর্তমানতা এবং বক্ষপেশীর টাটানি ও শ্বাসকৃচ্ছ ইহার অগ্রতর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ । টুবাকল বা গুটিকা সংস্থাপনের পূর্ববর্তী রোগারম্ভকালে এবং রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় ইহা উপযোগী ; পুরাতন গুড় কাসি থাকে এবং কাসি সরলও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নিষ্ঠীবন কষ্টকর ; শয়নে কাসি বৃদ্ধি পায় । রোগের পরিণত অবস্থায় গন্নার এবং প্রশ্বাসবায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, এমন কি রোগীর নিজের নিকটেও দুর্গন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ইহার প্রয়োগের সময় উপস্থিত হয় । এই সময়ে ইহার প্রয়োগে গন্নার নিষ্ঠীবন ও শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া থাকে । অক্ষসীমার অদম্য শীতলতা এবং বক্ষমধ্যে জ্বালা ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য ।

ফেরান মেট—যক্ষ্মাকাসের (Phthisis florida) প্রারম্ভিক অবস্থার রক্তপ্রাব ।

ল্যাকেসিস্—নিউমনিয়া হইতে যক্ষ্মাকাস জন্মিলে ।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্ ;—স্লাম্‌ইনেরিয়া পেশীর প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহাতে যে বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি জন্মে তাহা রসবাতরোগবৎ প্রতীয়মান হয় । টাটানিযুক্ত ও কঠিন পেশীতে চঞ্চল অথবা সূচিবোধবৎ বেদনা জন্মে । ইহাতে গ্রীবা এবং পৃষ্ঠের

পেশী বিশেষরূপে আক্রান্ত । স্বক্কের ডেন্টাইড-পেশীর রসবাতরোগে ইহার বিশেষ আরোগ্যশক্তি প্রকাশিত । এই বেদনার রজনীতে ও শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে বৃদ্ধি । বেদনা এতই কঠিন যে, রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না ।

ন্যাট্রো কার্ব—ইহার দক্ষিণ স্বক্কের বেদনার তাপে উপশম এবং শয্যায় বৃদ্ধি ।

ফেরাম—স্বক্ক এবং হস্তের উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশের পেশীর ছিন্নবৎ বেদনায় রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না ; কিন্তু হস্তের মূচ্ছ চালনায় বেদনা ক্রমে অন্তর্দান করে ।

ফেরাম ফস—স্বক্কের, বিশেষতঃ দক্ষিণ স্বক্কের রসবাতরোগে ইহা ফলপ্রদ ।

নাক্স মফেতা—বাম স্বক্কপেশীর আক্রমণ ।

বয়োত্রণ বা একনি :--বয়োত্রণরোগের, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের অত্যন্ত ঋতুপ্রাব এবং শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা থাকে তাহাদিগের বয়োত্রণরোগে **স্বাস্থ্যইনেরিয়া** উপকার করে ।

আমরা উপরে **স্বাস্থ্যইনেরিয়ার** যে কতিপয় প্রধান রোগের বিষয় উল্লেখ করিলাম অবস্থানুসারে তৎবাতীতও অনেক রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । তন্মধ্যে কতিপয় রোগের বিষয় নিয়ে উল্লিখিত হইল ।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসঙ্কিকালীন শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন বেদনাদি কৰ্ণ বিকারে ইহা উপকারী । এস্থলে ইহা প্লেনইনের তুল্য । শুষ্কবায়ুরোগে ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা থাকিলে ইহা তাহার ঔষধ । তাহাতে **স্বাস্থ্যইনেরিয়া** সহ **ফস**, **ইথের**, **ভ্যালেরি** এবং **নাক্স** ভ তুলনীয় । উপার উক্ত শোণিত সঞ্চলনবিশৃঙ্খলা বশতঃ মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব সহ শিরোধূর্ণনে রোগী

উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোথান করিতে বিবিধা ও মুচ্ছা যাওয়ার
 তায় বোধ করে। ঋতুসন্ধিকালীন নানা প্রকার শোণিত-
 স্রাবেও স্ফাঙ্কুইনেরিয়া উপযোগী ঔষধ, তন্মধ্যে জ্বরাস্থ
 রক্তস্রাবই প্রধান। শোণিতোচ্চাস বশতঃ মুখের রক্তমা ও
 তাপোচ্চাস। ইহার সহিত বমনযুক্ত শিরঃশূল বর্তমান থাকে এবং
 রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, চাপ চাপ ও কখন বা
 দুর্গন্ধযুক্ত ; প্লনইন, গ্রমিল নাই এবং ল্যাক-
 সিস তুলনীয় ঔষধ। শোণিতসঞ্চলন বিশৃঙ্খলাই ইহাদিগের অধিকাংশ
 রোগের কারণ। এজন্য শরীরবদ্বিবেশে রক্তাদিক্য ঘটিলে বিশেষ
 বিশেষ রোগ জন্মে। তরুণ নাসিকাসন্ধিতে পুনঃ পুনঃ
 হাঁচি, চক্ষু উপরি, চক্ষু অভ্যস্তরে এবং নাসিকামূলে বেদনা হইলে এবং
 কাসিতে রজনীতে রোগী উঠিয়া বাসিতে বাধা হইলে এবং উর্দ্ধাধ পথে
 বায়ু নির্গত হওয়ায় কাসির উপশম হইলে ইহা উপকারী। এই সকল
 রোগে রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উষ্ণ স্রোত উদরে যাইতেছে।
 ইন্সুল্কুফেঞ্জা রোগেরও অবস্থান্তরে ইহা ঔষধ।

স্বরযন্ত্রে রক্তাদিক্য বশতঃ স্ফরলোপ জন্মিলে, ইহা দ্বারা তাহা
 আরোগ্য হইতে পারে। কর্ণের এবং জরায়ুর বল্পাসাদার্ভুদ বা
 শলিণাস ইহা আরোগ্য করিয়াছে।

লেকচার ৯৪ (LECTURE XCIV.)

গুয়াইয়াকাম (Guaiacum officinale.)।

(জাইগোফিলিজাতি ।)

সাম্ভাবনা ক্রিয়া ।—গুয়াইয়াকামের ক্রিয়ায় ঘর্ম, মূত্র এবং পিত্ত-
শ্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং তাপবোধাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা রস-
বাতিক ও সন্ধিবাতিক বেদনা উৎপন্ন করে। রসবাতাক্রান্ত ও বেদনা-
যুক্ত অঙ্গে তাপের অনুভূতি হয়। রোগী শীর্ণ হইয়া যায়। রসবাতরোগ
নিবন্ধন ক্ষীণ ও বেদনায়ুক্ত সন্ধিতে তাপ সহ্য হয় না। শ্রাবমাত্রই
ভর্গকগুক্ত থাকে।

লক্ষণ ।—অত্যধিক পরিশ্রম করার ঞ্য় রোগীর, বিশেষতঃ
উরু ও বাহুতে বলক্ষয় ঘটে। সংকুচিত অঙ্গের কাঠিগ্ন বশতঃ তাগ
চালনার অনূপযুক্ত হইয়া যায়। বেদনার প্রকৃতি আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ
এবং অনেক সময়েই তাহা, বিশেষতঃ মস্তক বেদনা, সৃচিবৈধার ঞ্য়
বেদনায় পর্য্যবসিত হয়।

বোধ হয় যেন চক্ষু ক্ষীণ হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষুপুট
ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তাগ আবৃত করিতে পারিতেছে না। বাম বক্ষের
বম্বিগ্নিতে বৈধাবৎ বেদনার (Pluritic stitches) দীর্ঘকাল গ্রহণে বৃদ্ধি
এবং যক্ষ্মাকাসরোগে ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে। মস্তক
চালনা করিলে কুসকুসে তীব্র বেদনা এবং তাহা হইতে ভর্গক পূয় নিষ্ঠূত
হয়। মুখে প্রদাহ জন্মে এবং গলদেশ জ্বালা করে ও টনসিল গ্ৰন্থির
আশঙ্কিত প্রদাহভাব লক্ষিত হয়।

রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের অণ্ডাধারপ্রদাহ হইবার বিশেষ
সম্ভাবনা থাকে।

অঙ্গনিচয়ে ভিন্ন ও স্থলবেধবৎ বেদনা সামান্য চালনায় বর্ধিত । সন্ধিবাতে ছুরিকাঘাতের ত্রায় বেদনায় অঙ্গ সঙ্কুচিত অবস্থা প্রাপ্ত । উপবেশন করিলে উরুতে চুলকণার, তাহা চাপিত করার এবং তাহাতে কীট বিচরণবৎ কষ্টের অনুভূতি । বাহু এবং উরুতে ক্লান্তি জন্ম বেদনার ত্রায় বেদনা হওয়ায় রোগী তাহা চালনা করিতে ভীত ।

চিকিৎসা ।

টনসিলাইটিস বা টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ ;—প্রতি-শ্রায়িক টনসিলগ্রন্থি প্রদাহের আরম্ভক অবস্থায় **গুহাইইহাকাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য । প্রচণ্ড জ্বালা, শিরঃশূল, গলদেশের তাপ, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গে শীত ও কনকনানি ইহার প্রধান লক্ষণ ; গ্রন্থিতে অতি শীঘ্র পূয় জন্মে । শীঘ্র শীঘ্র **গুহাইইহাকাম** ১× প্রয়োগ করিলে রোগ অক্ষুরই বিনষ্ট হইতে পারে ।

পালক্ষত বা সোরথ্রোটি ;—গলাধঃগহ্বরদেশের সাধারণ প্রদাহ বা ফ্যারিঞ্জাইটিসরোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকিলে **গুহাইইহাকাম** প্রায় অবার্থ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয় । ইহার অস্ত্রান্ত্র প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে টনসিলগ্রন্থির স্ফীতি এবং কণ্ঠার শুষ্কতা বশতঃ গেলার কষ্ট হওয়ায় তাহার সাহায্য জন্ম জলপানের আবশ্যকতা বর্তমান থাকে ; কণ্ঠায় স্থলবেধবৎ বেদনা অথবা মরিচসংস্পর্শবৎ জ্বালা উষ্ণ ও সিক্ত বায়ুতে বর্ধিত ।

পাল্‌সোভিনা—কাল্‌চেলোহিত অথবা জ্বষৎ নীলকৃষ্ণের আভা-বৃদ্ধ হওয়ায় গলগহ্বর দেখিতে বিস্তৃত শিরাবৃত বলিয়া বোধ ; গলগহ্বরে চাঁচা, কাঁচা ও শুষ্কভাব থাকে কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না ।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্—**গুহাইইহাকামে** বহুতর রসবাতিক লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । সন্ধির পুরাতন রসবাতে

সন্ধিতে পিণ্ড বা বর্জুলের সংস্থাপন বশতঃ তাহার বক্রতাদি আকার-
 ব্রষ্টতা জন্মিলে গুয়েইয়াকাম অতুপকারী; রোগের
 প্রথমাবস্থায় প্রয়োজিত হইলে ইহা উপরি উক্ত বর্জুলাদি জমাট
 পদার্থ উৎপন্নের বাধা জন্মাইয়া থাকে। কষ্টিকামের পরে
 প্রথমেই ইহার নির্দিষ্ট স্থান। ইহার অত্যন্ত বিশিষ্ট লক্ষণ স্বরূপ
 কণ্ডুরা বা টেণ্ডনের সংকোচন বশতঃ আকৃষ্ট অঙ্গের আকার ব্রষ্টতা
 জন্মে এবং কোন প্রকার চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়। অত্রাত্ত কতিপয়
 ঔষধেও সন্ধিতে ঘনীভূত রস জন্ত গুটিকার সঞ্চয় হয়, কিন্তু তাহাদিগের
 কোনটিতেই ইহার ত্রায় অঙ্গের সংকোচনাবস্থা ঘটে না। সন্ধিতে কাঠি
 ও টাটানি এবং পেশীতে টাটানি ও পারদ এবং উপদংশ ঘটিত রসবাতেও
 ইহার কার্য হইয়া থাকে। পুষ্মেহের রসবাতে বহু সন্ধি আক্রান্ত হইলে
 তাহার কঠিন, তপ্ত, ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত এবং সংকুচিত হয় এবং সন্ধি
 সংসৃষ্ট পেশীবৃন্দ খর্ব্ব হইয়া যায়।

ফুস্ফুস্বেষ্টনিম্বিপ্রদাহ বা প্লুরিসি—যক্ষ্মা-
 কাদির দ্বিতীয়াবস্থায় পুষ্মযুক্ত শ্লেষ্মার গম্মার থাকিলে যদি প্লুরিসি হয়
 তাহাতে গুয়েইয়াকাম উপকারী।

লেখকচারণ ৯৫ (XCV.)

সার্সা পেরিলা (Sarsa Parila)।

(স্বিলেসি জাতি।)

সংস্করণ ১—সার্সা যাহার কার্ষ্যপ্রতিষেধক—বেল, মার্ক।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া ১—সার্সা পেরিলা শোণিতে অতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিলে ত্বকে দক্ষবৎ এবং অত্যাচ্ছ নানাবিধ উদ্ভেদ উৎপন্ন হয়। মূত্রযন্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ মূত্ররেণুরোগের লক্ষণের ত্রায় লক্ষণ দেখা দেয়। বস্তুতঃও ইহা শেযোক্ত রোগের অত্মতম ঔষধ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে; ইহার ক্রিয়ায় রোগী বড় শীর্ণ হইয়া যায় এবং লোল ও সংকুচিত ত্বক জন্ম অকালবৃদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। রোগী গণ্ডমালা ও পৃষধাতু প্রকৃতি বিশিষ্ট থাকে। কৃষ্ণকেশ ব্যক্তি ইহার উপযুক্ত কার্ষ্যক্ষেত্র।

লক্ষণ ১—প্রত্যেক বক্ষচালনায় পৃষ্ঠ হইতে স্চিবেধবৎ বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া যায়। বক্ষের আক্ষেপিক কষ্ট। পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছার সহিত অল্প মূত্রত্যাগে জালা। দিবস এবং রজনীতে পুনঃ পুনঃ, প্রচুর এবং ফেকাসে মূত্রত্যাগ। মূত্রে মূত্ররেণু অথবা স্কুদ মূত্রশিলা। অতাল্ল এবং ঘোলাটে মূত্রত্যাগ মাত্র কর্দম মিশ্রিত জলের ত্রায় হইয়া যায়। মূত্রশ্রাব শেষ হওয়ার পর কঠিন বেদনা এবং মূত্রের শেষ অংশে রক্ত। কামবিষয়ক স্বপ্ন হইলে রেতঃক্ষরণ, পৃষ্ঠবেদনা, দৌর্ভাগ্য এবং শিরোগর্ভন হয়। কামের অনুভূতি ব্যতীত সামান্য উত্তেজনাতেই শুক্রস্থলন। স্বপ্নদোষে শোণিতক্ষরণ হয়। লিঙ্গ-মুণ্ডত্বকে দক্ষবৎ উদ্ভেদ।

সম্পূর্ণ গাত্রেই দক্ষবৎ উদ্ভেদ। ত্বকে গভীর জালা ও বেদনায়ুক্ত বিদারণ। কখন কখন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয্যায় এবং প্রাতঃকালে গাত্রোথানে সম্পূর্ণ শরীরে চুলকনা। সিন্ধু উদ্ভেদ হইতে হাজাকর

স্রাব । শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ কুস্কুড়ি কেবল তাপের সংশ্রব হইলে চুলকায় ।
কোচকান ঝক ।

চিকিৎসা ;—মূত্রযন্ত্ররোগের চিকিৎসায় সার্সা পেরিলা
কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । কিড্‌নির স্নায়ুশূলরোগের
ইহা অগ্রতম ঔষধ । বৃক্কে মূত্রেণু জন্মিলে অথবা তাহা হইতে ক্ষুদ্র
মূত্রশিলার গমনকালে বৃক্ককশূল হয় । ডাং হোরিং উপরি উক্ত
রোগে, বিশেষতঃ রোগী রসবাতরোগগ্রস্ত থাকিলে, ইহা দ্বারা অনেক স্থলে
উপকার পাওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । লাইকর পরিষ্কার
মূত্রে লোহিত মূত্রেরেণু এবং সার্সার অত্যন্ত ও ক্লেদযুক্ত অথবা
স্তরবিশিষ্ট শুষ্ক মূত্রেরেণু থাকে । কথিত মূত্রলক্ষণ থাকিলে উভয়
ঔষধই পুরাতন রসবাত আরোগ্যে সক্ষম । মূত্রত্যাগ শেষ
হইলে অত্যন্ত, প্রায় অসহনীয় বেদনার
আক্রমণ সার্সার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । এই বেদনা
সহ অনেক সময়েই যে প্রচণ্ড কুহন হয় তদ্বৎ প্রবলকুহন অল্প ঔষধে
বিরল । কখন কখন উপরি উক্ত লক্ষণ সহ রক্তমুক্ত মূত্রস্রাব
হয় । লিঙ্কশেষ্ট্রকের দ্রুতরোগে ইহা উপকারী ।
গ্রীষ্মের দিনে ইহার উদ্ভেদ ক্ষতে পরিণত হয় । পারদ ঘটিত
অস্থিবেদনা দিক্ততায় বদ্ধিত হইলে এবং পারদ, উপদংশ ও
অস্তঃপ্রবিষ্ট পুয়ধাতু হইতে উৎপন্ন শিরঃশূল মস্তক পশ্চাৎ হইতে চক্ষুতে
বিস্তৃত হইলে সার্সা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম । উল্লেখিত মূত্রপ্রকৃতি;
শারীরিক, বিশেষতঃ গ্রীবার শীর্ণতা এবং হৃকের কুঞ্চিতভাব থাকিলে
শিশুক্ষ্মারোগে ইহা উপকার করিতে পারে । এস্থলে ইহা
আলুডিন, নেট মিউ এবং গ্রত্রটে সহ তুলনীয় । কামোন্তে-
জনা অথবা রজনীতে রোতঃক্ষরণ জন্ত অণুকোষরজুর ক্ষীতি ও নিম্নপৃষ্ঠ হইতে
অণুকোষরজু বাহিয়া নিম্নগামী বেদনা সার্সা আরোগ্য করিয়া থাকে ।

লেকচার ৯৬ (LECTURE XCVI.)

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana.)।

(ভ্যালেরিয়ানেসিজ্জাতি।)

সম্বন্ধ ।—ভ্যালেরিয়ানের কার্যপ্রতিবেদক—ক্যাফ্ফার, কফিয়া, পাল্‌স্‌।

সাধারণ ক্রিয়া ।—মস্তিষ্কমেরুসজ্জায় ক্রিয়া দ্বারা ভ্যালেরিয়ানা মাৎস্যভাবে স্নায়ুকেন্দ্রনিচয় আক্রমণ করিলে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়। এই ক্রিয়ার ফল স্বরূপ যে স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা, বেদনা এবং আক্ষেপ উৎপন্ন হয় তাহাতে ভ্যালেরিয়ানা-ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ গুল্মবায়ুরোগলক্ষণের আভাস পাওয়া যায়।

লক্ষণ ।—অসাধারণ আনন্দানুভূতি। বৃদ্ধির অস্পষ্টতাব। দ্রাস্তি-মূলক চিহ্না বশতঃ রোগী মনে করে সে অল্প কোন ব্যক্তি, তাহার স্থান করিবার জন্য শয্যার পার্শ্বে সরিয়া যায়; রোগিণী মনে করে তাহার নিকট কোন জন্তু শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে আঘাত করিতে পারে। মূহ প্রলাপকালে অত্যন্ত উত্তেজনা ও কম্প উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণ স্নায়ুগুল্মের কম্পাবিত্তাব, ঝাঁকি, আনন্দন ও কম্প। শরীরের অনেক স্থানে ক্ষণস্থায়ী ঝাঁকির স্থায় আকৃষ্টতা।

চিকিৎসা ।—গুল্মবায়ুরোগেই ভ্যালেরিয়ানা-নেত্র প্রধান প্রয়োগ দোষিত পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিমতে এরোগ চিকিৎসায় ইহা প্রধান অবলম্বন বলিলেও বোধ হয় অত্যাঙ্গি দোষ ঘটে না। হোমিওপ্যাথিমতে স্থলবিশেষে ইহা বিলক্ষণ উপযোগী ঔষধ বিবেচিত হয়। আমাশয় হইতে কোন ঔষধস্ত উখিত হওয়ার অনুভূতি

ইহার রোগের একটি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতালক্ষণে ইহা **ট্যারেন্টুল্লা** সহ তুলনীয়। **ট্যারেন্টুল্লা**র ন্যায়ই **ভ্যালেরিয়ানা**রোগী সর্বদা চঞ্চল থাকে বা শরীর চালনা করে; কিন্তু এই শ্রম বশতঃ শিরঃশূল জন্মে ও সামান্য বেদনাতেই রোগী মুচ্ছা যায়। উপরিউক্ত “আমাশয় হইতে কোন উষ্ণ বস্তু উত্থিত হওয়ার অনুভূতি” লক্ষণে স্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; ভীতি, কম্পভাব এবং জ্ব-কম্পও বর্তমান থাকে। **ভ্যালেরিয়ানা**রোগীর স্নায়ুগুণ অত্যন্ত উত্তেজিত থাকায় রোগীর মনোভাবের আনন্দময়তা, উল্লাস এবং গম-প্রিয়তার দিকে গতি থাকে। ইহাতে গুল্মবায়ুরোগের “গুল্ম বা শ্লোবাস হিষ্টেরিকাস” এবং রসবাতিক বেদনার প্রতিকৃতিবৎ নানাবিধ বেদনা উপস্থিত হয়। সুস্পষ্ট স্নায়বিক চাপ্তোল্য বা কম্পান্বিত ভাব এবং আমাশয় হইতে উষ্ণ বস্তু উত্থিত হওয়ার অনুভূতিই ইহার বিশেষ প্রভেদক লক্ষণ। মানসিক ভাবের পর্যায়ক্রমিকতাও ইহার প্রধান স্থানীয় লক্ষণমধ্যে গণ্য। আক্ষেপ অপেক্ষা গুল্মবায়ু ঘটিত অভ্যাসগত মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। কখন কখন রোগীর ঞ্চাশক্তির ঘ্রাণে অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা থাকায় ঞ্চাশক্তির ভাব জন্মে। **স্ফ্রাক্স**, **ফস**, **ইগ্রে** এবং **নাকস** ভ তুলনীয়।

ল্যাম্পেগ বা **পুপ্রসী** রোগবৎ লক্ষণও **ভ্যালেরিয়ানা**র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার প্রচণ্ড, আকৃষ্টবৎ, তীব্রবিদ্ধবৎ এবং ঝাঁক লাগার গ্রায় অঙ্গবেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইলে উপবেশনে বর্দ্ধিত ও চালনায় উপশ-মিত হয়! রোগীর কটিদেশে টান লাগার অনুভূতি থাকে। ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণও অগ্রাঙ্গ অঙ্গবেদনার অনুরূপ। ফলতঃ এই সকল বেদনা গুল্মবায়ু লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে।

লেকচার ৯৭ (LECTURE XCVII.)

ককুলাস ইণ্ডিকাস্ (Cocculus Indicus.)।

(মিন্‌স্পার্মেসি জাতি ।)

সম্বন্ধ।—ককুলাসের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, ক্যাম, কুপ্রাম, ইণ্ডে, নাক্‌স্‌ভ। ককুলাস্‌ বাহার কার্যপ্রতিষেধক—এল্‌কহল, ক্যাম, কুপ্রাম, ইণ্ডে, নাক্‌স্‌ভ।

সাধারণ ক্রিয়া।—জৈবক্রিয়াসাধক যন্ত্রমণ্ডলে ককুলাস প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিলে গতিদ-স্নায়ুমণ্ডলের বিকার বশতঃ প্রথমে ইচ্ছারূপ পেশীমণ্ডলী এবং পরে চৈতন্যবিধায়িনী স্নায়ুশক্তি আক্রান্ত হইয়া থাকে। উপরি উক্ত উভয় প্রকার স্নায়ুশক্তির বিকলতার ফলস্বরূপ বথাক্রমে পক্ষাঘাত ও ধনুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপ এবং শিরোর্বর্ণন ও মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ যে বিশেষ প্রকারের বিবমিষা ও মূচ্ছার ভাব উপস্থিত হয়, উপরি উক্ত শিরোর্বর্ণন সহ তাহা “আর্গব-বমন বা সামুদ্রিক বিবমিষার” সাদৃশ্য প্রকাশ করে এবং তাহার সহিত শিরোর্বর্ণন থাকুক বা না থাকুক তাহা নানাবিধ স্নায়বিক এবং গুল্মবায়ুলক্ষণের প্রতিকৃতি স্বরূপ প্রতীয়মান হয়; ককুলাসক্রিয়ার ইহাই বিশেষতা বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা অধিকাংশ সময়ে স্ত্রীলোক ও শিশুরোগে উপযোগী।

লক্ষণ।

স্নান। অবিশ্রান্ত ৩:খবিষয়ক চিন্তা, গীত গাহিতে অদম্য ইচ্ছা। স্নরণশক্তির অভাব। উৎকর্ষা, রোগী যেন কোন পাপকার্য্য করিয়াছে। রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে।

সম্ভবক।—মস্ততাৎ শিরোর্বর্ণন; অথবা শয্যা হইতে উত্থান-

কালে বমনেচ্ছায়ুক্ত শিরোগূর্ণন ; শিরোগূর্ণনকালে মস্তকের জড়তা নিবন্ধন বোধ যেন ললাটদেশের পাশাপাশিভাবে এক খানি তক্তা রহিয়াছে. তাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। মস্তকে শূল ও ফাঁপাভাবের অল্পভূতি। মস্তকের বিশৃঙ্খলা ও অজ্ঞানভাব। বমনেচ্ছায়ুক্ত শিরঃশূল।

চাপবৎ শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তক ফিতা দ্বারা চাপিয়া বাঁধা অথবা ক্রু বসাইয়া কশা হইতেছে। শিরঃশূলে বোধ যেন চক্ষু ছিঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে।

নিদ্রা ১—রাত্রি পাহারা, কার্য্যদক্ষীয় চিন্তা, উৎকর্ষা এবং অস্থিরতা প্রযুক্ত অনিদ্রা। শান্তিহীন নিদ্রা।

স্নান ১—সামান্য শ্রমে অত্যন্ত দুর্বলতা নিবন্ধন কষ্টে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলে রোগীর দুর্বলকর ঘর্ম্ম। রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে ও কম্পনে প্রবণতা জন্মে। অস্থিরতা। উষ্ণই হউক, শীতলই হউক মুক্তবায়ুতে অসহিষ্ণুতা। রোগী এতই দুর্বল যে, বড় করিয়া কথা কহিতে পারে না। শরীরের বাম পার্শ্বের অর্দ্ধাঙ্গ। অস্থিতে আঘাতিত হওয়ার স্থায়, ছিন্নবৎ ও গর্ত্ত করার স্থায় পক্ষাঘাতিক বেদনা। শরীরের চালনায় মুচ্ছার ভাব এবং মুখমণ্ডলপেশীর আকারভ্রষ্টতা।

গ্রীবাপেশীর দুর্বলতা নিবন্ধন মস্তক ধারণের অক্ষমতা। পদের এবং হস্তের পর্যায়ক্রমিক ঝিনঝিনি। আহারকালে হস্তের কম্প। জাহু ভাঙ্গিয়া পড়ে বলিয়া রোগী হাঁটিতে টলে। উপবেশনকালে পদতলের ঝিনঝিনি।

পল্লিশাকসন্ত্র—অত্যধিক উদর স্ফীতি। আশাশয়স্থানে সংকুচিতবৎ খোঁচানিতে স্বাসাভাব ঘটে। প্রায় মধ্য রজনীতে বায়ু জত্র আক্ষেপিক উদরশূলের বায়ুনিঃসরণে উপশম হয় না, এবং কাসিলে বৃদ্ধি। কুচকিদেশে অস্ত্রবৃদ্ধি হওয়ার স্থায় বেদনায়ুক্ত ঠেলমারা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—অতি শীঘ্রাগত ঋতুস্রাবকালে উদরে খল্লী, স্ফীতি এবং শূল। ঋতুরোধ বশতঃ বক্ষে খল্লী এবং মুচ্ছাজনক বিবমিষা।

ঋতুস্রাবকালে এত দূর দুর্বলতা জন্মে যে রোগিনী কষ্টে দাঁড়াইতে বা কথা কহিতে পারে। ঋতুস্রাবের স্থলে সিরামরসের ত্রায় খেতপ্রদরে পূষবৎ, হাজাকর ও তরল পদার্থ মিশ্রিত।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল বা হেডেক।—মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূলে ককুলনাস্ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই শিরঃশূলের কণকণানি অতি তীক্ষ্ণ, ইহার সহিত প্রায়ই শিরোরোবুর্নন থাকে এবং ইহা মস্তক-পশ্চাতের নিম্নাংশে আরম্ভ হইয়া গ্রীবাপশ্চাতে যায়। মস্তক অসাড়, শূণ্ড এবং জড়ভাবাপন্ন বোধ হয় ও শিরোবুর্নন সহ অবিশ্রান্ত বিবমিশ্রা থাকে। কোন প্রকার শকটায়োহণ এই শিরঃশূলের কারণ। ককুলনাস্ শিরঃশূলের একটী বিশেষ লক্ষণ “মস্তকপশ্চাতের অস্থি বা অক্সিপাট উন্মুক্ত ও বন্ধ হওয়ার অনুভূতি” ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার ও প্রদর্শক, কিন্তু ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার শিরঃশূলের উপস্থিত-কালের অবিশ্রান্ত ভাবপ্রবণতা দি মানসিক লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। ইহার শিরঃশূল প্রায় অবিশ্রান্তভাবে ধারণ করে এবং তাহাতে বামচক্ষু ও ললাটের উচ্চতর স্থানে বেদনা থাকে। ককুলনাস্ শিরঃশূলের মানসিক প্রমে বুদ্ধি এবং গৃহমধ্যে ও বিপ্রামে উপশম হয়; রোগী অনবরত পশ্চাৎদিকে মস্তক টানটান করে।

স্পাইন্যাল ইন্ডিটেশন বা মেরুদণ্ডের উত্তেজনা।—ককুলনাস্ রোগে কটিদেশে পক্ষাঘাতিক কণকণানি হয়; রোগী উদরে শূণ্ড ও কিছু নাট নাই ভাব বোধ করে। ইহার অত্যন্ত লক্ষণমধ্যে গ্রীবার কাঠিষ্ঠ, মস্তকে বেদনা, অনিদ্রা, ইন্ড্রিয়প্রামের চৈতন্যাদিকা, পুনঃ পুনঃ শিরোরোবুর্নন, অজনিচয়ের কম্প এবং চাপে মেরুদণ্ডের বেদনা প্রভৃতি প্রধান বলিয়া গণ্য।

সিকেলি—ইহাতে মেরুদণ্ড বা তাহার কণ্টকপ্রবন্ধন চাপিলে বেদনা হয়।

দুর্বলতা (Debility)।—অনিদ্রা বা রাত্রিজাগরণ বশতঃ মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডের স্নায়ুগুণের দুর্বলতার ককুলাস উপকার করিয়া থাকে। নিদ্রার অভাবে রোগী অবসাদগ্রস্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। রোগীর শুক্রবার জন্ত রাত্রিজাগরণের সহিত দুশ্চিন্তা থাকায় যে সকল ব্যক্তির দুর্বলতা জন্মে তাহাদিগের পক্ষেই ককুলাস বিশেষ উপযোগী।

কল্‌চিকাম—দুর্বলতা সহ অজীর্ণ থাকিলে।

সিন্‌নিহাম—অপরিমিত কামসেবা জন্ত ক্লাস্তি ও বলহানি জন্মে, রোগী শারীরিক বা মানসিক শ্রমে অশক্ত হয়। ত্বরিত বলহানি বটে।

এনাকার্ড—অপরিমিত কামসেবা ও পাঠ জন্ত স্নায়বিক দৌর্বল্য। শরীর চালনা করিলেই রোগীর কম্প হয়, সে শয়ন করিয়া অথবা সর্বদা বসিয়া থাকিতে চাহে, এক খানি হাত নাড়িতেও কষ্ট বোধ করে।

সি-সিক্‌নেস্ বা আর্গব-বমন।—অত্যন্ত বিবমিষা ককুলাস বমনের অত্যন্ত বিশেষতা। শরীর চালনা, শরীরাবস্থানের পরিবর্তন, বিশেষতঃ শকট অথবা নৌ-আরোহণে ভ্রমণ ইহার বমনের উত্তেজক। বিবমিষা সহ শিরোবুর্ণন থাকে ও মুচ্ছার উপক্রম হয়।

উদরশূল বা কলিক্।—উদর স্ফীত হইলে রজনীতে যে স্নায়বিক উদরশূল জন্মে তাহাতে ককুলাস উপকারী। ইহার ঋতুসংক্রমণ উদরশূল নিম্নোদর আক্রমণ করে এবং তাহাতে পুনরাক্রমণের প্রবণতা থাকে। শুক্রবায়ু ঘটিত উদরশূলেও ইহা ফলপ্রদ।

ইপ্রেসিয়া—শুক্রবায়ুরোগীর উদরশূলে নিদ্রা ভঙ্গ হয়; মানসিক দুঃখ জন্ত উদরশূল।

রক্তক্ষুণ্ণতা, বাধক বা ডিস্মেনরিয়া ।—অত্যন্ত, অনিয়মিত এবং কষ্টকর ঋতুশ্রাবে ককুল্যাস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। জরায়ুর খল্লী। প্রচুর ও চাপ চাপ রক্তশ্রাবকালে কঠিন শিরঃশূল হইলে এবং সমুদ্রবিবিমিষার গ্রায় আমাশয় ক্ষীত ও সংকুচিত হইতে থাকিলে ইহা উপকারী। এই রজোক্কচ্ছুরোগে কিঞ্চিৎ স্নায়ুশূল ও রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আক্ষেপিক রক্তঃশূলে ডেফলুস ১ X বলপ্রদ। ইঞ্জেন্সিয়ার বাধকবেদনা সহ রজোক্কচ্ছু ঘটিত উদরশূল হয় অথবা নিম্নোদরে ঠেলমারা থাকে এবং ইহার গুল্মবায়ু ঘটিত প্রসববেদনাবৎ বেদনা চাপে উপশম পায়।

প্রসবান্তিক বেদনা, ভ্যাডালির ব্যথা বা আফ্টার পেইন্স ।—বেদনা জরায়ু অপেক্ষা উদরে অধিকতর থাকিলে ককুল্যাস, বেদনাকালে সরলাস্ত্র ও মূত্রস্থালীতে চাপ হওয়ায় নিষ্ফল মলমূত্রবেগ হইলে নাকস, জরায়ুর টাটানির নিবারণ জন্ত প্রচলিত নিয়মানুসারে আর্নিিকা এবং আরোগ্যলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ রোগে জ্যাকুইনিসিলন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

লেকচার ৯৮ (LECTURE XCVIII).

ডায়স্কোরিয়া (Dioscoria.)।

(ডায়স্কোরিয়েসি জাতি।)

সাধারণ ক্রিয়াঃ—গ্রন্থিল স্নায়ুগুণ দ্বারা নাভিদেশ আক্রমণ করিয়া ডায়স্কোরিয়া তাহাতে পিত্তশূলবৎ কঠিন উদরশূল উৎপন্ন করে। এই বেদনায় রোগীর দ্বিভাঁজ হইবার প্রবৃত্তি এবং চাপে উপশমনের ধারণা থাকিলেও বস্তুতঃ তাহাতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শরীর অধিকতর রূপে প্রসারিত করিলে তাহার বিশেষ উপশম হওয়ায় ইহা ইহার সমক্রিয় কলসিন্দ্র হইতে প্রভেদিত হয়।

লক্ষণঃ—মুখ হইতে জল স্রাব। অন্ন ও তিক্ত উদগার। প্রভূত পরিমাণ স্বাদহীন উদগার উঠিলে আমাশয়ের কষ্টের উপশম। বিবমিষা। আমাশয়ের অস্বাস্তি প্রযুক্ত মুচ্ছার ভাব। আমাশয়ে পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ পরিত্যক্ত বস্ত্র শিথিল করিতে হয়। আমাশয়ে জ্বালা। আমাশয়স্থানে তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা।

যকৃত স্থানে কর্তনবৎ বেদনা। যকৃতপ্রদেশে মূছ ও গুরুত্ববোধক চূর্ণ করার ছায় বেদনার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। পিত্তকোষপ্রদেশে মূছ ও কঠিন বেদনা। নাভি ও আমাশয়নিম্নদেশে অবিশ্রান্ত কষ্ট হইলে আমাশয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে কতিপয় মিনিট পর পর কঠিন কর্তনবৎ ও উদরশূলের ছায় বেদনা। নাভিদেশে কামড়ানি এবং খল্লীবৎ বেদনা। অস্ত্রাভ্যন্তরে গড়গড় করিয়া ডাকিয়া প্রভূত পরিমাণ বায়ুনিঃসরণ। আহাশস্ত্রে উদরের বায়ুশূল জন্মে, কিন্তু প্রায় যকৃতবিকার হয় না হৃগন্ধ বায়ু নিঃসরণ। অস্ত্রে মোচড়ানি ও তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা। অস্ত্র চাপে

বেদনায়ুক্ত থাকে এবং টাটায় । কুচকিয় বেদনা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ে তাড়াতাড়ি শয্যাভ্যাগ করিয়া ঘাইতে হয় ।
প্রাতঃকালে অত্যধিক পাতলা এবং পীতবর্ণ মলত্যাগ ।

অবিশ্রান্ত উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোথান । পুংজননেন্দ্রিয়
শীতল ও শিথিল । অণ্ডবেষ্টত্বে ও জননেন্দ্রিয়ের কেশময় স্থানে দ্রুগন্ধ
ঘর্ষ । কামেচ্ছার হ্রাস । নিদ্রাকালে শুক্রক্ষরণ ।

চিকিৎসা ।

উদরশূল বা কলিকঃ—নাভিদেশের ও তৎসন্নিহিত
স্থানের অবিশ্রান্ত বেদনার আবেশে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ প্রকোপে
ডায়ক্লরিসিয়া উপকারী; বায়ুর সঞ্চয় নিবন্ধন এই আক্ষেপিক উদরশূল
জন্মে এবং দেহ কঠিন রূপে বিস্তৃত করিলে তাহার
উপশমন হয়; কলসিন্দ্র উদরশূল শরীর দ্বিভাঁজ
করিলে উপশমিত হইয়া থাকে । বেদনার উপরি উক্ত প্রকৃতি
 থাকিলে পিত্তশূল, রসবাতিক শূল এবং স্নায়ুশূল
প্রভৃতি উদরের সর্ব প্রকার শূলেই ইহা ফলপ্রদ । বেদনা বিকীর্ণ হইয়া
বন্ধ এবং পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যায় । অত্যধিক উদরশূল বর্তমান থাকিলে ইহা
বিশেষ প্রকারের উদরাময়ও আরোগ্য করিয়া থাকে ।

লেকচার ৯৯ (LECTURE XCIX.)

লবেলিয়া ইনফ্লেটা (Lobelia Inflata.)। ইণ্ডিয়ান
টুব্যাক ।

(লবেলিয়েসি জাতি ।)

সম্বন্ধ ।—লবেলিয়ার কাণ্ডপ্রতিবেদক—ইপিকা ।

সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া ।—মাস্তক মেরুমজ্জয় ন্নায়ুগলে, বিশেষতঃ
নিউমোগ্যাষ্ট্রিক ন্নায়ুতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া লবেলিয়া প্রগাঢ় শক্তি-
হীনতা, বিশেষ প্রকারের সর্কাল্পাণ শিথিলতা, বক্ষের কষ্ট, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস
ও গলাধঃকরণক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা উৎপন্ন করে । উপরি উক্ত লক্ষণ-
নিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাশয়স্থানে কষ্টানুভূতি, বিবমিষা এবং বমন উপস্থিত
হয় ; অবশেষে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক ন্নায়ুব পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাস
ক্রিয়ার অভাব ঘটিলে কোল্যাপ্‌স্ বা পতনলক্ষণ এবং মৃত্যু হইয়া থাকে ।
স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে স্বরবন্ত্র ও বায়ুনলীর আক্ষেপ উৎপন্ন হয় বলিয়া
উপরি উক্ত যন্ত্রের আক্ষেপিক রোগে, বিশেষতঃ তাহার সহিত বিবমিষা
বর্তমান থাকিলে ইহা প্রয়োগোপযুক্ত ।

লক্ষণ ।—বক্ষের সংকোচন বশতঃ অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস ।
শ্বাস-কৃচ্ছ্র । আমাশয়দেশে দুর্বলতা ও চাপের অনুভূতির সহানুভূতি
প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ঐরূপ কষ্ট । হৃৎপিণ্ডদেশের গভীর স্থানে সামান্য বেদনা ।
ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ডের নিক্রিয় অবস্থা ঘটবে, হৃৎপিণ্ডের
উদ্ধাংশের গভীর দেশে বেদনা । সন্ধ্যাকালে নাড়ী দ্রুত, কিন্তু ক্ষুদ্র ও
দুর্বল ; নাড়ী স্বাভাবিক হইতে ধীরতর ।

অবিশ্রাস্ত ও প্রচণ্ড বিবমিষা । প্রাতঃকালীন বিবমিষা এক চোক
জলপানেই দমন । বিবমিষাকালে মস্তকোপরি শীতল ঘন ।

আমাশয়ে অল্প জন্মে এবং আমাশয়োক্টোরস্থান কশিয়া ধরে। বুক-জালা করে ও মুখে জল উঠে।

চিকিৎসা।—নানা প্রকার আক্সেপিক শ্বাসযন্ত্র-রোগে, বিশেষতঃ হাঁপানিতে বিবমিষা, বমন, অত্যন্ত বল-হীনতা এবং বক্ষের কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে লব্বেলিফ্লা ফলপ্রদ। ইহার হাঁপানি রোগ অনেক বিষয়ে ইম্পিকারোগের তুল্য। ইহাতে বক্ষে যে কষ্ট ও দুর্বলতা থাকে আমাশয়োক্টোরস্থানের চাপানু-ভূতি তাহার মূল বলিয়া অনুমিত। বিবমিষা ও প্রচুর মুখলালার শ্রাব। রোগাক্রমণের পূর্বে সম্পূর্ণ শরীরের মধ্যদিয়া এক প্রকার বেঁধাবৎ অনু-ভূতি। ইহা বায়ুনগৌসস্বকীয় বা ব্রংকিয়াল পচা-শ্লেষ্মায়ুক্ত বা সেন্টিসিক (Septic) হাঁপানিরোগের বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার অতিশয় কষ্টজনক শ্বাসপ্রশ্বাস শরীর চালনাগ উপশমিত হয়। ইম্পিকার প্রশ্বাস অতীব কষ্টকর থাকে এবং বমন হইলে তাহার উপশম হয়। আর্সেনিকের হাঁপানি রজনী দ্বিতীয় প্রহরের পরে আক্রমণ করে।

অতি কঠিন প্রকৃতির বমনরোগে লব্বেলিফ্লা আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। বমনকালে মুখমণ্ডল প্রচুর ও শীতল ঘর্মসিক্ত হয় ও প্রভূত মুখলালা ঝরে। গর্ভাবস্থার কথিত প্রকারের বমন ইহা আরোগ্য করিয়াছে। বিবমিষা, প্রচুর ঘর্ম এবং সুস্পষ্ট দুর্বলতা সহ পুরাতন বমন-রোগে ক্ষুধা ভাল থাকিলে ইহা উক্ত বমন আরোগ্য করিয়া থাকে।

লেখক্চার ১০০ (LECTURE C.)

ফাইটলেকা ডিকেণ্ড্রা (Phytolacca Decandra.)।

(ফাইটল্যাক্সেসি জাতি।)

উপচয়।—সর্বস্থলেই রজনীতে ও সিক্তদিনে বেদনার বৃদ্ধি।

উপশম।—অধিকাংশ লক্ষণেরই শয়নাবস্থায় উপশম; মুক্ত বায়ুতে বেদনার হ্রাস হয়। সন্দ্বন্দন।—ফাইটলেকার কার্যপ্রতিষেধক—
ভৃগুঃ এবং লবণ; ইগ্নে, সাল্ফ। বিষমাত্রার—ওপিয়াম ও কাফি।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফাইটলেকার প্রধান ক্রিয়া গ্রন্থিমণ্ডলে, বিশেষতঃ গলাভ্যন্তরের গ্রন্থি ও স্তনে এবং রসবিম্বি, তন্তু এবং শ্লেষ্মিকবিম্বি-উপাদানে হইয়া থাকে। কিডনিতে ইহার ক্রিয়া হওয়ায় শরীরে লিথিক এসিডের বৃদ্ধি হয়। অস্থিবেষ্টবিম্বি ও ত্বকে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহার ফল পারদ, আয়ডাইড অব পটাসিয়াম এবং উপদংশ ক্রিয়াফলের সমান। উপরিউক্ত ক্রিয়া মূলতঃ প্রদাহিক অবস্থা উৎপন্ন করে; এই প্রদাহ তন্তুউপাদানে রসবাতের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, শ্লেষ্মিক বিম্বি এবং গ্রন্থিউপাদানে ক্ষত ও পুয়োৎপাদনপ্রবণতা বিশিষ্ট হয়। আমাশয় এবং অন্ত্রে ইহার গভীর ক্রিয়া নিবন্ধন বমন এবং বিরেচন হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের বসায় উপাদানের ক্ষয় হয়, পুয়জননক্রিয়া ক্রম হইতে থাকে এবং পুয় জলবৎ, দুর্গন্ধময় ও রসানির ভাব ধারণ করে; অস্থি প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীণ হয়।

লক্ষণ।

স্বাস্থ্য।—পেশীর পক্ষাঘাতিক অবস্থা নিবন্ধন অত্যন্ত বলক্ষয় ও শয্যাগতভাব। জঙ্ঘার দৌর্বল্য ও গুরুত্ব জন্মিলে রোগী চলিতে টলে।

পর্যায়ক্রমিক ধনুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপ এবং শিথিলতা পেশীমণ্ডল অনমনীয় ।

নাসিকা ।—নাসারবন্ধু রুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত জলবৎ তরল স্রাবের ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে । উগ্র স্রাবে হাজা জন্মে ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—হৃৎশূলে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হঠাৎ বেদনার আক্রমণ ; বেদনা দক্ষিণ বাহুমধ্যে যায় । হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানের চালনাশক্তির অভাব বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আর নিদ্রা হয় না । বক্ষে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা হওয়ায় নাড়ী ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, কখন বা পূর্ণ কিন্তু কোমল থাকে ।

মুখগহ্বর ও গলমধ্য ।—জিহ্বা অত্যন্ত কৰ্কশ ; শুভ্র এবং রসবিহ্বিকায়ুক্ত পার্শ্ববিশিষ্ট ; তাহার অগ্রভাগ লাল থাকে । গলাধঃকরণক্রিয়াকালে জিহ্বামূলে অত্যন্ত বেদনা । প্রচুর লালস্রাব ; লালা আটা দ্রব পীত, দড়ি দড়ি ও ধাতুবৎ স্বাদবিশিষ্ট থাকে । গলা ক্ষতবিশিষ্ট, গলগহ্বর রক্তাধিকায়ুক্ত, কৃষ্ণলোহিত ও শুষ্ক ; টন্সিলগ্রন্থি ক্ষীণ । গলক্ষত জন্মিলে প্রাতঃকালে উপজিহ্বা ক্ষীণ হয় এবং গলগহ্বরে ঘন, শুভ্র এবং পীতবর্ণ প্লেগ্মা জন্মে । গিলিবার সময় বোধ হয় যেন গলদেশে কোন বস্তুখণ্ড আছে, মস্তক বামপার্শ্বে ফিরাইতেও ত্রি রূপ বোধ । গলদেশ ও টন্সিলগ্রন্থিতে কাঁচা ও চাঁছাবোধ । গলমধ্যে শুষ্কতা, টাটানি ও জ্বালা সহ চন্চনি এবং কৰ্কশভাব । গলমধ্যে কৰ্কশভাব বশতঃ কাসির উদ্রেক ও গলা পরিষ্কার করার জন্য গলার্থীকর দিবার ইচ্ছা । গিলিতে কষ্ট হয় এবং প্রত্যেক বার গিলিবার চেষ্টাকালে অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা তীব্রবেগে উভয় কর্ণ ভেদ করিয়া ধাবিত হয় ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।—গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রন্থিতে কাঠিন্য । রজনী দুই প্রহরের পর গ্রীবার কাঠিন্য জন্মিলে দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা

অধিকতর থাকে এবং শযায় তাহা বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যেক দিন প্রাতঃ-
কালেই পৃষ্ঠ অত্যন্ত অনমনীয় থাকে। কটি এবং কটিপশ্চাতে অবিশ্রান্ত,
মৃৎ ও গুরু বেদনা। কটিপশ্চাৎ হইতে তীরবেধবৎ বেদনা দুই হিপসন্ধি
বহিয়া নিম্নে যায়।

অবহাদি।—বাহু এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা। উভয় উরুর
বহিঃপার্শ্বে স্নায়ুশুলের বেদনা। নিম্নাঙ্গে রসবাতিক বেদনা। জজ্বায়
ক্ষত ও গুটি বা নোড। প্রত্যেক রজনীতে জজ্বার বৃহদস্থি বা টিবিয়ার
অস্থিবেষ্টিকিল্লিতে বেদনা। শরীরের নানা অংশে সৃষ্টিবেধবৎ বেদনা সকল
সময়েই বাহু হইতে অভ্যন্তর পার্শ্বে যায় ও বহির্দেশে অবস্থিতি করে। বেদনা
সর্বদাই বহিরাংশে থাকে।

ছক।—অনতিপুরাতন ও পুরাতন (সেকেণ্ডারি ও টার্শিয়ারি)
উপদংশজ উদ্বেদ এবং ক্ষত। শকযুক্ত উদ্বেদ; মস্তকস্থকে কীটজ উদ্বেদ;
লুপাস্ বা বিশেষপ্রকারের ছ্বিত ক্ষত; ক্ষত।

চিকিৎসা।

ধনুষ্ঠকার বা টিটেনাস।—ফাইটলেকার ধনু-
ষ্ঠকাররোগে হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ এবং পদাঙ্গুলি সঙ্কুচিত হয়; ওষ্ঠ উন্টাইয়া
দায় এবং তাহার কোণ উর্দ্ধে আকৃষ্ট হওয়ায় দন্ত বাহির হইয়া পড়ে; এ
লক্ষণে ইহা ক্যান্সার ও স্ট্রীকনিয়া সহ তুলনীয়। মুখমণ্ডলপেশীর
পর্যায়ক্রমিক আক্ষেপ ও শিথিলতা।

টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ বা টনসিলাইটিস্।—কৌষিক
বা ফলিকুলার টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহে ফাইটলেকার বিশেষ উপকারী
ঔষধ। ইহাতে জিহ্বামূলে বেদনা থাকে অথবা গিলিবার সময় তাহা কর্ণ
পর্যাস্ত যায়। টনসিলগ্রন্থি বিবর্দ্ধিত ও নীলবর্ণ সন্নিহিত শরীর্যাংশ

কৃষ্ণনীল এবং গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক, জ্বালাময় চন্‌চনিযুক্ত ও জ্বালা-
বিশিষ্ট থাকে ।

ইন্‌সিফ্রা ।—ডাং র ইন্‌সিফ্রাকে কৌষিক টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহের
অমোঘ ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাতে টনসিলের উপরিভাগে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঈষৎ পীতভক্ত ক্ষত জন্মে এবং গলমধ্যে ছিপি থাকার
অনুভূতি গলাধঃকরণাতিরিক্ত সময়ে বর্ধিত হয় ।

গলক্ষত বা সোরথ্রোট ।—ফাইটলেঙ্কার গল-
ক্ষতে গলা কাল্‌চরণ ও টনসিল কৃষ্ণলোহিত হয়, গলা টাটায় এবং গলাধঃ-
করণে জিহ্বানূলে বেদনা লাগে ; আনুযুক্তিক লক্ষণরূপে পৃষ্ঠ এবং
অঙ্গনিচয় কনকন করে । অনেক সময়েই ইহাতে গলার দক্ষিণ পার্শ্ব
আক্রান্ত হয় । গলনগীর পুরাতন কৌষিক প্রদাহ বা ফলিকুলার
ফ্যারিঞ্জাইটিসরোগে সর্বদা গলা খাঁকর দিয়া গলা পরিষ্কার করিবার
প্রয়োজন হইলে অথবা গলায় উষ্ণ পিণ্ড থাকার অনুভূতি তপ্ত পানীয় পানে
বর্ধিত হইলে ইহা উপকারী । তরুণ গলক্ষত রোগে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান
করিতে গলমধ্যে অগ্নির গোলা প্রবেশের অনুভূতি থাকায়
আমরা রোগ ফাইটল দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি ।

প্র্যাফাইটিস ।—পুরাতন গলক্ষতরোগে গলমধ্যে পিণ্ড থাকার
অনুভূতি ।

বাপ্‌টিসিয়া ।—ক্ষতযুক্ত গলপ্রদাহের কণ্ঠ স্থান হইতে দুর্গন্ধ
নির্গত হইলে । ক্ষতের অত্যন্ত পচিতাবস্থাই ইহার প্রদর্শক ।

নেট্রাম আস ।—শব্দেরগৃহের বাষ্প ঘটিত গলক্ষত ।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত ।—নিম্নলিখিত
লক্ষণযুক্ত ডিফ্‌থিরিয়া রোগে ফাইটলেঙ্কা ফলপ্রদান করে,—গলমধ্য
অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত ও ক্ষীত ; গলদেশ এতাদৃশ টাটানিযুক্ত ও স্পর্শসহিষ্ণু
যে, কোন বস্তু গলাধঃ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; বেদনা তীরবেগে কর্ণে

প্রবেশ করে; জিহ্বা পুরু লেপযুক্ত থাকে; দুর্গন্ধ প্রশ্বাস বায়ু; স্ফীত গ্রন্থি; নাড়ী দুর্বল, দ্রুত ও উষ্ণতাবুক্ত; এবং গলদেশে দীর্ঘ ধূসবর্ণের বিল্লি। পৃষ্ঠবেদনা, সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি এবং প্রগাঢ় দুর্বলতা ইহার আনুষঙ্গিক ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকে। রোগের আরম্ভে **ঈষৎ শীত** এবং পালমস্প্রেয় **জ্বালা** ইহার প্রদর্শক। ডাং বাট ও ডাং বেজ্ ইহার মূল অরিষ্ট আভ্যন্তরীণ এবং কুলকুচারূপে বাহ্য প্রয়োগের জন্ত ব্যবহার করিতে বলেন। উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্তনরোপ বা ম্যাম্মারি ডিজিড্—স্তনের উত্তেজনা-প্রবণ অর্ক্‌দে রোপে ফাইটলে উপকারী; স্তন্য পান করাইতে স্তন অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু, এবং অত্যধিক উষ্ণের ক্ষরণ। সহজেই স্তন চাপ বাধিয়া কঠিন (cake) হইয়া যায় ও পাকে; একপাবস্থায় কোন ঔষধই ইহার সমকক্ষ নহে; স্তনাগ্র হইতে বেদনা সম্পূর্ণ শরীরে প্রসারিত হইয়া পড়ে। স্তনাগ্রের টাটানিস্ত কটা রোগে ইহা **প্র্যাক্সা** ও **হিস্পান্ন** সহ তুলনীয়। স্তনের রোগে সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি ইহার প্রদর্শক স্থানীয়।

ক্রটন টি—স্তনাগ্র হইতে বেদনা স্কন্ধমধ্যে যায়।

ফেলোঞ্জিড্রাম্—স্তনাগ্রে স্থিতিবেধনৎ বেদনা এবং উগ্ধবহা নলী বহিয়া বেদনা।

মিউরেক্সস্—ডাং জসেট্ ইহা দ্বারা স্তনের অর্ক্‌দে র বেদনা, বিশেষতঃ তাহার পাতুশ্রাবকালে বৃদ্ধি হইলে আরোগ্যা করিয়াছেন।

রসবাতরোপ বা ম্লিউম্যাটিজম্—উপদংশদোষযুক্ত রসবাতরোগেই ফাইটলে বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। জাহুসক্তি ও কহুইস্কির অধঃদেশের বেদনাতেই ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। পেশী

কঠিন ও অকর্ষণ্য; বেদনা ছুটিয়া বেড়ায় এবং রজনীতে, বিশেষতঃ আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি হয়। স্নায়ুবেষ্টিকাল্লির এবং অস্থিবেষ্টিকাল্লির, ফলতঃ তন্তুউপাদান মাত্রেরই রসবাতরোগে ফাইটল ফলপ্রদ ঔষধ। স্ক্রু এবং বাহুর রসবাতরোগে, বিশেষতঃ তাহা উপদংশ সংশ্লিষ্ট হইলে ইহা উপযোগী।

কেলিস হাই—ইহাও সন্ধির, বিশেষতঃ জাহুসন্ধির রসবাতরোগে উপকারী। জাহু স্ফীত হয়, টিপিলে লেইর ত্রায় অম্লভূতি দেয় এবং বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ রোগসহ উপদংশ অথবা পারদের সংশ্লিষ্টতা থাকে।

মাকু'রিস্ফাস—ইহার রসবাতরোগে প্রচুর বর্ষ হয় এবং তজ্জন্তু এবং রজনীতে রোগ বৃদ্ধি পায়।

সিলিসিস্ফা—ইহা বংশানুক্রমিক রসবাতরোগের ঔষধ। বেদনার রজনীতে ও রুগ্ন শরীরস্থান, অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি এবং তাপে ভ্রাস হয়।

উপদংশ বা সিম্ফিলিস—অনেক লক্ষণ দ্বারা ফাইটলেনের উপদংশ সংশ্রব প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপদংশজ রসবাতরোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; অস্থি সহ পেশীর সংযোগস্থান বেদনাক্রান্ত হয় ও বেদনার রজনীতে এবং আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি হয়। স্ট্র্যাফিসেমিগ্রিস্ফার উপদংশলক্ষণ জননেঞ্জিয় সম্বিহিত স্থানে কোমল ও সিক্ত উপমাংস এবং শুষ্ক চর্মকীল দ্বারা, সিলিসিস্ফার তাহা জননেঞ্জিয়দেশে পুয়জনক রোগ দ্বারা, এবং শুল্ক পুয়মেহনাশক ঔষধ হইলেও উপদংশরোগগ্রস্ত লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গবেষ্টিককে স্রাবী উপমাংস অথবা শুভ্র ও কোমল ক্ষত দ্বারা প্রকাশিত হয়।

লেকচার ১০১ (LECTURE CI.)

ইস্কুলাস্ হাইপক্যাষ্টেনাম (Æsculus Hypocastanum.)

(ছাপিগু্যাসি জাতি ।)

সাধারণ ক্রিয়া ।—ইস্কুলাসের মৌলিক ক্রিয়ায় যকুৎ এবং বকুচ্ছিরা বা পোর্টালশিরামণ্ডলী আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদিগের রক্তাধিক্য উৎপন্ন হয় । গোণভাবে ইহাতে কোলন, সরলান্ত্রপথ এবং মলদ্বারের প্রাতি-গ্ৰায়িক প্রদাহ জন্মে । অশ সংক্রান্ত রক্তবহানাড়ী অতিশয় রক্তপূর্ণ হইলে অতীব গুরুতর অবস্থার অর্শের উৎপত্তি হয় । নিম্নপৃষ্ঠ এবং কটি-পশ্চাতে কঠিন কনকনানি বেদনা ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

লক্ষণ ।

শ্রাবু । বাহু, জঙ্ঘা এবং মেরুদেশে পক্ষাবাতিক অনুভূতি । রোগী মূচ্ছার ভাব এবং দুর্বলতা বোধ করে ; ক্রান্তি এবং আমাশয়ে মূচ্ছার ভাব । ঝায়ুশূলের বেদনা অরিত স্থান পরিবর্তনশীলতা প্রকাশ করে ।

স্বরযন্ত্র ।—স্বরযন্ত্রদ্বারের এবং স্বরযন্ত্র-গলগহ্বরের শৈথিল্যবিহীন গুফতা বোধ । স্বরভঙ্গ ।

গলমধ্য ।—গলমধ্যে শৈত্যসংস্পর্শবৎ গুফতা ও কর্কশতা বা অবদারণভাব এবং জ্বালা । গলগহ্বরে সংকোচন বোধ । গলাধঃকরণ কষ্টকর ; গলমধ্যে গুফতা জন্মিলে গেলার ইচ্ছা হয় ।

মল এবং মলদ্বার ।—সরলান্ত্রে স্থূল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা-পূর্ণবৎ এবং গুফতাভবের অস্বাস্ত । সরলান্ত্রে টাটানি এবং তাহাতে ও মলদ্বারে জ্বালা, চুলকনা এবং পূর্ণতা বোধ । অশ চীনেবাদামের ছায় ও বেগুণে রঙের ; অর্শে জ্বালাযুক্ত বেদনা ; তাহা সাধারণতঃ অস্রাবী ; পৃষ্ঠে কনকনানি এবং খঞ্জতা বা তীরবেধবৎ বেদনা ; মলদ্বার স্থলিত বোধ ।

মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রে জ্বালা। নিষ্ফল মলবেগ। স্থূল, কঠিন এবং শুষ্ক
বিষ্ঠার কষ্টে ত্যাগ; মলত্যাগান্তে মলদ্বার স্থলিত বোধ।

পৃষ্ঠ ;—পৃষ্ঠের অবিশ্রান্ত কনকনানি, কটিপশ্চাৎ এবং হিপসফ্রি
আক্রমণ করে, ভ্রমণে ও সম্মুখে নত হইলে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং
রোগী উপবেশন করিলে কচিৎ উঠিতে পারে। ভ্রমণকালে পৃষ্ঠ শক্তিহীন
হইয়া পড়ে। ভ্রমণকালে নিম্নপৃষ্ঠে এবং হিপসফ্রিতে ছিন্নবৎ বেদনা। স্বক-
ষ্মের মধ্যবর্তী স্থানে কনকনানি।

চিকিৎসা ;—অর্শ—যকৃৎ শিরার অথবা উদরের শোণিতাধিক্য
বশতঃ অর্শরোগে ইস্কুলাস বিশেষ উপযোগী ঔষধ। এই অর্শ হইতে
রক্তস্রাব হউক বা না হউক সরলান্ত্রে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
শলাকা থাকার অনুভূতি সর্বস্থলেই প্রদর্শক স্থানীয়। ইহার
অত্যাশ্রয় লক্ষণ মধ্যে কটিদেশের কনকনানি, বহিনিষ্ক্রান্ত, বেগুণে রক্তের
অর্শ সহ নিম্নপৃষ্ঠ ও কটিপশ্চাতে বেদনা এবং যকৃৎপ্রদেশে পূর্ণতা প্রধান
স্থান অধিকার করে। পোর্টালশিরামণ্ডলীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন অর্শরোগ-
চিকিৎসায় ডাং হিউজ ন্যাক্স ভ এবং সাল্ফারের পক্ষপাতী।

পাল্‌স—ইস্কুলাসের পরে প্রযোজ্য। স্থূল রক্তাধিক্য
ও অজলীর্ণ ইহার অস্রাবী অর্শের কারণ। উচ্চ ক্রমে ফলপ্রদ।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ জঘ্ন অর্শ ইস্কুলাস আরোগ্য করিতে পারে।

পৃষ্ঠশূল বা ব্যাটেক্‌ ;—অনেক সময় ইস্কুলাস দ্বারা
পৃষ্ঠবেদনার উপকার হইয়া থাকে। ইহার বেদনারও সিপিঁর বেদনার
স্থায় ভ্রমণে বৃদ্ধি হয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনাও ভ্রমণে এবং দেহ সম্মুখে
নত করায় বর্ধিত হইলে অনেক সময়ে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

লক্ষণানুসারে ইস্কুলাস স্বরষভের প্রাতিশ্ঠায়িক
প্রদাহ এবং গলনলীপ্রদাহে উপকারী।

লেকচার ১০২ (LECTURE CII.)

ড্রসিরা রটাণ্ডিফলিয়া (Drosera Rotandifolia.)।

(ড্রসিরেসি জাতি।)

সম্বন্ধ :- কার্যপ্রতিষেধক—ক্যান্সর।

সাধারণ ক্রিয়া :- নিউমগ্যাষ্ট্রিকনায়ুতে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা ড্রসিরা অতি প্রবলরূপে শ্বাসযন্ত্র আক্রমণ করিলে বিশেষ ফলস্বরূপ যে, আক্কেপিক কাসি উৎপন্ন হয় তাহা ছুপ্শব্দককাসির প্রতিকৃতি বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ইতর জন্তুতে ইহা গুটিকোৎপাদক-রোগ বা টুবাকুলিনিস্ উৎপন্ন করিয়াছে।

লক্ষণ—শ্বাসযন্ত্র :- শ্রাবী অথবা অশ্রাবী নাসিকাসন্ধিতে বারম্বার হাঁচি ; শ্বাসপ্রশ্বাসকালে স্বরযন্ত্রে ঘৃষ্টবোধ। স্বরভঙ্গ এবং অতি মৃদু স্বর। শ্বাসযন্ত্রে কষ্টানুভূতি ; কথা কহিলেই কণ্ঠার সংকুচিতভাব ; ভ্রমণকালে শ্বাসকচ্ছ হয় না। কথা কহিলে বক্ষ ও কণ্ঠ লক্ষণের বৃদ্ধি। কাসির আক্রমণপরস্পরা এত প্রচণ্ডতা সহ হইতে থাকে যে রোগী ক্রুচিৎ শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হয়। স্বরযন্ত্রে বিড়বিড় বশতঃ কাসির উদ্বেক হইলে স্বরযন্ত্রে কোন কোমল বস্তু থাকার অনুভূতি হয় এবং খোঁচার ভায় বেদনা গলনিয়ন্ত্রণের দক্ষিণ পার্শ্বে যায়। সন্ধ্যাকালে শয়নের অব্যবহিত পরে এবং রজনীতে কাসি হওয়ায় ২টা রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। শুষ্ক আক্কেপিক কাসিতে বমনের ইচ্ছা। কাসির সময়ে এবং পরে তুষ্ক বস্তুর বমন। কাসিলে পূষবৎ অথবা রক্তময় গয়ার উঠে।

গলগহ্বরের গভীর দেশে এবং উপজিহ্বায় কর্কশ ও শুষ্ক বোধ জন্ম

হৃৎ হৃৎ কাসি হইলে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয় এবং স্বরভঙ্গ থাকিলে, গভীর স্বরে কথা কহিলে এবং কাসিলে বক্ষের কষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে বায়ু বন্ধ হওয়ায় নিশ্বাস ফেলিতে পারা যাইতেছে না। কাসিলে ও শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষপেশীতে স্থচিবোধবৎ বেদনার চাপে উপশম । রক্ত কাসি।

চিকিৎসা—**হৃৎ শব্দককাসি বা হৃৎপিংকফ**—**ড্রসিরা** হৃৎশব্দককাসির অগ্রতম প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ইহাতে খেউ খেউ করিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র কাসি হইতে থাকে যে রোগী শ্বাস গ্রহণের সময় পায় না। সন্ধ্যাকালে কাসির বৃদ্ধি। রোগী গয়ার উঠাইবার যতই চেষ্টা করুক না কেন তাহা বমনবেগ ও বমনে পর্য্যবসিত হয়। বিশেষ করিয়া মধ্যরজনীর পরে কাসির বৃদ্ধি হইলে শিশু কাসির সময় আমাশয়দেশ চাপিয়া ধরে। ডাং বেজ বলেন, “হৃৎপিংকাসির চিকিৎসাদোষোগী আমাদের যত ঔষধ আছে তন্মধ্যে **ড্রসিরা** সর্বোপেক্ষা অধিকতর উপকারী।” মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন, “**ড্রসিরা** ৩০ দ্বারাই প্রায় প্রত্যেক হৃৎপিংকাসিরোগ আরোগ্য হইতে পারে।” ফলতঃ তাহা প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু ডাং বেজের মতানুসারে ইহার ১× প্রয়োগে আমরা সর্বোচ্চ ফল পাইতে পারি। উপসর্গহীন রোগে ইহা কার্যকরী। ইহা দেশব্যাপী (epidemic) রোগে সর্বত্র ফলপ্রদ নহে।

যক্ষাকাসির রোগীদিগের **আম্ফ্রসিক কাসি**র সন্ধ্যাকালে, সম্ভবতঃ পুনর্বার মধ্য রজনীর পরে বৃদ্ধি হইলে এবং গয়ার তুলিবার চেষ্টা করিলেই তাহা বমনের বেগে ও বমনে শেষ হইলে **ড্রসিরা** উপকারী।

লেখক্কার ১০৩ (LECTURE CIII.)

আর্জেন্টাম মেটালিকাম্ (Argentum Metallicum.)

সম্বন্ধঃ—আর্জেন্টাম্ বাহার কার্যের প্রতিষেধক—মার্ক্যুরি।
আর্জেন্টামের কার্যের প্রতিষেধক—মার্ক, পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—পরিপাকযন্ত্রপথ, স্বাসযন্ত্রপথ এবং জননেদ্রিয়-মূত্রপথের শৈথিল্যকবিল্লি, ও সন্ধিতে এবং তাহাদিগের গঠনো-পাদান—অস্থি, উপাস্থি ও বন্ধনী প্রভৃতিতে, উপাস্থির উপরিভাগে, কর্ণের উপাস্থিতে এবং ইউষ্টেচিয়ান টিউব বা নলী, নাসিকা ও উপ-পল্লী প্রভৃতিতে আর্জেন্টাম্ মেটালিকাম্ প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা মেরুশক্তিমান্নায়ু আক্রমণ করায় শরীরের বহুবিধ স্থানে বেদনা এবং পেশীর আক্ষেপ প্রবণতা উৎপন্ন হয়। ইহা গ্রন্থি যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডেও ক্রিয়া প্রকাশ করে।

লক্ষণঃ—ভ্রমণের পর শক্তিহানি ঘটে; অসাধারণ ক্লান্তি জন্মে। অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য। শরীরাত্যস্তুরীণ যন্ত্রনিচয়ে টাটানি ও আবদারণভাব। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে দৌর্ভল্যা বোধ। রোগী রজনীতে অস্থির থাকে। মুগীৎ সর্কাক্ষীণ আক্ষেপের পর প্রিন্সিপাল্লু ক্রোশ, লক্ষ্মবাম্প, এবং নিকটস্থ ব্যক্তিকে প্রহার। রোগাক্রমণ প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রত্যাঘর্জন করে। পদের ক্ষুদ্রাস্থি নিচয়ে ছিন্নবৎ বেদনা।

কাসলে স্বরযন্ত্রের উদ্ধাংশে অবদারণভাব এবং টাটানি, গলাধঃকরণ কালে তক্রপ হয় না। ইহার স্বরভঙ্গ প্রধানতঃ গীতব্যবসায়ী ও বক্তা প্রভৃতির মধ্যেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরযন্ত্রে শ্বেতসার

(এরাকুট আদি) সিদ্ধবৎ প্রচুর স্রাব থাকিলে সহজে উঠান যায়। শ্বাস-
নলীদ্বিখাখস্থলে (at the bifurcation of the trachea) অবদা-
রণভাব এবং স্বরভঙ্গ, স্বরের ব্যবহারে বর্ধিত।

পুনঃপুনঃ মুত্রত্যাগেচ্ছার সহিত প্রচুর, ঘোলাটে ও মিষ্ট-
স্রাবস্বত্বে মুত্রস্রাবের রজনীতে বৃদ্ধি।

বাম অণ্ডাধার ও কটিতে স্ফুটবৎ বেদনা; বোধ যেন বাম
অণ্ডাধার রহস্তর হইতেছে; পীতবর্ণ, হাজাকর, কল-
তানির ছায় এবং অসহনীয় ত্বর্গক শ্বেতপ্রদররোগগ্রস্ত জরায়ু নিম্নাভিমুখে
ঠেল মারিলে ও বাম অণ্ডাধারে অত্যন্ত বেদনা
থাকিলে জরায়ুস্থলন জন্মে। জরায়ুরোগে সম্পূর্ণ উদরে ক্ষত থাকার
ছায় টাটানির শকটারোহণে বৃদ্ধি।

চিকিৎসা;—উপরি লিখিত লক্ষণ অনুসারে স্লগী, স্নাস্কু-
শূল (বেদনা যে স্থানেই হউক তাহার সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীতে
আকোপক নর্ভন থাকিলে), স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ ও
স্বরভঙ্গ, বহুমূত্র এবং অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য ও
বেদনা এবং তাহার সহিত জরায়ুস্থলন প্রভৃতি রোগে
আর্জেন্টাম্ মেটালিকাম্ উপকারী।



লেখক্চার ১০৪ (LECTURE CIV.)

কার্ব এনিমেলিস (Carbo Animalis.) ।

সম্বন্ধ :—কার্ব এনিম্যালিসের কার্যপ্রতিবেদক—আর্স, ক্যান্ফর, নাক্‌স্‌ ভ, ভাইনাম্‌ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—কার্ব এনিমেলিস প্রধানতঃ গ্রহিমণ্ডল আক্রমণ করায় তাহাদিগের বেদনায়ুক্ত স্থীতি, প্রদাহ, দড়কচড়াভাব ও ক্ষত এবং পরিপাকবশ্তে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে অজীর্ণলক্ষণ উৎপন্ন হয় । গ্রহিমণ্ডলে ইহার ক্রিয়ায় অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগের যে স্ক্রিয়াস্‌ ক্যান্‌সার-প্রকৃতির পরিবর্তন সংসাদিত হয় তাহাই কার্ব এনিমেলিসের বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত ।

লক্ষণ :—দৌর্বল্য এবং কার্যকরী শক্তির অভাব ; শিরোদেশে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন মাথার খুলি ফাটিয়া দাঁক হইয়া গিয়াছে ; রক্তনীতেও ঐরূপ হয় এবং রোগী হস্ত দ্বারা মস্তক ধারণ করে ; দিক্‌ দিবসে তাহার বৃদ্ধি ।

শ্রবণশক্তির বিশৃঙ্খলা ঘটে ; কোন্‌ দিক্‌ হইতে শব্দ আইসে রোগী তাহা বুঝিতে পারে না ; বধিরতা ।

প্রাতঃকালে গাত্রোথানান্তর স্বরবস্ত্রের কাঁচাভাব ও স্বরভঙ্গ । স্বরভঙ্গ সন্ধ্যাকালে বর্জিত । বক্ষ ও স্বরবস্ত্রের সংকোচন প্রযুক্ত শুড়শুড়িবুক্ত কাসি । সকালবেলা গাত্রোথান করিলে এবং প্রায় সম্পূর্ণ দিন কঠিন কাসি হইলে উদরে ব্যাকি লাগায় বোধ হয় যেন উদর স্থলিত হইবে, রোগী তাহা ধারণ করিতে বাধ্য হয় এবং যে পর্য্যন্ত কিছু নিষ্ঠূত না হয়, আল্‌গা প্লেয়ার শব্দ হইতে থাকে । বক্ষে জ্বালা ও

চাপবৎ বেদনা। বস্কে শৈত্যানুভূতি। সব্জ; পুয়বৎ এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ গয়ার। শ্বাসরোধকারী গলা ভাঙ্গা। কাসিতে মস্তিস্কে ঝাঁকি লাগায় বোধ হয় যেন মস্তকমধ্যে মস্তিস্ক শিথিলভাবে রহিয়াছে।

উদগারে বহুক্ষণ পূর্বের ভুক্ত বস্তুর আশ্বাদ পাওয়া যায়। বুকজালা। মাংস ভক্ষণ করিলে অনেক সময় পর্য্যাপ্ত বিবিম্বা থাকে। আমাশ-রোদ্ধ কোটিরস্থানে “কিছু নাই নাই ভাবের অনুভূতির” আহ্বার করিলেও উপশম হয় না।

সরলাস্ত্র এবং মলদ্বারে জালা ও টাটানি। মলদ্বার চইতে আটা রস ঝরে। অর্শ অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং ভ্রমণকালে জালা করে। বিলম্বে অভ্যন্তর বিদ্যাত্যাগ। কোমল বিষ্ঠা। মলত্যাগকালে রক্তের নির্গমন।

মূত্রস্রাবকালে মূত্রনলীতে জালাযুক্ত টাটানি। রক্তনলীতে বারম্বার মূত্রস্রাব।

রেতঃক্ষরণ; জননেদ্রিয়ের দুর্বলতা; মানসিক ও শারীরিক শক্তিহানি। উপদংশ; বাঘি। অণ্ডকোষবেষ্টকের পশ্চাতে আটা ও গন্ধগাঁন আদ্রতা।

অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাবকালে রোগিনী এতাদৃশ দুর্বল যে কষ্টে কথা কহিতে পারে; জরায়ুগ্রীবীর দড়কচড়াভাব ও ক্ষত হইলে জালা করে। জালা উরুমধ্যে যায়; বস্তিদেহে ও কটিপশ্চাতে প্রসববেদনাবৎ বেদনা হইলে ক্রেদবৎ ও রক্ত সংযুক্ত স্রাব; কর্কটরোগ। স্তনের স্কিরাস্ক্যান্দার বা কর্কট।

চিকিৎসা—ব্রংকাইটিস বা নলৌষ; নিউমোনিয়া; এবং সক্ষ্মাকাস প্রভৃতি বক্ষরোগের শেবাবস্থায় ফুস্ফুস্উপাদানের ধ্বংস এবং গয়ারের পচন আরম্ভ হইলে কার্ব গ্রনি এবং

কার্ব ভেজ, অবস্থাতেই এই উভয় ঔষধেরই উপযোগিতা দৃষ্ট হয়, এছাড়া বহুপূর্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরূপণের আবশ্যিক । শ্বাসরোধ-কর গলাভাঙ্গাকাসিতে মস্তিষ্ক আন্দোলিত হওয়ায় শিথিল থাকার অনুভূতি, বক্ষ মধ্য শীতল বোধ (ত্রিণ) এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের ধ্বংসাবশেষ গল্প হইতে সন্জ, পূহবৎ ও ভ্রাম্বহ দুর্গন্ধনুক্ত গল্পার নিষ্ঠীবন কার্ব এনির, এবং আক্কেপিক কাসি ও গভীর, কর্কশ অথবা বসা স্বর, বক্ষে স্পষ্টতর জালা, প্রচুর, পীতবর্ণ এবং কার্ব এনি হইতে অধিকতর দুর্গন্ধ শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন (বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের ব্রংকাইটিসে), ও রোগীর পার্শ্ব পরিবর্তনে এবং নিদ্রাবেশে বন্ধিষ্ণু শ্বাসকৃষ্ণের বর্তমানতা কার্ব ভেজিটেবিলিসের প্রভেদক । চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কার্ব এনি রোগীর শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে ।

অজীর্ণ এবং অর্শ।—সুত্বদাত্রী স্ত্রীলোকদিগের দুর্বলতা ঘটত অজীর্ণরোগে রোগিনী কিছু মাত্র আহারেই আমাশয়ের কষ্ট হইলে উভয় কার্বই প্রদর্শিত হইতে পারে । কিন্তু এই অজীর্ণের উপসর্গ “আমাশয় সন্নিহিত স্থানে শৈত্যানুভূতি হস্তের চাপে বা ঘর্ষণে উপশমিত হইলে” কার্ব এনি ; এবং “আমাশয় সন্নিহিত স্থানে গুরুত্ব নিবন্ধন বুনিয়া পড়ার ভ্রাম্ব অনুভূতি” থাকিলে কার্ব ভেজি উপযোগী । আমাশয়োর্ধ্ব কোটরস্থানে “কিছু না থাকার অনুভূতি আহারে উপশমিত না হওয়া” কার্ব এনির বিশেষ লক্ষণ সিপিহ্না সহ তুলনীয় ।

উপর উক্ত দুর্বল ও জীর্ণশক্তি রোগীর অর্শরোগে সরলাস্ত্র হইতে গন্ধহীন রস ঝরিলে কার্ব এনি এবং রসস্রাবের অভাব থাকিলে কার্ব ভেজি প্রয়োজ্য ।

উপদংশ বা সিফিলিস ; বাঘী বা বিউবো ;
এবং অন্যান্য প্রকার গ্রন্থিরোগ।—পারদের অপব্যবহার
 বশতঃ উপদংশরোগ ধাতুগত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্থল বিশেষে কার্ব
 এনি উপযোগী। শরীরে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ কলক এবং
 কুচকি ও বগলে দড়কচড়াভাবযুক্ত এবং প্রস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থির বর্তমানতা
 ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। উপরি উক্ত কাঠিগ্রু রুগ্ন গ্রন্থির চতু-
 স্পার্শ্বস্থ উপাদানেও বিস্তৃত হয়। এক্ষণে কাঠিগ্রু পূয়মেহজ বাঘীতেও ইহা
 উপকারী। কাঁচা বাঘী কাটিলেও তাহার এই রূপ দ্রবস্থা হয় ও তাহার
 ক্ষত স্থান বিস্তৃত হইয়া থাকে। এস্থলেও কার্ব এনি উপকারী।

ক্যান্সার, ককট বা মারাত্মক অর্ধদা।—স্তনের
 ফিরাসক্যান্সাররোগে স্তনমধ্যে কঠিন গুটিকা উৎপন্ন হওয়ায় তাহার
 দড়কচড়াভাব ও প্রস্তরবৎ কাঠিগ্রু হইলে এবং ত্বক স্বেদন নীল ও বৈচিত্র্য-
 বিশিষ্ট থাকিলে কার্ব এনি দ্বারা উপকার দর্শে। বগলের গ্রন্থি ক্ষীণ
 হয় এবং স্তনে আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে। **জন্মানুগ্রীবীর**
ক্যান্সাররোগে তাহা দড়কচড়াভাব ও জ্বালাময় বেদনা দ্রুত
 থাকিলে এবং যোনি হইতে পাতলা ও চূর্ণক্ৰ অব নির্গত হইলে ইহা
 প্রয়োজ্য।

কার্বলিক এসিড—ক্যান্সাররোগে ইহার আভ্যন্তরিক
 প্রয়োগ বিশেষ রূপে প্রশংসিত হইয়াছে।

সিড্রন—ক্যান্সারের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায় ডাং হেলমাথ ইহার
 সুখ্যাতি করেন।

লেখুচার ১০৫ (LECTURE CV.) ।

আইয়ারগসণ্টস্ ।

১। ফেরাম মেটালিকাম । ২। ফেরাম আয়-
ডেটাম্ । ৩। ফেরাম্ ফসফরিকাম ।

১। ফেরাম্ মেটালিকাম্ (Ferrum Metallicum.) ।

সম্বন্ধ।—ফেরামের কার্য্য প্রতিষেধক—আর্স, সিংক, ডিগার
সা, ইপিকা, পাল্‌স, ভিরেট এ, গিয়া । ফেরাম যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—
কপার, মার্কারি, প্রাসিক এসিড, আর্স, আয়ডি, সিংক ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফেরামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় শোণিতের
সজীবতার ও লোহিত কণিকার বৃদ্ধি হইলেও ইহা অচিরে শোণিত
নিষ্কাশক যন্ত্রমণ্ডলে একরূপ বৈকারিক শক্তি প্রকাশ করে যে, তাহাতে তাহার
লৌহ সমীকরণক্রিয়া (Assimilation of Iron.) বিধ্বস্ত হইয়া যায় ।
তাহার ফলস্বরূপ . সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্র এবং শরীরোপাদানের পুষ্টিহানি
হওয়ায় শরীরোপাদানের বিশ্লিষিত অবস্থা বশতঃ শোণিতের জলীয়াংশের
বৃদ্ধি এবং তাহার স্বেতলালা বা এল্‌বমেনের ও লোহিত কণিকার সংখ্যার
হ্রাস হইলে রক্তহীনতা এবং তদানুযায়িক দৌর্ভল্যাদি নিম্নবর্ণিত লক্ষণ
উৎপন্ন হয় ।

শোণিতের উপরি উক্ত অবস্থায় শরীর শীর্ণ হইয়া যায় । লোহিত-
বর্ণ শরীর স্থান পাণ্ডুর হয় । যন্ত্রাদি হইতে ফেকাসে আকারে শোণিত-স্রাব
হইলে তাহা সহজেই থানা থানা জমাট বাঁধে । শোণিতবহা নাড়ী, বিশেষতঃ
নস্তক, মুখ এবং পদের শোণিতবহা নাড়ী ক্ষীণ হয় । রোগী প্রকৃত
পক্ষে রক্তহীন থাকিলেও অসমান শোণিতসঞ্চালন হস্তায় শরীর

যন্ত্রবিশেষে অলীক রক্তাধিক্য চিহ্ন জন্মে। শোণিতপূর্ণ ষাত্ত্ব বিশিষ্ট, উগ্রস্বভাব এবং ব্যগ্র ব্যক্তিদেগের মুখমণ্ডল লোহিতাভ থাকে, কিন্তু ন্নায় শক্তি হ্রাস হয়।

লক্ষণ।

মন।—আমাশয়োর্ক কোটরস্থানে দপদপানি হওয়ায় উৎকর্ষা ; কার্যাদিতে সামান্য বাধা পাইলেই রোগী উত্তেজিত ; প্রত্যেক ঘটনাই তাহাকে উত্তেজিত অথবা অবসাদিত করে। মানসিক বিশৃঙ্খলা।

মস্তক।—নিম্নে নামিতে ; শ্রোত জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ; এবং ভ্রমণ কালে শিরোগর্ভনি। মস্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় শিরার ক্ষতি এবং মুখে তাপোচ্ছ্বাস। মস্তকে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও দপদপানি বেদনায় রোগী শয়ন করিতে বাধ্য।

শ্বাস।—অত্যন্ত দৌর্বল্য, রোগী সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শারীরিক উত্তেজনা প্রবণতা বশতঃ রোগী অসহিষ্ণু থাকে। অস্থিরতা ; রোগী ধীরে ভ্রমণ করিতে বাধ্য। রসক্ষয় হইতে পক্ষাঘাত। বেদনার সাময়িক আক্রমণ।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসিকাস্রাব রক্তময়, পূয়বৎ, ঈষৎ সবুজ, ক্রেদের ছায় এবং উগ্রতাবিশিষ্ট। রক্তহীন রোগী প্রাতঃকালে মস্তক নত করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বক্ষে কষ্ট বোধ যেন কেহ হস্ত দ্বারা বক্ষচাপিয়া ধরিয়াছে। বক্ষের আড়াআড়ি ভাবে বেদনা থাকায় অস্বস্তিকর শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রাতঃকালে শয্যোখিত রোগীর কাসিতে রক্ত উঠে। অত্যন্ত, পাতলা ও বৃদবৃদযুক্ত গম্বারে শোণিত রেখা থাকে ; অথবা প্রভূত, পূয়বৎ, পচা, ঈষৎ সবুজ কিম্বা বৃদবৃদ যুক্ত গম্বারের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

হৃৎশিশু ও নাড়ী :—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া। পরস্পরা-
গত হৃৎরোগ। সমস্ত শোণিতবহা নাড়ীতেই দপদপানি; হৃৎপিণ্ডের
চূড়াস্থানে হৃৎকারবৎ শব্দ। নাড়ী ক্ষুদ্র ও তর্কল এবং ধীরগতি।

পরিপাক বস্তুর :—কখন কখন পেটুকের ত্রায় ক্ষুধা, অধিকাংশ
সনয়ে অরুচি; সর্কদাই উদরের পূর্ণভাব, সর্কপ্রকার খাণ্ডেই অনিচ্ছা।
দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে অথবা প্রাতরাশের পরে ভুক্ত বস্তুর বমন।
পুনঃ পুনঃ জলবৎ উদ্ভ্রাময়ে কুহন হয় এবং মলত্যাগের পূর্বে
বেদনা থাকিতেও পারে না ও পারে, কিন্তু উদরের কাঁপ সর্কদাই থাকে;
আচারে অথবা পানে উদরাময়ের বৃদ্ধি। হঠাৎ বেদনা ও গন্ধহীন উদরাময়।
আহারকালে অজার্ণ ভুক্ত বস্তুর বেদনাহীন ও অনৈচ্ছিক উদরাময়।
সরলাস্ত্রে সূত্রবৎ কৃমি।

স্ত্রীজন্মনৈচ্ছিক :—ঋতুশ্রাব অতি বিলম্বাগত, দীর্ঘস্থায়ী এবং
প্রচুর। উদরে প্রসববেদনার ত্রায় বেদনা হইলে জরায়ু হইতে রক্ত-
শ্রাব এবং মুখে শোণিতাভাসুক্ত তাপ। কামেচ্ছার হ্রাস; বন্ধ্যাত্ব।
যোনি অত্যন্ত শুষ্ক; তাহাতে সম্মমে অত্যন্ত বেদনা। ঋতুশ্রাবের
পূর্বে মস্তকে জলবেধবৎ বেদনা ও কর্ণে বণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ হইলে জরায়ু
হইতে দীর্ঘাকার শ্লেষ্মাসূত্রের নির্গমন। ঋতুশ্রাবের পরে এবং ঋতুরোধ
ঘটিলে গুল্মবায়ুলক্ষণ। স্বৈতপ্রদর হৃৎবৎ ও ব্রিদ্ধ থাকে অথবা স্ত্রীঅঙ্গে
টাটার্নিবৃক্ত চুলকনার উৎপন্ন করে।

অঙ্গনিচয় :—হস্তের এবং জঙ্ঘার জানুপর্যাস্ত ক্ষীতি। প্রতি
রজনীতেই হস্তে ও পদে ছিন্নবৎ বেদনা। স্বক্ক এবং বাহুর পেশীতে
অবশকর ও ছিন্নবৎ বেদনায় হস্তোত্তোলন অসাধ্য, কিন্তু মূহু চালনায়
ক্রমশঃ তাহা দূর হইয়া যায়।

চিকিৎসা :—শিরঃশূল—ফেরামের রোগীর পুনঃ
পুনঃ শোণিতসঞ্চয়িক শিরঃশূল হইলে মস্তকে দৃশ্যপানিবেদনা

সাধারণতঃ রক্তনীতে বর্ধিত। আক্রান্তাবস্থায় মুখ অগ্নিবৎ লোহিতাভ হয় এবং পদ শীতল থাকে। এস্থলে ইহা বেঙ্গ সহ তুলনীর হইলেও তাহা প্রকৃত শোণিতসম্পন্ন রোগীর এবং ফেরাম্ মিথ্যা শোণিতাধিকাব্যঞ্জক রক্তহীন রোগীর পক্ষে উপযোগী। রক্তহীন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা প্রবণতাবিশিষ্ট রোগীর উপবেশনাবস্থা হইতে হঠাৎ গাজ্রোপ্সান, জলশ্রোত দর্শন এবং শকটারোহণ প্রযুক্ত শিরোবূর্ণনের ফেরাম্ উপকার করে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিসস্ক্লেরিডারোগে ফেরাম্ মেটে অনেক বিষয়ে ফস্ফরাসের তুল্য বলিয়া বিবেচিত। ফেরামের শোণিতহীনতার শোণিতের উত্তপ্ত ও ফুটন্ততাব (Ebulition) রূপ বিশেষতা থাকে এবং তাহার অসম সঞ্চলন বশতঃ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত যুবক যুবতীর সামান্য শ্রমেই বক্ষে শোণিত গতির বৃদ্ধি ও কষ্ট হয়। কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রযুক্ত নামাপুটের বিবৃতি ও দ্রুত ক্রিয়া হইতে থাকে। নামিকা হইতে পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল-লোহিত ও জমাট রক্তস্রাব এবং রক্তকাসি হয়। ইহার গুরু ও বিরক্তিকর কাসি উন্নত বস্ত্র শাটনে স্বস্তি পায় ; রোগের অন্ত্যস্ত লক্ষণমধ্যে বক্ষে দৃষ্টবৎ ও টাটানি বেদ-নার অহুভূতি প্রধানতম বলিয়া গণ্য। রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় পুয়ের তায়, ঈষৎ সব্জ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং শোণিতমিশ্রিত গয়ার নিষ্ঠূত হইলেও ফেরাম্ উপকার করে।

ঋতুরোধের অবস্থাবিশেষে ফেরাম্ উপকারী। রক্তহীন ও মৃৎপাতু বা কুরসিসরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের ঋতুরোধের অবস্থায় দুর্বলতা, অবসাদ, হৃৎকম্প, শারীরিক বিবর্ণতা এবং গুল্ফ-দেশের শোণিতভাবাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। রোগিনীর মুখমণ্ডল শোণিচ্ছটাযুক্ত বা পাতুর ও কাল্চেগোহিত এবং চক্ষুপার্শ্ব

নীলাভ । অধিক পরিমাণ কুইনাইন ও স্নায়বিক বলকারক ঔষধ সেবনে ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ ।

রক্তহীনতা ও যুৎপাণ্ডুরোগেরও অবস্থাবিশেষে **ফেরাম মেট** বিশেষ উপকারী ঔষধ । এলপ্যাথিমতে রোগের অবস্থা নির্ক্শেষে রক্তহীনতায় প্রভূত পরিমাণ আইয়রনের ব্যবস্থা করায় যে সর্বস্থলে রোগের উপকার হয় না কেবল তাহাই নহে ; পরে ঐ সকল রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও কিকিৎ কঠিন সাধ্য হয় । যাহা হউক যে সকল বিশেষ লক্ষণ থাকিলে হোমিওপ্যাথিমতে **ফেরাম সুব্য-**স্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি, যথা,—রোগীর আকারে ক্ষণিক ও অলীক রক্তাধিকা দৃষ্ট হয় ; পরেই উপরিউক্ত শোণিতপূর্ণ আকৃতির পরিবর্তে মুখের পাণ্ডুরতা, যুৎবর্ণ এবং অঙ্গের শোথবৎ ক্ষীণতা প্রভৃতি রোগীর প্রকৃত রক্তশূন্য অবস্থা প্রকটিত করে । **রক্তপূর্ণ স্থান বিশেষে** চাপ দিলে তাহা **রক্তশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ পুনঃ রক্তপূর্ণ হয়** ; চাহানা এবং নেট মিউর ঝায় ইহা শুক্র শোণিতাদি রসাপচয় নিবন্ধন রক্তহীনতার ঔষধ নহে । ইহার রোগীর শ্লৈষ্মিকবিহীন পাণ্ডুর থাকে, রোগী সহজেই ক্লান্তি ও অবিশ্রান্ত ভাবে ঈষৎ শীত বোধ করে, আহারান্তে বমন করিতে পারে এবং অপরাহ্ন অথবা সন্ধ্যাকালে প্রলেপক জ্বরবৎ জ্বর (Hectic fever) হয় ও গ্রীবাশিরায় রক্তাভতার দুৎকারবৎ শব্দ শ্রুত হওয়া যায় । রোগ অত্যন্ত কঠিনসাধ্য হইলে **ফেরাম ফস** তাহার উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত । ডাং সুস্লার প্রথমে **ক্যাঙ্কে ফস** পরে **ফেরাম ফস** ব্যবস্থা করেন । ডাং হাদ সহজ ও উপসর্গহীন রোগে **ফেরাম মেটের** প্রশংসা করেন । ডাং হিউজ **ফেরাম স্লিডাক্ট** টি ১* বা ২* পক্ষপাতী । ডাং লেড্‌লামের মতে **ফেরাম এট্ স্ট্রিক্‌নিয়া সাইট্রেট** সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ । ডাং জসেট্

ফেরাম এসেট অথবা ফেরাম প্রটিকজ্যালেনেটের এবং ডাং হলকুষ্ ফেরাম ফসের ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ হোমিওপ্যাথিকমতে একরূপ কোন স্থির ঔষধ থাকিতে পারে না। কেননা সাক্ষাৎভাবে আবশ্যকীয় পরিমাণ লৌহ পূরণ করা চিকিৎসার উদ্দেশ্য নহে। লক্ষণানুসারে স্থলবিশেষে ইহার যে কোনটি প্রদর্শিত হইতে পারে।

কুইনাইনের অপব্যবহার নিবন্ধন সবিরাম জ্বরের তাপের অবস্থায় শোণিতবহা নাড়ীর, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও ললাটপার্শ্বের শোণিতবহা নাড়ীর স্ফীতি ও দপ্পদপানি শিরঃশূল এবং প্লাহার বিবুদ্ধি, এমন কি জগশোধ পর্যাস্ত থাকিলেও ফেরাম মেট উপকারী।

সাম্ভারণ ক্রিয়া, লক্ষণ, ও চিকিৎসা।— ফেরাম আয়ডেটাম রোগীতে ফেরামের শোণিতাপ-কৃষ্টতা ও দুর্বলতা এবং আয়ডিনের বিশেষ গণ্ডমালা ও দীর্ণতা প্রভৃতির মিশ্র লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। রোগীর মুখ শোণিতপূর্ণ ও লোহিতবর্ণ থাকে; অথবা তাহার মুখাকৃতি মৃৎপাণ্ডুরোগবৎ দৃশ্যযুক্ত হয়; ফেরাম আয়ডেটাম রোগীর মুত্র কৃষ্ণবর্ণ, এবং ঘন ও শুভ্র তলানিযুক্ত। মুত্রের বিদাহী গুণ ইহার বিশেষ লক্ষণ একত্র হাম ও আরক্তজ্বর ইত্যাদি উদ্ভেদিক জ্বরের পরিণাম প্রবল স্বক্ককপ্রদাহ বা নেফ্রাইটিসরোগে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে ফেরাম আয়ডেটাম শক্তিহীন ও শোণিতাধিকায়ুক্ত জরাস্বর স্থানচ্যুতি, শ্বেতপ্রদর, রক্তো-লোশ এবং স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা প্রভৃতি রোগে উপকার করিয়া থাকে। লক্ষণঃ— নিম্নাভিমুখে অবিশ্রান্ত ঠেলমারার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগিণী মনে করে যেন বস্তিকোটর হইতে কিছু বাহির হইতেছে এবং উপবেশন করিলে বোধ হয় যেন জরাস্বর উর্ধ্বে কিছু চালিত হইতেছে; রোগিণী জরাস্ব-

গ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে। জ্বরান্বিত পশ্চাৎবক্রতা, সিদ্ধ শ্বেত-সারবৎ শ্বেতপ্রদর ও মলত্যাগকালে তন্দ্রবৎ শ্রাব। যোনি এবং যোনিকপাটের চুলকনা ও টাটানি। স্ত্রীঅঙ্গের ক্ষীতি। গণ্ডমালা ধাতুর স্ত্রীলোকদিগের স্নেহপাণ্ডুরোগে, পুত্র জন্মিলে গুণ্ডিকোৎপাদক রোগে, এবং সাধারণ গণ্ডমালা রোগেও ইহা উপকারী।

৩। ফেরাম ফস্ফরিকাম (Ferrum Phosphoricum.)।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ, ও চিকিৎসা।—
ফেরাম ফস্ফস একটা যৌগিক পদার্থ। ফেরাম এবং ফস্ফরাস এই উভয় মূল পদার্থের রাসায়নিক সংমিলনে ইহা উৎপন্ন। মনুষ্যশরীরে ইহার ক্রিয়ায় এই উভয় ঔষধেরই কিঞ্চিৎ নিদর্শন দৃষ্ট হইলেও সাধারণতঃ ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়াই অনুমিত, অথবা ইহাদিগের ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য সহজে বোধগম্য করা যায় না। এই ঔষধকে সুস্ফার তাঁহার টিনুরেমিডিভুক্ত করিয়াই হোমিওপ্যাথিচিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার স্থান নির্ণয়ের এবং প্রতিপত্তি স্থাপনের কারণ হইয়াছেন। ডাং সুস্ফার প্রদাহিক রোগের চিকিৎসায় ইহাকে 'একনাইটে'র স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তরুণ প্রদাহিক রোগে ইহার আরোগ্যশক্তি স্বীকার করিলেও তাহার প্রকৃত অধিকারাত্মক প্রয়োগ দ্বারা বথাযোগ্য ফললাভ করিয়া থাকেন।

ফেরাম ফস্ফসের প্রদাহিক জ্বরও এক জরের স্থায় শৈত্য, বিশেষতঃ ঘর্মাক্ত শরীরে শৈত্য সংস্পর্শে হয়; একনরোগী সবল, শোণিতসম্পন্ন এবং সুস্থ ও অল্পবয়স্ক, এবং জরাক্রমণে অস্থির, উৎকণ্ঠায়ুক্ত ও মৃত্যুভীতিকাতর। নাড়ী সবল, পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ। প্রদাহিক জ্বরের প্রথম রক্তাধিক্যের অবস্থার ইহা ঔষধ। ফেরাম ফস্ফসও প্রদাহিক রোগের প্রথম ও রক্তস্রাবাবস্থার পূর্বের ঔষধ। কিন্তু ইহার রোগীতে

আইয়ারণের রক্তহীনতা ও দৌর্বল্য প্রভৃতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । অরকালে শিথিল, কোমলস্পর্শ এবং দ্রুত নাড়ীর বর্তমানতা এবং একর ছায় উৎকৃষ্টাদির অভাব ইহার বিশেষ লক্ষণ ; সাধারণ লক্ষণমধ্যে অরকালে ঘর্ষ হয়, কিন্তু বেদনাদির উপশম হয় না এবং তৃষ্ণা ইহার প্রধান লক্ষণ । ফেরাম ফস্ফের শৈথিল্যবিধি প্রদাহে শিথিল কৈশিকধমনী হইতে সহজে শোণিত ক্ষরণ হেতু ও একনের প্রদাহে প্রবল শোণিতসঞ্চলনের চাপে কঠিন কৈশিক ধমনীর বিদারণ বশতঃ শ্লেষ্মা শোণিতচিহ্নযুক্ত হয় ।

তরুণ, প্রাতিস্থায়িক যোজকবিধি প্রদাহ বা কঞ্জাংটি-ভাইটিস ।—রোগের প্রথমাবস্থায় যোজকবিধির শিথিলতা, রক্তপূর্ণতা, নোহিতবর্ণ, জালা এবং অস্বাভাব থাকিলে ও চক্ষু চালনায় কষ্টের বৃদ্ধি হইলে এক অপেক্ষা ফেরাম ফস্ফ উৎকৃষ্টতর ।

অধিকাংশ সময়ে রক্তহীন ব্যক্তিদিগের কর্ণরোগে, বিশেষতঃ কর্ণের রক্তাধিক্য ও প্রদাহে, ফেরাম ফস্ফ উপকারী । কর্ণের প্রবল কনকনামি হয় । ডাং কোপ্ল্যাণ্ডের মতে আর্দ্রতাসংশ্রব নিবন্ধন কর্ণবেদনার ইহা সর্কোৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহাতে শাল্‌সের ছায় কর্ণনাদ থাকে, কিন্তু বধিরতা থাকে না । বোরাক্সের ছায় শব্দে অসহি-কৃত্য থাকে । দপ্দপানি ও তীক্ষ্ণ সূচিবোধবৎ বেদনা আবেশে আবেশে হয় । ডাং ওয়ানস্টলের সংক্ষিপ্ত প্রদর্শক লক্ষণ :—১ । প্রদাহের বিস্তারপ্রবণতা । ২ । আক্রান্ত স্থানের গোমাংসবৎ বর্ণ । ৩ । স্রাবে কষ্টের উপশমভাব । ৪ । পূয়বৎ শ্লেষ্মা ও রক্তস্রাবপ্রবণতা । ৫ । আবেশে আবেশে বেদনার প্রয়োগ ।

কেলি মিউরিয়েটিকাম ।—মুটেচিয়ান নলীর ও কর্ণমধ্যের সর্দিরোগে ইহা উপকারী । নলী পরিষ্কার করিয়া ইহা বধিরতা, কর্ণনাদ এবং পটহের আকৃষ্টতা দূর করে ও পুরাতন কানপাকা

আরোগ্য করে । ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বাল্মিব্রতান্ন ইহা ঔষধ । আমাশয়-বিকার সংশ্রবীয় কর্ণের পান্না বা একজিমাভ্রোণে ইহা ফলপ্রদ ।

ম্যাগ্নি ফস—স্নায়বিক কর্ণশুলের শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি এবং তাপে হ্রাস হইলে !

কেলি ফস—মধ্যকর্ণ পাকার ঔষধ ।

নাসিকাসর্দিতে ফেরাম ফস একনাইটেব্র তুল্য হইলেও ইহার আক্রমণ তাদৃশ হঠাৎ এবং প্রবল হয় না এবং তাহার হ্রায় ইহাতে উৎকর্ষা ও অস্থিরতা জন্মে না । নাকস ভ ও ক্যাঙ্কে কার্ভের হ্রায় ইহা সর্দি প্রবণতা দূর করিয়া থাকে ।

পূর্বকথিত রূপ জর ও নাড়ীর অবস্থাদি থাকিলে এবং রোগের প্রাথমিক রক্তসঞ্চয়িক অবস্থাতেই রক্তরেখাকলঙ্কিত স্নেহাস্রাব হইলে ফেরাম ফস লেক্সাইটিস বা নলৌষ, ক্রূপ বা ফুং রিকাসি, স্মরণবন্ত্রপ্রদাহ এবং নিউমোনিয়া প্রভৃতি খাসযন্ত্ররোগে উপকার করে ।

অস্ত্রের ইলিম্বসিক্যালপ্রদেহ ও অক্ষাত্ত্রের প্রদাহরোগে ফেরাম্ ফস্ এবং কেলি নিউ বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । ইহাদিগের প্রয়োগ কেবল বহুদশিতার উপর নির্ভর করে । শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত অল্পবেষ্টিবিল্লিরপ্রদাহেও ইহা উপকারী ।

গ্রীষ্মকালে শিশুর হঠাৎ শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঘর্ষরোধ বশতঃ প্রদাহিক উদ্ভ্রাময়ে, এবং শিশু কলেব্রারোগে জলবৎ বিষ্ঠা সহ অজীর্ণ ভুক্ত বস্ত ও শোণিতযুক্ত মলত্যাগে একনের অস্থিরতা দি ও মার্কেব্র কুহ্ন না থাকিলে ফেরাম ফস প্রযোজ্য । তরুণ প্রদাহিক আমরক্তরোগে একনাইটেব্র অপেক্ষা অধিক রক্ত থাকিলে ও কুহ্ন না থাকিলে ইহা উপকারী ।

লেখকচারণ ১০৬ (LECTURE CVI.)

প্ল্যাটিনাম্ . (Platinum.)

সম্বন্ধ ; প্ল্যাটিনামের কার্য্যপ্রতিবেধক—পাল্‌স্‌ স্পি, নাই, ডাল ।
প্ল্যাটিনাম যাহার কার্য্যপ্রতিবেধক—লেড্‌ বা সৌসক বিষক্রিয়ার ।

সাংপ্রারণ ক্রিয়য়া ।—প্ল্যাটিনাম প্রধানতঃ স্নায়ুকেস্ত্রে ক্রিয়য়া
প্রকাশ করায় মস্তক এবং জ্ঞানস্থানের অবসাদ, সর্ক্সাঙ্কীণ স্পর্শজ্ঞানের
লোপপ্রবণতা, জড়ত্ব এবং পক্ষ্যাবাত উৎপন্ন হয় । উপরি উক্ত ক্রিয়্যাবশতঃ
অধিকাংশ স্থলে জ্বীলোকদিগের জননেক্রিয় বিকার, গুল্মবায়ুলক্ষণ এবং
বিষাদবায়ু জন্মে ।

লক্ষণ ।

মন ।—ভ্রান্তি ; রোগিণী সকল বস্তুই অতি ক্ষুদ্র দেখে এবং সকল
ব্যক্তিকেই কি বুদ্ধি কি শরীর উভয়তঃ তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে
করে ; সকলকেই নীচ মনে করিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক দয়ার চক্ষে
দেখে । রোগিণী মনে করে পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই এবং জীবন
ভারবহ, কিন্তু তথাপি স্মৃত্ত্য নিকট বিবেচনা করিয়া
তজ্জন্ম ভীত হয় ; সামান্য কারণেও অসহিষ্ণুতা থাকে । পর্য্যায়-
ক্রমিক আনন্দ ও বিমর্ষভাব ।

মস্তক ।—মস্তক, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশে, অসাড়তার অমুভূতিতে
বোধ যেন থাকিয়া থাকিয়া খল্লীবৎ সংকোচন হইতেছে । ললাটপার্শ্বে,
গণ্ডে এবং কর্ণপশ্চাদ্দেশে আততভাব ও অসাড়তার অমুভূতি প্রযুক্ত
বোধ যেন ক্ষুর পাক দ্বারা মস্তক চাপিয়া একত্র করা অথবা
কশিয়া বাধা হইতেছে । মস্তকশীর্ষে অসাড়তা উৎপাদক বেদনা ।

অন্যতর ললাটপার্শ্বে শীতলতার অনুভূতি সহ বিড়বিড়ি নিম্নচুম্বাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

শ্বাস্রু।—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার আক্ষেপ। চীৎকার সহ ধনুষ্ঠ-
স্কারবৎ আক্ষেপ ও নিষ্পন্দবায়ুলক্ষণ (catalepsy) পর্য্যায়ক্রমে হয়।
আক্ষেপ এবং শ্বাসরুদ্ধ পর্ষ্যায়ক্রমে হইলে শ্বাসরোধের উপক্রম। একৈক
পেশীর আনর্ডন ও কম্প। সবল ও স্থায়ী আক্ষেপে জ্ঞানের অভাব হয়
না। পক্ষাঘাতিক দুর্বলতার বিশ্রামে বৃদ্ধি; অসাড়তা, অনমনীয়তা
এবং শীতলতা। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও তজ্রপেই হ্রাস; বেদনা
সহ আক্রান্ত শরীররাংশের অসাড়তা। রোগী বোধ করে যেন শরীর
প্রত্যেক দিকেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বরবাহ্য।—গুরু ও স্নায়বিক কাসিতে শ্বাসরুদ্ধ এবং হৃৎকম্প জন্মে।

পল্লিশাক।—অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ অবজ্ঞাসূচক
মানসিক ভাব সহ রাক্ষসের ত্যায় দ্রুত আহার করিলে আমাশয়দেশে বায়ু
জন্মে। উদরে চাপিতবৎ এবং ঠেলামারার ত্যায় অনুভূতি বস্তিদেশ পর্য্যন্ত
বিস্তৃত হয়।

মল ও মলদ্রাব।—কোষ্ঠবদ্ধে উদরে দুর্বলতাবোধ সহ পুনঃ
পুনঃ মল বেগ নিবন্ধন অল্প বিষ্ঠার ত্যাগ। দড়কচড়াভাবে, যেন দগ্ধবৎ
বিষ্ঠা। নরম কাদার ত্যায় বিষ্ঠা মলদ্বারে লাগিয়া যায়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রিয়।—জননেদ্রিয়ে ও তাহার কেশযুক্ত স্থানে
বেদনায়ুক্ত স্পর্শসাহসুতা এবং অবিশ্রান্ত চাপ হইলে শরীরান্তস্তরে শীত-
ভাব ও মুখ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য বহির্দেশে শীতলতা থাকে। বারম্বার
ঋতুস্রাবের অনুভূতি। অতি প্রচুর এবং কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ ঋতুস্রাব
অতি শীঘ্রাগত হইলে উদরে অত্যন্ত ঠেলামারা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা।
দক্ষিণ অণ্ডাধারপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। অণ্ডালার (Albumen)
ত্যায় শ্বেতপ্রদর।

বিশেষ লক্ষণ।—১। অহঙ্কার ও আত্মগরিমা ; রোগিণী অন্য ব্যক্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ; তাহার নিকট বস্তু সকল অতি ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয় ।

২। রোগিণীর জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু হইলেও অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা জন্মে ; অণ্ডাধাররোগ প্রযুক্ত কামোন্মত্ততা, জরায়ুভ্রংশ অথবা প্রচুর ঋতুস্রাব ।

৩। বেদনার যে রূপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি সেইরূপেই হ্রাস (ষ্ট্র্যাম) ; কখন কখন বেদনা সহ অসাড়তা (ক্যাম) ।

চিকিৎসা ।

মানসিক বিকার—কামোন্মত্ততা ; গুল্মবাস্তু ।
—প্ল্যাটিনাম রোগীর মানসিক অবস্থা বড়ই আশ্চর্য্য প্রকৃতি ধারণ করে। ইহার অহঙ্কারাদি মানসিক ভাবের বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অতি বৃদ্ধিতে রোগী যখন মনুষ্যের প্রাতি কার্য্যতঃও তদনুরূপ ব্যবহার করে তখন তাহাকে এক রূপ উন্মাদগ্রস্তই বলা যাইতে পারে। রোগীর অত্যন্ত মৃত্যুভীতি জন্মে এবং সে মৃত্যু নিকট বলিয়া মনে করে। ইহাকে গুল্মবাস্তু স্রাতিত উন্মাদরোগী বলা যায়। ইহাতে রোগীর নিকট সকলই ভয়বহ প্রতীয়মান হয় এবং সে কোন গুরুতর বিষয়ে চিন্তা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে করে।

ইহার গুল্মবাস্তুরোগী আত্মপ্লাবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহার দর্পের সীমা থাকে না, সর্ববিষয়েই সে সকলকে নীচ বলিয়া মনে করে। রোগিণীর চলাফেরাতেও তাহাই প্রকাশ পায়, যেন মহারাজ্যীর গায় হাব ভাব প্রকাশ করে। এ বিষয়ে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কখন কখন

রোগী হো হা প্রভৃতি গোলমালের সহিত অতি উচ্চ হান্ত করে। জননেদ্রিয় অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত থাকিলেও তাহাতে শুড়ভুড়ি হওয়ার কামপ্রবৃত্তির অসহনীয় উত্তেজনা হইলে রোগীগণী উন্নতবৎ হইয়া অতি অশ্লীল বাবহার করিতে পারে। তাহার কামোন্মাদরূপে জন্মে। হান্সসাহ্যামাসের কামোন্মাদের রোগীর উলঙ্গ হইবার প্রবল ইচ্ছা হয়, প্যাটিনাম্ রোগীর অহঙ্কার প্রভেদক থাকে। ইহার সহিত প্যাটিনাম্ রোগীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও দাস্তিকতার অভাব, তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে বলিয়া সহজেই মনে করা, সহজেই দোষগ্রহণ ও ভৎসনা করা এবং গীতবাঞ্চে উত্তেজিত হওয়া প্রভৃতি তাহাকে প্রভেদ করিয়া থাকে।

প্যাটিনাম্ রোগীর অপস্মাররোগে মায়বিক উত্তেজনা হইলে অমনলীর আক্ষেপ এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে। ইন্সেসিহান্স-রোগী সাদাসিদে এবং প্যাটিনাম্ রোগী অত্যন্ত গর্ষিত থাকে। টিনাম্ রোগ, সময়ে বিষাদ বাস্কুল প্রকৃতি ধারণ করিলে রোগী দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট থাকে এবং ক্রন্দন করে। মায়বিক উত্তেজনায় অতি বৃদ্ধিতে রোগীর নিজস্বাধীনতা জন্মে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিহান্স ;—খলীর শ্বায় ও সংকু-চিতবৎ বেদনায় আক্রান্ত শরীররাংশে অসাড়তা এবং চন্চনি জন্মিলে প্যাটিনাম্ উপকারী ; রোগীর চক্ষু হইতে প্রচুর জলশ্রাব হয়। নাসিকামূলে অথবা শরীরের যে কোন অংশে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াসি দ্বারা চাপিত হইতেছে। বেদনার রজনীতে ও বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং স্টেনাম্ রোগের বেদনার শ্বায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমে ক্রমেই উপশম হয়। পারদমিশ্রিত ধাতু (Amalgum.) দ্বারা ক্ষত দস্ত পূরণ করিলে মাস্কুলিহান্সের শ্বায়ুশূল জন্মে এবং তাহা রজনীতে বৃদ্ধিত হয়। গর্ভযুক্ত দস্তের, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের

বহু গর্ভযুক্ত দস্তের স্নায়ুশূল সময়ে অতি প্রচণ্ড হইলে ষ্ট্র্যাঙ্কি-সেপ্টিসিয়া তাহার ঔষধ । শুষ্কবায়ুরোগিণীর প্রচুর, ঘন, কাল এবং দুর্বলকর ঋতুস্রাব থাকিলে স্নায়ুশূলরোগে প্ল্যাটিনাম উপযোগী হয় ।

কোষ্ঠবদ্ধ :—সম্পূর্ণ অন্ত্রপথের জড়ত্ব নিবন্ধন বুঝা মলবেগ ও সরলাস্ত্রের অত্যন্ত শুষ্কতা জন্মিলে প্ল্যাটিনাম উপকারী । বোধ হয় যেন বিষ্ঠা সরলাস্ত্রে গাঁদের ছায় লাগিয়া থাকে । দুর্বল উদরে ভারি চাপিয়া থাকার ছায় বোধ হয়, তাহা দূর করা যায় না । ইহা দেশান্তরিত ব্যক্তি ও পথিকদিগের পক্ষে উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয় ; এজন্য অহুমান করা যাইতে পারে স্বস্থান ত্যাগে তাহাদিগের দৈনন্দিন অত্যন্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটে ইহা তাহাদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ফলপ্রদ । সীসকবিধ কর্তৃক কোষ্ঠবদ্ধ ইহা আরোগ্য করে । উদরের দুর্বলতা, পুনঃ পুনঃ মলবেগ এবং শুষ্ক ও অত্যন্ত মলত্যাগ ইহার লক্ষণ । ইন্ডেসিয়ার ছায় ইহাতেও সরলাস্ত্রে সূচিবোধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা থাকে ।

স্ত্রীজননেদ্রিয়রোগ—অর্ধবাধিক্য ; রজোকুচ্ছ ; সঙ্গমে বেদনা ; অগাধারের প্রদাহ, পুরাতন স্ফীতি ও কাঠিন্য —প্ল্যাটিনামের গর্ভিত মানসিক ভাব সর্বস্থলেই এবং এস্থলেও বিশেষ প্রভেদক বলিয়া স্মরণ থাকিলে অনায়াসেই ইহার স্ত্রীরোগ নির্ণয় করা যায় । ইহার অর্ধবাধিক্যে প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হয় ও জননেদ্রিয়ে স্পর্শসাহসু বেদনা জন্মে । জননেদ্রিয়ের বহিরাভ্যন্তরে অবিশ্রান্ত উত্তেজনা হওয়ায় অনেক সময়ে কামোন্মত্ততা উপস্থিত হইলেও সিপিছা, বেল, ক্রিস্টিজেনাট এবং এপিসের ছায় পুরুষসংসর্গ বেদনাযুক্ত হয় । ঋতুস্রাবকালে জরায়ুপ্রদেশে ঠেলমারা উপস্থিত থাকে ।

ক্যামিনিলার ঋতুশ্রাবণে ইহারই স্থায় প্রকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু মানসিক দক্ষণে উভয়কে প্রভেদ করিয়া দেয়। প্যাটিনামে জরায়ুর দড়কচড়াভাব ও জরায়ু ভ্রংশেরোগে জন্মে এবং কুচকি ও পৃষ্ঠে অবিশ্রান্ত চাপ এবং স্ত্রীঅঙ্গে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা। সিপিহ্মা ও প্যাটিনামের রজোক্রমের বেদনা বস্তু বেড়িয়া হয়, বেলোডনার তাহা বস্তু ভেদ করিয়া যায়। স্ত্রীঅঙ্গ শুষ্ক ও বেদনাবৃক থাকে। অণ্ডাধারের প্রাদাহে জালাগুক্ত বেদনা ও নিম্নাঙ্গে অসাড়তা জন্মিলে প্যাটিনাম উপকারী; ইহা অণ্ডাধারের পুরাতন দড়কচড়াভাবেরও অত্যন্ত ঔষধ।

প্যাটিনামের শিরঃশূলরোগে ত্র্যরেণ্ডুলার স্থায় মস্তক সংকুচিত বোধ হয়; কিন্তু অধিকন্তু ইহাতে মস্তক নিষ্পে-
বিতবৎ বোধ হয় এবং ঋত্নীবৎ বেদনা এবং অসাড়তা থাকে। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং ক্রমে ক্রমেই হ্রাস হয়।

প্যাটিনামের ফিসার অব দি এনাস্ বা মল-
দ্বারবিদ্যারোগে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে কীট বিচরণবৎ
অনুভূতি এবং চুলকনা জন্মে।



লেখক্চার ১০৭ (LECTURE CVII.)

জিঙ্কাম্ মেটালিকাম (Zincum Metallicum.) ।

সম্প্রসারকঃ—জিঙ্কামের কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাঙ্কর, হিপার সা, ইথে। জিঙ্কাম্ যাহার কার্যপ্রতিষেধক—ব্যারা কা, ক্যাম, নাক্‌স্‌ ভ।

সাধারণক্রিয়া।—জিঙ্কাম দ্বারা মস্তিষ্কমেরুমজ্জায় স্নায়ুমাণ্ডলে অতি গভীর ক্রিয়া হইলে মস্তিষ্ক, মেডুলাঅবলঙ্কেটা এবং মেরুমজ্জায় উত্তেজনার অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহার ফলস্বরূপ প্রলাপ, নানা প্রকার আক্কেপিক লক্ষণ, স্নায়ুশূল এবং অত্যন্ত চৈতন্যাদিকা জন্মিলে প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কের অবসন্নতা এবং অস্থান্য স্নায়ু-কেন্দ্রের বলক্ষয় [পক্ষাঘাত] হয়। এই শেষোক্ত ক্রিয়া থাকাতাই জিঙ্কাম হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় রক্তহীনতা (লোহিত রক্ত কণিকার হ্রাস) জন্মে।

লক্ষণ।—স্মরণশক্তির দুর্বলতা। উৎকর্ষা। মানসিক ক্রিয়ার কাঠিষ্ঠ ; চিন্তার অভাব ঘটে এবং মন যেন সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। অধিকাংশ সময়ে সন্ধ্যাকালে খিটখিটে ভাব, বিষন্নতা ও রুচী-ভাব জন্মে। শিশুকে যাহা বলা যায় সে পুনর্বার বলে। অর্দ্ধশিরঃশূল হইলে মস্তকের ছিন্ন ও হলবিক্রবৎ বেদনা মধ্যাহ্ন আহারের পর বদ্ধিত হয়। মস্তকশার্শ্বের অথবা ললাটদেশের বেদনা চক্ষুপর্ষাস্ত বিদ্যুত। মুহু অথবা তীক্ষ্ণ, সবিরাম কিন্তু অদম্য শিরঃশূল। মস্তকশার্শ্বে চাপের মধ্যাহ্নভোজনাঙ্তে বৃদ্ধি হয় এবং রোগী বিষাদোন্মত্তভাবে ধারণ করে। মস্তক-

পশ্চাতে গুরুত্ব ও জড়ত্ব । সর্বপ্রকার শিরঃশূলই অন্ন ওয়াইন মত্ত পানেই বৃদ্ধিত হয় ।

স্নায়ু।—মস্তিষ্কীয় ও স্নায়বিক বলক্ষয় ; জীবনীশক্তির অসম্পূর্ণতা ; রোগী এতাদৃশ দুর্বল থাকে যে হাম, বসন্তাদি উদ্ভেদ পুষ্ট হয় না, ঋতুস্রাবের রোধ ঘটে, মূত্র আসে না এবং কিছু বৃদ্ধিতে অথবা স্মরণ রাখিতে পারে না । স্নায়বিক অস্থিরতা বশতঃ পদের বা নিশ্বাসের চাপ্রণ্য (Fidgetiness) ; রোগী অবিরত তাহার চালনা করিতে বাধ্য হয় । আক্ষেপ-কালে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়, মস্তকপশ্চাদেশ ভিন্ন অত্র কোন শরীরংশ তপ্ত হয় না, শারীরিক তাপেরও বৃদ্ধি হয় না, চক্ষুর ঘর্নন এবং দস্তকিড়িমিড়ি থাকে । হস্তদ্বয় এবং মস্তকের অথবা এক হস্ত ও মস্তকের গতি-শীলতা । সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডের জ্বালা ; পৃষ্ঠে বেদনা । অত্যন্ত দুর্বলতা । রোগী পৃষ্ঠ স্পর্শ করা সহ করিতে পারে না । এতৈকক পেশীর আনর্জন ও ঝাঁকি । অঙ্গনিচয়ের দুর্বলতা ও কম্প ; ঋতুকালে এবং লিখিতে হস্তের কম্প ।

নিদ্রা।—শিশু নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে ; তাহার সমুদয় শরীরের ঝাঁকি হয় ; ভীত অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে চমকিয়া উঠে ; মস্তক এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে গড়াইতে থাকে এবং মুখ পর্যায়ক্রমে পাণ্ডুর ও লাল হয় ।

চক্ষু।—যোজকঝিল্লির (Conjunctiva) প্রদাহ এবং রক্তিমতা চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর থাকে, চক্ষুতে বালুকা পড়ার স্থায় বেদনা ও তাহার জলস্রাব সন্ধায় এবং রজনীতে বৃদ্ধি পায় ; ঋতুস্রাবসময়েও ঐ রূপ হয় ।

শ্বাসযন্ত্র।—গুরু এবং আক্ষেপিক কাসিতে শোণিতযুক্ত গম্বীরের

নিষ্ঠীবন সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধিত হয় এবং ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং সময়ে কাসির আক্রমণ দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে আহারান্তে উদরে বায়ু জন্মিলে খাসকৃচ্ছ হওয়ায় গম্মার উঠা বন্ধ হইলে তাহার বৃদ্ধি এবং গম্মার উঠিতে আরম্ভ হইলে হাস হয়।

পরিপাকহীনতা।—জীবনীশক্তির দুর্বলতা বশতঃ দস্তোদ্ভেদ না হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা ও পেশী আনর্জন প্রভৃতি আক্ষেপলক্ষণ দেখা দেয়। কাকের ক্ষুধার তায় অতি ক্ষুধায় পেটুকের তায় আহার করে তথাপি যেন শীঘ্র শীঘ্র আহার করা হয় না। বায়ু জন্ম উদরশূল, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে অধিক হয়, উদর ডাকে ও গড় গড় করে এবং পুনঃ পুনঃ হর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়। অনৈচ্ছিক উদরাময় ও অচৈতন্য উদরাময়।

মূত্রহীনতা।—ভ্রমণ করিতে, কাসিতে এবং হাঁচিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। রোগী কেবল বসিয়া পশ্চাদিকে বক্র হইলে মূত্রত্যাগ করিতে পারে।

পুঞ্জনেত্রিয়তা।—সহজে কামোত্তেজনা ঘটে ; স্ত্রীসঙ্গকালে অতি শীঘ্র গুরুক্ষরণ হয় অথবা অতি কষ্টে হয় অথবা প্রায় হয় না। কোন কারণ ব্যতীতই অতি প্রচুর গুরুস্রাব হয় এবং জননেত্রিয়ের উত্তেজনা বশতঃ অণ্ডকোষ আকৃষ্ট থাকে।

স্ত্রীজনেত্রিয়তা।—রজোরোধ অথবা রজোকৃচ্ছ। ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়া মাত্রই রোগিণী সর্কপ্রকারে সুস্থ বোধ করে ; কিন্তু ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে সকল অসুস্থতাই পুনরাবর্তন করে। ঋতুস্রাবকালে ভ্রমণ করিলে বৃহৎ শোণিতচাপ নির্গত হয়। ঋতুস্রাব হইলে অণ্ডাধারের বেদনা উপশম পায়।

নিশ্বাসহীনতা।—পদ বন্দিসক্ত এবং পদাঙ্গুলী হাজ্জাবিশিষ্ট থাকে ; পদের হর্গন্ধ ঘর্ষের রোধ হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা জন্মে।

প্রদর্শক লক্ষণ ।—পদের অথবা নিম্নাঙ্গের অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের অনুভূতি এবং রোগীর অবিরত পদচালনা ।

চিকিৎসা ।

শিরঃশূল ১—পূর্ববর্ণিত নানা প্রকার শিরঃশূলে জিক্কাম দ্বারা উপকার হয় । কিন্তু ইহার শিরঃশূল অতীব বিরল । সামান্য ওষু-ইনমতপানে তাহার হ্রাস ইহার প্রদর্শক ।

মস্তিস্করোগ—পুরাতন রক্তহীনতা ; মস্তিস্কের কোমলতা ।—মস্তিস্কের পুরাতন রক্তহীনতা, বিশেষতঃ তাহা অপরি-মিত ব্রোমাইড অথ পটাসিয়াম সেবন জন্ম হইলে জিক্কাম মেট ফলপ্রদ ঔষধ । আরক্তজ্বর ও শিশুকালের কালীন মস্তিস্ক বিকারেও ইহা উপকার করিয়া থাকে । মস্তিস্ককোমলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাতিক অবস্থাতে জিক্কাম কার্যকারী ।

ব্রাসউক্স—বৃদ্ধিগের মস্তিস্কের উপাদানগত বিকারে উপকারী । মস্তক চালনা করিলে মস্তিস্কে জলপতনবৎ অনুভূতি । মস্তিস্করোগ বশতঃ পক্ষাঘাতিক কষ্টেও ইহা ফলপ্রদ ।

মস্তিস্কোদক বা হাইড্রোক্লেফালাস ।—অধিকাংশ সময়ে শিশুকলেরারোগান্তিক মস্তিস্কোদকরোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ উপস্থিত হইলে জিক্কাম প্রযুক্ত হয় :—শিশুর শিরোনুষ্ঠান এবং যেন ভীতি বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ ; মস্তকপশ্চাদ্দেশ তপ্ত ও ললাটের শীতলতা ; দস্তকিড়ি-মিড়ি ; চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু ও স্থির দৃষ্টিবিশিষ্ট এবং পলকহীন ; নাসিকার শুষ্কতা ; নিদ্রাকালে পেশীর বাঁকি এবং পদের চঞ্চল গতি ; বিবর্জিত মস্তকে অত্যন্ত বাহাভিসুখীন চাপের অনুভূতি ; শিশু দুর্বল এবং শীতল, মস্তক আবৃত্তি করিয়া বালিসের মধ্যে প্রবেশ করায় এবং মধ্যে

মধ্যে চীৎকার করে । ইহা ক্যালকেকে ফ্রস সহ তুলনীয় । হৃৎস্তেদের অন্তঃপ্রবেশ প্রযুক্ত রোগ ।

স্পাইন্টাল ইরিটেশন বা মেরুদণ্ডেয় উত্তেজনা ।—

জিফ্ফামেনের মেরুদণ্ডের উত্তেজনা প্রসূত লক্ষণের বিষয় আমরা ইতিপূর্বে বিবৃত করিয়াছি । তাহাতে বিশেষতঃ পৃষ্ঠের সর্কনিম্ন কশেরুকা কনকন করিয়া বেদনা করে এবং ভ্রমণাপেক্ষা উপবেশনেই রোগের বৃদ্ধি হয় । মেরুদণ্ড বাহিরা জ্বালা ও অঙ্গের কম্প থাকে । প্রতিক্রিপ্ত কারণে মেরুদণ্ডের উত্তেজনা হইলে জিফ্ফাম ভ্যালেনেরিয়ানেট তাহার ঔষধ ।

সিপিছা—ইহাতেও সর্কনিম্ন পৃষ্ঠকশেরুকাতে বেদনা হয়, কিন্তু উপচয় কারণ বিভিন্ন থাকে ।

ফসফরাস্—মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনাযুক্ত ; তাহার দুর্বলতা ; অঙ্গাদি দুর্বল ; রোগী হাঁটিতে ঠোকর লাগিয়া পড়ে ।

চাইনি সাল্ফ—মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠাংশে স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা । গ্রীবার সর্কনিম্ন এবং পৃষ্ঠের প্রথম কশেরুকার চাপ দিলে বেদনা ।

তাণ্ডবরোগ বা করিছা ।—তণ্ডুস্তেদ বসিয়া যাইয়া অথবা ভীতি নিবন্ধন তাণ্ডবরোগে যদি সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং শব্দের অবিশ্রান্ত চঞ্চল গতি থাকে তাহাতে জিফ্ফাম মেট উপকারী । ইহার পদচাঞ্চল্য নিদ্রাবস্থাতেও থাকিতে পারে, রোগ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বই অধিকতর আক্রমণ করে এবং রোগীর মানসিক অবসাদ ও উত্তেজনাপ্রবণতা ওয়াইনমল পানে বর্ধিত হয় । রোগ পুরাতন হইলে ইহা অধিকতর কার্যকারী । জিফ্ফাম ভ্যালেনেরিয়ানেটও ইহার ঔষধ । মানসিক ভাববিকারপ্রযুক্ত রোগে ওপিছাম ফলপ্রদ ; তাহাতে শরীরের কম্প ও আকুঞ্চক পেশীর ঝাঁকি হওয়ায় বাহ বহির্দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে শরীর সহ সমকোণ নির্মাণ করে ।

স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াদৌৰ্বল্য বা নিউরিস্থিনিয়া ।—

অতিশয় দুৰ্বলকর রোগ বশতঃ অবসন্ন জীবনীশক্তি প্রতিক্রিয়াহীন হওয়ায় স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপনে অশক্ত হইলে জিঙ্কাম্ উপকার করে। সৰ্ব্বনিম্ন পৃষ্ঠকশেৰুকাদেশে পৃষ্টবেদনা দ্বারা স্নায়বিক দৌৰ্বল্য প্রকটিত হয় এবং শব্দের অত্যন্ত চঞ্চল গতি ইহার প্রদর্শক থাকে। মেরুদণ্ডে জালা, জ্বালাপশ্চাতে কীটবিচরণের অনুভূতি এবং অঙ্গাদির দৌৰ্বল্য ইহার অগ্রাণু লক্ষণ। মেরুদণ্ডলক্ষণ ও দৌৰ্বল্যের প্রাধান্য থাকিলে জিঙ্কাম্ সাইক্রেটাম অধিকতর উপযোগী। বিষয়ী ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক-দুৰ্বলতায় (Brain fag) রোগীর রোগজীর্ণ আকৃতি, পাণ্ডুরতা এবং নিদ্রাহীনতা, নান্দিক অবসাদ ও চুশ্চিস্তাগ্রস্ততাব থাকিলে জিঙ্কাম্ ফসফাইড তাহার ঔষধ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ ।—পদের বর্ষরোধ বশতঃ মস্তিষ্ককোমলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাতরোগে শিরোঘূর্ণন ও আক্রান্ত অঙ্গের কম্প, অসাড়তা এবং বিড়বিড়ি জন্মিলে জিঙ্কাম্ প্রযোজ্য হইয়া থাকে। ঘর্ষণে রোগ লক্ষণের উপশম এবং ওয়াইনমত্ত পানে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগ সহ স্পষ্ট চক্ষুপুটপতন থাকিতে পারে।

ইহার রোগে স্নায়বিক দুৰ্বলতা, মস্তিষ্ককোমলতা এবং কম্প থাকায় ইহা ফসফের তুল্য হইলেও তাহার রোগ ওয়াইনমত্তে বৃদ্ধি পায় না। প্লাস্মাম সহও ইহাকে তুলনা করা যাইতে পারে। প্লাস্মামে রুগ্ন অঙ্গ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তাহার অগ্রাণু লক্ষণ জিঙ্কামের সমান দেখা যায়। প্লাস্মামে ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গের বেদনা ও উদরশূল পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে।

কাসি বা কফ ।—জিঙ্কামের আক্ষেপিক কাসিতে বোধ হয় যেন বক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া জড়সড় হইতেছে। গন্ডার রক্তময় থাকিতে পারে। এরূপ কাসি প্রায়শঃই ঋতুপ্রাবের পূর্বে বা সময়ে দেখিতে

পাওয়া যায় । মিষ্ট বস্তু আহারে কাসির বৃদ্ধি হয় । শিশুদিগের জিহ্বাকাম কাসির প্রত্যেক আক্রমণে তাহারা জ্বননেক্রিয়ে হস্ত প্রদান করে ।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিমালিন্য বা এম্ব্লিয়পাইয়া ; কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা ; টেরিজিয়াম বা মাংসবৃদ্ধি ; অঙ্গপক্ষরোগ বা গ্র্যানুলার অফথ্যাল্মিয়া প্রভৃতি ।—তীক্ষ শিরঃশূল, চক্ষুতরকার সংকোচন এবং প্রত্যেক চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর তীক্ষতা বিশিষ্ট বেদনায় এবং এম্ব্লিয়পাইয়ারোগে জিহ্বা মেট উপকারী । চক্ষুর পুনঃ পুনঃ প্রদাহ হওয়ার কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা জন্মিলে জিহ্বাকাম সালফ অধিকতর উপযোগী ঔষধ । চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে জালাযুক্ত চনচনি ও হলবেধবৎ বেদনা থাকিলে জিহ্বা মেট টেরিজিয়াম আরোগ্য করিতে পারে । চক্ষুপত্রের দানাম্বুক্ত প্রদাহে জিহ্বাকাম মেট অপেক্ষা তাহার সালফেটই উৎকৃষ্টতর ঔষধ ।

মুখমণ্ডলস্নানশূল বা প্রসপ্যালজিফ্রা ।—ইহার অতি তীক্ষ বেদনাকালে চক্ষুপত্রের নীলাভা জন্মিলে জিহ্বাকাম উপকার করিয়া থাকে ।

পরিপাকযন্ত্ররোগ—উদরশূল ; শিশুকলেহা ।
—জিহ্বাকামের উদররোগ অনেকাংশে প্লাস্মাকামের তুল্য । উভয়েই নাভিদেশে কামড়ানি ও অদমা কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন করে । প্লাস্মাকামের উদর-শূলের প্রচণ্ড বেদনা চতুর্পার্শ্বে বিকীরিত, এবং উদরপ্রাচীর অভ্যন্তরভিমুখে আকৃষ্ট হয় ; জিহ্বাকামের ঐরূপ বেদনা ও আকৃষ্টতা উদরের উভয় পার্শ্বে থাকে ; অনেক রোগীর মূত্রে রক্ত দেখা যায় ; কখন বা মূত্র ঘোলাটে, পচা ও মৃৎবর্ণ হয় এবং তাহাতে ঈষৎ পীত তলানি পড়ে । মূত্রস্থলী পূর্ণ

থাকিলেও রোগী দাঁড়াইয়া পায় চাপ না দিলে মৃত্যোগ করিতে পারে না । পূর্ববর্ণিত মস্তিষ্কলক্ষণ থাকিলে শিশুকালের পরিশ্রম মস্তিষ্কদাকরোগে ইহা ব্যবহৃত হয় । ইহাতে শিশু তাড়াতাড়ি জল পান করে ।

শুক্রেমেহ বা স্পার্মাটরিয়া।—বহুকালব্যাপী অপরিমিত ও অবথা কামসেবা নিবন্ধন শুক্রেমেহ ও বিষাদোন্নততায় জিঙ্কাম উপকারী । রোগীর পাণ্ডুবর্ণ মুখ বসিয়া যায়, চক্ষু বেড়িয়া নীলবর্ণ রেখা পড়ে এবং জননেক্রিয়প্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা থাকায় অণ্ডকোষ উল্কে আকৃষ্ট হয় । কনাইয়ামে স্থানিক উত্তেজনা থাকে না, অরামরোগী অধিকতর বিমর্ষ থাকে ।

প্রীজননেক্রিয়রোগ—ঋতুবিকার ; জরাস্র-প্রাবান্ধত ; অণ্ডাধারশূল।—জরায়ুর গ্রীবাঙ্কত সহ ঋতু-স্রাবের বিশৃঙ্খলা ও বাম অণ্ডাধারের বেদনায় জিঙ্কাম উপকারী । ঋতুস্রাবের আরম্ভে সকল লক্ষণেরই উপশম হয় । অণ্ডাধার ও জরায়ুর উত্তেজনা, বহু দিন ব্যাপী হৃশিচন্তা, শিশুপালন জন্ত বিশ্রামাভাব বর্শতঃ স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং অস্থিরতা প্রশমনে জিঙ্কাম্ ভ্যালেরিয়ানেট অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য । বেদনাহীন জরায়ুর গুরুত্ব জন্মে । অণ্ডাধার স্পর্শে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত থাকে । সম্ভবতঃ জরায়ু ও অণ্ডাধার উভয়েরই স্থলন হয় এবং উদরাময় জন্মে । মস্তিষ্কের ক্লাস্তি ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা এবং অঙ্গচাক্ষুণ্য প্রভৃতি দেখা যায় । ইহার ২× এবং ৩× ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

লেকচার ১০৮ (LECTURE CVIII.)

ক্রিয়জোট (Kreosotum.)

সম্ভব ১—ক্রিয়জোটের কার্যপ্রতিষেধক—একন, আর্স, সিংক, ইপিকা, নাক্স ভ।

সাধারণ ক্রিয়া ১—লসীকামণ্ডলে ক্রিয়জোটের ক্রিয়া হইলেও পরিপাকযন্ত্র ও স্ত্রীজননেত্রিরের শৈল্পিকবিল্লি এবং ত্বকে ক্রিয়ার প্রাধাত্ত প্রকাশ পায়। শৈল্পিকবিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ আক্রান্ত শরীরাংশের প্রাতিষ্ঠায়িক অবস্থা ঘটলে তাহার বিশ্লেষণপ্রবণতা ও ধ্বংসের পরিণাম স্বরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহাতে যে উগ্র ও ক্ষতকর স্রাব জন্মে তাহাই ইহার বিশেষতা বলিয়া গণ্য। ইহার রোগী ধাতুগত রক্তস্রাবপ্রবণতাবিশিষ্ট; মূহু রক্তস্রাব হয়।

লক্ষণ ১—বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং দীর্ঘাকার, ও শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্রিয়জোট উপযোগী ঔষধ। রোগীর সাধারণ দুর্বলতা থাকে। প্রাতঃকালে অভ্যন্ত সময়ের পূর্বে গাত্রোথান করিলে মূছার ভাব হয়। অসাড়তা; স্পর্শজ্ঞানের অভাব। দ্রুত শরীরক্ষয়।

চক্ষু ১—চক্ষুতে জ্বালা এবং তাপ; প্রাতঃকালে চক্ষু হইতে তপ্তজল স্রাব।

শল্লিশাক্ষয় ১—দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা। আহায়ের তিন বা চারি ঘণ্টা পরে অঙ্গীর্গাবস্থায় সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্তুর বমন বশতঃ দৃষ্টিমালিন্ত। গর্ভাবস্থায় বেদ্রূপ হয় ওজ্রূপ বিবমিষা। তাহাতে মুখ জ্বালা করে, থু থু উঠে এবং সম্পূর্ণ শরীরের শীতকম্প হয়, কিন্তু তাপ ও তৃষ্ণা হয় না।

মূত্রশুদ্ধি :—রোগীর মূত্রবেগে নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্তু মূত্র ধারণ করিতে না পারায় শয্যায় মূত্রত্যাগ হয় ; অথবা মূত্রত্যাগ করিতেছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে ।

স্ত্রীজলনেক্রিয় :—ঋতুশ্রাব অতি শীঘ্রাগত, অতি প্রচুর এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী । অতীব দুর্বলকর, বিশেষতঃ জন্মার দুর্বলকর, পীতবর্ণের এবং শ্বেতপ্রদর থাকায় বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে এবং তাহার উগ্রতা নিবন্ধন বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ চুলকায় ও কামড়াইয়া উঠে । শুভ্র শ্বেতপ্রদরে কাঁচা শস্তের জ্ঞান থাকে । বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গের উভয়ার্দ্ধ মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি ; বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ ও উরুর মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি সহ জালা ও কামড়ানি বেদনা । যোনিকপাটের এবং যোনির প্রচণ্ড চুলকনায় রোগিনী শরীরংশ বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়, বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ স্ফীত এবং উষ্ণ, কঠিন ও টাটানিযুক্ত । বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গ ও যোনিকপাটের মধ্যবর্তী স্থানে, টাটানি ও জালাযুক্ত চনচনি ।

অক্র :—চুলকনা হইলে সন্ধ্যাগমে তাহা অতি প্রচণ্ডভাবে ধারণ করে । সম্পূর্ণ গাত্রোপরি পূর্ণপূর্ণ উদ্ভেদ ।

চিকিৎসা :—দস্তোদগমবিকার উপশম করিতে ক্রিয়াজোটে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । অতিশয় বেদনাদায়ক এবং কষ্টকর দস্তোদগম দস্তমাড়ি স্পঞ্জের গ্রায় ও বেদনায়ুক্ত ; শিশুর দস্তোদ্ভেদ অত্যন্ত কষ্টকর হয় এবং শিশু সম্পূর্ণ রজনী ছটকট ও এ পাশ ও পাশ করে ; দস্ত কাটিয়া বাহির হইলে তদুপরি ধ্বংস চিহ্ন দৃষ্ট হয় । কোষ্ঠবদ্ধ থাকে অথবা শিশু অজীর্ণ মলত্যাগ করে ॥ জিহ্বাভাগে রোগী দস্তোদগমকালে নিদ্রালু থাকে ও তাহার মুখ পাণ্ডুর দেখায় ; মস্তিষ্কলক্ষণ প্রকাশ পায় । অত্যাগ যন্ত্রের উদ্ভেদনা বশতঃ বা সহানুভূতি প্রতিক্ষিপ্ত প্রযুক্ত বমনে ক্রিয়াজোটে উপকার করে ।

আহারান্তে অনেক সময় পরে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর বমন হয়। যক্ষ্মাকাসি, ককটরোগ বা ক্যান্সার এবং কিডনিরোগ ও গুদ্রবাহুর বমনে ইহা ফলপ্রদ। ক্রিন্জ-জোটেইর শস্যামূত্রস্রাবে রোগী প্রস্রাব করিতেছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে এবং শস্যায় মূত্রস্রাব করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজোবাহুল্য; স্বেত প্রদর জননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতি; জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত ও ক্যান্সারক্ষত;—ক্রিন্জজোটেইরোগীর সাধারণতঃ প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং তজ্জগ্গ মস্তকে গুনগুন ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে, স্রাবের পূর্বে উদরের স্ফীতি জন্মে। শোণিতস্রাব সবিরাম হইতে থাকে এবং তাহার সহিত পৃষ্ঠের অধোভাগে আকৃষ্টভাব থাকিতে পারে। ইহার স্রাব শীঘ্রাগত ও প্রচুর, সিপিহ্না তাহা বিদগ্ধাগত ও অত্যন্ন। ঋতুস্রাবের পরে ঘোর কটা এবং দুর্গন্ধ স্বেতপ্রদর দেখা দেয়। ক্রিন্জজোটেই স্বেতপ্রদরের বিশেষতা এই যে, তাহার অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং উগ্রগুণ স্রাব সংস্পর্শে স্ত্রীঅঙ্গপ্রদেশে হাজা ক্ষত জন্মে; ইহার পূর্বকথিত পীতবর্ণ স্রাব পূর্কোক্ত রূপ চুলকনা প্রভৃতি উৎপন্ন করে এবং তাহাতে আক্রান্ত শরীরংশ স্ফীত, তপ্ত, কঠিন ও টাটানিযুক্ত হয় এবং রোগী দুর্বল হইয়া যায়। এ প্রকার রোগা-রোগো ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্রাব অনেক দিন থাকিলে তাহাতে কাঁচা শস্তের গন্ধ হয়। স্রাবের উগ্রতা থাকায় ক্রিন্জজোটেই সিপিহ্না ও মিউরেক্‌স হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতির, বিশেষতঃ জন্মান্মূলশৈর, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। পৃষ্ঠে আকৃষ্টতা থাকে এবং ইহার নিম্নাভিমুখীন আকৃষ্টতার শরীর চালনায় উপশম হওয়ায় ইহা সিপিহ্না এবং নাক্সুভ হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত রোগে দুর্গন্ধ ও ক্ষতকর স্রাব

হইলে এবং জননেক্রিয়ে তাপ, জ্বালায়ুক্ত বেদনা ও টাটানি জন্মিলে ক্রিয়জোট তাহার ঔষধ।

ক্রিয়জোটের ছকরোপে সন্ধির প্রসারণপার্শ্বে (Extensor side) পুষ্ণুগুটিকা জন্মে।

সিলিনিন্ফ্রাম্—ছকের তাঁজে ও গুল্ফ সন্ধিদেবে চুলকনা। কাউরোড্বেদযুক্ত স্থানের কেশস্থলন।

বরাক্‌স্—ডাং মাক্‌ক্ল্যাচ ইহাকে বিচর্চিকা বা সরাসিস্‌রোগের নিরাময়িক ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

পেট্রিলিন্ফ্রাম্—ইহা অমিশ্র পামা বা একজিমার ঔষধ। স্থূল বিধিকা জন্মে। পূয় বরে। ছক ও হস্তাঙ্গুলির মস্তক ফাটে। ছক কৰ্কশ ও শুক থাকে, করতল পার্চমেণ্টের ত্রাণ হয়। ইহা কাণের পিঠের উদ্বেদে বিশেষ উপকারী।



লেকচার ১০৯ (LECTURE CIX.)

প্লাস্লাম মেটালিকাম্ (Plumbum Metallicum.) ।

সংস্করণ।—সিসকবিষক্রিয়ার প্রতিষেধক—এলাম্, এলুমিনা, বেল, ককুল, হায়সা, নাক্‌স্ ভ, ওপি, প্ল্যাটি, ট্র্যাম, জিঙ্ক, বিদ্যৎস্রোতের প্রয়োগ, এল্‌কহল, দুগ্ধ ।

সাধারণ ক্রিয়া :—প্লাস্লাম্ মেরুমজ্জাতে অতি প্রবল এবং বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় মেরুমজ্জার উত্তেজনা বশতঃ চৈতন্যধিক্য, স্নায়ুশূলঘটিত আক্ষেপ এবং সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন উৎপন্ন হয়। স্নায়ু-কেন্দ্রের এইরূপ অবস্থার ফল স্বরূপ মেরুমজ্জার ও মস্তিষ্কের ক্রমশঃ ঘনীভূততা এবং কোমলতা জন্মে, অথবা এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্যভাব, পক্ষাঘাত, পেশীক্ষয় এবং মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়াজড়তা ঘটে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিক সময় অন্তর অন্তর স্নায়ুশূল এবং মৃগী বা তাহাদিগের ত্রায় অগ্রবিধ স্নায়ুবিকারলক্ষণ উপস্থিত হয়। কিড্‌নিতেও ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ার তাহাদিগের দানায়ুক্ত পরিবর্তন উৎপাদক অপকৃষ্টতা (Granular degeneration.) উৎপন্ন করিলে ফল স্বরূপ লালামেহ প্রভৃতি কিড্‌নিরোগ উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ড ও বক্‌রুৎ প্রভৃতি যন্ত্রেরও ইহা অপকৃষ্টতা জন্মাইতে পারে। ডাঃ এলেন বলেন, "ইহা যন্ত্রের উপাদান মধ্যবর্তী তাস্তব পদার্থের প্রদাহ উৎপন্ন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করে না।

লক্ষণ।—মন—অনুভূতির ধীরতা ; ওদাস্ত। স্মরণশক্তির অভাব হওয়ার রোগী কোন বিষয় বলিতে উপযুক্ত কথা সংগ্রহ করিতে

পারে না। প্রচণ্ড প্রলাপকালে মুখের বিকৃতভাব। গোপনে বিষদানে তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া প্রলাপকালে ভীতি ; রোগী তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া মনে করে। **মস্তকে**—শিরোগর্ধন ; কনকনানি। মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার নিম্নাংশে গুরুত্ব। **শ্রাস্ত্র**।—পক্ষাঘাত হইবার পূর্বে মানসিক বিকার, কম্প, আক্ষেপ, অথবা বৃহৎ বৃহৎ স্নায়ুপথে তীরবেধবৎ, তীক্ষ্ণ এবং ছিন্নবৎ বেদনা হয় ; রোগাক্রান্ত শরীররাংশ শীর্ণ হইয়া যায় ; মণিবন্ধপতন (Wrist-drop—মণিবন্ধের পক্ষাঘাত বশতঃ কর বুলিয়া পড়ে)। পুরাতন মৃগীবৎ আক্ষেপ ; ফিটের পূর্বে জজ্বার গুরুত্ব এবং অসাড়তা জন্মে, জিহ্বা স্ফীত হয়। ফিটের পরে মস্তকে অনেক সময় স্থায়ী জড়ভাব জন্মে। **চক্ষু**—পীতাত যোজক বিলি। **মুখমণ্ডল**—মৃত ব্যক্তির শ্রায় মলিন ও ফেকাসে বর্ণ। অত্যন্ত উৎকর্ষা ও ক্লেশব্যঞ্জক মুখাকৃতি। হৃৎস্তম্ভ। **পালনশ্রম**—গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার সংকোচন। **পল্লিপাকযন্ত্র**—মিষ্টশ্বাদ। ক্ষুধার অভাব। হিক্কা। বিবমিষা। ভুক্ত বস্ত, বিষ্ঠা এবং স্রবৎ কটা অথবা স্রবৎ কাল পদার্থের অবিশ্রান্ত বমন ; বমিত পদার্থে শোণিতরেখা থাকিতে পারে। **উদর**—প্রচণ্ড উদরশূল ; উদর মেরুদণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট থাকায় বোধ যেন তাহা দড়ি দ্বারা টানিয়া মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নাভিদেশের অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা তীরবেগে উদরের ও শরীরের অগ্রাংশে যায় এবং চাপে তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। **মল ও মলদ্বার**—মলদ্বারের সংকোচন হওয়ায় তাহার উর্ধ্বে আকৃষ্ট হয়। কোষ্ঠবন্ধে বিষ্ঠা অত্যন্ন, কঠিন, চাপ চাপ অথবা বলের শ্রায় এবং ছাগলের নাতির শ্রায় থাকে ; তাহার বর্ণ কাল্চে অথবা সবুজ হয় এবং তাহা কষ্টে ত্যাগ করা যায়। **মূত্রযন্ত্র**—মূত্রকৃচ্ছ ; কেবল বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ ; নিষ্ফল মূত্রবেগ ; কষ্টে মূত্রত্যাগ। ঘোরবর্ণ ও অত্যন্ন মূত্র ; মূত্রে খেতলালা বা এষমেন

থাকে এবং তাহা কটাসে, লাল ও ঘোলাটে হয়; অস্বাস্ত্র মূত্রে রক্তের লোহিত কণিকা এবং দীর্ঘ জমাট পদার্থের তলানি থাকে ।

স্ট্রীজেননেক্রিয়া—যোনির আক্ষেপ । স্তন্যদুগ্ধ অত্যন্ত হইয়া যায় ।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—উদর মেরুদণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট থাকায় রোগী এবং দর্শক উভয়ের নিকটেই বোধ হয় যেন তাহা দড়ি দিয়া টানিয়া মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে । প্লাস্মার অধিকাংশ রোগে এই লক্ষণ উপস্থিত থাকায় ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক । দস্তমাড়ির পার্শ্ব বাহিয়া স্পষ্ট নীলবর্ণ রেখাকার কলঙ্ক । “মণিবন্ধ-পতন,” প্রসারক পেশীর পক্ষাঘাত ।

চিকিৎসা ;—কখন কখন পূর্ববণিতরূপ প্রচণ্ড প্রলাপ উপস্থিত হইলে প্লাস্মাম দ্বারা তাহার উপশম পাওয়া যায় । ইহার প্রলাপ বেনাডনার ঠায়ই প্রবলতা বিশিষ্ট এবং নিকটস্থ ব্যক্তিদিককে প্রহার ও দংশন করিতে চাছে । প্রভেদ এই যে ইহাতে মস্তক এবং হস্তের কল্প থাকে, মুখ ও দস্ত প্রভৃতিতে হলুদবর্ণ প্লেগ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রলাপ ও উদরশূল পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে । প্লাস্মামের ক্রিয়ায় সুপীন্ন লক্ষণ উৎপন্ন হয় । তাহাতে প্রথমে পদের প্রায় পক্ষাঘাতিক গুরুত্ব হইলে রোগের আক্রমণ হয় এবং আবেশের পরে পদের পক্ষাঘাত ও নাসিকাধনি সহ নিদ্রা অনেক সময় থাকিয়া যায় । মস্তিষ্কপদার্থের ঘনীভূততা নিবন্ধন স্থূলত্ব ও মস্তিষ্কের অর্কুদ ইহার রোগের কারণ । ইহা পুরাতন সুপীন্নরোগের ঔষধ । শীরে জ্ঞানের পুনঃসংগঠন হওয়া অগ্রতম প্রদর্শক । কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরশূল থাকে । কশেরুকামজেক্ষয় ক্ষয় বা লোকোমটর এটাক্সিনিয়া রোগের মেরুদণ্ডের রোগজ পরিবর্তনে আমরা প্লাস্মাম লক্ষণের অতি স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাই । ইহাতে অঙ্গের

পক্ষাঘাতের আনুষঙ্গিক রূপে তাহার ক্ষয়, সামঞ্জস্যভূত ক্রিয়ার অভাব ও চৈতন্যহানি এবং ধ্বজভঙ্গ হয়। ইহার অগ্নিস্কুলিঙ্গ সংস্পর্শানুভূতিবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হইলে কখন কখন এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা জন্মে যে, রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। ডাং লিলিয়েস্থাল এ রোগে প্লাস্মাম ফস্ফরিকাম অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষাঘাতরোগে আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ অঙ্গের ক্ষয় বা শীর্ণতা থাকাই প্লাস্মামের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

মণিবন্ধ-পতন, অঙ্গ-সংকোচন সহ পক্ষাঘাত, চক্ষুপুট-পতন, জিহ্বার গুরুত্ব বা পক্ষাঘাত, অঙ্গের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ এবং স্বকের পাণ্ডুর, শুষ্ক ও শীতল অবস্থা উৎপাদক সমন্বয়স্বরূপ নিবন্ধন পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানাবিধ ও নানা অঙ্গের পক্ষাঘাত-রোগে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডাং বেজ বলেন নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত-রোগে ইহা দ্বারা তিনি কোন উপকার হইতে দেখেন নাই। ফলতঃ ইহা অধিকতর সময়েই উর্দ্ধাঙ্গেরই পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। সৰ্ব্বম্প-পক্ষাঘাতে ইহা মার্কু' রিসাসের তুল্য। প্লাস্মাম এবং ক্রাসাসাসাসাস এ রোগের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। মেরুমজ্জার ঘনীভূততায়ুক্ত স্থূলতা অথবা বসাপকৃষ্টতা প্লাস্মামের পক্ষাঘাতের কারণ। কুপ্রামের পক্ষাঘাত অনেক বিষয়ে প্লাস্মাম-পক্ষাঘাতের তুল্য হইলেও তাহার রোগে অধিকতর খল্লী থাকে।

প্লাস্মামের কোষ্ঠবন্ধরূপ অতি স্পষ্টতর লক্ষণ দ্বারা প্রক-
টিত হয়। লক্ষণ—পুনঃ পুনঃ মলবেগ সহ উদরশূল, উদরের আকৃষ্টতা
বশতঃ শারিন্দার পেটের ত্রায় খোল হইয়া যাওয়া, মলদ্বার-
সংকোচক পেশীর বেদনায়ুক্ত আক্ষেপ বশতঃ তাহার উর্দ্ধ আকৃষ্টতা

এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কাল, শুষ্ক এবং কঠিন বিষ্ঠার গোলা অতিকষ্টে ত্যাগ হওয়া প্রভৃতি । ইহার রোগে পেশীশক্তি ও অস্ত্রের স্রাবের অভাব ঘটিত হয় ।

নেফ্রাইটিস বা **স্বক্ককপ্রদাহরোগেও** অবস্থা বিশেষে প্লাস্মাম উপযোগী ঔষধ বলিয়া গণ্য । ইহার বৃক্কক বা কিডনিতে দানায়ুক্ত অবস্থা উপন্নকারী প্রদাহ জন্মে । মূত্ররোধ বশতঃ কনুভালসন হয় । অস্থান্ন লক্ষণমধ্যে জলশোথ, মলিনতায়ুক্ত ফেকাসে মুখ এবং গুল্ফ-সন্ধিদেশের শোথিতভাব প্রধান । এইরূপ পুরাতন রোগে আর্স এবং মার্কারি ও প্রযোজ্য । ডাঃ শুড্‌নো মূত্রাঘাত ঘটিত লক্ষণে কুপ্রাম আর্সের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । মূত্ররোধ নিবন্ধন আক্ষেপের কুপ্রাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । **পার্টিট** বা **স্কুদ্রবাত**, **পুল্পস্রাব** অথবা **উপদংশরোগ** নিবন্ধন **লাল্যামেহ-রোগের** অরাম উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া পরিগণিত । অবস্থা বিশেষে **গর্ভপাত** নিবারণে প্লাস্মাম সাহায্যকারী ঔষধ । কোন কোন স্থলে ক্রণের আয়তনের বৃদ্ধি সহ জরায়ু শরীরের বৃদ্ধি না হওয়ার জরায়ু ক্রণধারণে অক্ষম হইলে গর্ভপাত হইয়া থাকে । যে সকল স্ত্রীলোকের ইহা অভ্যাস-গত দোষ রূপে উপস্থিত হয় পূর্ক হইতে প্লাস্মাম ব্যবহারে তাহার সংশোধন হইতে পারে ।



লেখক্কার ১১০ (LECTURE CX.)

ট্রিলিয়াম (Trillium.)

(ট্রিলিয়েসি জাতি ।)

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের প্রায়মণ্ডল দ্বারা ট্রিলিয়াম শৈল্পিক বিলি এবং কৈশিক রক্তবহা নাড়ী, বিশেষতঃ জরায়ুর উপরি-উক্ত নাড়ী, আক্রমণ করিলে শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে প্রবল এবং মৃদু উভয় প্রকার রক্তস্রাব হয় ।

লক্ষণ এবং চিকিৎসা । ট্রিলিয়ামে নাসিকা, দন্তমাড়ি, আমাশয়, অন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র, বিশেষতঃ জরায়ু হইতে সাধারণতঃ প্রচুর ও উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব হয় । রক্তস্রাবে বোধ হয় যেন কটির উভয় পার্শ্বের সংযোগের (Sacro-iliac synchondrosses) অস্থিঘর্ষ সংযোগস্থ্য হওয়ার ফাঁক হইয়া যাইতেছে, রোগী তাহা কশিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহে । প্রচুর রক্তস্রাব হইলে অস্থিনিচয় ভগ্ন হওয়ার অনুভূতি জন্মে । আক্রান্ত শরীরংশ কশিয়া বাঁধার ছায় শিরাতে রাশিকৃত শোণিত সঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি জন্মে এবং তাহা জঘা ও গুল্ফসন্ধিতে অধিকতর থাকে ।

প্রবল এবং মৃদু উভয় প্রকার শোণিতস্রাব নাসিকা, দন্তমাড়ি, আমাশয়, অন্ত্রপথ এবং বিশেষরূপে জরায়ু প্রভৃতি যে কোন শরীরগর্ভ হইতেই হউক বহুতর চিকিৎসকের মতেই ট্রিলিয়াম তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ । ডাং হেল এবং ডাং বাট্ ইহাকে স্যায়া-ইনা, সিকেলি এবং হেমায়েলিস অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিশ্বাস করেন । প্রবল নাসিকাশোণিতস্রাবে এবং

রক্ত দস্তম্বাড়া অথবা দস্তম্বাড়াপাটন জনিত ক্ষত দস্তম্বাড়া হইতে রক্তস্রাবে ইহা মূল অরিষ্ট দ্বারা সিক্ত তুলার স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। আমরক্তরোগ বশতঃ প্রভূত শোণিত স্রাবে এবং রক্তসংশ্লুক উদরাময়ে ইহা উপকারী। সুস্পষ্ট ধাতুগত দোষ ব্যতীতই নিম্নমিত প্রভূত স্রাব অত্যধিক পরিমাণ হইলে ডাং ফ্যারিংটনের মতে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি সর্ব প্রকার রক্তস্রাবেই ৬ ক্রমের ঔষধ যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। ট্রিলিফাটমের রোগ নির্ণয়ার্থ কোন প্রদর্শক দৃষ্ট হয় না। আরোগ্যলক্ষ বহুদশিতাই ইহা প্রয়োগের মূল ভিত্তি। প্রসবাস্তিক অভ্যস্ত জরায়ু রক্তস্রাবে, পরিশ্রম এবং সৌত্রিক অর্কুদ (fibroid) জনিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে পূর্বকথিত কটিসন্ধি বিকার বর্তমান থাকিলে ইহা ফলপ্রদ। রোগীর আমাশয়ের ভাবান্তর হেতু মুচ্ছার ভাব অঙ্গসীমার শীতলতা এবং নাড়ীর দৌর্বল্য থাকে।

লেখক্চার ১১১ (LECTURE CXI.)

সালফুরিকাম এসিডাম্ (Sulphuricum Acidum.)।

সালফুরিক এসিড।

সম্বন্ধ।—সালফুরিক এসিডের কার্যপ্রতিষেধক—পাল্‌স্। সালফুরিক এসিড বাহার কার্যপ্রতিষেধক—লেড্ ওয়াটারের।

সাধারণ ক্রিয়া।—শৈল্পিকঝিল্লি মাত্রই সালফুরিক এসিডের প্রধান কার্যক্ষেত্র হইলেও, পরিপাকযন্ত্রপথ এবং শ্বাসযন্ত্রপথের শৈল্পিকঝিল্লিতেই ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ত্বকও আক্রমণ করে। ইহা দ্বারা শক্তির অত্যন্ত অপচয় সংঘটিত হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। দৃষ্টতঃ কম্প না থাকিলেও রোগীর আভ্যন্তরীণ কম্পভাব জন্মে। বৃদ্ধ্যক্তি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং তাহাদিগের ঋতুসন্ধিকাল ইহার উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র।

লক্ষণ ও চিকিৎসা।

দৌর্ভল্য।—উপরউক্ত লক্ষণযুক্ত দৌর্ভল্য রোগে সাল্‌ফু এসি উপকারী।

অদ্যাত্ন।—বহুকালের অভ্যস্ত মত্‌পায়ীদিগের রোগে বারম্বার নাক্‌স ভ দ্বারা উপকার হওয়ার পর অবশেষে তাহার আর ক্রিয়া হয় না। রোগীর শোচনীয় স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ স্বরূপ লোলচর্ম, রক্তহীনতা, শীর্ণতা এবং জৈবতাপাঙ্গতা বশতঃ শরীরের শীতলতা উপস্থিত হয়। ইহাতে সাল্‌ফু এসি আমাদিগের প্রায় এক মাত্র অবলম্বনীয় ঔষধ। রোগী সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্ত্র বমন করে এবং ছইক্ষিমত্ত মিশ্রিত না করিলে জল পর্যাস্তও পান করিতে পারে না। রোগী অত্যন্ত ত্রস্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং সাল্‌ফু, নাক্‌স ভ ও আর্সেনিক রোগীর ত্রায় ত্রাণিমত্তে প্রবল ঋকাজ্যযুক্ত হয়।

অন্তিম টার্ট—আমাশয়ের শৈল্পিকঝিল্লির বিকারের প্রাধান্য

এবং নিউমনিয়ারোগ প্রবণতা থাকিলে; প্রধানতঃ বিষারমত্তপানজনিত রোগে ; শীতল ঘর্ম হয় ।

ক্যাম্পসিকাম—ইহার মূল অরিষ্টের ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রাতঃ-কালীন বমন, আমাশয়স্থানে দমিয়া যাওয়ার ভাব এবং মস্তে অদম্য ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণের দমন দ্বারা ইহা ক্ষুধার বৃদ্ধি করে । ত্রাসিতভাব ও কম্পের উপশম করিয়া ইহা স্ননিদ্রা আনয়ন করে ।

এফ্‌থাসু সোর মাউগ্‌ বা ‘জাডী দ্যা’—কঠিন ও স্থায়ী রোগ জন্ম জীর্ণদেহ এবং দুর্বল রোগীর অথবা ক্ষয় বা কলেরারোগ-জীর্ণ দুর্বলীকৃত শিশুদিগের মুখের জাডী ঘা ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে । ক্ষতের বর্ণ ঈষৎ পীত থাকে এবং মুখ হইতে প্রচুর লালা ঝরে । শিশুর গাত্র হইতে অম্লমাত্রা নির্গত হয় । ভগ্ন অণ্ডের গ্রাম ঈষৎ পীত বা ক্রেদময় মল-তাগ হয় ; অনেক সময় শিশুর কাসি থাকে ও উদগারে তাহার উপশম হয় ।

ডিফ্‌থিরিয়া বা দুম্বিত পলক্ষত—ঝিল্লির প্রাচুর্য্য-হেতু শিশুর কণ্ঠে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে, সে কথা কহিতে কি কোন শব্দ করিতে পারে না । টনসিলগ্রন্থি ক্ষীত ও উজ্জ্বললোহিত এবং শিশু মৃতবৎ পাণ্ডুর হয় এবং কিছু আহার করিলে তাহার নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায় ।

টাইফয়েড জ্বর—অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত রোগী ফস্‌ এন্সি রোগীর গ্রাম ধীরে ও কণ্ঠে প্রশ্নের উত্তর করে ; কম্প থাকে না, কিন্তু কম্পের অনুভূতি থাকে ; মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত ও পাণ্ডুর এবং চক্ষু নীলরেখা-বেষ্টিত ; আমাশয়ে শীতলতা ও শিথিলতার অনুভূতিতে উগ্রমত্তে ইচ্ছা যায় । এইরূপ লক্ষণে সাল্‌ফ্‌ এন্সির উপযোগিতা দৃষ্ট হয় ।

শোণিতস্রাব—রক্তস্রাব নিবারণে সাল্‌ফ্‌ এন্সি অশ্রান্ত এমিড হইতে উৎকৃষ্টতর । ইহা প্রত্যেক শরীরদ্বার হইতে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে ; রক্ত তরল ও কৃষ্ণাভ থাকে ।

লেখক্চার ১১২ (LECTURE CXII.)

ক্যাক্টাস্ (Cactus Grandi florus.)।

(ক্যাক্টাসিজাতি ।)

সম্বন্ধ।—ক্যাক্টাসের কার্য্য প্রতিবেদক—একন, ক্যান্ফর, সিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাক্টাস বিশেষরূপে হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর চক্রাকার পেশীস্থলে ক্রিয়া প্রকাশ করার হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা-প্রবণতা, স্নায়ুশূল, আক্ষেপ, এবং কম্প উপস্থিত হয়। নিউমগ্যাষ্ট্রিক্‌স্‌ দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌ এবং আমাশয় আক্রমণ করিলে ফুস্‌ফুসের সংকোচনে এবং আমাশয় লক্ষণে অজীর্ণ ও অন্ন জন্মে। ইহার সবিধান অরাক্রমণে সাময়িকতার অনিয়ম ঘটে (বিপরীত—সিড্রণ)। দেহের বিভিন্ন অংশে সংকুচিত ভাবে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ লৌহ-পতর দ্বারা আবদ্ধ থাকার অনুভূতি ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ ও চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল।—ইহা এবং ম্যালেরিয়া বাটত হে কোন প্রকারে বেদনা অভ্যন্তকালে আহাৰ না করিলে যদি বৃদ্ধি পায় ক্যাক্টাস্ তাহার ঔষধ।

হৃৎরোগ- হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেইক্টরিস্ ; হৃৎবিবন্ধি ; হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ ; হৃৎবহির্বেষ্ট-বিবন্ধিপ্রদাহ ; হৃৎপিণ্ডের পরপরকম্পতাব (Fluttering.)।—ক্যাক্টাস্, লক্ষণ হৃৎপিণ্ডরোগের বিশেষ প্রকাশক। “হৃৎপিণ্ড যেন লৌহস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত থাকার অনুভূতি”

শীতলতা এবং মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ থাকে। হাইড্রোসাইনিক এসিডের সুগীরোগে জ্ঞানের লোপ, মুষ্টিবদ্ধ কর, হনুস্তম্ভ, মুখে ফেন উঠা ও গলাধঃকরণক্রিম্বার অসামর্থ্য থাকিলে এবং কিটের পরে অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও দৌর্ভাগ্য আসিলে ডাং হিউজ ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন। শিশু খেলা করিতে চাহে না এবং তাহার কিছুই ভাল লাগে না। প্রনুষ্ঠকারের অবিশ্রান্ত ও প্রবল আক্রমণে হাইড্রোসাইন উপকারী। মুখমণ্ডল, চুষাল এবং পৃষ্ঠের পেশীতে আক্ষেপ। হনুস্তম্ভ, মুখের অলীক হাস্যভাব এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা জন্ম শরীরের নীলাভা এবং মুখে ফেনোদগীরণ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। হঠাৎ শরীরের কাঠিন্জ জন্মিলে তাহা পশ্চাৎ দিকে বক্র হয়। স্ট্রিকনিয়ার স্থায় ইহাতে স্পর্শসংস্কৃত বা প্রক্ষিপ্ত কারণের উত্তেজনাশ্রয়ণতা থাকে না। কুসুসুরোগনিবন্ধন অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে ল্যাসিরেসাস্ তাহা পুনরুত্তেজিত করিতে সক্ষম। স্ক্রফোসরোগের শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসির পক্ষে ইহা উপকারী।



লেকচার ১১৪ (LECTURE CXIV.)

কফিয়া ক্রুডা (Coffea Cruda.)।

(রুবিয়েসিজ্জাতি ।)

সম্বন্ধ :—কফিয়ার কার্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম, ইগ্নে, নাকস্ ভম, পাল্‌স্। কাফির অপব্যবহার নিবন্ধন পুরাতন রোগে ক্যাম, ইগ্নে, মার্ক, নাকস্ ভ, সাল্‌ফ্। কফি যাহার কার্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, কলদি, নাকস্ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা :—কফিয়া মাস্তক মেরুমজ্জের স্নায়ুগুণ উত্তেজিত করে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এবং জৈব ক্রিয়োদ্দীপনা হওয়ায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা এবং অসহিষ্ণুভাব এবং জৈবক্রিয়াশক্তির রোগজ উত্তেজনা সংঘটিত হয়। এ কারণ রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং তাহার মাস্তকীয় এবং দৈহিক কার্যকারিতা অত্যন্ত উত্তেজিত ও উন্নত ভাব ধারণ করে। নিম্নে ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও রোগের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

১। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্রেরই তীক্ষ্ণতা ; রোগী সহজে ক্ষুদ্র অক্ষর পাঠ করিতে পারে ; জ্ঞান, রসনা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা জন্মে ; মানসিক এবং শারীরিক ক্রিয়োত্তেজনা ঘটে ; রোগী কল্পনাপূর্ণ থাকে, স্বরিত-কথ্যা হয় এবং উপরিউক্ত উত্তেজনা বশতঃ তাহার নিদ্রা হয় না।

২। রোগী অত্যন্ত মানসিক ভাবোত্তেজনাপ্রবণ থাকে ; হঠাৎ কোন আশ্চর্য্য সংবাদে, বিশেষতঃ হঠাৎ আনন্দোৎপাদক সংবাদে সে রোগগ্রস্ত হয়।

৩। রোগী বেদনা সহ করিতে পারে না, তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে ; বেদনার অসহনীয় হইয়া পড়ে ; ক্রন্দন করে ; যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দেয় ; অত্যন্ত নিদ্রাহীনতা জন্মে ।

৪। অত্যন্ত মানসিক শ্রম, চিন্তা ও গল্প করা প্রভৃতি নিবন্ধন শিরঃশূল ; বোধ যেন মস্তক ছিন্ন অথবা ঠোকর লাগিয়া টুকরা টুকরা হইতেছে ; অর্কশিরঃশূলে মস্তিষ্কাভ্যন্তরে পেরেক বসানের স্থায় বোধ ; মুক্ত বায়ুতে শিরঃশূলের বৃদ্ধি ।

৫। ঝাঁকি লাগার স্থায় দস্তশূল ; বরফ দেওয়া শীতল জল মুখে রাখিলে তাহার উপশম এবং মুখে ঐ জল তপ্ত হইয়া উঠিলে বৃদ্ধি ।

৬। কক্ষিয়ার শুষ্কবায়ুরোগে মস্তক পশ্চাতে পেরেক ঠুকিয়া দেওয়ার স্থায় বেদনা (Clavus Hystericus) থাকে । শুভ্রতা সহ তুলনীয় ।

৭। অত্যন্ত ইঞ্জিরবোধাদিক্য এবং দৌর্বল্য থাকিলে সাহা-
তিকা বা গুপ্তসীরোগে কক্ষিয়া প্রদর্শিত হয় । রোগ সহ
রোগীর যন্ত্রণায় সামঞ্জস্য থাকে না, সে অসহনশীল হইয়া পড়ে ।

৮। উত্তেজনাপ্রবণ ও বাসপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের প্রসব
বেদনা অসহনীয় হইলে কক্ষিয়া উপকারী । প্রসব বেদনা হয়,
কিন্তু কোন ফল হয় না ।

মানসিক লক্ষণে ইহ একন, ক্যান, ইয়ে এবং নাক্স
সহ তুলনীয় ।

মস্তকে পেরেক ঠুকিয়া বসানের ন্যায় শিরঃশূলে কক্ষিয়া,
শুভ্রতা এবং ইয়ে ; শুষ্কবায়ুর “ক্লেভাস” বা পেরেক বসানের ন্যায়
বেদনা মস্তকপশ্চাতে থাকিলে শুভ্রতা ; এবং প্রসববেদনার অসহনীয়-
তার ইহা ক্যান সহ তুলনীয় ।

লেখক্কার ১১৫ (LECTURE CXV.)

নাকস্ মস্কেটা (Nux Moschata.)।

সম্ভব ১—নাকস্ মস্কেটার কার্যপ্রতিবেদক—ক্যান্ফর, জেল্ন্, নাকস্ ভ। ইহা যাহার কার্যপ্রতিবেদক—আর্স, রড, লর।

সাধারণ ক্রিয়া ১—নাকস্ মস্কেটা স্নায়ুশুলের দ্বারা বিশেষ রূপে পরিপাকযন্ত্রপথ, অণ্ডাধার এবং জরায়ু আক্রমণ করিলে কেবল কতিপয় অবিমিশ্র স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ কথঞ্চিৎ রক্তাধিক্য বাতীত ইহার ক্রিয়ার যন্ত্রনিচয়ে কোন প্রকার উপাদানগত পরিবর্তন সংঘটিত হয় না; কিন্তু জ্বপিশুের ক্রিয়ানাশ বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। সর্ক্সবিধরোগ সহই আলস্ত এবং নিদ্রানুভার বর্তমানতা ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহা বাত প্রকৃতির ও গুল্মবায়ুরোগপ্রবণ স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী।

লক্ষণ ১—মানসিক ভাব পরিবর্তনশীল। এই মুহূর্তেই হস্ত এবং পর মুহূর্তেই ক্রন্দন। সকল বিষয়েই হস্তপ্রবণতা। স্মরণশক্তি হীনতা, চিন্তার অক্ষমতা, নিদ্রার ভাব। কণিক অট্টেতচ্ছ। বাম ললাটের উচ্চতর স্থানে অল্প স্থল ব্যাপক চাপবৎ শিরঃশূল। দৃষ্ট বস্ত বৃহত্তর প্রতীয়মান হয়। বস্তনিচয় অতি বৃহৎ অথবা অতি দূর্বর্তী বা অতি ক্ষুদ্র দেখায়। মুখ, গুষ্ঠ এবং জিহ্বার শুষ্কতা থাকে, কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না। মুখলালা তুলার ছায়। জিহ্বার পক্ষাঘাত। অতিশয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হীনতা। উদরের অত্যধিক স্ফীতি ও ডাক। বিষ্ঠা কোমল থাকিলেও সহজে ত্যাগ হয় না। সিন্ধু শীতল বায়ুতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা।

রোগী অত্যন্ত দুর্বল থাকে ও ক্লান্ত বোধ করে ; সামান্য পরিশ্রম করিলেই নিদ্রালুতা বশতঃ শয়ন করার আবশ্যিকতা বোধ করে। পেশী-কম্প ; সোম্বাস্তি হীনতা ; মুচ্ছার উপক্রম ; সামান্য বেদনাতেও ঐক্লম। স্থানে স্থানে, চঞ্চল, সবিয়াম ও খনন করার ছায় বেদনা। গুল্মবায়ুৎ এবং মূত্রের ছায় সর্বাঙ্গীন আক্ষেপে জ্ঞান থাকে ; শিশু-দিগের উদরাময়ে আক্ষেপ ; নিস্পন্দবায়ু বা ক্যাটালেপসি। স্বক শীতল বায়ুতে অসহিষ্ণু। রক্তহীনতা।

চিকিৎসা।—নাক্স মস্কেটার স্বরযন্ত্ররোগ ও অঙ্গীর্ণ প্রভৃতির বিষয় আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু গুল্ম-বায়ু রোগ চিকিৎসাতেই ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। যে সকল অপস্মাররোগগ্রস্ত রোগী স্বরিং গাভীর্ষ্য হইতে আনন্দের ভাব প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। নিদ্রালুতা, অত্যন্ত উদর স্বকীতি এবং মুখের শুষ্কতা ইহার প্রদর্শক। রোগীর মধ্যে মধ্যে মুচ্ছার উপক্রম হয় এবং সে অল্প শ্রমেই ক্লান্ত বোধ করে। সাধারণতঃ আহাৰাস্তে উদরাধান হইলে লাইক এবং কার্ব ভেজ আমাদিগের স্মরণ পথে আইসে, কিন্তু শেবোক্ত ঔষধদ্বয়ে গুল্মবায়ুর লক্ষণ না থাকায় তাহারা প্রভেদিত হয়। নাক্স মস্কেটার শুষ্ক ও স্নায়বিক কাসিতে বক্ষের কষ্ট এবং মুচ্ছার উপক্রম হয় এবং গুল্মবায়ুর সংশ্রব থাকে। মুচ্ছার উপক্রম হওয়া ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ। ডাং বেজ বলেন “গুল্মবায়ু, বিশেষতঃ তাহার গুল্ম বা প্লোবাস হিষ্টিরিকাস্ নিবারণে অল্প ঔষধই নাক্স মস্কেটার ছায় আশু ফলপ্রদ।” তিনি ৩ হইতে ৬ ক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন “১০ কি ৫ মিনিট পর পর ডাং রুবিনির ক্যাম্ফর চিনির সঙ্গে সেবন করাইলে প্রবল গুল্মবায়ুর ফিট নিবারণ হয়”।

লেকচার ১১৬ (LECTURE CXVI.)

টেরিবিছিনা (Terebinthina.) ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা।—সম্পূর্ণ শৈথিল্যবিশিষ্ট টেরিবিছিনার ক্রিয়া হইলেও, মূত্রযন্ত্রের, বিশেষতঃ কিড-নির শৈথিল্যবিশিষ্টেই তাহার প্রাধিক্য দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার অগভীরতা বশতঃ উপাদান ধ্বংসকরা তরুণ বা পুরাতন রোগে ইহা ফলপ্রদ হয় না। কিডনিপ্রমুখ মূত্র যন্ত্রের ইহা প্রভূত উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে কিডনিদেশে প্রচণ্ড জ্বালা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, ক্রেশকর মূত্রকৃচ্ছুর পর মূত্রযন্ত্রের টাটানি, রক্ত মেহ, অত্যন্ত মূত্রত্যাগ এবং যন্ত্রণাপ্রদ লিঙ্ফোথ্যান প্রভৃতি ইহার মৌলিক এবং অতি শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক উপস্থিত থাকে। ফলতঃ সর্বপ্রকার রোগেই উপরি-উক্ত মূত্রযন্ত্রলক্ষণের বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক। অতএব উপরিউক্ত লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে নেফ্রাইটিস, উপসর্গিক লাল্য-মেহ, মূত্রস্থলীপ্রদাহ এবং মূত্রনালীপ্রদাহ প্রভৃতি মূত্রযন্ত্ররোগে এবং জ্বলশোথে ইহা প্রয়োজ্য। ইহার শ্বাসযন্ত্র পথের রক্তাধিক্য ও প্রতিজ্বালিত প্রদাহে তাহার গুণ্যতা ও শ্বাসকৃচ্ছ হয় এবং শোণিতরেখাবৃত্ত গ্লেছা উঠে। পরিপাক যন্ত্রপথ আক্রান্ত হইলে জিহ্বার উপত্বক স্থান হওয়ায় তাহা মৃগতা প্রাপ্ত হয় এবং অতি প্রধান লক্ষণ স্বরূপ প্রভূত উদরাধ্বান জন্মে। কুধা থাকে না। মধ্যে মধ্যে পেশী আনর্জন হয়। শরীর শীতল ও চটচটে ঘর্মসিক্ত এবং নাড়ী দ্রুত, কুদ্র, সূত্রবৎ ও দুর্বোধ্য থাকে। উপরিউক্ত উদরাধ্বান ও মূত্র-লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা পেন্টিটনাইটিস ও টাই-ফয়েড জ্বর প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য। অস্ত্রের রক্তস্রাবের ইহা অতি প্রধান ঔষধ। মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা লক্ষণ না থাকিলে, কলেরার মূত্রাবাতে ইহার ২ X ক্রম দ্বারা মূত্র আনয়নে আমরা কখনই নিষ্ফল হই নাই।

লেকচার ১১৭ (LECTURE CXVII.)

বোরাক্স (Borax)।

সম্বন্ধে—বোরাক্সের কার্যপ্রতিবেদক—কফিফ্রা, ক্যানা।
সাম্প্রদায়িক ত্রিস্থা ও লক্ষণে।—সম্পূর্ণ শৈল্পিককিঞ্জিতে, বিশেষতঃ মুখগহ্বর, অস্ত্র, জরায়ু এবং যোনিপথের শৈল্পিককিঞ্জিতে উপকৃত উৎপন্ন করাই বোরাক্সের প্রধান কার্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খাস-যন্ত্রপাথ এবং ত্বকেও ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হয়।

“দোল খেলার স্তায় অথবা শিঁড়ি বাহিনী অবতরণের স্তায় নিম্নাতিমুখে গতি হইলে উৎকণ্ঠা সহ তীতিব্যঞ্জকতা” বোরাক্সের অতি বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য; কেননা এরূপ লক্ষণ অল্প কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইহার অগ্ন্যন্ত লক্ষণ মধ্যে প্রধান গুলির বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—জিহ্বা, মুখগহ্বর এবং গণ্ডের অভ্যন্তর পার্শ্বে উপকৃত বা “জাড়ী ঘা” থাকায় মুখগহ্বরে অত্যন্ত তাপ ও শুষ্কতা। শিশু স্তম্ভ পান করিতে ক্রন্দন করে। আহার করিতে ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়। কোমল, ফেফাসে পীত ও প্লেথাময় বিষ্ঠাত্যাগ করিলে অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে। শিশু তপ্ত মূত্রত্যাগ করে। মূত্রে তীব্র ও কটু গন্ধ থাকে। শিশু প্রায় ১০।১২ মিনিট পরে পরেই মূত্রত্যাগ করে। এবং তাহার পূর্বে পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন ও চীৎকার করে। স্ত্রীজননেক্রিয়রোগে অণ্ডলালাবৎ ষ্বেতপ্রদরস্রাবকালে তপ্ত জলের স্রোত বহিয়া পড়ার স্তায় অসহ্যুতি। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর এবং তাহার পূর্বে আশাশয় হইতে কটি পর্য্যন্ত বেদনা। প্রচণ্ড ও খ্যাক্খ্যাকে কাসিতে

পচাটে আশ্বাদ ও গন্ধযুক্ত গয়্যারের নিষ্টিবন। প্রত্যেক কাসি ও গভীর শ্বাসগ্রহণে বক্ষে সৃচিবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।—ট্রিকিহেসিস্ বা বক্র চক্ষু-পত্র-কেশ বা পঙ্কের সংশোধনে বোরাক্স প্র্যাক্স সহ তুলনীয়। নাসারন্ধ্রের ক্ষতরোগে নাসিকাগ্র স্ফীত ও বেদনায়ুক্ত থাকিলে বোরাক্স উপকারী। বক্ষে সৃচিবেধবৎ বেদনায়ুক্ত কাসিতে ইহা ঔষধ। দক্ষিণ বক্ষের উর্দ্ধাংশে বেদনা অধিকতর থাকে। এরূপ লক্ষণ থাকিলে যক্ষ্মাকাসেও বোরাক্সের প্রয়োগ হইতে পারে।

শিশুদিগের মুখের উপক্ষত বা “জাড়ী ঘা”র বোরাক্স অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। জিহ্বা প্রভৃতি মুখের অগ্রাংশ অংশে ক্ষত থাকিলেও গণ্ডাভ্যন্তরপার্শ্বেই তাহার অধিকতর আক্রমণ। মুখ তপ্ত ও শুষ্ক থাকে এবং ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়ে। শিশু শীর্ণ, পাণ্ডুর ও কাল্চে বর্ণ হইয়া যায় এবং নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠে ও হাত ছোড়ে। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের জাড়ী ঘায় মুখের শুষ্কতা জন্ম মুখ সিক্ত না করিলে শিশু স্তনে মুখ দিতে চাহে না—ক্রান্তঃ এরাম ট্রির মুখক্ষতে মুখের প্রচণ্ড প্রদাহ হয়, নাসারন্ধ্রের চতুর্পার্শ্বে টাটানি, মামড়ি ও স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা জন্মে। প্রতি-শ্যায়িক মুখক্ষতঃ ইহার উদ্ভ্রাময়ে শিশু সবুজ অথবা হরিদ্রাভ ও নরম মনত্যাগ করে এবং মনত্যাগের পূর্বে উদ্ভ্র-শূল হয়।

মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ গণ্ডের বিসর্প বা ইন্ডিসিপেলাস রোগে মুখোপরি মাকড়সার জালের অহুভূতি থাকিলে বোরাক্স ফলপ্রদ। বিচর্চিকা বা সোরায়াসিসুরোগে ডাং ম্যাক্ক্যাচি ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

লেকচার ১১৮ (LECTURE CXVIII.)

সিড্রন (Cedron.)।

(সিমারুবেসিজাতি)।

সাধারণ ত্রিন্ধা ও চিকিৎসাঃ—মস্তিষ্ক-মেরুমাঞ্জের এবং সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু মণ্ডলের আক্রমণ দ্বারা সিড্রন মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে যে অরাক্রমণ হয় কার্যক্ষেত্রে সবিরাম জ্বরে আমরা তাহার প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। এই জ্বর অতি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং সিড্রন তাহাতে অমোঘ রূপে কার্য্য করে। নিম্ন ও জলাভূমির সিক্তোঞ্চবায়ু এই জ্বরের উৎপত্তির কারণ এবং ঘড়ির কাঁটার নিহনানুযায়ী জ্বরাক্রমণের সাময়িকতা ইহার প্রদর্শক। এই জ্বর বড়ই অদম্য প্রকৃতির, শীঘ্র শীঘ্র পুনরাবর্তন করে এবং ইহাতে প্রচণ্ড মস্তিষ্করক্তাধিক্য থাকে। রোগী অত্যন্ত রক্তহীন হয় এবং তাহার যক্ৰুৎ ও প্লাহার বিহ্বলিত্তি জন্মেঃ সবিরাম স্নানুশূল, গুঞ্জবান্ন এবং তাণ্ডবরোগ চিকিৎসাতেও ইহা কথঞ্চিং খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

লেকচার ১১৯ (LECTURE CXIX.)

পেট্রোলিয়াম (Petroleum.) ।

সম্বন্ধ ।—পেট্রোলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ককুল, নাক্‌স্‌ ভ।
পেট্রোলিয়াম বাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিসকবিষক্রিয়ায় ।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ । শৈথিল্যক্রিয়া এবং ত্বকে পেট্রোলিয়ামের মূল ক্রিয়া । ইহা তাহাদিগের উদ্দীপনা উপস্থিত করে এবং তাহার ফল স্বরূপ যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা আমরা নিয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, যথা,—রোগী অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ ও প্রচণ্ড, সহজে দোষ গ্রহণ করে এবং কলহ করে । প্রলাপ বশতঃ মনে করে তাহার পার্শ্বে অত্র কোন ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে অথবা সে দুই ব্যক্তি কিম্বা তাহার এক অঙ্গ দুইটা হইয়াছে । মস্তকপশ্চাতে সিনকের চাপের ছায় চাপ ও গুরুত্বের অনুভূতি । চক্ষুপত্রপার্শ্বের এবং ল্যাক্রিম্যালকোষের প্রদাহ ও তাহাতে পুয় সঞ্চার । আমাশয়লক্ষণে প্রাতঃকালে অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং মুখে জল সঞ্চয় ; গাড়ির ঝাঁকিতে অথবা নৌকার চালনায় তাহার বৃদ্ধি । প্রচণ্ড বমন । মলত্যাগান্তে অতি ক্ষুধার নিবৃত্তি । কেবল দিবসে উদরাময় থাকে ও তাহার পূর্বে উদরশূল হয় । স্বরবদ্ধ । রজনীতে শুষ্ক কাসি । হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে শীতলতার অনুভূতি । হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্কশ, বিদীর্ণ ও ফাটযুক্ত ; তাহাতে খোঁচা ও কর্ত্তনব্য বেদনা ।

সামান্য আঘাতেই ত্বকে ক্ষত জন্মে ও তাহা বিস্তৃত হইতে থাকে । পুরাতন ও সিক্ত কাউর, আক্রান্ত শরীর্যাংশের হাজ্জাভাব । সম্পূর্ণ ত্বকের স্পর্শসহিষ্ণু বেদনা, বস্ত্রাবৃত হইলেও বেদনা লাগে । ক্ষত হুলবেধব্য বেদনা করে ও তাহাতে মাংস বৃদ্ধি হয় । অনেক সময়ে গভীর ক্ষত জন্মে ও তাহার পার্শ্ব উচ্চ থাকে ।

সাধারণ লক্ষণে অঙ্গ নিচয়ের কিন্‌ঝিনি এবং কাঠিহ । সন্ধি কড়ু কড়ু

করে ও তাহাতে সন্ধিবাতের কাঠি জন্মে। মুক্তবায়ুতে অনিচ্ছা। সহজেই সন্ধির আক্রমণ। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে দুর্বলতা বোধ।

চিকিৎসা :—চক্ষুপুটপার্শ্বপ্রদাহ বা ব্লেফা-
রাইটিস এবং ল্যাক্রিম্যালকোষপ্রদাহরোগে পুত্র
সঞ্চায় ও তাহাতে নালীস্কত জন্মিলে পেট্রলিনিয়াম দ্বারা
উপকার হয়। মস্তকপশ্চাতে দশদশানি বেদনায় ইহা
উপকারী। রোগী রজনীতে শয়ন করিলে পেট্রলিনিয়ামের গুণ
কাসির আক্রমণ। ইহা শিশুদিগের মধ্যে অধিকতর।

আর্গব-বমন বা সি-সিক্‌নেসরোগের পেট্র-
লিনিয়াম অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ডাং বেজ্ এ রোগে
ইহাকে একমাত্র উপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি
ইহার ৩x ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাং ডিউই এবং ডাং হিউজের
মতেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ--উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি
করিলে শিরোবর্গনের বৃদ্ধি; শকট ও অস্বাভাবিক রোগ বন্ধিত
এবং যদিও কখন কখন পিত্তের বমন হইতে পারে কিন্তু অবি-
শ্রান্ত বিবসিষা ও মুখ হইতে জ্বলোদ্গীরণই
ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। সমুদ্রযাত্রার কিছুকাল পূর্বে
হইতে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করিলে ইহা রোগের প্রতিষেধকরূপে
কার্য করিয়া থাকে। উপরি উক্তরূপ বিশেষ লক্ষণ থাকিলে ইহা
পর্ভাবস্থার প্রাতঃকালীন বমনেও উপকারী।
রসবাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্ধি মচকাইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত
হওয়া যায়। জাহ্নসন্ধির রসবাতরোগে সন্ধির কাঠি ও
সংশ্রবীয় খোঁচানিবৎ বেদনা, গ্রীবার অনমনীয়তা এবং
মস্তক চালনায় কড়কড় ভাবের অনুভূতির পক্ষে ইহা উপকারী। সহজে
নিম্ন চুল্লানের সন্ধিলেপ্ততায় ইহা কলপ্রদ।

লেখক্চার ১২০ (LECTURE CXX.)

রিসিনাস্ কয়ুনিস্ ।

প্রতিনাম γ —পাগা ক্রিষ্টাই, এরও ।

সাধারণ নাম γ —ভারেণ্ডা ।

প্রস্হোপক্ৰম γ —তৈলজ অরিষ্ট বা “ওলিয়াম্ রিসিনি” এবং
বীজমারোংপন্ন অরিষ্ট বা “রিসিনাস” ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম γ —সাধারণতঃ ৩ X, ৬ X এবং ৩০ ।

ভুলনীয় ঔষধ γ —জার্ট্রিকা, ক্রটন টিগ্, আইরিস্, ভিরেট্টাম,
আর্স, যুক্তকর্ক ।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ γ —কাষ্টর অইল বা রেটির
তৈল আমাদিগের বিশেষ পরিচিত বস্তু । কেননা বেদনাদি ক্লেশরহিত মুহু
বিরেচক বলিয়া অনেকেই ইহা সহজ কোষ্ঠ্বন্ধরোগে সাধারণতঃ ব্যবহার
করিয়া থাকেন । এরওবীজ নিস্পেষণ দ্বারাই এই স্থায়ী তৈল প্রস্তুত
হইয়া থাকে এবং ইহা হইতেই “ওলিয়াম্ রিসিনি” প্রস্তুত হয় ।
“রিসিনাস” এরওবীজের শাস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে । রাসায়নিক
প্রক্রিয়া দ্বারা এরওবীজ-সার হইতে “রিসিনিন্” বলিয়া একটি উপক্ষার
এবং “রিসিনিক, ইলয়াডিক ও মার্গারিষ্টিক এসিড” নামে তিনটি অতি
উগ্রগুণ অম্ল প্রাপ্ত হওয়া যায় । শেথোক্ত তিনটি এসিড-উপাদান-
বিশিষ্ট হওয়াতেই এরওবীজ সেবনে বিষ-লক্ষণ প্রকাশ পায় । উপরি
উক্ত বিষের স্থানিক ক্রিয়া বশতঃ কখন কখন আমাশয়ান্তিক উদ্দীপনা ও

রক্তাধিক্য উৎপন্ন হইলে তদানুযায়িকরূপে প্রাদাহিক উদরাময়রোগবৎ লক্ষণ এবং বমন ও উদরশূলদি উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাশয়োর্দ্ধ-বেদনা বিকীর্ণ হইয়া নাভি ও কুক্ষিদেহে যায়। উদরোপরি বেদনা চাপে বৃদ্ধি হয়।

ফলতঃ পরিপাক-যন্ত্র-পথ সহ এরণ্ডবিষের কলেরাবিষবৎ নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বশতঃ যে কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তজ্জন্তই ইহা হোমিওপ্যাথি মতে কলেরা চিকিৎসায় সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ডাঃ এলেন-উদ্ধৃত এরণ্ড-বৌজের বিষ-লক্ষণ হইতে নিম্নে আবশ্যিকানুসারে কতিপয় লক্ষণ বিবৃত হইল :—জ্বালাযুক্ত তৃষ্ণা ও মুখলালাশ্রাব। গলমধ্যে ও আমাশয়ে জ্বালা। প্রথমে পরিমাণে ও সংখ্যায় অল্প থাকিয়া ক্রমে আমমিশ্রিত সিরামরসের প্রচণ্ড ও প্রচুর ভেদ বমন। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলতাগ। বমন এবং বিরচনে বেদনাহীনতা। অবশেষে ভেদ অবিশ্রাস্ত ভাব ধারণ করে এবং কলেরা সদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হয়। মূত্রাঘাত (suppression of urine)। অতিরঞ্জিত, স্বল্প, গাঢ় ও প্রচুর এলবুমেনপূর্ণ মূত্র। স্বরবদ্ধ। নাড়ী স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং মণিবন্ধদেশে কখন কখন দুর্বোধ্য। বিষ্ঠা রক্তময় হইতে পারে। ভেদ ও বমনকালে গভীর পতন-লক্ষণ বা কোল্যাপ্স। দেহের অঙ্গ ও কাণ্ডভাগের পেশীর খল্লী। চক্ষু আক্ষেপযুক্ত ও উর্দ্ধে আকৃষ্ট। শীতলতা; ললাট শীতল ঘর্মান্বত। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও বস। রিসিনাসের যকৃতাক্রমণের লক্ষণ স্বরূপ ভেদ ও বমন কালে কখন কখন পাণ্ডুরোগচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ :—ভেদ এবং বমনকালে উদরশূলের অভাব রিসিনাসের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। পতনাবস্থা বা কোল্যাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ভেদ ও বমনের স্বল্পতা বা অভাব ঘটে; কিন্তু রিসিনাসরোগীর তাহা সমভাবে চলিতে থাকে অথবা বর্ধিত হয়। এজন্য হীনাঙ্ক বা কোল্যাপ্স অব-

স্থায় ভেদ ও বমন-পূর্ববৎ সমভাবে হইতে থাকা অথবা বর্দ্ধিত হওয়া অনেক স্থলেই রিসিনাসের অন্ততর প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ।

চিকিৎসা ।—উদরাময়ঃ প্রাদাহিক উদরাময় এবং কলেরা বা ওলাউলী ।—আমরা ইতিপূর্বে ক্যান্টর আইলের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেদনাহীন উদরাময়ে গুলিফ্রাম রিসিনি দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় । ফলতঃ উদরাময়ে বেদনার অভাব ও বিষ্ঠার প্রাচুর্য্যই ইহার প্রদর্শক স্থানীয় ।

প্রাদাহিক উদরাময়ে স্থলবিশেষে রিসিনাস আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে । স্ফূর্ত্যভীতি ও অস্থিরতাদি লক্ষণ দ্বারা একনাইট, এবং ভ্রমাবহ কুস্থনের বর্তমানতায় মার্ক কর ইহা হইতে প্রভেদিত হয় ।

রিসিনাসের প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে কলেরার সকল অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগোপযুক্ত । ফলতঃ রোগের “পূর্ব্বরূপ অবস্থায়” অত্র কোন ঔষধ প্রদর্শিত না হইলে অনেক চিকিৎসকই ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন । কলেরার “বিকাশ” ও “হিমাঙ্কাবস্থায়” ও বেদনার অভাব, বিষ্ঠার প্রাচুর্য্য এবং ক্রমে ক্রমে ভেদ ও বমনের পরিমাণ ও সংখ্যার স্বন্ধি এবং রোগের শেষ বা পতনাবস্থায় তাহাদিগের অত্যধিক্য বা অবি-
রাম ভাব ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে । জ্যাক্ট্রি-
ফার উদরের প্রচণ্ড ডাক এবং প্রভূত পরিমাণ এলবুমেন সদৃশ তরল পদার্থের বমন, আইরি-
সের অত্যন্ত অল্প পদার্থের বমন ও পরিপাক-

পথের অগ্নিদাহবৎ জ্বালা, ভিরেড্রামের উদর বেদনার বর্তমানতা এবং ফ্লুফর্সিয়ামের হঠাৎ এক-যোগে প্রভূত পরিমাণ ভেদ ও বমন রিসিনাস হইতে যথেষ্ট প্রভেদক বলিয়া গণ্য ।

রক্তভেদনুক্ক বা ব্লাডি কলেব্রাল এবং কলেব্রাল স্রাব (Jaundice) লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে ।

প্লাস্মাম—কোষ্ঠবদ্ধের সহিত চক্ষু আদিতে স্রাবারোগ লক্ষণ উৎপন্ন হইলে যদি প্লাস্মামবৎ উদরশূলদি লক্ষণ বর্তমান থাকে তাহাতে ইহা ফলপ্রদ । শিল্পশিলারোগের আনুষঙ্গিকরূপে উপরিউক্ত স্রাবা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরশূলদি থাকিলে প্লাস্মাম দ্বারা তাহার স্থায়ী উপকার প্রত্যাশা করা যায় ।

ভ্যারেণ্ডাপত্র ২।৩ ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দ্বারা কতিপয় বার স্তন প্রক্ষালন এবং অবশেষে সিদ্ধ পত্র পুলাটিদের আকারে স্তনে প্রয়োগ করিলে রক্ত স্তন পুনরানয়ন করিয়া থাকে । উভয়ই ঈষদুষ্ণ থাকিতে প্রযোজ্য ।

হানিম্যান ব্যবহৃত ঔষধ ও তাহার মাত্রা ।

অরাম মেট। ১২, ৩০

আয়ডিয়ন। ৩০

আর্জেন্টাম। ২৪

আর্গিকা মর্ট। ৬, ১২, ৩০।

আর্সেনিকাম এল। ৯, ১৮, ৩০

ইগ্নেসিয়া। ১২

ইণ্ডিগো। ৩০

ইপিক্যাক। ১২

একনাইট। ১২, ৩০

এগারিকাস। ৩০

এগ্রাস। ১৮

এক্সটুরা। ৩০

এনাকাডিয়াম। ১৮

এণ্টিম ফ্রু। ২৪

এণ্টিম টার্ট। ১২

এমন কার্ব। ২৪

এথ্রাগ্রিসিয়া। ২৪

এরানিয়া ডায়া। ৩০

এগমিনা। ৩০

এসাকিডিড। ৩০

এসিডাম নাই। ৩০

এসিডাম ফস। ৩০

এসিডাম মিউ। ৩০

এসেরাম ইউ। ৩০

ওর্পিয়াম। ১২, ৩০

ওলিয়াম এনি। ৩০

ওলিয়াম টেরি। ৩০

ওলিয়েগোর। ২৪

ককুলাস। ১২

কনায়াম মেকু। ২৪

কফিয়া ফ্রু। ৩০

কল্চিকাম। ১৮

কলসিঙ্ক। ৩০

কার্ক এনি। ২৪

কার্ক শুজ। ১২, ৩০

কুপ্রাম মেট। ৩০

কপেবা। ২৪

করেলিয়াম। ৩০

ক্যানাবিস স্তাট। ১২, ৩০

ক্যান্ডারিস। ৩০

ক্যান্স ফ্রু ভা। ১২

ক্যাপসিকাম। ৩০

ক্যামমিলা। ১২

ক্যানফর। ৬, ২৪

ক্যালাডি সেণ্ড। ২৪

কেলি কার্ক। ৩০

কেলি হাই। ২৪

ক্যাঙ্কেরিয়া এসেট। ২৪

ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ক। ৩০

ক্যাষ্টেরিয়াম। ২৪

ক্রকাস স্তাট। ১৮

ক্রিমেটিস। ১২

গুয়েইয়াকাম। ৩০

গ্র্যাটিয়লা। ২৪

গ্রাফাইটিস। ২৪

চায়না। ৩০

চেলিডন মেজ। ৩০

জিকাম মেট। ৩০

জ্যাসিয়া। ২৪

টিং সালফ। ২৪

টুক্টিয়াম মে। ১৮

টেবেকাম। ১২

ডালুকামারা। ২৪

ডিজিট্যালিস। ২৪

ড্রসিরা। ১৮

বুজা। ১২।

নাইট্রাম। ২৪

নাক্স ভমিকা। ১২, ৩০

নিকলাম । ২৪
 নেট্রাম কার্ব । ২৪
 নেট্রাম মিউ । ৩০
 পালসেটলা । ২, ৩০
 পেট্রেলিয়াম । ২৪
 পেট্রেলিনাম । ১৮
 প্যারিস কোয়া । ২৪
 প্লাস্টাম্ মেট । ২৪
 প্ল্যাটিনাম । ২৪
 কস্ফরাস । ১৮
 ফিলিক্‌স মাস । ১৮
 ফেরাম মেট । ২৪
 ক্যালান্তি য়াম । ২৪
 বভিষ্টা । ২৪
 বিসমাথ । ১৮
 বেলাডনা । ১২, ৩০
 বরাক্‌স্ । ১৮
 ব্যারাইটা এসেট । ৩০
 ব্যারাইটা কার্ব । ৩০
 ব্রয়নিয়া । ৬, ১৮, ৩০
 ভায়লা ওড । ২৮
 ভার্কেস্কাম । ১৮
 ভিয়েট্রাম । ৩০
 ভ্যালেরিয়ানা । ১৮
 মস্কাস । ২৪
 মাকু রিয়াস কর । ২৪
 মাকু রিয়াস ভাই । ২৪
 মাকু রিয়াস সল । ৩০
 মিনিটেস্টিস টিফ । ২৪
 মিলিকলিয়াম । ১২
 মিলেপ । ২৪
 মিজিরিয়াম । ২৪
 ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব । ২৪
 ম্যাগ্নিসিয়া মিউ । ২৪

যুফর্কিয়াম । ২৪
 যুফেসিয়া । ১২
 যুক্তা আস । ৩০
 রাস্টক্‌স্ । ১২
 রিয়াম । ১৮
 রুটা । ১২
 রেনাকুলাস বালু । ১৮
 লাইকপোড । ৩০
 লিডাম । ২৪
 ল্যাকেসিস্ । ৩০
 ল্যামিয়াম এল্ । ২৪
 স্টেনাম । ৩০
 স্ট্রাক্‌সেগ্রিয়া । ২৪
 স্ট্রনসিয়ানা । ৩০
 স্ট্রামনিয়াম । ২৪
 সাইক্রেমেন । ২৪
 সার্সাপেল্লা । ২৪
 সালফার । ৩০
 সিকুটা । ২৪
 সিকেলি কার্প । ১৮
 সিনা । ৩০
 সিনাবার । ২৪
 সিমিয়া । ৩০
 সিলিকা । ৩০
 সিলিনিয়াম । ১৮
 স্কুইলা । ৩০
 স্পঞ্জিয়া । ৩০
 স্পিজিলিয়া । ২৪
 স্ত্রাবাইনা । ২৪
 স্ত্রাবাডিলা । ১৮
 স্ত্রাবুকাস । ১৮
 হায়দারামাস । ১২
 হিপার সাল্ফ । ১৮
 হেলিবারাস নাই । ২৪

ভৈষজ্য-সূচীপত্র

স্থান সংক্ষেপার্থে সূচীপত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পরিশিষ্ট
খণ্ড যথাক্রমে (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) সংজ্ঞায় লিখিত হইল।

অক্জ্যালিক এসিড।
অণুকোষপ্রদাহ অর্কাইটিস্। (২)
আরাম। (৪) ৪৪৮
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪৫০, ৪৫১।
চিকিৎসা। (১) ৩৬ ২২৭। (২) ৪২,
২১০, ২৫৩, ৩০৩। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬১
—৪৬৮। (৫) ১৫, ১০২, ২২০, ২২৭,
২৬৬, ৪১৫, ৫৩৩, ৫৪২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৪৬০, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪৫২, ৪৬০।
রোগকারণ। (৪) ৪৫১, ৪৫২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৪৪৮, ৪৪৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪৫২।
আয়ডিয়াম। (৫) ৪২। ৫০
চিকিৎসা। (১) ১৭, ২২৮, ২৩৯। (৩) ৪৫৭।
(৪) ১১৬, ১১৯, ২৭৯, ৩১০, ৪১৯।
(৫) ৭, ৪৭, ৫৫—৫৯, ৭৮, ১৭৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪, ২৪৫। (৫)
৫৪, ৫৫।
লক্ষণ। (৫) ৫১—৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০, ৫১।

আয়ডফরম।

চিকিৎসা। (৪) ১১৯। (৫) ৫৯।

আইরিস ভার্শিকলার।

(৫) ৩৯১। ৩৯৪।

চিকিৎসা। (২) ২৫৩, ২৯৮। (৩) ৪৩৮।

(৪) ১৪৮, ৩৭১। (৫) ৩৮৯, ৩৯৫, ৩৯৬।

লক্ষণ। (৫) ৩৯৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৯৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৯৪।

আর্জেন্টাম্ নাইট্ কাম্। (৪) ৪২১

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪২২—

৪২৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭, ১৬৯। (২) ৫৬, ৫৭,

৯২, ২০০, ২০৮। (৩) ৪০, ২১২, ২১৮,

২১৯। (৪) ৫২, ৮১, ৮৫, ২০১,

৩৩৩, ৪৩৮—৪৪৭। (৫) ৫৯, ৭২, ৮০,

১০৪, ১৮৬, ৪৫০, ৪৫৫

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (৪) ৪৩৬—

৪৩৮।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪২৫—

৪৩৬।

রোগকারণ। (৪) ৪২৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৪২১, ৪২২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪২৫।

আর্জেন্টাম্ মেটালিকাম্।

(৫) ৫০৫।

চিকিৎসা। (৪) ৫৮। (৫) ৪৬৯, ৫০৬।

লক্ষণ। (৫) ৫০৫, ৫০৬।
 সংজ্ঞাদি। (৫) ৫০৫।
 সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৫।
 আটিকা ইয়ুরেন্গ।
 চিকিৎসা। (২) ২১৬। (৫) ৩০১।
 আটিনিসিয়া ভালগারিস।
 (৫) ১০০।
 চিকিৎসা। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০০,
 ১০১, ২১৫।
 সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০০।
 আণিকা। (৩) ১০২।
 উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১১২, ১১৩।
 চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২, ১৬৭।
 (২) ৭৮। (৩) ৭০, ১০৪, ১২৫—১৩৮,
 ২১৫, ৩২০, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৭৩,
 ৪৩৯। (৪) ২৭, ৩৯, ৫১, ৫২, ১২৩,
 ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫৫।
 (৫) ১৯, ৪০, ৮৯, ৯৫, ২৫৭, ২৬০,
 ৪০৭, ৪৪৯, ৪৬১, ৪৬৬, ৪৯০, ৪৪৮।
 প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২২। (৩) ৯১, ১২০
 —১২৫।
 বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১১৪—১২০।
 রোগকারণ। (৩) ১১৩।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১০৯—১১২।
 সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ১১০—১১৪।
 (৪) ২২৭, ৩৩১।
 আর্সেনিকান আয়ডটাম।
 চিকিৎসা। (২) ৯০। (৫) ৫৮, ৫৯।
 বিশেষ ক্রিয়া। (২) ৮।
 আর্সেনিকাম এলবাম। (২) ১।
 উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৪—৬।
 চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৯, ৩০, ৪৩, ৪৪,
 ৪৬, ৮২, ৯৯, ১০৭, ২২৯, ২৪২,
 ২৯৯, ৩৩৮, ৩৪৪। (২) ৪৮—৯৪, ১৪৪,

১৫৪, ১৫৬, ২০৫, ২০৭, ২২৯, ৩১৪,
 ৩০৯, ৩৬৮, ৩৯১, ৩৯২। (৩) ৯৩, ৯৮,
 ১০৩, ১০৫, ১১০, ১৩০, ১৯২, ২৪৭,
 ২৫৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩৭৮, ৪০১, ৪০৬—
 ৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪১৩। (৪) ৩৫, ৪৩,
 ৪৪, ৪৫, ৫২—৫৫, ৬০, ৬২, ৭৩, ৬৪,
 ৯১, ১২২, ১৪৪—১৪৭, ১৭১, ১৮৪,
 ১৮৬, ২০৭, ২৫৪, ২৫৭, ২৭৮, ৩০১,
 ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১১, ৩৪৫, ৩৫৩,
 ৩৫৬, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯২, ৩৯৫, ৪১৪,
 ৪৪৫, ৪৬২। (৫) ২১, ৫৯, ৬৬, ১৪৫,
 ১৯৪, ১৯৫, ২৪৯, ৩০৯, ৩২৪, ৩২৫,
 ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮৮, ৪০২, ৪৩০,
 ৫৫৩, ৩৯৩, ৫৪২, ৫৪৫।
 প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯, ২৩১, ২৩২,
 ৩৭০। (২) ৩৯—৪৮, ১৩৬, ১৮৮,
 ২৪৪, ২৫১, ৩৬৬, ৪৪২। (৩) ২৭,
 ৬৩, ৬৫, ৩১৬, ২৯১, ২০, ৩৯, ৪১,
 ৩৯৬, ৩৯৮। (৪) ৭৬, ১৭৯, ১৮০,
 ১৮১, ২২৭, ২২৮, ২১৬।
 বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৮—৩৯।
 রোগকারণ। (২) ৬।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ১—৬।
 সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৬—৮।
 আষ্টিলেগ। (৫) ৩৫৭। ৩৬৬।
 চিকিৎসা। (২) ২১৩। (৫) ২৬১, ৩৫২,
 ৩৬৭, ৩৬৮।
 লক্ষণ। (৫) ৩৫৯, ৩৬০।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি—(৫) ৩৬৬।
 সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৬।
 ইউ (য়ু) পেটেরিয়াম পাপুরিয়াম।
 (৫) ১০০। ১১৭।
 চিকিৎসা। (১) ৩৭০, ৩৭১। (৩) ৩১৫।
 (৫) ১১৭, ১১৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১

লক্ষণ। (৫) ১১৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৭।

ইউ(য়ু) পেটেরিয়াম্ পার্কলিয়েটাম্।
(৫) ১০০। ১১৩।

চিকিৎসা। (৩) ১০৩, ৪০০। (৪) ৩৩৯,
৩৫০। (৫) ১১৫, ১১৬, ১১৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১১৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১৩, ১১৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৪।

ইউ(য়ু) ফর্কিয়াক করনেটা।
(৫) ৪২৫। ৪৩০।

চিকিৎসা। (৫) ৪৩০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩০।

ইউ(য়ু) ফর্কিয়াম রেজিনিফেরা।
(৫) ৪২৫। ৪২৮।

চিকিৎসা। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪।
(৫) ১৩২, ৪২২, ৪৩০।

লক্ষণ। (৫) ৪২৮, ৪২৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪২৮।

ইউ(য়ু) ফেসিয়া অফিসিওয়ালিস।
(৫) ২৪৫।

চিকিৎসা। (১) ১৬৬। (৩) ১২৮। (৪)
৩৭৬, ৪১৪, ৪৪৩। (৫) ১২৪, ১২৫,
২৪৭—২৪৯।

লক্ষণ। (৫) ২৪৫—২৪৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৪৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৪৫।

ইউ(য়ু) ভা আসাই।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্রশিলাদি। (৩) ৩১৮।

ইকুইসিটাম হাইমেল।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্রপথের উদ্দীপনাদি। (৩)
৩১৫।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৬।

উপযোগী ষাতুআদি। (২) ৩১৮—৩২০।

চিকিৎসা। (২) ১৪৪, ১৪৭, ১২৪, ১২৫,
২৪৬, ৩০৫, ৩৩৪—৩৪৮। (৪) ৪২,
১১২, ২০০, ২৪০, ২৪১, ২৭৪, ২৭৫,
৩৪২, ৪৪০, ৪৪৫। (৫) ৩৫, ৪৬,
২৮১, ৩০২, ৩৮৮, ৩৯৩, ৪০২, ৪৭৭,
৪৮৫, ৪৮৯, ৪৯০, ৫২৩, ৫২৪, ৫৫২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১। (২) ১৩২, ১৮৭,
২৪৬, ৩২৫—৩২৮। (৪) ১২৯, ২২৮,
২২৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩১৫—৩২৫।
(৩) ২৪।

রোগকারণ। (২) ৩১৪।

সংজ্ঞাদি। (২) ৩১০—৩১২।

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩১৪, ৩২৫।

ইণ্ডিগো।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৮। (৫) ২১৫, ২২৪,
৪০২।

ইথুসা সাইনেপিয়াম। (৫) ২১১।

চিকিৎসা। (২) ২৫২, ৩৬৮। (৩) ১৫৪,
২২৪, ২২৬। (৫) ২১২, ২১৩।

লক্ষণ। (৫) ২১২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২১১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১১।

ইন্ডাস্ট্রি ক্রেকেটা।

(৫) ২১১। ২১৩।

চিকিৎসা। (৩) ২১২। (৫) ২১৪, ২১৫।

ইপিক্যাকুয়াহ্লা । (২) ৩৭৭ ।

উপযোগী ধাতুআদি । (২) ৩৭২, ৩৮০ ।

চিকিৎসা । (১) ১১৪, ১৫০, ২৬৮ । (২)

৭৮, ৮০, ৮১, ১৪৮, ১৫৫, ৩৮৮—৩৯৩।

(৩) ৪০, ৪২, ৯৬-গ, ৯৭, ১৫৪, ১৭০,

১৭১, ১৭৪, ৩৭৩, ৪১২, ৪৫৮ । (৪) ৯২,

৩০৩ । (৫) ১১, ৪৬, ৩৯০, ৪০৯, ৪৯৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (২) ৩৮১—৩৮৬ ।

রোগকারণ । (২) ৩৭২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (২) ৩৬৯—৩৭১ ।

সাধারণ ক্রিয়া ॥ (২) ৩৮১ ।

ইপমিয়া নিল্ ।

মূত্রশূল । (৩) ৩১৮ ।

ইরিজিরণ । (৫) ১০০ । ১১৩ ।

চিকিৎসা । (৫) ১১৩, ২৬১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১১৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১১৩ ।

ইরিজিয়াম একোয়াটিকাম ।

(৫) ২১১ । ২১৫ ।

চিকিৎসা । (৫) ২১৬ ।

লক্ষণ । (৫) ২১৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২১৫, ২১৬ ।

ইলেটেরিয়াম ।

চিকিৎসা । (২) ৩৯২ । (৪) ১৪৮ । (৫)

২৫১, ৩৮৯, ৪২৬, ৪২৭ ।

ইল্যাপ্স্ করেলিনাস্ ।

(৫) ২৭২ । ২৭৭ ।

চিকিৎসা । (৪) ৩১ । (৫) ২৭৭ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৭৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৭৭ ।

ইকুলাস হাইপকাষ্টেনাম ।

(৫) ৫০১ ।

চিকিৎসা । (১) ১০২ । (২) ২০৭, ২৬১

(৪) ৪৪১ । (৫) ৫০২ ।

লক্ষণ । (৫) ৫০১, ৫০২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫০১ ।

একনাইটাম । (১) ১ ।

উপযোগী ধাতুআদি । (১) ৩, ৪ ।

চিকিৎসা । (১) ২২—৪৮, ৫৭, ৫৮,

৭৫, ৭৭,

১০২ ১১

১৩৬, ১৩৭, ১৫৮, ১৭১, ২৬৪, ২৬৫,

২৬৭, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৫৪ । (২) ৪৯,

৬৩, ৭৪, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৯৮,

২১৯, ২৬৪, ৩৩৯, ৩৭০, ৩৭৪ ।

(৩) ২৮, ৩২, ৩৬, ৪৯, ৪৩, ১০৬,

১২৬, ১৯৪, ২৮৭, ৩২৬, ৩৩৮, ৪০৭,

৪৫৮ । (৪) ৫৭, ৮২—৮৬, ৮৮, ৯০,

৯২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ৩০৪, ৩১১,

৩৩৬, ৩৪১, ৩৯৪, ৪১৪, ৪৪৫ । (৫)

১০, ১১, ২০, ৫৬, ৬৪, ৬৬, ১১০,

১২৬, ১৪২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২৩৮,

২৩৯, ২৪৮, ৩৯৩, ৪০২, ৪১৮, ৪৪৪,

৪৫০, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫৪৮,

৫৫২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৬—২২,

(২) ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৩৩১,

৩৬৪, ৩৬৬ । (৩) ১২৪, ১৪৯ ;

৪৩৫, ৪৫২ । (৪) ১৩৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৪—১৬ ।

রোগ কারণ । (১) ৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ১—৩ ।

একালিকা ইঞ্জিকা ।

(৫) ৪২৫ । ৪৩২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৪৩৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া লক্ষণ ও চিকিৎসা । (৫)
৪৩২ ।

একটিয়া রেসিমমা (সিমিসি-

ফিউগা । (৫) ১ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪১, ১৪২, ১৫০ । (২)
১৪৮, ২৫৫, ২৬৪ । (৩) ২৮০ । (৪) ৩৭,
৮৭, ৩৯১ । (৫) ৫—১০, ১৩৩, ২৪৪,
৩৫২, ৩৬২, ৩৮৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৫ ।

লক্ষণ । (৫) ২—৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১ ।

সাধারণ ক্রিয়া (৫) ২ ।

একটিয়া স্পাইকেটা ।

(৫) ১ । ১০ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৬ । (২) ৭০, ৭১,
২৮৭ । (৫) ১২, ১৩ ।

লক্ষণ । (৫) ১২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১২ ।

এগারিকাস মাস্কেরিকাস ।

(৫) ৩৫৭ ।

চিকিৎসা । (১) ২২৬, ৩৩০ । (২) ১৪৮,
১৫৫ । (৪) ২৭ । (৫) ১৬১—১৬৩,
৩৯৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৩২ । (২) ১৩৬ ।

(৪) ২১ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৫২, ৩৬০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৫৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৫৭, ৩৫৮

এগ্রাস ক্যাষ্টাস । (৫) ৪০৩ ।

চিকিৎসা । (১) ৩৪৬ । (২) ২১৭ । (৪) ৮৭ ।

(৫) ১৪৫, ৪০৩, ৪০৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৪০৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪০৩ ।

এক্সাষ্টিউরা ।

ধনুষ্টকায় বা টিটেনাস । (৫) ১৬৬ ।

এট্রোপিয়া ।

চিকিৎসা । (১) ৫২, ৯৫ । (৪) ৮৬ ।

এডনিস ভার্ণেলিস্ । (৫) ১ । ১৬ ।

চিকিৎসা । (৫) ১৬, ২০১ ।

লক্ষণ । (৫) ১৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । ১৫ ।

এনাকাডিয়াম ওরিএন্টাল ।

(১) ৩৮৩ ।

উপযোগী ষাতুআদি । (১) ৩৮৫—৩৮৭ ।

চিকিৎসা । (১) ১৮২, ১৮৩, ৩৮২, ৩৯৩—

৪০০ । (২) ১৩৬, ২০৪ ।

(৪) ২৭, ১৬৫, ২২২, ২৩৮, ৩৪৭,

৪১৬ । (৫) ৬৫, ১৪৫, ৪৮২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯১—৩৯৩ । (২)

১৩৬, ২৯২ । (৪) ১২২ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৩৮৭—৩৯১ ।

রোগকারণ । (১) ৩৮৭ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ৩৮৩—৩৮৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (১) ৩৮৭ ।

এনিসাম স্টিলেটাম ।

বন্ধাকাশ বা থাইসিস্ । (৫) ৩১৬

এক্টিনিয়াম ক্রোডাম

(৩) ১৩৯ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৪১, ১৪২ ।

চিকিৎসা । (২) ২০৫, ৩৯০, ৩৯১ । (৩)

১৫০—১৫৬, ২৮৩, ২৮৪, ৪৫৯ । (৪)

৪২৫ । (৫) ২১, ২৭, ৫৯, ৯৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৩০ । (২) ২৪৮,

৪০২, ৪০৩ । (৩) ২৫, ১৪৯, ১৫০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১৪৩—

১৪৯ ।

রোগকারণ । (৩) ১৪২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৩৯—১৪১ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৪২, ১৪৩ ।

এক্টিনিয়াম টার্টারিকাম ।

(৩) ১৫৭ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৫৯, ১৬০ ।

চিকিৎসা । (১) ১১০, ১৩০, ১৪০, ১৪১,

১৫০, ১৭২, ৩৮০, ৩৮১ । (২)

৩৮৮, ৩৯০ । (৩) ১৫৬, ১৬৯—

১৭৭, ৩৭১, ৩৭২ । (৪) ৩৩৬ । (৫)

৪৭, ৮৯, ৯৮, ১৭৬, ৪৪৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ । (২) ১৬৭—

১৬৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১৬১—১৬৭ ।

রোগকারণ । (৩) ১৬০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৫৭—১৫৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৬০, ১৬১ ।

এক্টাসিনাম । (৫) ৩১৯ । ৩২৩ ।

চিকিৎসা । (২) ৮৯, ৯১ । (৪) ১২৩ ।

(৫) ৩২৪, ৩২৫, ৩৮১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩২৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩২৩, ৩২৪ ।

এপমফিয়া ।

আর্ণব বমন (Sea-sickness).

(৫) ৩১৫

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ ।

এপসাইনিাম কেনাবিনিাম ।

(৫) ৪৫১ ।

চিকিৎসা । (২) ৮৬ । (৪) ৩০৪, ৩৫৮ ।

(৫) ২০২, ৪৫২, ৪৫৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । ৪৫২ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৫১, ৪৫২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৫১ ।

এপিস্ মেলিফিকা ।

(৪) ২৮১ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (৪) ২৮৩, ২৮৪ ।

চিকিৎসা । (১) ২৫, ২৮, ২৯, ৮৩, ৮৫,

৯৮, ১০৭, ১২১, ১৩৭, ১৩৯, ২৪৭ ।

(২) ৮৬, ২৫২ । (৩) ৩৬, ২৮৯, ৩০৮,

৩১৩, ৩৭০, ৩৮০ । (৪) ৩৯, ৫২, ৫৩,

৫৪, ৫৯, ২৫০, ২৯৭—৩১৪, ৩৩৯,

৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৯৪, ৪১৯ ।

(৫) ২০, ৯৫, ১১৬, ১৩৩, ১৪৩, ৩২৮,

৪৩৪, ৪৫৩, ৫২৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৮৭, ১৯১, ৪০৩ ।

(৩) ১৬৯ । (৪) ২০, ৭৭, ২২৫—

২২৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ২৮৫—

২২৫

রোগকারণ । (৪) ২৮৪, ২৮৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ২৮১—২৮৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ২৮৫ ।

এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্ ।

(৫) ২৫৫ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৫৫, ২২১ ।

লক্ষণ । (৫) ২৫৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৫৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৫৫ ।

এবিস্ নাইগ্রা । (৫)

২৫৫ । ২৫৬ ।

চিকিৎসা । (২) ১৫৮, ২০৫ । (৩) ২৬ । (৫)
২৫৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ২৫৬ ।

লক্ষণ । (৫) ২৫৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৫৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৫৬ ।

এব্রটেনাম্ (৫) ১০০ । ১০১ ।

চিকিৎসা । (৫) ১০২—১০৪, ১৭৮, ৪৮৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৪৪, ২৪৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০১ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০১, ১০২ ।

এব্‌সিষ্টিয়াম্ (৫)

১০০ । ১০৪ ।

চিকিৎসা । (৫) ১০৫, ২১৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৪ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০৪, ১০৫ ।

এভিনা স্টাটিভা ।

(৫) ৪৫৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা । (৫)
৫৬ ।

এমনিয়াম কপ্টিকাম । (৫) ৮৩।২৭ ।

চিকিৎসা । (৫) ৮৮, ২৭, ২৮ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৭ ।

এমনিয়াম কার্বনিকাম

(৫) ৮৩ । ৮৪ ।

চিকিৎসা । (২) ২০৭ । (৩) ৪১০, ৪৫৭ ।

(৪) ৪৬৬ । (৫) ৮৭—২০, ২৪, ২৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৮৬, ৮৭ ।

লক্ষণ । (৫) ৮৫, ৮৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৮৪ ।

এমনিয়াম গামাই ।

চক্রযোগ । (২) ২৫৮, ৪০৭ ।

এমনিয়াম ফসফরিকাম ।

চিকিৎসা । (৫) ২২, ২৮ ।

এমনিয়াম বেঞ্জোইকাম ।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ । (৪) ৫২ ।

এমনিয়াম ব্রোমেটাম ।

(৫) ৮৩ । ২৮ ।

চিকিৎসা । (৫) ২২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৮, ২২ ।

এমনিয়াম মিউরিয়োটিকাম ।

(৫) ৮৩ । ২০ ।

চিকিৎসা । (২) ১৩৪ । (২) ২৬১ । (৩) ২৪৮,

৩৭৬, ৪৪১ । (৫) ৮২, ২৩—২৭, ১০৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৪২ । (৫) ২৩ ।

লক্ষণ । (৫) ২০—২৩

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২০ ।

এমিল নাইট্রাস ।

চিকিৎসা । (১) ২৬ । (৪) ৫৭ । (৫) ৪৭৮

এম্‌প্‌ গ্রিসিয়া (৫) ৩১২ ।

চিকিৎসা । (২) ৩৪৫ । (৩) ৩৭৮ । (৪) ৮০,

২০৬ । (৫) ৮৭, ২২৬, ৩২১—৩২৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৭৮ ।
 লক্ষণ । (৫) ৩২০, ৩২১ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩১৯ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩১৯, ৩২০ ।

এরানিয়া ভায়াজেমা ।

(৫) ৩০৮ । ৩১৬ ।

চিকিৎসা । (৩) ১০৪ । (৪) ৩৪৫ । (৫)
 ৩১৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৪৪ । (৫) ৩১৭ ।
 লক্ষণ । ৩১৭ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩১৬ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩১৬, ৬১৭ ।

এরাম ট্রিফিলাম ।

(৫) ৪৬৭ ।

চিকিৎসা । (৩) ১৫১, ৩০৯ । (৪) ১৬৮,
 ৩১৮, ৬১৫ । (৫) ১৯, ১৯৫, ২৪৯,
 ৩৬৮, ৬৬৯, ৫৫৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৪৬৮ ।
 লক্ষণ । (২) ৪৬৭, ৪৬৮ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৬৭ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৬৭ ।

এরানিয়া রেসিমসা ।

সাময়িকরোগ । (৩) ৩৭২ ।

এইরিজিরণ ।

চিকিৎসা । (৩) ৯৭, ৩১৭ ।

এলাস্তাস গ্যাগুলোসা ।

(৫) ৪৭০ ।

চিকিৎসা । (৪) ৩৫৫, ৩৫৬ । (৫) ৪৭০,
 ৪১১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১৪৯ ।
 লক্ষণ । (৫) ৪৭০ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৭০ ।

এলাম ।

চিকিৎসা । (৩) ২৪, ২৬১ ।

এলিয়াম সেপা ।

(৫) ১৯২ ।

চিকিৎসা । (১) ১১০, ১১৩ । (২) ৫৪ ।
 (৪) ২৪৩ । (৫) ৯৭, ১৯৪, ১৯৫, ২৪৮,
 ৩৪৯, ৩৫০ ।

লক্ষণ । (৫) ১৯৩, ১৯৪ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৯৩ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৯৩ ।

এলুমিনা । (৫) ৭৩ ।

চিকিৎসা । (১) ১৬৯ । (২) ৩০১ ।
 ৪০৭ । (৩) ২১৬, ৩২০, ৩৭৩, ৩৭৫,
 ৪১০, ৪১৩, ৪৪০ । (৪) ২৭, ১৪২,
 ১৪৯, ২০১, ২৩৬, ৪১৫ । (৫) ৬, ৭৮,
 —৮২, ১৮৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৭৭, ৭৮ ।
 লক্ষণ । (৪) ৭৪—৭৭ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৭৩ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৭) ৭৩, ৭৪ ।

এলেপ্তিস্ ফ্যারিনসা ।

স্ত্রীজননেদ্রিয় রোগ । (৫) ২৯১ ।

এলো । (৫) ১৯২ । ১৯৫ ।

চিকিৎসা । (৩) ৪২, ৬৬, ৪৪০ । (৪) ২০৩,
 ২৫০ । (৫) ১০৭, ১৯৮, ১৯৯, ৩৮৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ৩৭৬ ।
 লক্ষণ । (৫) ১৯৬, ১৯৭ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৯৫ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৯৬ ।

এসাফিটিডা । (৫) ২১১ । ২১৬ ।

চিকিৎসা । (২) ২১৭ । (৩) ২৪ । (৪)

২২২, ২৭১। (৫) ২১৯—২২২, ২৮১,
২৮৮।

লক্ষণ। (৫) ২১৭—২১৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২১৬, ২১৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১৭।

এসেটিক এসিড।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪

শিল্পকয়রোগ। (৫) ১০৪।

এসেরাম।

অল্প চিকিৎসাস্ত্রিক চক্ষুবেদনা। (২) ৩৪৪

(৫) ৩২০।

এম্পারেগাস্।

সংপিণ্ডরোগ। (৪) ৩০৫।

ওপিয়াম। (৩) ৩৬।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩৪৮—
৩৫০।

চিকিৎসা। (১) ৭২, ৭৪, ২২২, ৩০০,
৩০৫, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৫০, ৩৫৪।

(২) ১৪২, ১৬০, ১৬১, ৩০০, ৩৩৭,
৩৩৯। (৩) ১২৬, ১৩৮, ২০৪, ২১৬,
৩৬৫—৩৮০—৪০৮।

(৪) ৫২, ৫২, ৮৫, ১৪৩, ১৪২, ৪৪৬।

(৫) ৩৯, ৩৪৭, ৩৯০, ৫৩০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১, ২২৪, ৩৩৩,
৩৩৪। (৩) ১৬৮, ১৬৯, ৩৬৪—৩৬৫।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৩৫১—৩৬৩।

রোগ কারণ। (৩) ৩৫০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৩৪৬—৩৪৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৩৫১।

ও(অ)নসুমডিয়ম।

শিরঃশূল। (৪) ৭৮

গুলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫১। ৪৫৩।

চিকিৎসা। (৩) ২৬৭। (৫) ৪৫৪, ৪৫৫।

ওসাইনাম।

পুয়ধাতু বা গণোরিয়া। (৩) ৩১৮।

ককুলাস্ ইণ্ডিকাস। (৫) ৪৮৬।

চিকিৎসা। (২) ১৬০, ১২৩, ২১১, ২৫৫,

৩৩১, ৩৩৬, ৩৪০। (৩) ৩০, ১২৫,

২১১। (৪) ৪৫, ৭৮, ২৩৪, ৫৩৪।

(৫) ১৪৫, ২৮১, ৪৮৮—৪৯০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৬৪, ২১০।

লক্ষণ। (৫) ৪৮৬—৪৮৮

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮৬।

ককুলাস্ ভিসিকুলোসাম।

মুখ ও গল গহ্বরে রোগ। (৫) ১৭৬।

কক্লিয়ারিয়া আর্মো।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ। (৩) ৩১৮।

কন্ড্যালোরিয়া মেজাস্। (৫) ১২২।

২০০।

চিকিৎসা। (৫) ২০০—২০২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০০।

কফিয়া ক্রুডা। (৫) ৫৫১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯। (২) ১৩৩, ১৩৪,
৩৩৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫১।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১)

৩২, ৩৫৪। (২) ২১৫, ৩৩৪, ৩৭৪।

(৪) ৪৪০। (৫) ২৭, ৩০২, ৫৫১, ৫৫২।

কর্ণাস ক্লরিডা ।

ছররোগ । (৩) ১০২ ।

কলফাইলাম । (৫) ৩ । ৭ । ৩৮২ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৪ । (৩) ৭০, ৭১, ২৮৮ ।

(৪) ৮৭ । (৫) ১০, ১২, ১৪৫, ২২১,

৩৮৩—৩৮৫, ৪২২ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৮২, ৩৮৩ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৮২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৮২ ।

কলসিষ্ট । (৩) ১৭৮ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৮০ ।

চিকিৎসা । (১) ১০৭, ২৬৮ । (২) ৩৬৮ ।

(৩) ১২০—১২৬, ৩১০, ৩৪৫ । (৪)

২৭৮, ৩৪৩, ৩৯৭ । (৫) ২৭, ১০৭,

৩৪৫, ৩৫১, ৩৫২, ৩৮৮, ৪২৬, ৪২২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১৮৮, ১৮৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১৮১—১৮৮ ।

রোগ কারণ । (৩) ১৮১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৭৮—১৮০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৮১ ।

কলিননিয়া ।

চিকিৎসা । (২) ২৬১, ৩৪২ । (৫) ১২৯,

২০১ ।

কল্‌চিকাম । (৩) ৫৩ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৫৫ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৪, ১৪৫ । (২) ৬৮, ৭১,

৭৩, ৭৪, ২২০, ৩০৮ । (৩) ৬৪—৭২,

৯৫, ৯৬ ক, ৩১০ । (৪) ৪৭, ৪৮,

৫০, ৫১, ৫২, ১৪২, ২০৭, ৩৪৮ ।

(৫) ৪১, ১২৫, ৪০১, ৪১৯, ৪২২, ৪২৩,

৪২৪, ৪৮৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ৬৩, ৬৪ । (৪) ১৮০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ৫৬—৬২ ।

রোগ কারণ । (৩) ৫৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৫৩—৫৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৫৬ ।

কষ্টিকাম (৩) ৩২১ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৩২৩, ৩২৪ ।

চিকিৎসা । (১) ১১০, ১১২, ৩৫৪ । (২)

১৪০, ১১৭, ২৫৯ । (৩) ৩৫, ১২৪,

২৮৯, ১১৯, ২১৫, ৩৩৫—৩৪৫,

৩৭৮ । (৪) ৪৯, ৫৪, ১১৮, ২০৮,

২৪০, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৯ ।

(৫) ৯৫, ৯৭, ১৭৫, ২৪৮, ৩০৬, ৩৩৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২০ । (২) ১৩৬,

১৩৭ ।

(৩) ৩৩৪, ৩৩৫ । (৪) ২৭৩ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ৩২৫—৩৩৩ ।

রোগ কারণ । (৩) ৩২৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৩২১, —৩২৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৩২৫ ।

কাণ্ডুরৈজ ।

কর্কট বা ক্যান্ডার । (৫) ২২৬ ।

কার্ডাস্‌মেরিয়ানাস্ । (৫) ১০০।১০৫ ।

চিকিৎসা । (৫) ১০৬, ১০৭ ।

লক্ষণ । (৫) ১০৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া (৫) ১০৫, ১০৬ ।

কার্ক্‌ এনিমেলিস্ । (৫) ৫০৭ ।

চিকিৎসা (১) ২৪৯ । (২) ১২৩ । (৩) ২৪১

৪১২ । (৪) ৩৩৩ । (৫) ৪৮, ৩৫২,

৫০৮—৫১০ ।

লক্ষণ । (৫) ৫০৭—৫০৮ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫০৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫০৭ ।

কার্ব ভেজিটেবিলিস । (৩) ৩৮১ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৩৮৩—৩৮৫ ।

চিকিৎসা । (১) ৪৬, ১০০ । (২) ৫৬, ৫৭,
৬৮, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮৯, ১৫৯,
২০৪ । (৩) ৩৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬-ক,

৩৯৮—৪১৪ । (৪) ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫২,
৫৫, ৬০, ৬৩, ৬৪, ১১২, ২৫৭, ৩৫৩,
৩৫৬, ৪১৫ । (৫) ৮৮, ৮৯, ৩৩৭, ৩৮৮,
৫০৯, ৫৫৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৯২ । (২) ২৩৬,
২৩৭, ৩৯৪—৩৯৮, ৪৩০ । (৪) ১৮০,
২২৯, ৪৩৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ১০৪, ৩৮৫—
৩৯৪ ।

রোগকারণ । (৩) ৩৮৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৩৮১—৩৮৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৩৮৫ ।

কার্বন বাইসাল্ফাইড ।

কর্ণরোগ । (৩) ৩৩৯ ।

কার্বলিক এসিড ।

চিকিৎসা । (৩) ৩১, ৩৩০ । (৪) ৩৯, ৫২

(৫) ৩২৫, ৫১০ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯৩ ।

কিউবেবা ।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্ররোগ । (৩) ৩১৬ ।

কিউরেয়ার ।

ত্বকরোগ । (২) ৩১৫ ।

কুইলারিয়া ।

নাসিকারোগ । (৪) ৮৩ ।

কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম

চিকিৎসা । (৩) ২১৩, ২১৬, ২১৮ ।

কুপ্রাম এসেটিকাম ।

পরিপাকযন্ত্রসংস্থ রোগ । (৩) ২১৮

কুপ্রাম মেটালিকাম । (৩) ১৯৭

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৯৯, ২০

চিকিৎসা । (১) ৭৭, ৮২, ১৫০, ৩০৩ ।

(২) ১৪৭, ৩৩৯, ৩৮৯ । (৩) ১৭৫,

২১০,—২২০, ২৪১, ২৫৩, ৩৪১ । (৪)

১৪২, ১৪৪ । (৫) ৪৬, ২৩৪, ৫৪১,

৫৪২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ২০৯, ২১০, ৩৪৫,
৪০০, ৪০১ । (৪) ১৩৯, ১৪০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ২০১—২০৯ ।

রোগকারণ । (৩) ২০০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৯৭—১৯৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ২০০, ২০১ ।

কুপ্রাম মাল্ফেট,

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ২০২ ।

কেফালাগুয়া ।

জ্বররোগ । (৩) ১০৩ ।

ককা

চিকিৎসা । (৪) ২৩৮ । (৫) ৪৪৮ ।

কোকাস ক্যাঙ্টাই ।

(৫) ৩০৩ ।

চিকিৎসা । (৩) ২৫৩ । (৪) ৩৭৫ । (৫)

৩০৪, ৩০৫, ৩৮০ ।

লক্ষণ । (৫) ৩০৩, ৩০৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩০৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩০৩ ।

কড়িন ।

অক্ষিপুটআনর্জন । (৫) ৩২৩ ।

কোনায়াম ম্যাকুলেটাম ।

(৫) ২১১ । ২২২ ।

চিকিৎসা । (২) ২১০, ২৬৪, ৩০৮ । (৩)
১০৫, ৩১৬, ৩৭২, ৪৫৭ । (৪) ২৮, ৮১,
২৮০, ২৫৩, ৩৪৭ । (৫) ২২৬—২৩০,
৩৪৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৪৭ ।

লক্ষণ । (৫) ২২২—২২৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২২২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২২২ ।

কোপেবা ।

পুয়নেহ বা গনোরিয়া । (৩) ৩১৬ ।

কোবাপ্ট ।

চিকিৎসা । (২) ১৪৮, ১৬২, ১২৭ ।

কোব্রা ।

কলেরা বা ওলাউঠা । (৩) ৪০৭ ।

কোরেলিয়াম কুব্রাম । (৫) ২২৯ ।

চিকিৎসা । (৩) ২১৪ । (৫) ২৮৪, ৩০০,
৩০১ ।

লক্ষণ । (৫) ২২৯, ৩০০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২২৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২২৯ ।

ক্যান্ডাস গ্র্যাণ্ডি । (৫) ৫৪৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩২৩ । (৫) ৫৪৭ ।

লক্ষণ ও চিকিৎসা । (১) ৩৬ । (৩) ১৩০.
২১৫, ২৪৮ । (৫) ২১, ১৪৫, ৫৪৭,
৫৪৮ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৪৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৪৭ ।

ক্যান্ডমিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (৪) ৪৪ । (৫) ২৭৪ ।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (৫) ৪৪৬ ।

চিকিৎসা । (১) ৩৪ । (২) ১২৭ । (৩)
৩২২ । (৫) ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৮৮ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৪৭, ৪৪৮ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৪৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৪৬ ।

ক্যানাবিস্ স্তাতিভা ।

(৫) ৪৪৬ । ৪৪৯ ।

চিকিৎসা । (৩) ৩১৪, ৩১৫ । (৪) ৪৪৭ ।
(৫) ১৩৪, ৪৫০ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৪৯, ৪৫০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৪৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৪৯ ।

ক্যান্ডারিস্ । (৩) ২২৩ ।

উপযোগী ষাভু ইত্যাদি । (৩) ২২৫, ২২৬ ।

চিকিৎসা । (১) ৩০৬, ৩২৬, ৩৪৭,
৩৪৯ । (২) ৫৬, ৩১৫, ২৬৪ । (৩) ৬৭,
১২৬, ৩০৪—৩২০ । (৪) ১৪২, ৩০৭-
০৮, ৩১৪, ৩৫৭ । (৫) ১৩৯, ৪০৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩০৬, ৩০৪ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ২২৬—৩০৩ ।

রোগকারণ । (৩) ২২৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ২২৬—২২৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ২২৬ ।

ক্যাপ্ সিকাম্ । (৫) ২৬২ ।

চিকিৎসা । (২) ৫২ । (৩) ২৪, ১০৩, ১০
৩০৮, ৩১০, ৩১৬, ৩৭১ ।

(ক) ১১৬, ৪৬৪। (এ) ১২২, ২৬৫—
২৬৬, ৫৪৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৯১। (এ) ২৬৫।
লক্ষণ। (এ) ২৬০—২৬৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ২৬২।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ২৬২, ২৬৩।

ক্যামোমিলা (২) ৩৪৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৩৫১—৩৫৩।
চিকিৎসা। (১) ৯৪, ১০৩, ১৬৬, ২৫৫।
(২) ১৫৩, ১২২, ১৫৬, ১২৮, ৩১৫,
৩১৬, ৩৩৯, ৩৬৬—৩৭৬। (৩)
১২১, ১২৩, ১২৫। (৪) ৩০৫। (এ) ১০,
২৭, ২৮, ৩৪৫, ৩৪৬, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২। (২) ১২৯, ১৩১,
৩৯৫, ৩৩১, ৩৬৩—৩৬৬, ৪০২, ৪০৩।
(৩) ২৭, ৯০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৫৩—৩৬৩।
রোগকারণ। (২) ৩৫৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৩৪৯—৩৫১।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৫৩।

ক্যাম্ফরা। (এ) ৪৪১।

চিকিৎসা। (১) ৪৩, ৪৫। (২) ৫২, ১৫৭।
১৩: ২১৮, ৩১২। (৪) ৬১, ৯০, ১৪৪,
১৪৫। (এ) ১২৫, ২৭১, ৩৩৭,
৪৪১—৪৪৫, ৪৯৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৯৩। (৪) ১৩৯, ১৪০।
লক্ষণ। (এ) ৪৪২, ৪৪৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ৪৪১।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ৪৪১, ৪৪২।

ক্যালাডিরাম।

চিকিৎসা। (২) ৪০৯। (৩) ৪৫। (৪) ৫৭,
৮৭। (এ) ২৮।

ক্যাকেলি আয়ডেটাম।

(এ) ১২০। ১২১।
চিকিৎসা। (৩) ৪, ১৭। (৪) ৩৩, ১৬৬,
১৭১, ৩১০। (এ) ৩০, ১০৪—১০৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (এ) ১২৪।
লক্ষণ। (এ) ১০১—১২৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১২১।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১২১।

ক্যাকেলি কার্বনিকাম।

(এ) ১১০। ১২৮।
চিকিৎসা। (১) ১৩৮, ১৪৬, ৩৮১। (২)
৩০২, ৩৪৬। (৩) ৯৬, ১৭৪, ৩৪২,
৩৪৩, ৪০৩। (৪) ৫২, ৩৬৬, ৩৩৯,
৩৭৪। (এ) ১৩০—১৩৬, ১৪৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৮। (২) ২৪০। (এ)
১৩০।
লক্ষণ। (এ) ১১৯—১২০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১২৮, ১২৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১২৯।

ক্যাকেলি ক্লরিকাম।

(এ) ১২০। ১৩৬।
চিকিৎসা। (এ) ১৩৮, ১৩:
লক্ষণ। (এ) ১৩৬—১৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১৩৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১৩৬।

ক্যাকেলি নাইট্রিকাম।

(২) ১২০। ১৩৯।
চিকিৎসা। (৩) ৩১৩। (এ) ১৪১, ১৪২।
লক্ষণ। (এ) ১৪০, ১৪১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১৩৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১৩৯।

ক্যাকেলি পার্ম্যাঞ্জ্যানিকাম ।

(৫) ১২০ । ১৪২ ।

চিকিৎসা । (৪) ১৮৬ । (৫) ১৪০ ।

ক্যাকেলি ফস্ফরিকাম ।

(৫) ১২০ । ১৪৩ ।

চিকিৎসা । (৩) ২৫৪ । (৪) ৩৭৫ ।

(৫) ১৪৫, ১৪৬, ৫১২ ।

লক্ষণ । (৫) ১৪৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৪৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৪৩, ১৪৪ ।

ক্যাকেলি ফেরোসাইয়ানিকাম ।

(৫) ১২০ । ১৪৬ ।

চিকিৎসা । (৫) ১৪৬, ১৪৭ ।

ক্যাকেলি বাইক্রমিকাম ।

(৪) ৩৫৮ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৫) ৩৫৮—৩৬০ ।

চিকিৎসা । (২) ৫৬, ৫৮, ১৫২, ৩১২,

৩২০, ২৫, ২৫৪, ৩০৮ । (৩) ৪১,

৬৭, ১, ৭৫, ২, ৭৬, ৩, ৪ । (৪) ২২ ।

৩৭, ৪৭, ৭৮, ৩০২, ৩৭০—৩৭৮,

৪৬৪ । (৫) ১৩৫, ১৩৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৪, ৩৮৬ । (৪)

৩৬২—৩৭০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ৩৬১—৩৬২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ৩৫৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ৩৬০, ৩৬১ ।

ক্যাকেলি ব্রোমেটাম ।

(৫) ১২০ । ১৪৭ ।

চিকিৎসা । (৩) ৪৫২ । (৫) ১৫১—১৫৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ১৫০, ১৫১ ।

লক্ষণ । (৫) ১৪৮—১৫০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৪৭

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৪৭, ১৪৮

ক্যাকেলি মিউরিয়োটিকাম ।

(৫) ১২০ । ১৫৩ ।

বিবরণ ও চিকিৎসা । (৩) ৩৩৬ । (৫) ১৫৩,

৫১৮, ৫১৯

ক্যাকেলি সাল্ফরিকাম

(৫) ১২০ । ১৫৪ ।

বিবরণ ও চিকিৎসা । (২) ২২০ । (৫)

ক্যালেলুলা ।

চিকিৎসা । (৩) ১৩৪ । (৪) ১৩৩, ৩৫৫

(৫) ৪২৪ ।

ক্যাকেরিয়া আইওডেটাম ।

(৫) ১৮০ । ১২০ ।

চিকিৎসা । (৩) ২৮১ । (৪) ১২৩, ১৩১ ।

(৫) ৫৮, ১৭৭, ১৮৭, ১২০, ৫০০ ।

ক্যাকেরিয়া আর্সেনিকোসাম ।

বিশেষ ক্রিয়াদি । (২) ৮ ।

ক্যাকেরিয়া এসেটিকাম ।

(৫) ১৮০ । ১৮৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা । (৩) ১৮৩ ।

(৫) ১৮৮ ।

ক্যাকেরিয়া কার্বনিকা । (৩) ২৫৬ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ২৫৭—২৫৯ ।

চিকিৎসা । (১) ৭৪, ৮০, ৮৫, ১০০, ১০৪,

১১০, ১১২, ১১৫, ১১৮, ১৮৫, ২৩৯,

২৪৬, ২৬৩, ২৯৯ । (২) ১৪৬, ১৬২,

২১৩, ২৬৫, ৩৭১, ৪০২। (৩) ৩০,
৩২, ৩৫, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ১৫১, ২৭২—
২৯২, ৪৫৪, ৪৫৭। (৪) ১১৩,
১০, ১২২, ১২৩, ১৬৭, ২৪৬, ২৪৭,
২৫০, ২৫৬, ৩৪৩, ৩৪৮, ৪১৫, ৪১৯,
৪৬৪। (৫) ৬, ৫৯, ৭৮, ১০৪, ১৭৬,
১৮৬, ১৮৭, ২৯৪, ৩১৬, ৩৪৭, ৩৮৯,
৫১৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৭। (৩) ২৬৯—
২৭২। (৪) ১০৯, ২২৬, ২২৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২৬২—২৬৯।
রোগকারণ। (৩) ২৫৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২৫৬, ২৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২৫৯, ২৬০।

ক্যাকেরিয়া ফস্ফরিকা।

(৫) ১৮০।

চিকিৎসা। (৩) ৯, ১, ২৮১, ২, ২৩৮, ২,
২, ৪। (৪) ১৭১, ৩৭৭, ৪৪৫। (৫)

১৫. ৫৩০

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৭০। (৫) ১৮৪.
১৮৫।

লক্ষণ। (৫) ১৮১—১৮৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৮০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৮০, ১৮১

ক্যাকেরিয়া ফ্লুরোরিকা।

(৫) ১৮০। ১৮৯।

চিকিৎসা। (৩) ২৯১। (৪) ১১৭, ৩৪৯
(৫) ৭১, ১৮৯, ১৯০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৮৯।

ক্যাকেরিয়া সাল্ফুরিকা।

(৫) ১৮০। ১৯১।

চিকিৎসা। (৫) ১৯১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৯১।

ক্যাকেরিয়া হাইপোফস্ফরিকা।

(৫) ১৮০। ১৯০।

পুয়শোথ বা এব্‌সেস। (৫) ১৯০।

ক্যালিয়াম ল্যাটফোলিয়া।

(৫) ৪১৩। ৪১৬।

চিকিৎসা। (১) ৩৬। (২) ২১৫। (৩) ৭০,
৭১, ২। (৪) ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৮,
৩৯৪। (৫) ২৫২, ৪১৭—৪২০।

লক্ষণ। (৫) ৪১৬, ৪১৭।

সংজ্ঞাদি। (৫) ৪১৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৬।

ক্যাষ্টার ইকুই। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (৫) ২৮০।

ক্যাষ্টারিয়াম। (৫) ২৭৮।

চিকিৎসা। (৫) ২৭৯, ২৮২।

লক্ষণ। (৫) ২৭৮, ২৭৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৮।

ক্যাঙ্কারিয়া।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১।

ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৪।

চিকিৎসা। (১) ২৫৫। (২) ১৫৫। (৩)
২৮৩, ২৮৪। (৪) ৩৬, ৪৪২। (৫) ২৭,
২৬, ২০৬, ২৪৮, ১৯৭, ২৯৮, ৪১৮,
৫২৪, ৫৩৫—৫৩৭।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৫৭ ।

লক্ষণ । (৫) ৫৩৪, ৫৩৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৩৪ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৩৪ ।

ক্রোকাস্ স্মাটিভাস্ । (৫) ৩৯১ ।

চিকিৎসা । (২) ৩৩৭, ৩৩৮ । (৪)

৪১৫ । (৫) ২৬১, ২৮৭,

৩৯০—৩৯৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৯১, ৩৯২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৯১ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৯১ ।

ক্রোটিন টিগ্ লিয়াম্ । (৫) ৪২৫ ।

চিকিৎসা । (৪) ১৪৮, ৩৫৭ । (৫) ২৫১,

লক্ষণ । (৫) ৪২৫, ৪২৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪২৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪২৫ ।

ক্রোটেলাস্ হরিভাস্ । (৫) ২৭২ ।

চিকিৎসা । (২) ৮৯ । (৪) ২৭, ৩৮, ৩৯,

৫২, ৬২ । (৫) ২৭৩—২৭৫, ২৭৭,

৩২৫ ।

লক্ষণ । (৫) ২৭৩ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৭৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৭২ ।

ক্র্যাটিগাস অক্সিরিয়া ক্যাস্ত্রা ।

রূপপিত্তরোগ । (৫) ১০২ ।

ক্রিমিটিস্ ইরেষ্টা । (৫) ১ । ১৩ ।

চিকিৎসা । (৩) ৩১৬ । (৫) ১৪—১৬, ২২৭ ।

লক্ষণ । (৫) ১৩, ১৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৩ ।

ক্রোরিশ । (৫) ৪২ । ৪৯ ।

চিকিৎসা ও বিবরণ । (৪) ৩০২ । (৫) ৮৬,
৪২, ৪৩৪ ।

গল্‌থেরিয়া ।

বন্ধশূল । (৩) ১২৭ । (৫) ১৯ ।

গুয়েইয়াকাম । (৫) ৪৭২

চিকিৎসা । (৩) ১৯৬, ৩৫৯ । (৪) ৩১৯ ।

(৫) ৮, ৩০৬, ৩৫২, ৪৮০—৪৮১ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৭২, ৪৮০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৭২ ।

গ্যাংস্বোজিরা ।

উদরাময় । (৫) ৪২৭ ।

গ্রিগেলিয়া রোবাস্টা

রূপপিত্তরোগ । (৪) ৮৪ ।

গ্র্যাটিয়োলা । (৫) ২৪৫ । ২৪৯ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৫০, ২৫১, ৪২৭

লক্ষণ । (৫) ২৫০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৪৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৪৯, ২৫০ ।

গ্র্যাফাইটিস্ (৪) ৩৯৯ ।

উপধোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ৪ —৪০২ ।

চিকিৎসা । (১) ১০৭, ৩৮২, ৩৯৭ । (২)

১৩৮, ১৯২, ২০৯, ২১০ । ৩০২, ৩০৩,

৩০৫ । (৩) ২৮, ৩, ৩, ৪, ৪, ৪ ।

(৪) ৩৩, ৫৮, ১১৮, ১২৩, ৩৭৬, ৪১৩,

—৪২০ । (৫) ৯৭, ৪৬৯, ৪৯৮, ৪৯৯,

৫৫৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৩৫, ২৩৯, ২৪০ ।

(৩) ৪৪৯, ৪৫০ । (৪) ১১১, ৪১১—

৪১৩ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪০২—৪১১।
রোগকারণ। (৪) ৪০২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৯৯, ৪০০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪০২।

গ্ননইন্।

চিকিৎসা। (১) ৩১, ৭০। (২) ৩৫৩, ৩৩৯।
(৩) ১২৬, ২৮৭। (৪) ৫৭, ৭৯, ৩০০,
৩৯৫, ৪৬৩। (৫) ৪০০, ৪৭৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮৯।

চাইনিনান আর্সেনিকোসান।

চিকিৎসা। (৩) ১০৬। (৫) ২৩৪।

চাইনিনাম সাল্ফুরিকাম

(কুইনাইন)।

চিকিৎসা। (২) ৫১, ৫২, ৭৬—৮০। (৩)
৭৮, ৯৩, ১০০—১০৪। (৪) ২৩৬, ৩৩।
(৫) ৫৩০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৮।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৩। ৪১৫

চিকিৎসা। (৩) ৩১৭। (৫) ৪১৫, ৪১৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৫।

চেনপোডিয়াম।

কর্ণরোগ। (৩) ৩৩৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৬৮।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৬।

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ৩৫৮—৩৬০।
চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪৬, ২৬৯,
২৭০, ৩৭৪—৩৮২, ৩৯৭। (৩) ১০৫,
২১৪, ২৪৯। (৫) ৩০১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩১, ৩৬৭—৩৭৪।
(২) ১৯১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৩৬১—৩৬৭
রোগকারণ। (১) ৩৬০।
সংজ্ঞাদি। (১) ৩৫৬, ৩৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৩৬০, ৩৬১।

জিঙ্কাম। (৫) ৫২৬।

চিকিৎসা। (১) ৮২, ১০৭, ১৫০, ১০৩.
৩০৪। (২) ১৯৭, ৩০৮। (৩) ২৪১.
২৫৩। (৪) ৫৮, ২০১, ২৩৭, ২৪৮,
৩০০। (৫) ১০৩, ১৮৫, ২২৬, ২২৭,
৫০৯—৫৩৩, ৫৩৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১৮১। (৫) ৫২৯।
লক্ষণ। (৫) ৩২৬-৩২৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫২৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫২৬।

জিঙ্কাম পাইক্রেটাম্

স্নায়ুশূল। (৫) ৫৩১।

জিঙ্কাম ফস্ফাইড।

স্নায়ুশূল। (৫) ৫৩১।

জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানাস্।

চিকিৎসা। (৫) ৩১১, ৫৩০।

জিঙ্কাম সাল্ফুরিকাম।

চিকিৎসা। (৩) ৩১১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৩৮৭।

জিজিয়া।

তাণ্ডব রোগ বা কোরিয়া। (৫) ৩০৯—৩১১।

জিল্লিবেরিস্।

মূত্রাঘাত (Suppression of urine)।
(৩) ৩৭৮।

জেলসিমিয়াম্। (৪) ৬৫।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ৬৬, ৬৭

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ২৯, ১১১, ২৪২,
৩৫৪। (২) ২১০, ২৫০, ৩০১, ৩৩৬,
৩৬৮। (৩) ৩১, ৪৪, ১৭০, ২৮৭,
৪০০। (৪) ২৩, ৬০, ৭৭—৯২, ১১২,
১৪৩, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৯৩, ৪৪৬।
(৫) ৩৯৬, ৪০০, ৪৭৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৮। (৩) ১৪৯
(৪) ৭৫—৭৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৬৮—৭৯।

রোগকারণ। (৪) ৬৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৬৫, ৬৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৬৮।

জ্যাট্রিকা।

পরিপাক-যন্ত্র-সংস্থিত রোগ। (৪) ১৪৪, ১৪৫,
১৪৭। (৫) ৪২৭।

জ্যাণ্ডক্সাইলাম্। (৫) ৪০৫। ৪০৯।

চিকিৎসা। (৫) ৪১০, ৪১১, ৭২০।

লক্ষণ। (৫) ৪১০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪০৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৯, ৪১০।

জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪০৫। ৪১১।

চিকিৎসা। (২) ৩০২। (৫) ৪১০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১১।

টুক্রিয়াম্।

চিকিৎসা। (২) ৪০৯। (৩) ২৯০। (৪) ২৫৬।

টিটেনিয়াম্।

অর্ধ দৃষ্টি। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।

টিঙ্গিয়া ট্রিফলিয়েটা। (৫) ৪০৫।

৪০৭।

চিকিৎসা। (৫) ৩৫৬, ৪০৯।

টুঁবাকু লিনাম—বাসিলিনাম। (৫)

৩১৯। ৩২৫।

চিকিৎসা। (১) ১৮০। (৩) ৩২, ২৮১

(৪) ২৪৫। (৫) ১০৪, ৩২৮, ৩২৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬১।

বিষয়ণ। (৫) ৩২৫।

লক্ষণ। (৫) ৩২৭, ৩২৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩২৬, ৩২৭।

টুসিলেগো।

পূয়মেহ বা গণোরিয়া। (৫) ৪০৪।

টেবেকাম্। (৫) ২৬২। ২৬৭।

চিকিৎসা। (৩) ২১৫। (৫) ২৭০, ৩৭১।

তাম্বকুট-কুফল-প্রতিষেধক। (৫) ২৬৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৬৮। (৫) ২৭০।

লক্ষণ। (৫) ২৬৮—২৭০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৬৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৬৮।

টেরাপাইনি।

গৃধ্রসী বা সাইয়াটিকা। (৩) ১২০।

টেরিবিষিনা। (৫) ৫৫৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৫৫।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৩)

১২৩, ২২৫, ৩৭৭, ৪৫৯। (৪) ৫২, ৫৩,

১৮৫, ৩৩৯, ৩৪৩। (৫) ৪০, ৫৫৫।

টেলুরিয়াম্।

চিকিৎসা। (১) ২৪। (২) ৩১৫।

টারাক্সেসকাম্। (৫) ১০০।

১১৮।

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৪। (৫) ১১৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৫১।

লক্ষণ। (৫) ১১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৮৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৯।

টারেন্টুলা। (৫) ৩০৮।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৩। (৪) ৬৩, ১২৩।
(৫) ১৩৩, ৩০৯—৩১১, ৩১৫, ৩২৫,
৩৬১, ৩৯৩, ৪৮৫, ৫২৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ২২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০৮, ৩০৯।

ট্রাইফলিয়াম প্র্যাটেস্।

পাণ্ডবেদনা (Plurodynia)। (৩) ১২৭।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

লক্ষণ এবং চিকিৎসা। (৩) ২৭, ২৮৭। (৫)
২৬১, ৫৪৩, ৫৪৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৩।

ট্রিকোরা। (৫) ৩০৩। ৩০৭।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৬। (৫) ৩০৭।

ডলিকস্। (৫) ২৩৮।

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৭। (৫) ২৩৮, ২৩৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩২২।
লক্ষণ। (৫) ২৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৮।

ডাইওস্করিয়া। (৫) ৪১১।

চিকিৎসা। (৩) ৪১, ৪৪, ১২৪। (৪)
৮৬, ৪৪৫। (৫) ৪১২।
লক্ষণ। (৫) ৪১১, ৪১২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১১।

ডল্‌কামায়া। (৩) ৪৪২।

উপদোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৪৪৩—৪৪৪।

চিকিৎসা। (২) ২১২, ৩৬৯। (৩) ৩৩৮।
৪০১, ৪৫২—৪৫৯। (৪) ৩০, ৮৯,
৩৩৪। (৫) ৪২০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১,—
৪৫২।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৪৪৫—৪৫১।

রোগকারণ। (৩) ৪৪৪, ৪৪৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৪৪২, ৪৪৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৪৪৫।

ডিষ্টেমাস।

শ্বেতপ্রদর। (৫) ৩৭৫।

ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৭৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৩৮০, ৩৮১।

চিকিৎসা। (২) ৩০৬। (৩) ২৫৩, ৩১৮।

(৪) ৫০, ৫৩, ৮৪, ৮৬, ২৭৮, ৩১১—
৩২৮। (৫) ৪১৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭। (৪) ৩৮৯,
৩৯০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৮২—৩৮৮।

রোগকারণ। (৪) ৩৮১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৭৯, ৩৮০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩৮১, ৩৮২।

ডিফেনবেকিয়া।

ডিফ্‌গিরিয়া। (৩) ৩০৯।

ড্রিসিরা। (৫) ৫০৩।

চিকিৎসা। (২) ২০২। (৩) ১৭৭, ২১৩,
২১৫, ২৪২। (৪) ২৫৮। (৫) ১০৮,
১১৫, ২৮৪, ৪৩৪, ৫০৪।

লক্ষণ। (৫) ৫০৩, ৫০৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৩।

থিরিডিয়ন্। (৫) ৩০৮। ৩১৩।

চিকিৎসা। (২) ২২৮, ২২৯। (৪) ৩৩৩।
(৫) ২৪২, ৩১০, ৩১৪—৩১৬।

লক্ষণ। (৫) ৩১৩, ৩১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩১৩।

থুজা। (৪) ২৫৯।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ৩১১—৩১৩।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ৩০৪। (২) ৩২১,
৩০৩, ৩৪৪। (৩) ৪৬, ৩১৭, ৪৪০।
• (৪) ৩৬, ১৩১, ১৬৯, ২৭৪—২৮০,
৩৩৯, ৩৭৮, ৪৪০। (৫) ৫৯, ১৩৭,
১৬৩, ১৯৮, ৩৪০, ৩৯৪, ৫০০, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯৩। (৪) ১১১,
২৭৩, ২৭৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৮৪—৩৭৩।
রোগকারণ। (৪) ৩৬৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৫৯—৩৬০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩৬৩, ৩৬৪।

থ্যাম্পিবাসী প্যাষ্টরিস।

।।য়ু রক্তস্রাব। (৫) ৩৬৬।

নাইটি কান এসিডাম। (৪) ১৫০।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ১৫০—১৫৪
চিকিৎসা। (১) ১৬৯, ৩৩৬, ৩৫৩, ৩৫৪
(২) ৩৪৬। (৩) ৪৬, ২৭৬, ২৭৮,
৪১০। (৪) ২৯, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৫৬,
১২৩, ১৬৫—১৭১, ১৮৫, ২৮০, ৩০
৪১৭, ৪৪৬, ৪৬৪। (৫) ৫৯, ৮
১২৭, ১৩৪, ২৬৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩২২। (২) ৩৪৮, ৩৪৯
(৪) ১৬৩—১৬৫, ১৮০, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১৫৫—১৬৩।
রোগ কারণ। (৪) ১৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১৫০—১৫২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১৫৪।

নাইট্র-মিউ এসিড।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৩।

নাক্স ভমিকা। (২) ৯৫।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ১০১—১০৪।
চিকিৎসা। (১) ৪৮, ১৩০, ১৩৩, ১৩৯,
১৪৫—১৪৮, ১৮৩, ২৫০, ২৬৮,
৩৫৪, ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ৫০, ৯২,
১৩৯—১৬৩, ১৯৬, ২০৫, ২০৮, ২৫৩,
২৬০, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০—৩০৩,
৩৪৫, ৩৪৭, ৩৭০, ৩৭৩। (৩) ১৯,
৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৬৫, ৭০, ৯৮-গা,
১৯১, ১৯৩, ১৯৬, ২১৩, ২১৫, ২১৬,
২৪১, ২৪৬, ২৫০, ২৯০, ৩৩৭,
৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৯৯, ৪০২,
৪০৯, ৪১০। (৪) ৮১, ১১৩,
১৬৯, ২০৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৭২,
৩০৫, ৩৩৯, ৩৭৫, ৪১৬, ৪৭৫।
(৫) ১১, ৭৮, ৮০, ১২৭, ১৮৭, ২০৭,
২৮৭, ২৯৭, ৩৪৬, ৪০৯, ৪৭৭, ৪৮১,
৪৯০, ৫০২, ৫১৯, ৫৩৬, ৫৫৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৩০। (২) ১১৯—
১৩৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ২৪৭, ৩৩০,
৩৩১, ৩৬৪। (৩) ১৪৯, ২১০, ২৩৮।
(৪) ২০৮, ৪৬১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ১০৬—১০৯।
রোগ কারণ। (২) ১০৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৯৫—১০
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ১০৪—১০৬।

নাক্স্ মস্কেটা। (৫) ৫৫৩।

চিকিৎসা। (১) ১৫৮। (৩) ৪০০, ৪০৩,
৪৪০। (৫) ২৮১, ৪৭৭, ৫৫৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৮৮, ১৯১, ২৪৬,
৩৩৩। (৫) ৫৫৩।

লক্ষণ। (৫) ৫৫৩, ৫৫৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৫৩।

নাফার লুটিয়া।

শুক্রেমেহ বা স্পার্মাটোরিয়া। (৫) ৫০৪।

নিকোটিনাম।

ধনুষ্টকর বা টিটেনাস। (৫) ২৭০।

নেট্রাম্ আর্সেনিকোসাম।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৩। (৫) ৪৯৮।

নেট্রাম্ কার্বনিকাম।

চিকিৎসা। (২) ২৫৩। (৩) ৪০। (৪)

৪১৫। (৫) ৯৭, ৩০০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৯৩। (৩) ১৪৯

নেট্রাম্ ফস্ফরিকাম।

শুক্রেমেহ। (২) ২৩২।

নেট্রাম্ মিউরিয়টিকাম (২)।

২২২।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ২২৬—২২৮।

চিকিৎসা। (১) ১৪৮, ১৪৯। (২) ৫০,

৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৮, ১৪০, ১৪৪,

২৫১—২৬৭, ২৬২, ৩০০, ৩১০, ৩১৩,

৩৪২, ৩৪৬। (৩) ১০৫, ১০৬, ২৫০,

৩৪২, ৪১০, ৪৩৮, ৪৫৭। (৪) ৩৩, ১৯,

৮১, ২৪৯, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৫০, ৩৭১,

৪১৫, ৪৬৩। (৫) ৫৮, ৫৯, ১০৪, ১২১

১৩৩, ১৫৯, ২০৭, ২৬৬, ২৯১, ৩০১

৩৪৪, ৩৯৩, ৪০০, ৪৮৩, ৫১৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৭—১৩৮, ১৮৮

২৪৩—২৫১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ২২৯—২৪৩

রোগকারণ। (২) ২২৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ২২০—২২৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ২২৮, ২২৯।

নেট্রাম্ সাল্ফুরিকাম।

চিকিৎসা। (১) ১৪২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬।

(৩) ৪১, ২৫০। (৪) ২৭৮, ৪১৫।

(৫) ১০৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৯১। (৪) ২৭০

নেট্রাম্ স্যালিসিলিকাম

শিরোনর্গন। (৪) ৩৩৩

নেট্রাম্ হাইপক্লরিকাম।

চিকিৎসা। (৪) ৩৬। (৫) ২৯১।

ন্যাজা ট্রিপুডিয়ানস্। (৫)

২৭২। ২৭৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭। (৩) ৪০৭। (৪)

(৫) ২৭৬, ২৭৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৪৬১।

লক্ষণ। (৫) ২৭৫, ২৭৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৫।

ন্যাপ্‌থ্যালিন্।

হৃৎ শব্দক কাসি। (৫) ২৮৪।

ন্যাক্যালিয়াম্। (৫) ১০০। ১০৭।

চিকিৎসা। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩। (৫)

১০৭, ১০৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৭।

পডফাইলাম্। (৫) ৩৭৭। ৩৮৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭। (২) ৩৯২। (৩)

৪১, ৬৮, ৯৬—ক, ১৯৬। (৪) ১৪৭,

১৪৮, ২০৩, ২৭৯। (৫) ২৫১, ৩৮৭—

৩৯০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩১।

লক্ষণ। (৫) ৩৮৫—৩৮৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৮৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৮৫।

পলিনিয়া ।

বননযুক্ত শিরশূল । (৫) ৩২৬ ।

পিক্রিক এসিড ।

চিকিৎসা । (৪) ২০০, ২০৫, ২৩৫ ।

পাইনাম্ সিল্ভেস্ট্রিজ্ ।

পদের বক্রতা । (৩) ২২২ ।

পাইরজিনিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩২৫ ।

পাল্‌মেটোলা । (২) ১৬৪ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (২) ১৬৮—১৭০ ।

চিকিৎসা । (১) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৬৬, ১৮৪, ২৫২, ৩৯৮ । (২) ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৬, ১৯২—২২১, ২৫২, ২৫৬, ৩৫৮, ২৯৮, ৩৯০, ৩৯১ । (৩) ৩০, ৪৬, ৪৭, ৭০, ৯৫, ১৫৫, ২৪৬, ৩১৭, ৩৭৮, ৪৫৭, ৪৫৮ । (৪) ২৩, ২৭, ৮৫, ৮৯, ১৪৩, ১৪৮, ১৬৭, ১৭১, ৩৪৮, ৩৯৪, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯, ৪৪২, ৪৬৩ । (৫) ১১, ২০, ৬৭, ৭৮, ৯৭, ১০২, ১৫৪, ১৫৭, ৩৫৫, ৩৮৪, ৪৬৬, ৪৮০, ৫০২, ৫১৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১২৯, ২৩২, ৩৭৩ ।

(২) ১৮৫—১৯১, ২৪৫, ২৪৭, ৩৮৭ ।

(৪) ৭৭, ১১০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (২) ১৭৩—১৮৫ ।

রোগকারণ । (২) ১৭২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (২) ১৬৪—১৬৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (২) ১৭২, ১৭৩ ।

পিওনিয়া ।

চিকিৎসা । (২) ২০৭ । (৪) ৪১৭ ।

পিক্‌স্ লিকুইডা ।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্ । (৫) ৩১৬ ।

পিণ্ডোরিয়া রোবাষ্টা ।

দ্রীহারোগ । (৩) ১০৪ ।

পেট্রিলিয়াম্ । (৫) ৫৫৯ ।

চিকিৎসা । (১) ৩০৪, ৩৮২, ৩৯৭ । (৩)

৪১ । (৪) ৩৩, ৩৩৬, ৩৪৯, ৪১৪,

৪১৬ । (৫) ৫৩৭, ৫৬০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৫৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৫) ৫৫৯, ৫৬০

পেট্রোসিলিনাম্ । (৫) ২১১ । ২৩০

চিকিৎসা । (৩) ৩১৫ । (৪) ৩৯৭ । (৫)

৩৩১, ৪৫০ ।

লক্ষণ । (৫) ২৩০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৩০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৩০ ।

পেশ্বরাম সিডইড্ ।

নাসিকাসর্দি । (৩) ৩০১ ।

প্যারিরা ব্র্যাভা ।

মুক্তরোগ । (৩) ৩১৯ । (৫) ৩৮০ ।

প্যারিস্ কোয়াড্রিফেলিয়া ।

(৫) ১৯২ । ২০৮ ।

চিকিৎসা । (৪) ২৭, ১১২, ৪৪৩ । (৫) ২০

লক্ষণ । (৫) ২০৮, ২০৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২০৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২০৮ ।

প্যালাডিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৮২, ৫২৩ ।

প্যাসিল্লোরা ।

অনিদ্রা । (৫) ৪৪৮ ।

প্লাস্টাম্ ফস্ফরিকাম্ ।

লোকোমোটার এটাক্সিসি । (৫) ৫৪১ ।

প্লাস্টাম্ মেটালিকাম্ । (৫) ৫৩৮ ।

চিকিৎসা । (৩) ১১৬, ৩৭৫ । (৪) ৪৯,
২০৪, ২৩৭, ৪৬৭ । (৫) ১৮৭, ৩৫১,
৫৩১, ৫৩২, ৫৪০—৫৪১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৫৪০ ।

লক্ষণ । (৫) ৫৩৮—৫৪০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৩৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৩৮ ।

প্লাটিনাম্ । (৫) ৫২০ ।

চিকিৎসা । (১) ৩৪৭, ৩৫০ । (২) ৩৬৪,
৩১২, ৩১৬, ৩৪০, ৩৭৩ । (৩) ৩৪১,
৩৭৩, ৪০০, ৪৫৭ । (৪) ১৪২ । (৫)
২৮, ১০, ২৯৭, ২৯৮, ৩৬৬,
৫২০—৫২৫ ।

বিশিষ্ট লক্ষণ । (৫) ৫২০ ।

লক্ষণ । (৫) ৫২০—৫২১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫২০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫২০ ।

প্লাণ্টেগো মেজর ।

চিকিৎসা । (২) ১৯৮ ।

ফস্ফরিকা রুফা ও ভেম্পা ।

(৫) ৩৫৩ । ৩০৬ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩০৭ ।

নিবরণ । (৫) ৩০৬ ।

ফস্ফরাস্ । (৪) ২০৮ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (৪) ২১০—২২২ ।

চিকিৎসা । (১) ১০৮, ১১০, ১১২, ১৪০,
১৪৯, ২৩৯, ৩৪৭ । (২) ৫৪, ৮৫,
১৪২, ১৪৮, ১৫৬, ২১২, ২৫৪, ৩১০,

৩৪২, ৩৪৫, ৩৯০ । (৩) ৪১, ৪৮,
১০৮, ১৭৭, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮৯,
২৯০, ৩৪১, ৩৯৯, ৪৫৪, ৪৫৭ । (৪)
২৭, ১৭১, ২০৫, ২০৭, ২৩১—২৫৮,
২৭৬, ৩৫৩ । (৫) ৫৯, ৬৬, ১২৪,
২৯১, ৩০২, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮৫, ৫১৪,
৫৩০, ৫৩১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৪৫, ৪৭ । (৩) ২৭,
২৭১ । (৪) ১২৬—১৩১, ২৯৬ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ২১৩—২২৬ ।

রোগকারণ । (৪) ২১২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ২০৮—২১০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ২১২, ২১৩ ।

ফস্ফরিকাম্ এসিডাম্ । (৪) ১৮৭ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ১৮৮—১৯০ ।

চিকিৎসা । (২) ৬৮, ৭১, ৭৪ । (৩) ৯৬
—ক, ৯৬—গ, ১০৮, ১০৩ । (৪)
১২০, ১৮৪, ১৯৯—২০৭, ২৫৭, ৩৫৪ ।
(৫) ১৯৮, ৩৮৯, ৫৪৬ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৪৫, ২৯৬ । (৪) ১৯৮,
১৯৯ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ১৯১—১৯৭ ।

রোগকারণ । (৪) ১৯১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ১৮৭, ১৮৮ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ১৯১ ।

ফাইস্টিগুমা । (৫) ২৩৮ । ২৩৯ ।

চিকিৎসা । (৫) ২৪১, ২৪২ ।

লক্ষণ । (৫) ২৪০, ২৪১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৩৯, ২৪০ ।

ফাইটলেফা ডিকেণ্ডা । (৫) ৪৯৫ ।

চিকিৎসা । (৪) ৩৬, ১২৩ । (৫) ১২৫,
৩৮১, ৪১৮, ৪৯৭, ৫০০ ।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১২৪।

লক্ষণ। (৫) ৪৯৫—৪৯৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৯৫।

সাধারণ ক্রিয়া। ৪৯৫।

ফেরাম আয়ডেটাম।

(৫) ৫১১। ৫১৬।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৫)
৫১৬, ৫১৭।

ফেরাম আর্সেনিকোসাম্।

উদরাময়। (৩) ২৬—খ।

ফেরাম এট্‌ স্ট্রিক্‌নিয়া সাইট্রেট।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া। (৩) ১০৭।
(৫) ৫১৫।

ফেরাম এসেটিকাম্।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম প্রোটোক্‌জ্যালোট।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম ফস্‌ফরিকাম্।

(৫) ৫১১। ৫১৭।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১) ২৫,
২৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৩৬, ১৩৮।

(২) ৩৭০, ৩৭১। (৩) ১০৭, ৩১৭,
৩৪৩। (৪) ৮৩। (৫) ৮০, ১৬৭, ১৮৬,
৫১৬, ৫১৭—৫১৯।

ফেরাম মেটালিকাম্। (৫) ৫১১।

চিকিৎসা। (১) ৭০। (২) ৫৮, ৮৮, ১২৭,
২২১, ৩৭৬। (৩) ২৬—খ, ১০৩, ১০৫,
১০৭। (৪) ৩৪৮, ৪১৯। (৫) ৩৮৮,
৪৫৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৫১৬—৫১৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪।

লক্ষণ। (৫) ৫১২, ৫১৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫১১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫১১, ৫১৩।

ফেরাম্‌ ডিডাক্টাম।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।

ফেলাগ্‌নিয়াম্। (৫) ২১১। ২৩১।

চিকিৎসা। (৪) ১১৬। (৫) ২৩১, ৪৯৯।

ফ্লুয়োরিকান এসিডাম। (৫) ৪০। ৬৭।

চিকিৎসা। (১) ২৬০। (৩) ১২২। (৫) ৭১,
৭২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৭০—৭১।

লক্ষণ। (৫) ৬৮—৭০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৬৭, ৬৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৬৮।

বভিষ্টা। (৫) ৩৫৭। ৩৬৩।

চিকিৎসা। (১) ৩০৫। (২) ২৫২। (৩)
১২৬, ৩৭৩, ৪৫৯। (৪) ৩০৯। (৫)
৩৬৫, ৩৬৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮২।

লক্ষণ। (৫) ৩৬৩, ৩৬৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৬৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৩।

বাক্‌ রেণা। (৫) ২৯৩।

চিকিৎসা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩। (৫)
২৯৩, ২৯৪

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৯৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৩।

বার্কেরিব্‌ ভল্‌গারিস। (৫) ৩২৭।

চিকিৎসা। (১) ১৪৭। (৩) ৪০, ২৬—গ,
৩১৯। (৪) ৪১৫। (৫) ৩৭২—৩৮১

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২২৫ ।

লক্ষণ । (৫) ৩৭৭—৩৭৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৭৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৭৭ ।

বালসাম পেরু ।

রন্ধাইটিস্ । (৩) ৩৬ ।

বিসমাথ্ ।

চিকিৎসা । (২) ১৫৮ । (৪) ২৪৯, ২৫০, ২৫৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৪৫, ৪৬ ।

বেঞ্জইকাম এসিডাম ।

চিকিৎসা । (৩) ২৫২ । (৪) ৫০ । (৫) ২৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ১৬৪ ।

বেলাডনা । (১) ৪৯ ।

উপযোগী বাত্ ইত্যাদি । (১) ৫১—৫৪ ।

চিকিৎসা । (১) ২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৪৫,

৪৮, ৬৮—১২০, ১৩১, ১৩৪, ১৩৫,

১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৫৮, ১৬১, ১৬৬,

১৬৭, ২৩৬, ২৪০, ২৪২, ২৬৭, ২৬৪,

২৬৫, ২২৫, ২২৭, ২২৯, ৩০০,

৩০১, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩৩৫, ৩৩৯—

৩৪৪, ৩৪৮—৩৫১, ৩৫৪ । (২) ১২৭,

১২৮, ২৬৪, ৩১১, ৩১২, ৩৩৮, ৩৩৯,

৩৪২, ৩৭১, ৩৭৬, ৪০৭ । (৩) ৩২,

৯২, ৯৩, ৯৭, ১২৬, ২১০, ২৪১, ২৫৩,

২৯১, ৩০৮, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৮, ৪৫৮ ।

(৪) ২৩, ২৪, ৪৮, ৪৯, ৭৮, ৮৯,

৯০, ৯২, ১৪০, ১৮৫, ২৪৩, ২৫৫,

২৯৯, ৩০৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩৩৩,

৩৭৫, ৪১৪, ৪৬৪ । (৫) ৭, ৪৬, ৫৯,

১২৭, ১৬৬, ১৭৬, ২৪৮, ৩৫১, ৪০০,

৪৩৬, ৪৭৫, ৫১৪, ৫২৪, ৫২৫, ৫৪০ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৬৫—৬৮, ১২৮, ১২৯,

২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ৩৩১, ৩৩২, ৩৭৩,

৩৭৪ । (২) ১৩৩, ১২০ । (৩) ৬৫,

৯২, ২৩৮, ২৩৯, ৩৭৮ । (৪) ২০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৫৬—৬৫ ।

(৩) ২০৪ ।

রোগকারণ । (১) ৫৪

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ৪৯—৫১ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (১) ৫৪—৫৬ ।

বেলিস পেরিনিস ।

চিকিৎসা । (৩) ১০৫ । (৫) ১৫৯, ২৬৬ ।

বোরাক্স্ । (৫) ৫৫৬ ।

চিকিৎসা । (২) ৩৬৯ । (৪) ৪১৪ । (৫)

৩৫৩, ৫১৮, ৫৩৭, ৫৫৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৫৫৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৫৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৫) ৫৫৬, ৫৫৭ ।

ব্যাডিয়োগা । (৫) ২৯৯ । ৩০১ ।

চিকিৎসা । (৩) ৪১৩ । (৫) ৩০২ ।

লক্ষণ । (৫) ৩০২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩০১ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩০২ ।

ব্যাপ্টিসিয়া । (৫) ৪৫৮ ।

চিকিৎসা । (১) ৩০৪ । (৩) ৪২, ১৩৬,

১৩৭, ৪৩৯ । (৪) ৩৪, ৪০, ৮৩, ৯২,

২০৭, ২৭৬, ৩৫৩ । (৫) ৪৩০—৪৬২,

৪৯৮

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৯২, ২৯৩ । (৩) ৯১,

১২৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৫৮—৪৬০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৫৮ ।

ব্যারাইটা আয়ডেটা।

চিকিৎসা। (এ) ৫৮, ১৭৬, ১৭৭।

ব্যারাইটা এসেটিকা। (এ) ১৬৯।

১৭৮।

চিকিৎসা। (এ) ১৭৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১৭৮।

ব্যারাইটা কার্বনিকা। (এ) ১৬৯।

ক্রিয়া। (এ) ১৬৯, ১৭০।

চিকিৎসা। (এ) ২৭৮, ৩৯৯। (৪)

১১৩, ৪৬৪। (এ) ১৭৪—১৭৮,
১৮৬, ২৩০, ৪৬৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৪৫১। (৪) ১১১।

(এ) ১৭২—১৭৪।

লক্ষণ। (এ) ১৭০—১৭৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১৬৯।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (এ)

১৬৯। ১৭৯।

চিকিৎসা। (এ) ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১৭৯।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২১।

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ১২৩—১৩৫।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ৪৬, ৮৩, ৮৫,

৮৬, ৯১, ১০১, ১০২, ১০৮, ১১০,
১১১, ১১২, ১৩০—১৫০, ২৪২, ২৪৭,

৩৩৬। (২) ১৪০, ১৫০, ১৫১,
১৫২, ১৬০, ২০৭, ২১৩, ২২০, ২৫৯,

৩১০, ৩৭২। (৩) ৩৬, ৪১, ৪৩, ৭০,
৯৬, ১২৭, ১৭৬, ৪৫৪। (৪)

২৩, ৮০, ৯২, ১৪৩, ১৮৫, ২৩৪,
২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৫৬, ২৫৮, ৩,

৩১০, ৩১১, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪২,
৩৪৫, ৩৪৬, ৩৭৫। (৫) ২০, ৬৬, ৮০,

৮১, ১১৫, ১২৬, ১৩৪, ২৪৪, ৩৯০, ৭২৩,

৪০৯, ৪২৩, ৫৫৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৮—১৩০, ১৬৮,

৩৬৯, ৩৭৩, ৩৭৪। (২) ১৩৮, ১৫২,

১৯০, ২৪৮, ২৯৫, ৩৬৩, ৩৬৪

৬৩, ১৪৯, ১৮৯। (৪) ৩৩৩।

বিশেষ ক্রিয়া। (১) ১২৬—১২৮।

রোগকারণ। (১) ১২৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১০১—১০৩

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ১২৬

ত্রিয়াম। (এ) ৪২

চিকিৎসা। (১) ১৭০। (৩) ১৩১। ৯১

৩০২, ৩০৩, ৩৪১। (৫) ৮৫—৯৯,

৫৬, ১৮৬, ২৮৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৩৯। (এ) ৪৫

লক্ষণ। (এ) ৪১—৪৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ৪২, ৪৩।

ব্র্যাটা অরিয়েন্টেলিস। (এ) ৩০৩।

৩০৭।

চিকিৎসা। (এ) ৩০৭।

ভায়লা ওডরেটা।

সন্ধিবাত। (১) ১৪৪।

ভাইবার্গাম অপুলাস। (এ) ৪৩৩।

৪৩৪।

চিকিৎসা। (২) ৩১১, ৩৭৪। (এ) ৩৫২,

৪৩৫, ৪৩৬।

লক্ষণ। (এ) ৪৩৪, ৪৩৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ৪৩৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ৪৩৪।

ভায়লা ট্রিকলর।

দ্রব রোগ। (এ) ৪৫৫।

ভার্সিনা হেপ্টেটা

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি। (৫) ২২৫।

। (৫) ২৪৫। ২৫১।

চিকিৎসা। (৫) ২৫২, ৪১৮।

লক্ষণ। (৫) ২৫১, ২৫২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫১।

ভিক্সা মাইনর।

চিকিৎসা। (৫) ৪২৪, ৪৫৫।

ভেরিওলিনাম।

বসন্ত রোগ। (৪) ২৮০।

ভিরেট্রাম এল্বাম। (৪) ১২৪।

উপযোগী ষাটু ইত্যাদি। (৪) ১০৬—১০৮।

চিকিৎসা। (১) ২২৭, ২২৮, ৩০৫, ৩৩৮,

৩৪৭। (২) ৪৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১৬০,

১৯৩, ৩৩৭, ৩৭৬। (৩) ১৭৫, ১৭৬,

১৯৪, ২১৯, ২৪১, ২৮৭। (৪) ৬০, ৮৫,

১৪০—১৪৯, ১৮৬, ৪৪৬। (৫) ২৭১,

৩২২, ৩৯০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১, ৩৩৪। (২)

৪০২। (৩) ১৮৯। (৪) ১৩৮—১৪০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১২৯—১৩৮।

রোগ কারণ। (৪) ১২৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১২৪—১২৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১২৯।

ভিরেট্রাম ভিরিডি।

(৫) ১৫৫, ১৬৩।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৭, ৮০, ৮১, ৯৯,

১১০, ১১১, ৩৫৩। (৪) ৫৭, ৬৩, ৮৪।

(৫) ১৬৫—১৬৮, ৪৭৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৬৫।

লক্ষণ। (৫) ১৬৪, ১৬৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৬৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৬৩, ১৬৪।

ভেঙ্কা।

(৫) ৩০৩। ৩০৬।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।

বিবরণ। (৫) ৩০৬।

ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৪।

চিকিৎসা। (২) ৩৪১, ৩৪৫। (৩) ৩৭৮

(৪) ২৪১। (৫) ২৯৬, ৪৭৭,

৪৮৪—৪৮৫।

লক্ষণ। (৫) ৪৮৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮৪

ভ্যালেরিয়ানেট অব্‌ জিঙ্ক।

শুন্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া। (২) ৩৪২, (৫) ৩১১।

মঙ্কাস্‌। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (২) ৩৪১। (৩) ১৭২, ৩৭৩।

(৫) ২৮১—২৮৩

লক্ষণ। (৫) ২৮০, ২৮১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৮০।

মাইগেল। (৫) ৩০৮। ৩১২।

চিকিৎসা। (৫) ৩১০, ৩১২।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৩১২।

মাকু'রিয়াস্‌ করসাইভাস্‌।

চিকিৎসা। (১) ১০২, ২৫০, ২৫২, ২৫৬,

২৬১, ২৬৩—২৬৭, ২৭৩। (২) ২০০।

(৩) ৩০৯, ৩১৭। (৪) ৩৯৭। (৫) ১৪,

১২৫, ১৩৯।

মাকু'রিয়াস্‌ ডালসিস্‌।

চিকিৎসা। (১) ২৪২, ২৫০, ২৬৩, ২৭১।

মাকু'রিয়াস্‌ প্রোটো-আইওডেটাস্‌।

চিকিৎসা। (১) ১৭৮, ২৫০, ২৫৬, ২৫৮,

২৫৯, ২৬০, ২৭১, ২৭২ । (৪) ৩৭৪ ।
(৫) ১৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ২৩৯ । (৪) ৩৭০ ।

মাকু'রিয়াম্ বিন্-আয়ডেটাস্ ।
চিকিৎসা । (১) ২৫০, ২৫৬—২৬০, ২৭১,
১

মাকু'রিয়াম্ ভাইবাস্ ।
চিকিৎসা । (১) ১৩৮, ১৭৭, ২৪৬, ২৫১,
২৬০, ২৬৩, ২৬৭, ২৭০ ।

মাকু'রিয়াম্ সলুবিলিস । (১) ১৮৮ ।

উপযোগী ষাত্ত্ব ইত্যাদি । (১) ১২৩—১২৭
চিকিৎসা । (১) ৪১, ৯৮, ৯৯, ১০২,
১০৮, ১৩৬, ১৫৮, ১৬২—১৬৯, ২৩৩
—২৭৩, ৩০৮, ৩৮০, ৩৮১ । (২) ৫৪
১৬, ১৪৪, ১৫৬, ২০৮, ২৬৪, ৩৭১

২৭৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৬, ৩১৭, ৪৩৮ ।
(৪) ৩৯, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৪৮, ২৮০,
৩৭৫, ৩৯৭, ৪১৪, ৪৪২, ৪৬৪ । (৫)
৩৯, ১২৫, ২৬৬, ৩১৮, ৩৪৭, ৩৫৫,
৩৫৬, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪০৯, ৪৫০, ৪৬৬,
৫০০, ৫২৩, ৫৪১, ৫৪২ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৩০—২৩৩ । (২)
১৮৮, ১৯১ । (৩) ১৪৯ । (৪) ১৮৩ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ১৯৮—২১০ ।

মাকারির প্রতিষেধক । (১) ২২২—২৩০ ।

রোগকারণ । (১) ১২৭ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি—(১) ১৮৮ ১৯০ ।

সাধারণ ক্রিয়া—(১) ১২৭, ১৯৮ ।

মার্টাস্ কয়ুনিস্ ।
বল্লাকাস । (৫) ৩১৬ ।

মিউরিয়োটিকাম্ এসিডাম্ ।

(৪) ১৭২ ।

উপযোগী ষাত্ত্ব ইত্যাদি । (৪) ১৭৩—১৭৪ ।

চিকিৎসা । (১) ২৪২, ৩৩৮ । (৪) ৩৫, ৬১,
১৬৭, ১৬৮, ১৮২—১৮৬, ৩১৩, ৫৫৩,
৩৯৮, ৪৬৩ । (৫) ১২৯ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ৩৯৬ । (৪) ১৮০—
১৮২ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ১৭৪—১৮০ ।

রোগকারণ । (৪) ১৭৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ১৭৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ১৭৪ ।

মিডরেক্‌স্ পাপু'রিয়াম্ । (৫) ২৯৫ ।

চিকিৎসা । (১) ৩০৫ । (৫) ২০৭, ৩৯৬—
৩৯৮, ৪২৯, ৫১৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৯৫ ।

মিশ্চলা ।

জরায়ু-রক্তশ্রাব । (৫) ৩৬৬ ।

মিনিয়ান্থিস্ (Menyanthes tri.)

চিকিৎসা । (১) ১২৩, ৩১৮ । (৩) ১০২ ।
(৪) ৬৭, ১১২ ।

মেলিফোলিয়াম্ । ৫ ১০০ । ১০৯ ।

চিকিৎসা । (১) ৪০ । (২) ২১৩ । (৩)
৯৭ । (৪) ১৮৫ । (৫) ১১০ ।

লক্ষণ । (৫) ১০৯, ১১০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৯ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০৯ ।

মেজিরিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (১) ২২৮ । (২) ৩১৫ । (৪) ৪৯,
১৬৮ । (৫) ২২১ ।

মেডুসা । (৫) ২২৯ । ৩০১ ।
 চিকিৎসা । (৫) ৩০১ ।
 মেডোরাইনাম । (৫) ৩১৯ । ৩২৯ ।
 চিকিৎসা । (৫) ৩৩৫—৩৩৭ ।
 প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ২৭ ।
 লক্ষণ । (৫) ৩৩১—৩৩৫ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩২৯, ৩৩০ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৩০, ৩৩১ ।
 নেক্টিস্ । (৫) ২৭৮ । ২৮৩ ।
 চিকিৎসা । (৩) ২১৪ । (৫) ২৮৪, ২৮৫, ৩০১ ।
 লক্ষণ । (৫) ২৮৩, ২৮৪ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৮৩ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৮৩ ।
 মেলিলোটাস্ । (৫) ২৩৮ । ২৪২ ।
 চিকিৎসা । (৫) ২৪৪ ।
 লক্ষণ । (৫) ২৪৩, ২৪৪ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৪৩, ২৪৩ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৪৩ ।
 ম্যাথিসিয়া কার্বনিকা । (৫)
 ৩৪২ ।
 চিকিৎসা । (১) ১৮৫ । (৩) ১৯৪, ১৯৫ ।
 (৫) ৯৬, ১৮৬, ৩৪৪—৩৪৭, ৪৩৮, ৪৭৭ ।
 লক্ষণ । (৫) ৩৪২—৩৪৪ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৪২ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৪২ ।
 ম্যাথিসিয়া ফক্ষরিকা । (৫) ৩৪২ ।
 ৩৪৭ ।
 চিকিৎসা । (২) ২৫৪ । (৩) ১৯৪ । (৫)
 ৩৪৯—৩৫২, ৫১৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৪৭, ৩৪৮ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৪৮, ৩৪৯ ।
 ম্যাথিসিয়া মিউরিগেটিকা । (৫)
 ৩৫২ । ৩৫৩ ।
 চিকিৎসা । (২) ২৬১ । (৪) ১১৯ । (৫)
 ২২০, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৮৪, ৪০৯ ।
 প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ১১০ ।
 লক্ষণ । (৫) ৩৫৩, ৩৫৪ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৫৩ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৫৩ ।
 ম্যাঙ্গ্যানাম্ ।
 চিকিৎসা । (৩) ১৭২, ৪৪৩ । (৫) ২৬ ।
 বাকা ফিলামেন্টোসা ।
 চিকিৎসা । (১) ১৪৭ । (৫) ৩৮৮ ।
 রডডেগুন্ । (৫) ৪১৩ ।
 চিকিৎসা । (২) ১৪৮ । (৩) ৭০, ৭১ ।
 (৪) ৩৩৬, ৩৪৬ । (৫) ৪১৫, ৪১৯, ৪২০ ।
 প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ২৪৭ । (৫) ৪১৪ ।
 লক্ষণ । (৫) ৪১৩, ৪১৪ ।
 সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪১৩ ।
 সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪১৩ ।
 রাকেনাস্ ।
 উদরাধান । (৩) ২৪৯, ৩৭৭ ।
 রাস্টক্সিকোডেগুন্ ।
 (৪) ৩১৫ ।
 উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ৩১৮, ৩১৯ ।
 চিকিৎসা । (১) ২৫, ২৯, ৩০, ৩৬, ৪৮, ৯০, ৯৯, ১০০, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১৩৩—১৩৬, ১৪৪, ২৪২, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮ । (২) ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৮৯, ১৯৯, ৩৪৪, ৩৭৬ । (৩) ৩৩, ৩৫, ৪২,

১৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১২১, ২৫৫, ২৭৭,
২২১, ৩৩৮, ৩৪৪, ৩৪৫, ৪৫৩, ৪৫২।
(৪) ৪০, ৪৮, ৫০, ৬১, ৬৪, ১৮৪,
১৮৫, ২০৭, ২৫৭, ৩০১, ৩১৩, ৩১৪,
৩৩২—৩৫৭, ৩২৪, ৪৪২। (৫) ১১,
২১, ৩১, ১১৬, ১৫৭, ২৪৮, ৩৮৮,
৩৯৩, ৪১৮, ৪২০, ৪১১, ৫২২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৭, ১৯, ২০, ২১,
২৩১, ৩৭৩। (২) ১২০, ২৪৭, ৩৬৬।
(৩) ২৪, ১৩৬, ১৫০, ৪৫১। (৪) ২০,
৩৩১, ৩৩২। (৫) ৪১৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৩৭।
(৪) ৩০—৩৩০।
রোগকারণ। (৪) ৩১২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩১৫—৩১৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩১২—৩২০।

রাস্ ভেনিক্যান্‌স্‌।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩২

রাস্ রেভিক্যান্‌স্‌।

চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২। (৪) ৩৩২,
৩৪৮। (৫) ১২।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৩২০।

রিয়াম। (৫) ৪৩৭।

চিকিৎসা। (৩) ২৮৪। (৫) ৩৪৫, ৪৩৮।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৭, ৪৩৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৭।

রিসিনাস্‌ কমুনিন্‌স্‌। (৫) ৫৬১।

চিকিৎসা। (৫) ৫৬৩, ৫৬৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৬২, ৫৬৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৬১।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৬১, ৫৬২।

রুটা গ্রাভিয়লেন্‌স্‌। (৫) ৪০৫।

চিকিৎসা। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ৩৬৫,
৩৬৬, ৪১৫। (৫) ৪০৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৩৪।

লক্ষণ। (৫) ৪০৫—৪০৭

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪০৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৫।

রুমেক্‌স্‌ ক্‌। (৫) ৪৩৭, ৪৩৮।

চিকিৎসা। (১) ১১০, ১১২, ১৪১, ১৪২

(৩) ৪১, ১৭৭। (৪) ১১৫, ১১৬,

২৫৮। (৫) ২৮৫, ৪৩২, ৪৪০।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৮।

রেটানিয়া।

চিকিৎসা। (১) ২৬১। (৪) ১৬২, ২১

৪১৭। (৫) ১২২, ৩৪৬।

রেড সাল্‌ফুরেট্‌ অব্‌ মার্কারি।

চিকিৎসা। (১) ২৫১। (৪) ৩২৮।

রেগাক্সলাস্‌ বাবসাম্‌।

(৫) ১। ১৭।

চিকিৎসা। (১) ১৪১। (২) ১২৩। (৩)

১২৭, ৩৭১। (৫) ১২, ১৮—২১।

লক্ষণ। (৫) ১৭, ১৮

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭, ৩৫৮

রেগাক্সলাস্‌ স্কিলিওরেটাম্‌।

(৫) ১। ৩০।

চিকিৎসা। (২) ১২৩। (৫) ৩১, ৩২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০, ৩১।

লরসিরেসাম্ ।

(হাইড্রোসায়ানিক এসিড । ,

চিকিৎসা । (১) ৭৮, ৭৯, ৮০ । (২) ১৪৭, ১৪৮ । (৩) ১৭১, ৩৭২ । (৪) ৬১, ১৮৬, ২০৬ । (৫) ৬৬, ৮৮, ২৭০, ২৭১, ১১০, ৪৪৪ ।

লাইকপাস ভার্জিনিকাস ।

চিকিৎসা । (৫) ২০১ ।

লাইকপোডিয়াম । (৩) ২২১ ।

দুপনোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ২২৪—২২৬ ।
চিকিৎসা । (১) ৯৯, ১০০, ১৭৮, ১৮৩, ৩৭৯ । (২) ৫৬, ১৪৪, ১৫৮, ১৬০, ২০৩, ২০৮, ২২১, ২৫৮, ৩০৬, ৩১৫ । (৩) ৩৭, ৩৯, ৪৫, ৯৫, ২৪০—

২০৩, ৪৫৫ । (৪) ৩৬, ৩৯, ৫৬, ৬১, ১১৬, ১৬৭, ১৭০, ২৩৬, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৯৬, ৪১৬, ৪৬৩, ৪৪৪ । (৫) ১১, ২৯, ৪১, ১০৪, ১৭৭, ১৮৬, ২৮৭, ৩১৬, ৩৮১, ৪৬৯, ৪৮৩, ৫৫৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৩ । (২) ১৩৯, ২৪৮, ৩০৪ । (৩) ২৭, ৬৪, ১৬৮, ২৩৬—২৪০, ৩৯৭ । (৪) ২০, ৪৩৭ । (৫) ৯৩ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ২২৭—২৩৬ ।

রোগকারণ । (৩) ২২৬ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ২২১—২৩৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ২২৬, ২২৭ ।

লাইনেরিয়া ।

পয়নেছ বা গণরিয়া । (৩) ৩১৫ ।

লাইসিন ।

(৫) ৩৪১ ।

চিকিৎসা । (৫) ৩৪১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ৩৭০ ।

লিডাম । (৫) ৪১৩ । ৪২০ ।

চিকিৎসা । (১) ৪০, ১৪৪ । (৩) ৭০, ১২৮, ১৩৪, ১৯৬, ৩৪৫ । (৪) ১২০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪৮ । (৫) ১০২, ২৮৪, ৪১৯, ৪২০, ৪২২—৪২৪ ।

লক্ষণ । (৫) ৪২০—৪২২ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪২০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪২০ ।

লিথিয়াম্ কার্বনিকাম্ ।

চিকিৎসা । (৪) ৪৬৩ । (৫) ৪১৯ ।

লিলিয়াম্ টাইগ্রিনাম্

(৭) ১৯২ । ২০২ ।

চিকিৎসা । (২) ২৬৪, ৩০২, ৩১২, ৩১৩ ।

(৩) ২১৬ । (৫) ৯৬, ১৫৯, ১৯২, ২০৫—২০৮, ২২৭, ২৯৮ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯২ । (২) ১৮৪ ।

লক্ষণ । (৫) ২০৩—২০৫ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২০২, ২০৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২০৩ ।

লেপ্টোগু । (৫) ২৪৫ । ২৫২ ।

চিকিৎসা । (১) ২৬১ । (৫) ২৫৩, ২৫৪ ।

লক্ষণ । (৫) ২৫৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৫২, ২৫৩ ।

লবেলিয়া ইনফ্রেটা ।

(৫) ৪৯৩ ।

চিকিৎসা । (২) ৩৮৯ । (৫) ৪৯৪ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ৩৮২ । (৫) ৪৯৩, ৪৯৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৯৩ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৫৮, ৪৯৩ ।

লবেলিয়া সিফিলিটিকা

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৬৮ ।

ল্যাক্‌কেনিম্।

(এ) ২৭৮। ২৮৫।

চিকিৎসা। (১) ১৭৮। (২) ২১৭। (৩)
৩০৯। (৪) ২৯, ৩৯, ৩০৬, ৩০৭।
(এ) ২৮৬—২৮৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ২৮৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ২৮৫, ২৮৬।

ল্যাক্‌ডিক্লোরেটম্।

(এ) ২৭৮। ২৮৮।

চিকিৎসা। (১) ২১৭। (এ) ২৮৮, ২৯০—
২৯১, ৩৪০।

লক্ষণ। (এ) ২৮৯, ২৯০।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ২৮৮, ২৮৯।

ল্যাক্‌সিস্। (৪) ১।

ঔপযোগী ষাভু ইত্যাদি। (৪) ৩—৫।

চিকিৎসা। (১) ৯০, ৯৯, ১০২, ১০৭,
১১০, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১৩৯, ১৭৮,
২৯৬, ২৯৯, ৩৩৮। (২) ৫৬, ৫৭, ৭৮,
৮১, ৮৯, ৯১, ২১৮, ২৬০। (৩) ৪০,
৪২, ১০৬, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৭২,
২৪৪, ২৪৭, ২৫৫, ৩৪২, ৩৭০, ৩৮০,
৪০১। (৪) ৩১—৬৪, ৮৩, ১১৩,
১৪২, ৩০৬, ৩০৯, ৩১৩, ৩১৪, ৩৪২,
৩৪৫, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৯২।

(এ) ৪০, ৬৬, ৭৮, ১৪৩, ২৭৪, ২৭৬,
২৭৭, ২৮৬, ৩২৫, ৩১৭, ৪৭৬, ৪৭৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩, ৩৩৩। (২)
১৩৯, ৩৮৯, ২৯০। (৩) ৯১, ৪৩৪।
(৪) ১৮—২১, ১৮১, ১৯৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ২২৮। (৪) ৬-১৮।

রোগকারণ। (৪) ৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১—৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৬।

ল্যাক্টিকা ভিরোসা।

(এ) ১০০। ১০৮।

চিকিৎসা। (৪) ৩৭৬। (এ) ১০৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ১০৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ১০৮।

ষ্টিক্টা পালমনেরিয়া।

চিকিৎসা। (১) ২৫৬, ৩৪৫, ৩৭০।

(৩) ১৭৬, ৪৫৫। (৪) ২৫৮। (এ)
১৭৫, ২৮৫।

ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস্। (এ) ৪৫৬।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা। (এ) ৪৫৬,
৪৫৭।

ষ্টিলিজিয়া। (এ) ৪২৫। ৪৩০।

চিকিৎসা। (এ) ২৯, ৩৩১। (২) ২২৯।

লক্ষণ। (এ) ৪৩১, ৪৩২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ৪৩০।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ৪৩০, ৪৩১।

ষ্টেনাম্।

চিকিৎসা। (১) ৩৫২, ৪০৬। (৩) ৩০,
১৯১, ২১৬। (এ) ২৯৪, ৫২৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮৯। (৪) ২৩৯।

ষ্ট্যান্টিসেপ্টিয়া। (এ) ১। ২১।

চিকিৎসা। (১) ৩৪। (২) ১৪৮, ১৬২,
২১০। (৩) ৪৫, ১৩৪, ১৯৫, ২১৫,
২১৯। (৪) ৩৫, ২৮০, ৩৩৬। (এ)

২৬—৩০, ২১৫, ৪২৪, ৫০০, ৫২৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৩০, ৩৫৭, ৩৯৪।

(৩) ১৩০। (এ) ২৬।

লক্ষণ। (এ) ২২—২৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ২২।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ২২।

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত কার্বনিকাম্ ।

চিকিৎসা । (২) ৩৪৪ । (৪) ৫৭, ১১২ ।
(৫) ৩০, ২২১, ৩২৪ ।

ব্রহ্মসিদ্ধান্তম্ ।

চিকিৎসা । (৪) ২০৪ । (৫) ২০২ ।

ব্রহ্মসিদ্ধান্তম্ ।

চিকিৎসা । (৩) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৬২ ।
(৫) ২৩৪, ২৭০, ৪২৭, ৫৫০ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১০২ ।

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত কৰ্ম্মফরিকাম্ ।

চিকিৎসা । (৫) ১৩৩, ৩১১ ।

ব্রহ্মসিদ্ধান্তম্ । (১) ২৭৪ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (১) ২৭৭—২৮১ ।

চিকিৎসা । (১) ৭৩, ৭৪, ৭৮—৮২, ২৯৪—

৩০২, ৩৩৩—৩৩৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১—

৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৬—৩৪৪, ৩৪৭—৩৫০,

৩৫৩, ৩৯১, ৩৯৫ । (২) ৫০, ৩৩২ ।

(৩) ২১১, ২৪১, ২৫৩, ৩৭৮, ৩৮০ ।

(৪) ২৭, ৬৩, ১৪২, ২০৭, ২৭৬ ।

(৫) ৩৪২, ৩৮৮, ৩৯৩ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৯১—৩২৪, ৩৪১,

৩৩২, ৩৩৩, ৩৯১ । (২) ১৩৩ । (৩)

৩৬৪ । (৪) ২১ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ২৮২—৩৯০ ।

রোগকারণ । (১) ২৮১ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ২৭৪—৩৭৬ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (১) ২৮১, ২৮২ ।

সাইকুটা ভিরোসা । (৫) ২১১ । ২৩১ ।

চিকিৎসা । (১) ৩৫৮ । (২) ১৪১, ৩৪৭ ।

৪০৬ । (৩) ২১২ । (৪) ৩০০ । (৫)

১৬৬, ২৩৪, ২৩৫, ৩৬২, ৩৯৩ ।

লক্ষণ । ২৩২, ২৩৩ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩১ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৩১, ২৩২ ।

সাইক্রেমেন ।

চিকিৎসা । (২) ২০১, ২১১, ১০২ ।

(৩) ৯৭, ১০৬ ।

সায়ানাইড অব্ মার্কারি ।

চিকিৎসা । (১) ২৫৮ । (৪) ১৮৬ । (৫)

৪৪৪ ।

সিলিসিয়া । (৪) ৯৩ ।

(সিলিকন ।)

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ৯৫—৯৭ ।

চিকিৎসা । (১) ১৬১, ১৬৮, ২৪৫, ২৪৬,

২৪৮, ২৬৩, ৩০৮ । (২) ১৪৪, ২৪৯,

৩৩০ । (৩) ২৪, ২৫০, ২৭৬, ২৮১,

২৮২, ৩৪৪, ৪৩৮, ৪৫৭ । (৪) ৩৬,

১১১—১২৩, ২৫৪, ২৫৫, ৩৭১, ৪১৭,

৪১৮, ৪১৯ । (৫) ১৯, ৭১, ১৭৮, ১৮৮,

২৬৬, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৫, ৪৩৩,

৪৪০, ৫০০ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯২ । (৪) ১০৮—

১১১ । (৫) ৪১৪ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ৯৮—১০৮ ।

রোগকারণ । (৪) ৯৭ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ৯৩—৯৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ৯৭, ৯৮ ।

সার্সা পেরিলা । (৫) ৪৮২ ।

চিকিৎসা । (৩) ২৫২, ৩১৮ । (৪) ৩৭৮ ।

(৫) ১০৪, ৪৮৩ ।

লক্ষণ। (এ) ৪৮২, ৪৮৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ৪৮২।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ৪৮২।

সালফার। (৩) ১।

উপযোগী বাতু ইত্যাদি। (৩) ৩-৭।
চিকিৎসা। (১) ৩০, ৩১, ৮০, ৮৩, ৮৫,
৯৮, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১৩৭, ১৩৯,
১৫৮, ১৬১, ১৭৩—১৭৬, ২৪৬, ৩০৮।
(২) ৫০, ৮৪, ৯০, ১৪২, ১৪৬, ১৫৬—
১৫৯, ১৯২, ২০৭, ২১৫, ২১৬, ২৪৯,
৩০০, ৩০৯, ৩৬৪। (৩) ৩৮—৫২,
১০৫, ১৭০, ২০৩, ২৪১, ২৪৭, ২৪৯,
৩৭২—২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩,
৩৮৮, ২৮৯, ৩১০, ৩১৮, ৩২৬, ৩৩৬,
৩৪৪, ৩৬৫, ৪০০; ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০,
৪৪১। (৪) ৩১, ৬৩, ৭৯, ১২১, ১২৩,
১৭০, ২১৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৪,
৩০৩, ৩০৪, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩৫০,
৩৭৩, ৩৯৭, ৪১৪, ৪১৯। (এ) ৭, ৭৮,
১৭৭, ১৮৮, ১৯৮, ২০৬, ১১৬, ১২৮,
১৮১, ৪৪৪, ৪৬৫, ৪৭৫, ৫০২, ৫৪৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩। (২) ৪৭, ১৩৮,
২৮৯, ২৯৪। (৩) ২৪—২৭, ১৪৯,
১৫০, ২৭১, ৩৬৫, ৪৩০—৪৩৪। (৪)
১১১, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৬, ৪১২।
(এ) ৩৩৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৫৮। (৩) ৯—
১৪, ৪৩৬।

রোগকারণ। (৩) ৭, ৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১—৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৮, ৯।

সালফুরিক এসিড। (এ) ৫৪৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৮৯।

লক্ষণ ও চিকিৎসা। (২) ৩৩৫। (৩) ১৩৫,
৩৪৪, ৩৭১, ৪০৩। (৪) ৩৬, ৫৯, ১৮৬,
৩৩৩, ৩৪৫। (এ) ৮৯, ৩২২, ৩৩৯,
৫৪৫, ৫৬৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (এ) ৫৪৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ৫৪৫।

সিকেলি কল্লুয়েটাম্।

(এ) ৩৫৭; ৩৬৮।

চিকিৎসা। (১) ৬৩, ৬৪, ৯১। (৩) ২৭,
১১৮, ১১৯। (৪) ৫৫, ১৪৫, ২৩৬।
(এ) ৫৯, ৭৯, ২৭১, ৩৩৭, ৩৬৫, ৩৬৮,
৩৭৩—৩৭৬, ৪৩০, ৪৮৯, ৫৪৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৭। (এ) ৩৭২।

লক্ষণ। (এ) ১৭০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। ৩৬৮, ৩৬৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (এ) ৩৬৯, ৩৭০।

সিকনা। (৩) ৭৩।

(চায়না।)

উপযোগী বাতু ইত্যাদি। (৩) ৭৩—৭৭।

চিকিৎসা। (১) ৪৮, ৭০, ১০০, ২০৬। (২)
৫১, ৫৮, ৬০, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩,
৭৯, ৮৮, ৯১। (৩) ৪০, ৭৮—৮১,
৯২—১০৮, ২০৩, ২০৪, ২৩৬, ২৩৭,
২৭৫, ৩১৯, ৪০৩, ৪১১, ৪৩৫,
। (৪) ২৩, ৪১, ৪২, ৫৫,
১৮৫, ১৯১, ২০২, ২০৫, ২৩৪, ২৯৭,
৩৩৩, ৩৫০, ৩৯১, ৪১৬, ৪৩৭।
(এ) ১৫২, ১৮৫, ৩৮৮, ৪৫৫, ৫১৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬০। (২) ১৩৩,
১৩৪, ২৪৫। (৩) ৮৯—৯১, ১২৫,
১৯৭। (৪) ২২৭, ৪৩৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৭৮—৮৯।

রোগকারণ। (৩) ৭৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৭৩—৭৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৭৭, ৭৮।

সিড্রন। (৫) ৫৫৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১। (৫) ৫৫৮।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা। (২) ৫২

(৩) ৯৩, ৯৯। (৫) ৫১০, ৫৪৭, ৫৫৮।

সিনা—স্ট্রাটোনাইন্স।

(২) ৩৯৪।

উপযোগী ষাত্তু ইত্যাদি। ৩৯৬।

চিকিৎসা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৫৪,

২৫৭, ২৫৮, ৩৪৮, ৩৮৯, ৪০৪, ৪১০।

(৪) ৩৯১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩১, ৩৬৪, ৪০২,

৪০৪।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৯৭—৪০২।

রোগ কারণ। (২) ৩৯৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। ৩৯৪, ৩৯৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৯৬, ৩৯৭।

সিনাথেরিস্।

চিকিৎসা। (১) ২৫৩, ২৭৩।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ২৬৬।

সিনামমাম্। (৫) ৪৪১, ৪৪৫।

চিকিৎসা। (৩) ১০৬। (৫) ২৬০, ৪৪৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৫।

সিনিসিয় অরিয়াম্।

(৫) ১০০, ১১০।

চিকিৎসা। (২) ২১৩। (৫) ১১১, ১১২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১১১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১০।

সিপিয়া। (২) ২৬৮।

উপযোগী ষাত্তু আদি। (২) ২৭০, ২৭৪।

চিকিৎসা। (১) ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ১৪২,

১৬৩, ১৯৫, ১৯৭, ২০৯, ২৫৮, ২৬১,

২৬৪, ২৯৬—৩১৫। (৩) ৪৬, ৫২,

২৫১, ২৫২, ২৫৭, ৩৪২, ৩৭০, ৩৯৯,

৪৪০। (৪) ২৭, ৮৩, ১৬৪, ২৪৯, ৩১৪,

৩৯৯, ৩৯৫, ৪৬২। (৫) ৬, ৩৫, ৭৮,

১৩৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৯, ১৯৯, ২০৬,

২০৭, ২০৮, ২২৮, ২৬০, ২৯৭, ২৯৮,

৩১০, ৩৪৭, ৪০৪, ৪৩৬, ৫০২, ৫২৪,

৫২৫, ৫৩০, ৫৩৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৮৮—২৯৬। (৩)

২৭, ৯০। (৪) ১৯, ১৬৪, ২২৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ২৭৫—২৮৮।

রোগ কারণ। ২৭৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ২৬৮—২৭০।

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ২৭৪, ২৭৫।

সিকিলিনাম্। (৫) ৩১৯, ৩৩৭

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩৩৯।

রোগ ইত্যাদি। (৫) ৩৩৯—৩৪১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৩৭, ৩৩৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৩৮, ৩৩৯।

সিমেক্‌স্‌ ল্যাঙ্কুলেরিয়াম্।

(৫) ৩০৩। ৩০৫।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৫, ৩০৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩০৫।

সিন্ফাইটাম্।

চিকিৎসা। (৩) ১৩৫। (৫) ১৮৮।

সিগ্নানথাস্ আমেরিকানাস্।

দীহারোগ। (৩) ১০৫।

সিলিনিয়াম্ ।

চিকিৎসা । (৩) ৩০, ৪০, ৪৫, ৩৪১ ।
(৪) ৪৪৩ । (৫) ৪৬২, ৪৮২, ৫৩৭ ।

সিলেপিস্ নাইট্রো ।

কুমিরোগ । (২) ৪১০ ।

সুইট স্পিরিট অব্ নাইটার ।

টাইকয়েড ফিবার । (৪) ২০৭ ।

সেনেগা ।

চিকিৎসা । (১) ১৪১, ১৪২ । (২) ৩৪৪ ।
(৩) ৪০০, ৪০১, ৪৫৫ । (৫) ১২, ৩২৪ ।

সোরিনাম । (৩) ৪১৫ ।

উপবোনী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৪১৫—৪১৮ ।

চিকিৎসা । (৩) ৩০, ৩৪, ২০৩, ২০৪, ২৭৫,
৩৭৮, ৪৩৫—৪৫১ । (৪) ২০৬, ৩৭১ ।
(৫) ১২, ১০৪, ৩৩১ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৬১, ৩৩২ । (৩) ২৫,
২৬, ৪৩০—৪৩৫ । (৪) ১১১ ।
(৫) ৩৩২ ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ (১) ১৫২ । (৩) ২০৩,
২০৪, ৪২১—৪৩০ ।

রোগকারণ । (৩) ৪১৮, ৪১৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৪১৫ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৪১৯ ।

সোলেনাম কেরো ।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সিসি । (৫) ৪১৫ ।

সুইলা, সিলা ম্যারিটীমা ।

(৫) ১২২, ২০৯ ।

চিকিৎসা । (৩) ১৭১, ৪০১ । (৪) ২০৪ ।
(৫) ২১০ ।

লক্ষণ । (৫) ২০২, ২১০ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২০২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২০২ ।

স্পঞ্জিয়া । (৫) ৫৯৯ ।

চিকিৎসা । (১) ৪০, ১৭১ । (২) ২১০ ।

(৫) ৬৬, ৬৭ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৬৩ ।

লক্ষণ । (৫) ৬০—৬৩ ।

। (৫) ৫২, ৬০ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৬০ ।

স্পাইঞ্জিলিয়া । (৫) ৩৯৭ ।

চিকিৎসা । (১) ২৬ । (২) ১২৩, ২০২,

৪১০ । (৩) ৬৫, ১২০ । (৪) ৩৭৫, ৩৩৩ ।

(৫) ৫৭, ৫২, ৬৬, ৪০০—৪০৩ ।

লক্ষণ । (৫) ৩২৮, ৩২৯ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৯৭ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৯৭, ৩২৮ ।

স্পার্টিন সাল্ফেট ।

কুমিরোগ । (৫) ২০২ ।

স্ট্রাকেরাম অক্সিগ্যালিস্ ।

চক্ষুরোগ । (৩) ২৭৭ ।

স্ট্রাঙ্কুইনেরিয়া । (৫) ৪৭২ ।

চিকিৎসা । (১) ৭০, ৭১, ১৪১ । (২) ২২৮,

৩৩৬ । (৩) ৩৭, ২৪, ১৭৫, ২২০, ৩৩৯,

৪৫৪ । (৫) ১৬৭, ২৮৭, ৩৪২, ৪০০,

৪৭৪—৪৭৮, ৪৮৫ ।

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ১৯ ।

লক্ষণ । (৫) ৪৭২—৪৭৪ ।

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৭২ ।

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৭২ ।

স্ট্রাঙ্কুইনেরিয়া নাইট্রেট ।

চিকিৎসা । (৪) ১৬৯ । (৫) ৩৫০ ।

শ্রানিকুলা।

চিকিৎসা। (৪) ১১১। (৫) ১০৪।

শ্রাবাইনা। (৫) ২৫৭। ২৫৮।

চিকিৎসা। (৩) ২৭। (৫) ২৬, ২৫২—
২৬১, ৩৬৫, ৩৪৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ২৫৭।

লক্ষণ। (৫) ২৫৮, ২৫৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৭।

শ্রাবাডিলা। (৫) ১৫৫। ১৬০।

চিকিৎসা। (২) ৪১০। (৫) ১৬২, ১৬৩,
৪০২।

লক্ষণ। (৫) ১৫৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৫৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৫৫।

শ্রাষুকাস্। (৫) ৪৩৩।

চিকিৎসা। (১) ৪০। (২) ৩৭০। (৪)
৩০২। (৫) ৪৬, ৬৪, ৪৩৪।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৩।

শ্রালিসিলিক এসিড।

চিকিৎসা। (৩) ৩৩৯। (৪) ৩৬।

হাইড্রকোটাইল।

(৫) ২১১। ২৩৫।

লক্ষণ। (৫) ২৩৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৫।

হাইড্রফবিনাম।

(৫) ৩১৯। ৩৪১।

হাইড্রোজিনিয়া।

পুষ্টিমেহ। (৩) ৩১৮।

হাইড্রোপিস্ ক্যানাডেনসিস্।

(৫) ১। ৩২।

চিকিৎসা। (২) ১৫৯, ১৯৮, ২০২, ৩০৫।

(৩) ২৪, ৪০, ৪৬, ৯৬—গ। (৪) ২৮০।

(৫) ৩৫, ৩৬, ১০৭, ৪৬১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৩৬৯।

লক্ষণ। (৫) ৩৩—৩৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩২, ৩৩।

হাইপেরিকাম্।

চিকিৎসা। (৩) ১৩৫। (৪) ৩৩৬। (৫)
১৬৬, ৩৫০, ৪২৪।

হায়সায়ামাস্। (১) ৩১০।

উপযোগী ষাডু আদি। (১) ৩১৩—৩১৫।

চিকিৎসা। (২) ৪৬, ৭৪, ৭৬—৮০, ৮২,

৯০, ১১৫, ১১৭, ১৩৪, ১৭৯, ২২৭,

২৯৯, ৩০০, ৩৩৪—৩৩৫। (২) ৩৩৮,

৩৩৯। (৩) ১৩৭, ৩১৬, ৩৮০, (৪)

২৭, ৫৯, ১৪২, ২৪৫, ৩৫২। (৫) ১৫১,

১৭৫, ৩০৭, ৩৯৩, ৫২৩, ৫৪১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২২১, ৩৩১—৩৩৪।

(৩) ৩৬৪। (৪) ২১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৩১৫—৩৩১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ৩১০—৩১৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৩১৫।

হিপমেন্স। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (৫) ২৮০।

লক্ষণ। (৫) ২৮০।

হিপার সাল্ফার।

ঔষোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ১৫৩—১৫৬।

চিকিৎসা। (১) ২৩, ৪০, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ৯৯, ১০৮, ১৬১—১৮৭, ২২৩, —২২৫, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮, ২৫৭, ৩০৮। (২)

২৬০, ৩৪৫। (৩) ১৭১, ২৭৬, ৩৩৬, ৪৩৮। (৪) ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৫৬, ১১৭, ১২২, ১২৩, ১৬৮, ৩০৪, ৩৭৩, ৩৭৫, ৪১৪। (৫) ৪৭, ৫৬, ৬৬, ৮০, ১৭৭, ২৬৬, ৪৩৮, ৪২২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০, ১৬০, ১৬১, ৩৯২। (৩) ৩৩৪, ৪৩৪। (৪) ১১০, ৪৬১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৫৭—১৬০। (৩) ২৪।

রোগকারণ। (১) ১৫৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১৫৬, ১৫৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ১৫৬, ১৫৭।

হেমমেগিস্ট। (৫) ৪৬৩।

চিকিৎসা। (২) ২১০, ২১৩, ২১৫, ২১৬।

(৩) ৪২, ৯৭, ১২৮, ১২৯। (৪) ৬২, ১৮৫, ২৭৮, ২৭৯। (৫) ১১, ৬৭, ১০৭, ৩৪৭, ৩৬৫, ৩৮৮, ৪৬৪—৪৬৬ ৫৪৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৪৬৪।

লক্ষণ। (৫) ৪৬৩, ৪৬৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৬৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৬৩।

হেলিবোরাস্ট। (৫) ১। ৩৬।

চিকিৎসা। (১) ১৩৭। (৪) ৩৬, ৫২, ২২৯।

(৫) ৩৮—৪১, ৩২৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৭।

লক্ষণ। (৫) ৩৭, ৩৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৭।

হেলোনিয়াস্ট। (৫) ১৫৫।

চিকিৎসা। (৫) ১৫৭—১৬০, ২২১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫৬।

লক্ষণ। (৫) ১৫৫, ১৫৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৫৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৫৫।

চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট

১। অস্থি এবং অস্থি-সংস্ফট রোগ।

১। অস্থি-অর্কুদ বা এক্জণ্টসিস্ অব দি বোন্‌স্‌।

অরাম (৪) ৪৬৮।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৮।
কেলি আয়ডি। (৫) ১০৭।
ক্যাক্‌রিয়া কার্ব। (৫) ৭১।
ষ্ট্রিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।
সিগ্‌লিনাম। (৫) ৩৪১।

ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ১২০, ২০৫, ৩০৬।
ফ্লুরিক এসিড। (৫) ৭১।
মাকু'রিয়াম্‌। (৫) ২৯।
লাইকপোডিয়াম। (৫) ৩১৬।
ষ্ট্রিলিঞ্জিয়া। (৫) ৩৯, ২২১, ৪৩২।
ষ্ট্রাক্সিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
ট্রুন্‌সিয়ানা কার্ব। (৫) ৩০, ২২১।
ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৯, ১২০, ২৫৪, ২৫৫।
(৫) ৭১।

২। অস্থি ও অস্থিবেষ্ট ক্লিসিসংস্ফট

নানাবিধ রোগ।—বাল্যস্থিবিহার বা রেকাইটিস্‌ ইত্যাদি, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ বা পেরি-অস্টাইটিস্‌, অস্থি-কৃত বা কেরিজ এবং অস্থি-ধ্বংস বা মিক্রোসিস্‌ অব দি বোন্‌স্‌ প্রভৃতি।

অরাম (৪) ৪৬৫, ৪৬৮। (৫) ৩৬৬।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৮।
এরানিয়া ডায়াডেমা। (৫) ৩১৮।
এসাকিটিড। (৫) ২২১।
কেলি হাই। (৫) ২৯, ১০৭।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৫, ২৬৬।
ক্যাক্‌রিয়া কার্ব। (৩) ৩৯১। (৪) ১০০।
(৫) ৩১৬।
ক্যাক্‌রিয়া ফস্‌। (৫) ১৮৮।
ক্যাক্‌রিয়া ফ্লুর। (৩) ২৯১। (৫) ১৮৯।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৬।
নাইট্রিক এসিড। (৫) ২৬৬।
পাইনাস সিল্‌। (৩) ২৯১।
ব্র্যাটিনাম। (৫) ৩০।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৫৪, ২৫৫।

সার্মাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (৪) ৩৫৫। (৫) ১৮৮, ৩১৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিফাইটাম। (৫) ১৮৮।

২। কর্ণ এবং কর্ণ-সংস্ফট রোগ।

১। ইউষ্টেচিয়ান টিউব্‌ ও কর্ণের সর্দি। (৫) ৫১৮।

২। কর্ণশূল, কর্ণ-প্রদাহ এবং অটরিয়া বা কানপাকা প্রভৃতি।

অরাম্‌। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬৪।
আয়ডিয়াম। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫।
আর্সেনিকাম্‌। (২) ৫৩, ৭৮।
ইল্যাপস্‌। (৫) ২৭৭।
একনাইট। (২) ১৯৮, ৩৬৯।
কার্ব এনি। (১) ২৪৯।

কার্বন ভেজ। (১) ২৪৮। (৪) ৪১৫।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৫, ২৬৬।
ক্যামিনা। (১) ২৪, ১৬৬। (২) ১২৮,
৩৩৯।

কেলি ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
কেলি বাই-ক্রমিকাম। (৩) ২৭৬। (৪)
৩৭২, ৪৬৪

ক্যাকেরিয়া আর। (৫) ১২০।
ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৫, ২৭৬। (৪)
৪৬৪

ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।
ক্রটেলাস্। (৫) ২৭৭।
গ্রাফাইটিস্। (৪) ৪১৫।
টেলুরিয়াম্। (১) ২৪।
ডাল্‌কামরা। (২) ৩৬৯। (৩) ৪৫৪।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬৪।
পাল্মেটোলা। (১) ১৬৬। (২) ১২৭।
(৫) ৫১৮।

প্ল্যাণ্টেগো। (২) ১২৮।
ফেরান ফস্‌ফরিকাম্। (৫) ৫১৮।
বেলোডনা। (১) ২৩, ২৪, ১৬৬। (২)
১২৮।

বয়াক্‌স্। (২) ৩৬৯। (৫) ৪১৮।
ব্যারাইটা কার্বনিকা। (৪) ৪৬৪।
মাকু রিয়াস্। (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬, ৪৩৮।
(৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৬।

ম্যাগ্নিসিয়া ফস্। (৫) ৫১৯।
ল্যাকেসিস্। (৫) ২৭৭।
সাইলিসিয়া। (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬।
(৪) ১১৫। (৫) ২৬৬।

সাল্‌ফার। (৩) ৩৪, ৪৩৮।
সরিগাম। (৩) ৩৪।
স্ট্রুইনেরিয়া। (৩) ৪৫৪। (৫) ৪৭৮।
হাইড্রাটিস্। (২) ১২৮।
হিপার সাল্‌ফার। (১) ২৪, ১৬৬, ৪৪৮।
(৩) ২৭৬, ৪৩৮। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৬।

৩। কর্ণ থইল।
কনায়াম। (৪) ২৮।

৪। কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম।

আর্গিকা। (৩) ৩৩৯।
কনায়াম। (৪) ২৮।
কটিকাম। (৩) ৩৩৯।
কার্বন বাইসাল্‌ফ্। (৩) ৩৩৯।
ক্রটেলাস্। (৪) ২৮।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৯।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৩৩৯।
স্ট্রুইনেরিয়া। (৩) ৩৩৯।
স্ট্রালিমিলিক এসিড। (৩) ৩৩৯।
হিপার সাল্‌ফার। (৪) ২৮।

৫। বধিরতা, ডেফেন্স্ অব হিয়ারিং

এবং কর্ণরোধ।

আয়ডিন। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫।
আর্গিকা। (৩) ৩৩৯।
ইগ্রেসিয়া। (৪) ২৪০।
কার্বন বাই-সাল্‌ফ্। (৩) ৩৩৯।
ক্রটেলাস্। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস্। (৪) ৪১৫।
চেনোপোডিয়াম। (৩) ৩৩৯।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৪০।
স্ট্রালিমিলিক এসিড। (৩) ৩৩৯।

৩। গ্রাঙ্স্থ এবং গ্রাঙ্স্থি-সংস্ফট

রোগ।

১। অণুকোষ গ্রাঙ্স্থিরোগ।

(পুং জননেন্দ্রিয়রোগ দেখ।)

২। ওভারি-গ্রাঙ্স্থি-রোগ

(স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ দেখ।)

৩। কর্ণমূলগ্রহি বা প্যারটিউ প্রাণ্ড-

প্রদাহ, প্যারটাইটিস বা মাল্পস্

অরাম। (৪) ৪৬৫। (৫) ১৫, ২২৭।

কনারাম। (৫) ২২৭।

ক্যাক্ কার্ক। (৪) ৩৪২।

ক্রিমিটিস ইরেস্ট। (৫) ২২৭।

জাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

পাল্‌সেটিল। (২) ২০৩। (৫) ১০২।

নেলাডনা। (১) ৯৬।

মাকু'রিয়ান্। (১) ২৫৫।

রাস্টকস। (৪) ৩৪১, ৩৪২।

লাইকপোডিয়ারাম। (৪) ৩৪২।

লাকেসিস্। (৪) ৩৪২।

সাইলিসিয়া। (৩) ২৮২, ৩৪৪। (৪) ১১৮,
১১৯, ৪১২

সাল্‌ফার। (৩) ৪৭, ৪৮, ২৮২, ৩৪৪।
(৪) ৪১২।

সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৩৪৪।

৫। গলগণ্ডরোগ বা গয়টার।

আয়ডিন। (৫) ৫৭।

এপিস। (৩) ২৮২।

ক্যাক্ কার্ক। (৩) ২৮২।

ব্রোমিন। (৫) ৪৮।

সাইলিসিয়া। (৩) ২৮২।

স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৭।

৪। গণ্ডমালা-রোগ বা ক্রফুলা।

আয়ডিন। (৪) ১১২। (৪) ৫৭, ৫৮।

আয়ডফরম্। (৪) ১১২।

আর্সেনিকাম আয়। (৫) ৫৮।

কষ্টিকাম। (৩) ২৮২, ৩৪৩।

কার্ক এনি। (৫) ৪৮।

ক্যাক্ আয়ডেটাম। (৫) ৫৮।

ক্যাক্ কার্ক। (৩) ৪৭, ৪৮, ২৮৮।

(৪) ৪১২।

ক্যাক্ ফস্। (৩) ২৮২।

গ্র্যাফাইটিস। (৩) ২৮২। (৪) ৪১২।

থুজা। (৪) ২৭২।

ফস্‌ফরাস। (৩) ৩০১।

ফেরাম। (৪) ৪১২।

ফেরাম আই। (৫) ৫৮, ৫১৭।

ব্যারাইটা আই। (৫) ৫৮। (৫) ১৭৭।

ব্যারাইটা কার্ক। (৩) ২৮২।

ব্রোমিন। (৪) ১১২। (৫) ৪৮।

মার্ক সল। (১) ২১৭।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৩) ২৮২। (৪) ১১২।

দি ম্যাগুস্।

এলুমিনা। (৩) ৪১৩। (৫) ৮১।

কার্ক এনি। (৩) ৪১৩। (৫) ৪৮, ৩০২,
৫১০।

কার্ক ভেজ। (৩) ৪১৩।

কনারাম। (৫) ২২৮, ২২৯।

ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩।

ক্যাক্‌রিয়া। (১) ২৪৬। (৪) ৪১২।

ক্যাক্ আই। (৫) ১২০।

ক্রিমিটিস্। (৫) ২২৭।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১২।

জাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

ফাইটলেকা। (৫) ৪২৭, ৪২৮।

ফেরাম। (৪) ৪১২।

ফেরাম কস। (৫) ৫১২।

ব্যাডিয়াগা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।

ব্যারাইটা আই। (৫) ১৭৭।

ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৬, ১৭৭।

ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৭।

ব্রোমিন। (৫) ৪৮।

মার্ক ভাইভাস। (১) ২৪৬।
 মার্কু রিয়াস। (১) ২৪৬, ২৪৭।
 সাইলিসিয়া। (১) ২৪৬। (৪) ১১২, ৪১২।
 সাল্ফার। (১) ২৪৬, ২৪৭। (৪) ৪১২।
 (৫) ১৭৭।
 স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৭।

৭। টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ বা
 টনসিলাইটিস্।

অরাম। (৪) ৪৬৫।
 ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫। (৫) ১৭৬, ৪২৮।
 এপিস মেল। (১) ২৮। (৪) ৩০৫।
 এমন মিউ। (৫) ২৪।
 ককুলাস ভিসি। (৫) ১৭৬।
 কনাগ্রাম। (৫) ১৭৭।
 ক্যাকেরিয়া আই। (৫) ১৭৭, ১৮৬।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৫) ১৭৬।
 ক্যাকেরিয়া ফস্। (৫) ১৭৬, ১৮৬।
 ক্যাকেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১২১।
 ফাইটলেকা। (৫) ৪২৭, ৪২৮।
 ফেরাম ফস। (৫) ১৮৬।
 বেলাডোনা। (১) ২৬—২২, ২৫৬, ২৫৭।
 (৪) ৩০৬। (৫) ১৭৬।
 ব্যারাইটা আই। (৫) ১৭৬।
 ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৬, ১৭৭, ১৮৬।
 ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৬, ১৭৭।
 ব্রোমিন। (৫) ১৮৬।
 মার্ক বিন-আই। (১) ২৫৭।
 মার্কু রিয়াস। (১) ২৮, ২২, ২৫৭।
 (৪) ৩৭।
 লাইকোপোডিগ্রাম। (১) ২২। (৫) ১৭৭,
 ১৮৬।
 ল্যাকেসিস্। (১) ২২। (৪) ৩৭।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১৭।
 সাল্ফার। (১) ২৮।

হিপার সাল্ফ। (১) ২৮, ২২, ২৫৭।
 (৪) ১১৭। (৫) ১৭৭।

৮। টেব্‌স মেমেটারিকা বা অস্থ-
 বেষ্ঠ-বিল্লি-গণ্ডমালা।

আইওডিন। (৫) ১৭৮।
 ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৭, ১৭৮।
 সাইলিসিয়া। (৫) ১৭৮।

৯। প্রুটেটগ্রন্থিরোগ।

(পুং জননেত্রিয় রোগ দেখ।)

১০। বাঘী বা বিউবো।

(রতিজ বা ভিনিরিয়েল রোগ দেখ।)

১১। লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফাটিক
 গ্যাণ্ডের প্রদাহ।

এপিস। (৩) ২৮২।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৮২।
 বাকোরেনা। (৫) ২২৪।
 মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
 সাইলিসিয়া। (৩) ২৮২।
 সাল্ফার। (৩) ২৮২।
 মার্কু রিয়াস। (১) ২২৭।
 সাল্কুরেটেড্ হাইড্রজেন। (৫) ৪২।

৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেক্
 অব্ দি আইজ্।

১। অঞ্জনিকা, আজনাই বা ষ্টাইট।
 ইউফ্রেসিয়া। (১) ১৬৬।
 গ্র্যান্ফাইটিস্। (৪) ৪১৩।
 পাল্‌সেটলা। (২) ১২৮, ১২২।
 ফস্ফরাস্। (১) ১৬৬।

মাকু'রিয়াম । (১) ১৬৬ ।
লাইকোপডা । (৪) ৪৬৪ ।
ট্র্যাফিসেগ্রিয়া । (৫) ২৭ ।
সাইলিসিয়া । (৪) ১১৪ ।
হিপার সাল্ফার । (১) ১৬৬ ।

২ । অনুপেক্ষরোগ বা টেরিজিয়াম ।

জিঙ্কাম । (৪) ২৪০ । (৫) ৫৩২ ।
রেট্যানিয়া । (৪) ২৪০ ।

৩ । অক্ষুদ্বাদি বিবিধ দৃষ্টিবিপর্যায় ।

—অক্ষু, দৃষ্টিমালিন্দ্র বা দোরদৃষ্টি বা
শ্লেকোমা, দৃষ্টিমৌর্খল্যা বা এম্ব্লোপাইয়া,
বিষমদৃষ্টি, অর্কুদৃষ্টি, দ্বিব্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি বা
প্রেস-বাইওপাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইও-
পাইয়া প্রভৃতি ।

অরাম । (১) ২৫৮ । (৪) ৪৬৩ ।
আর্জেণ্ট নাই । (৪) ৪৪৩ ।
আটিমিসিয়া । (২) ২৫৭, ৪০৭ । (৫) ১০১ ।
আসে নিক । (২) ৫২, ৫৩ ।
ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪৮ ।
এপিস । (৪) ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩৩২ ।
এমন গাম । (২) ২৫৮, ৪০০ ।
এলুমিনা । (৪) ৪১৫ ।
এসাকিটিডা । (৫) ২২০ ।
কষ্টিকাম । (৩) ৩৪০ ।
কনায়াম । (৪) ২৪০ ।
গ্র্যাফাইটিস । (৪) ৪১৪ ।
চেলিডোনিয়াম । (১) ৩৭৮ ।
জিঙ্কাম । (৫) ৫৩২ ।
জেলসিমিয়াম । (৫) ৮০ ।
জ্যাবরেণ্ডাই । (২) ৩০২ । (৫) ৪১২ ।
টিটেনিয়াম । (২) ২৫৮ । (৪) ৪৬৩ ।
থুজা । (২) ৩০৩ ।
নাক্স-ভমিকা । (১) ৩০৩ ।

নেট্রাম মিউ । (২) ২৫৭, ২৫৮, ৩০২ ।
(৪) ৪১৫ ।

পালসেটিলা । (২) ১৯৯ ।
ফস-ফরাস্ । (৪) ২৩৮, ২৩৯ ।
ফাইজ্জিগ্'মা । (৫) ২৪২ ।
বারাইটা কার্ব । (৫) ১৭৫ ।
ব্রাইওনিয়া । (১) ১৪৯ ।
মিউরিয়টিক এসিড । (৪) ৪৬৩ ।
রাস-টক্‌স্ । (৪) ৩৩৭ ।
ফটা । (২) ২৫৭, ৪০৭ ।
লাইকোপোডিয়াম । (২) ২৫৮ । (৪) ৪৬৩,
৪৬৪ ।

লিথিয়াম কার্ব । (৪) ৪৬৩ ।
লিথিয়াম । (২) ২৫৮, ২৩২ ।
লাকেসিস । (৪) ২৭ ।
সাইক্লোমেন । (২) ৩০২ ।
সাইলিসিয়া । (৪) ২৪০ ।
সিক্কানা । (৩) ৯৩ ।
সিনা । (২) ২৫৭, ৪০৭ ।
সিপিয়া । (২) ৩০০—৩০৩ ।
সিফিলিয়াম । (৫) ৩৪০ ।
স্ট্রাটোনাইন । (২) ২৫৮, ৪০৭ ।

৪ । অফথ্যালমিয়া কঙ্ক্যাণ্টিভাইটিস্ ।

বা যোজকঝিল্লি প্রদাহ—সহজ

বা সিম্পল, পূর্ণধাতুজ বা গণোরিয়েল,
গণ্ডমালীয়া বা কুফুলাস, দ্বানায়ুক্ত বা
গ্রামুলার, পূর্ণজনক বা পুরুলেন্ট, পূর্ণ-
গুটিকায়ুক্ত বা পাশ্চুলার এবং যোজক
ঝিল্লিসহ রসবিষিকায়ুক্ত বা ফ্রাক্টি-
নিউলার প্রভৃতি ।

অরাম । (৪) ৪৬৩ ।
আর্জেণ্টাম নাই । (২) ২০০ । (৪) ৪৪১,
৪৪২, ৪৪৩ ।

অর্গিকা। (৩) ১২৮।
 অর্সনিক। (২) ৫২, ৫৩। (৪) ৩০১।
 ইউক্রেসিয়া। (১) ১৬৬। (৩) ১২৮।
 (৪) ৪১৪, ৪৪৩। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
 একোনাইট। (১) ৩০, ২৫। (৫) ২৪৮,
 ৫১৮।
 এন্টিম ক্রু। (৩) ১৫১।
 এর্পিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩৩২।
 এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
 কলিকাম। (৩) ৩৪০।
 ক্যালি কার্ব। (৪) ৩৩২।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩০২, ৩৭২, ৩৭২।
 ক্যালকরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৬, ২৭৭।
 ক্রিয়োকোটে। (৪) ৪৪২।
 ক্রোমিটোস। (৪) ২৮।
 গ্র্যান্ডাইটিস। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৩।
 জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
 জিঙ্কাম সাল্ফ। (৫) ৫৩২।
 থুজা। (৪) ২৮০।
 নাইটি ক-এসিড। (৩) ২৭৮।
 নাকস তম। (২) ১৫৫।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৮, ৩০১। (৪) ৪১৫।
 পানসেটিল। (২) ১২২, ২০০, ২৫৮।
 (৪) ৪৭২, ৪৭৩।
 ফস্ফরাস। (১) ১৬৬।
 ফেরাম ফস। (৫) ৫১৮।
 বেলোডোনা। (১) ২৫।
 মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৬, ২৪২। (৩)
 ১৫১। (৪) ২৮০, ৪৪২।
 মার্কুরিয়াস ক্রু। (২) ২০-।
 রাস্ফটক্‌স। (১) ১২২। (৪) ৩০১, ৩৩৭,
 ৩৩৮, ৪৪২।
 রুট। (৪) ৪১৫।
 স্যাক্সেসিয়া। (৪) ২৮।
 স্ট্রাক্সেসিয়া। (৫) ২৭।

সাল্ফার। (১) ৩০। (২) ১২২। (৩) ৩৪,
 ৩৫।
 সিপিয়া। (২) ২৫৮, ৩০১।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৬।

৫। অফথ্যাল্মিয়া নিওনেটোরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুঃপ্রদাহ।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪১, ৪৪২।
 পানসেটিল। (২) ২০০। (৪) ৪৪২।
 মার্কুরিয়াস। (৪) ৪৪২।
 সিফিলিটাম। (৫) ৩৪০।

৬। অশ্রু-যন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেক্‌- অব্‌ দি লাক্রিম্যাল এপারেটাস্‌।

পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৬০।
 বেলোডোনা। (১) ২৫।

৭। অস্ত্র চিকিৎসাস্তে বেদনাদি চক্ষু বিকার।

অর্গিকা। (৩) ১৩২।
 ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৩, ৩৪৪। (৫) ৩২৩।
 একোনাইট। (১) ৩০। (৫) ৩২৩।
 এসেরাম। (২) ৩৪৪। (৫) ৩২৩।
 ক্রোকাস। (৫) ৩২৩, ৩২৪।
 জ্যাবরেঞ্জাই। (৫) ৪১২।
 থুজা। (২) ৩৪৪। (৫) ৩২৪।
 ব্রাইওনিয়া। (৫) ৩২৩।
 রাসটক্‌স। (২) ৩৪৪। (৫) ৩২৩।
 স্ট্রুসিয়ানা কার্ব। (২) ৩৪৪। (৫) ৩২৪।
 সেনেগা। (২) ৩৪৪। (৫) ৩২৪।

৮। আগন্তুক বস্তুর বা ফরেন বডি সংস্রবে চক্ষুঃপ্রদাহ।

একোনাইট। (১) ৩০। (৩) ৩৪।
 ফেরাম ফস। (৩) ৩৪।
 সাল্ফার। (১) ৩০। (৩) ৩৪।

৯। আঘাতজ চক্ষু-প্রদাহ।

আর্ণিকা। (৩) ১২৮। (৫) ২৪৮
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।

১০। উপত্যারোগ বা ডিজিজেক্স
অব্দি আইরিস।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪। (৫) ২২০।
আর্ণিকা। (৩) ১০৮।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
এটুপিয়া। (১) ৫২, ৯৫, ২৫১।
এমাকিটিড। (৪) ৪৬৪। (৫) ২২০।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্লিমেটিস। (৫) ১৫।
জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮২।
টেরিবিয়। (৪) ৩৩৯।
থুজ। (৪) ২৭৬, ৩৩৯।
ফাইজটিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
বেলাডোনা। (১) ৫৯, ৬৭, ৯৬।
মার্ক কর। (১) ২৫০। (৫) ১৪, ১২৫।
মার্ক ডাল বা ক্যালমেল। (১) ২৫০।
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫০।
মার্করিস্-বিন আই। (১) ২৫০।
মার্ক রিয়াস্। (১) ২৪৯, ২৫০, ২৫১।
রাস্‌টক্স। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।
রেড্ সাল্‌ফুরেট অব্ মার্কানি বা সিনা
বেরিস্। (১) ২৫১।
হেয়ার্মেলিস। (৩) ১২৮, ১৭৯।

১১। করইডাইটিস বা চক্ষুর ব্রক্ত
নাড়ীময়-বিপ্লি-প্রদাহ।

ক্যালি আই। (৫) ১২৫।
জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮২।
কস্করাস্। (৪) ২৩৮।

১২। কর্ণিয়া বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের
অস্বচ্ছতা বা ওপেসিটি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০২।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ৩৫, ২৭৬।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৭, ৩৭৮।
জিঙ্কাম। (৪) ২৪০। (৫) ৫৩২।
জিঙ্কাম সাল্‌ক। (৫) ৫৩২।
ফাইজটিগ্‌মা। (৫) ২৪২।

১৩। কর্ণিয়া বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের
প্রদাহ বা কিরাটাইটিস্

ও ক্ষত।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
আর্সেনিক। (২) ৫৩।
কলিকাম। (৩) ৩৪০।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ৩৫, ২৭৬।
ক্রোটোলাস্। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস্। (৪) ৪১৩।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০০।
ফাইজটিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
মার্ক রিয়াস কর। (২) ২০০।
রাস্‌টক্স। (৩) ৩৫।
লাইকোপোডিয়াম। (৪) ৪৬৪।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৪, ৩৫।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

১৪। কর্ণিয়ার এব্‌সেস্, হাইপপিয়ন
বা কর্ণিয়ার পশ্চাৎনিমে অর্ধ-

চক্রাকারে পুয়সংগ্রহ।

ক্যাকেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১১১।
নাক্‌রিয়াস। (১) ২৪২
নাক্‌রিয়াস কর। (২) ২৫০।

১৫। মকোমা বা চক্ষু-রসের

অস্বচ্ছতা বশতঃ যোরদৃষ্টি।

অরাম। (৪) ৪৬০।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮২।
ব্রাইওনিয়া। (১) ১৪২।
বাস্টক্‌স। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।

১৬। চক্ষুপুট আনর্ভন (Twitching)

বা চোক নাচা, চক্ষু মিটিমিটি।

ইথ্রেসিয়া। (২) ৩৪৪।
এগারিকাস্। (১) ৮২। (২) ১৫৫, ২৫৮।
এগারিসিন। (৫) ৩৬২।
কোভিন। (৫) ৩২৩।
ক্রোকাস। (৫) ৩২৩।
ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৮।
নাল্‌ভমিকা। (২) ১৫৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭।
ফাইজ্‌টীগমা। (৫) ২৪২।
সিপিয়া। (২) ৩০০।

১৭। চক্ষুপুট পতন বা টোসিস।

ইউথ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
এলুমিনা। (২) ৩০১।
কষ্টিকাম। (২) ৩০১। (৩) ৩৩৮, ৩৩৯।
(৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮।
ক্যান্থিয়া। (৩) ৩৩৮। (৪) ৩৩৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩১, ৫৩২।

জেলসিমিয়াম। (২) ৩০১। (৪)
৮১, ৩৩৭।

নাক্‌স্‌ভমিকা। (৪) ৩৩৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ৩০১।
প্লাস্‌ম। (৫) ৫৪১।
বাস্টক্‌স্। (৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮
সিপিয়া। (২) ৩০০। (৪) ৩৩৭, ৩
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।

১৮। চক্ষুপুটপ্রদাহ বা ব্রেকারাইটিস্।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪১, ৪৪২।
ইউথ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২
ক্রিয়োজোটি। (৫) ২৪৮।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১৩।
পূজা। (৪) ২৭৬।
পালসেটলা। (২) ১৯৮।
পেটোলিয়াম। (৪) ৪১৪। (৫) ---
বোরাক্‌স্। (৪) ৪১৪।
নাক্‌রিয়াস। (১) ২৪২। (৪) ৪৪২।
সালফার। (৪) ৪১৪।

১৯। চক্ষুপুটবিপর্যাস বা এষ্ট্রোপিয়াম

ও টিকইয়াদিস্ চক্ষুপুট বক্র হওয়া
ও চক্ষুকেশ উন্টান।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
বোরাক্‌স্। (৫) ৫৫৭।
মার্ক সল। (৩) ৪৩৮।
সালফার। (৩) ৪৩৮।
সিলিকন। (৩) ৪৩৮।
সরিগাম। (৩) ৪৩৮।
হিপার সাল্ফ। (৩) ৪৩৮।

২০। চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ।

আসেনিক। (৪) ৪১৪।
 গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
 থুজা। (২) ৩০০।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭।
 পেটোলিয়াম। (৪) ৪১৪।
 বোরাক্স। (৪) ৪১৪।
 সালফার। (৪) ৪১৪।
 দিপিয়া। (২) ৩০১।

২১। চক্ষুশি, তারা বা পিউপিলের

ডাইলেটেশন বা প্রসারণ।

বেলাডোনা। (১) ৬৭, ২২৩।
 স্ট্রামোনিয়াম। (১) ২২৩, ২২৪।

২২। চক্ষুর কালশিরা বা
 একিমোসিস।

জার্ণিকা। (৩) ১২৮।
 লিডাম। (৩) ১২৮। (৫) ৪২৪।
 হেমামেলিস। (৩) ১২৮।

২৩। চক্ষুর স্নায়ুশূল।

এমিল নাইটাস। (১) ২৬।
 চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৫৮।
 বেলাডোনা। (১) ২৬।
 স্পাইজিলিয়া। (১) ২৬।

২৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ্
 অব দি আইজ্।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
 আর্টমিসিয়া। (৫) ১০১।
 আর্নিকা। (৩) ১২৮, ১২৯।

আসেনিক। (২) ৫২। (৪) ৪১৪।
 ইউক্রেসিয়া। (৪) ৪১৪। (৫) ২৪৭,
 ২৪৮।
 ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৩, ৩৪৪।
 একোনাইট। (৪) ৪১৪।
 এপিস। (৪) ৩০০, ৩০২, ৩০২।
 এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
 এসাকিটিড। (৫) ২২০।
 কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৯, ৩৪০।
 কনারাম। (৪) ৪১৫।
 ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১, ৩৭২।
 ক্যালকেরিয়া কার্ক। (৩) ৩৫, ২৭৬—
 ২৭৮।
 ক্যালকেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।
 ক্রোকাস। (৪) ৪১৫। (৫) ৩৯৩, ৩৯৪।
 গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
 চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৭, ৩৭৮।
 জিঙ্কাম। (৫) ৫০২।
 জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১, ৮২।
 জ্যাংগুই। (৫) ৪১২।
 থুজা। (৪) ২৭৬।
 নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৮।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৪, ১৫৫।
 নেট্রাম কার্ক। (৪) ৪১৫।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৬—২৫৮। (৪) ৪১৫।
 পালসেটলা। (২) ১৯৮—২০০।
 পেটোলিয়াম। (৪) ৪১৪।
 ফসফরাস। (৪) ২৩৮, ২৩৯, ২৪০।
 ফাইজিগ্গমা। (৫) ২৪২।
 বাবেরিস। (৪) ৪১৫।
 বেলাডোনা। (১) ২৪—২৬। (৪) ৪১৪।
 বোরাক্স। (৪) ৪১৪।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
 মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৯—২৫১। (৩) ৪৩৮।
 (৪) ৪১৪।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৪।
 রাস্টক্‌স্। (২) ১২৯। (৩) ৩৫, ২৭৭।
 (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।
 রুটা। (৪) ৪১৫। (৫) ৪০৭।
 ল্যাকেসিস্। (৪) ২৭।
 ট্র্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
 ট্র্যামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
 সাল্ফার। (৩) ৩৪, ৩৫, ২৭৭, ৪৩৮।
 (৪) ৪১৪।
 সিলিয়া। (২) ৩০০—৩০৩।
 সিলিকন। (৩) ৪৩৮।
 স্ফাকেরাম অফি। (৩) ২৭৭।
 হিপার সাল্ফ। (৪) ৪১৪।
 হেমামেলিস। (৩) ১৩৯।

২৫। দৃষ্টিদোর্বলতা বা এছেনোপাইয়া।

অরাম। (২) ২৫৮।
 আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৩।
 আর্টমিসিয়া। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০১।
 এগারিকাস। (২) ২৫৮।
 এপিস। (৪) ৩০২, ৩৩৯।
 এমনিয়াম গামাই। (২) ২৫৮, ৪০৭।
 ক্যালি কার্ব। (৩) ৩০২।
 জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮৩।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (২) ৩০২।
 টিটেনিয়াম। (২) ২৫৮।
 যুক্তা। (২) ৩০৩।
 নাক্‌স্ ভমিকা। (২) ৩০৩।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৫৮, ৩০২।
 (৪) ৪১৫।
 পাল্‌সেটলা। (২) ৩০২।
 ফস্‌ফাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯।
 রুটা। (২) ৪০৭। (৪) ৪১৫। (৫) ৪০৭।
 লাইকোপোডিয়াম। (২) ২৫৮।

লিলি ? কার্ব। (২) ২৫৮।
 লিলিয়াম টাই। (২) ৩০২।
 সাইক্লোমেন। (৩) ৩০।
 সিক্কোনা। (৩) ২৩।
 সিনা। (২) ২৫৭, ৪০৭।
 সিলিয়া। (২) ৩০২, ৩০৩।
 স্ট্রাণ্টোনাইন। (২) ২৫৮, ৪০৭।

২৬। বক্রদৃষ্টি বা ট্র্যাবিস্মাস।

এলুমিনা। (২) ৪০৭।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
 ম্যা। (৫) ২৪২।
 বেলাডোনা। (২) ৪০৭।
 সাইক্লোমেন। (২) ৪০৭।
 সিনা। (২) ৪০৭।
 স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০।
 স্ট্রাণ্টোনাইন। (২) ৪০৭।

২৭। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট

ম্যা। (৩) ৩৪০। (৪) ২৪০। (৫)
 ৩৪৪।
 কনায়াম। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
 চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
 নেট্রাম মিউ। (২) ৩৩০। (৫) ৩৪৪।
 ফস্‌ফাস্। (৪) ২৩৮, ২৪০।
 ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৪।
 সাইলিসিয়া। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
 সিকেলি। (৪) ২৪০।

২৮। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি

চক্ষুরোগের অন্ত্র-চিকিৎসাস্থিতিক অর।
 আর্গিকা। (৩) ১৩৩।
 ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৪।
 একনাইট। (১) ৩০। (২) ৩৪৪। (৫)
 ৩২৩।

- এসেরাম। (২) ৩৪৪।
 ফ্রোকাস। (২) ৩৪৪।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৮।
 থুজা। (২) ৩৪৪।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৩০। (৪) ২৪০।
 ব্রায়নিয়া। (২) ৩৪৪।
 রাস্টিক্স। (২) ৩৪৪।
 ট্রুন্সিয়ানা। (২) ৩৪৪।
 সিপিয়া। (২) ৩০০।
 সেনেগ। (২) ৩৪৪।
 স্ট্যান্টনাইন। (৩) ২৫৮।

রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ—রেটিনাইটিস
 বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্রপত্রের
 শোণিতাধিক্য, রেটিঙ্কাল এট্রুফি বা চিত্র-
 পত্রের ক্ষয়, রেটিঙ্কাল এপ্লেসকসি বা চিত্র-
 পত্রে রক্তস্রাব এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের
 খলন বা ডিটাচমেন্ট প্রভৃতি।

- অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
 আর্গিকা। (৩) ১২৮, ১২৯। (৪) ২৭।
 ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৪) ২৭।
 ক্রোটেলাস। (৪) ২৭।
 জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
 নাস্ত ভমিকা। (২) ১৫৫।
 ফস্‌ফরাস। (৪) ২৭, ২৩৮, ২৩৯।
 বেলাডোনা। (১) ২৫, ২৬। (৪) ৪৬৪।
 মার্কু'রিয়াস কর। (১) ১৫১।
 ল্যাকেসিস। (৪) ২৭।
 সাল্‌ফার। (৪) ৪৬৪।
 হেমায়েলিস। (৩) ১৩৫।

৫। স্বক্‌রোগ বা ডিভিজেজ্‌ অব দি স্কিন।

- ১। অরগিকা, স্বক্‌রক্‌মা বা ইরিথিমা
 বেলাডোনা। (১) ১১৩।

২। আকুলইড়া বা হুইটলো, প্যানারিটাম।

- আসেনিক। (৫) ৩২৫।
 এন্থ্রাসিনাম। (৫) ৩২৪।
 এপিম। (৪) ৩১০।
 কার্লিক এসিড। (৫) ৩২৫।
 ল্যাকেসিস। (৫) ৩২৫।
 সিলিসিয়া। (৪) ১২১।

৩। আমবাত, শীতপিত্ত বা হুইলস, হাইডস্‌ নেটেলরেস।

- আটিকা ইউরেনস। (৩) ৪৫৯। (৫) ১০১।
 আসেনিকাম। (২) ৩১৪।
 ইপিকাক। (৩) ৪৫৮।
 একোনাইট। (৩) ৪৫৮।
 এটিম কু। (৩) ৪৫৯।
 এপিম। (৪) ৩১৪।
 ওলিয়েওয়ার। (৫) ৪৫৫।
 ক্যালি প্রোমেটাম। (৩) ৪৫৯। (৫) ১০১।
 ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। (৩) ২২২, ৪৫৯।
 ফ্রোকাস। (৫)
 ফ্রোরাল। (৩) ৪৫৯।
 টেরিথিঙ্ক। (৩) ৪৫৯।
 ডাক্সামার। (৩) ৪৫৮।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৭।
 পাল্‌সেটিল। (৩) ৪৫৮।
 বস্তিষ্ট। (৩) ৪৫৯। (৫) ৩৬৬।
 বেলাডোনা। (৩) ৪৫৮।
 মেডুসা। (৫) ৩০১।
 রাস্টিক্স। (৩) ৪৫৯।
 সাল্‌ফার। (৪) ৩১৪।
 সিপিয়া। (২) ৩০৮, ৩০৯। (৪) ৩:৪।

৪। ইম্পেটিগো বা চর্খদল—

গোলাকার ও চেপ্টা

পূর্ণপূর্ণ উদ্ভেদ।

এস্টিম টাটা। (৩) ১৭৭।

নেটামিউ। (২) ২৬৭।

ভায়োলা টুক। (৫) ৪৫৫।

সিপিয়া। (৩) ৫১, ৫২।

৫। এডিসম্ভ ডিজিজ—তৃক্কলঙ্ক

বিশেষ দ্বারা স্পষ্টীকৃত নায়বীয় ও

যান্ত্রিক ক্রিয়াবসাদবটিত

দুশ্চিকিৎস রোগবিশেষ।

আর্জেন্টাম নাই। (৫) ৫৮, ৫৯।

আস আইওডেটাম। (৫) ৫৯।

আসেনিকাম। (৫) ৫৯।

এস্টিম ফু। (৫) ৫৯।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৫) ৫৯।

(৫) ৫৯।

নাইট্রিক এসিড। (৫) ৫৯

নেটাম মিউ। (৫) ৫৯।

ফরফরাস। (৫) ৫৯।

বেলাডোনা। (৫) ৫৯।

সিকেলি। (৫) ৫৯।

স্পাইঞ্জিলিয়া। (৫) ৫৯।

৬। কঙ্কুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ্,

ইচ, সোরা।

কষ্টিকাম। (৩) ৫২।

মাকু'রিয়াস। (৩) ৫২।

সাল্কার। (২) ৩০৯। (৩) ৫১, ৫৩।

সিপিয়া। (২) ৩০৯। (৩) ৫১, ৫২।

সোরিনাম। (৩) ৪৪১।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

৭। কণ্ডু, সাধারণ চুলকনা বা

ফ্রাইটিস্।

ফ্রয়োদ্রিক এসিড। (৫) ৭২।

রাস্ টল্। (৪) ৩৫৭।

সিলিনিয়াম। (৫) ৩৩৭।

৮। কাউর, পামা বা এক্জিমা।

আসেনিকাম। (২) ২১, ৩০৯।

এস্টিম ফু। (৩) ১৫৬।

ক্যালি রোমেটাম। (৫) ১৫৩।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২২২।

ক্রোটোন টিগ্। (৪) ৩৫৭। (৫) ৪২৭, ৫২৮

ক্রিমেটিস। (৫) ১৫, ১৬।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।

টুবাঙ্কু লিনাম। (৫) ৩২২।

নেটাম মিউ। (২) ১৬৭।

নেটাম সাল্ফ। (১) ১৭৪।

পেট্রোলিয়াম। (৫) ৩৩৭।

ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৮।

স্তিক্কা মাইনর। (৫) ৪৫৫

মার্ক সল। (৩) ৫১।

মেজিরিয়াম। (২) ৩১৫।

রাস্ টল্। (৪) ৩৫৭।

রেণাকু বাধো। (৩) ১৫৬।

রেণাকু ফি। (৫) ৩২।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।

সিপিয়া। (২) ৩১৪।

সিলিনিয়াম। (৫) ৩৩৭।

সরিনাম। (৩) ৪৪১।

হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৩।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

৯। কেশশ্বলন; টাক বা

এলোপেসিয়া, বন্ডনেস।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।

নেটাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬৫।

ক্লোরোরিক এসিড। (৫) ৭২।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২২৭।
সিপিয়া। (২) ২২৭।

১০। চর্মকৌলক বা ওয়ার্টস্

কটিকাম। (৩) ৩৪৫।
থুজা। (৪) ২৮০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৮০।
মাকু'রিয়ান্স। (৪) ২৮০।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ২৮০।

১১। স্বক্‌রোগ বা ডিজজেজ্

অব দি স্মিন।

আর্সেনিকাম। (২) ৯২, ৯২, ৯৪, ৩১৪।
ইউ ফর্কিয়াম্ রেজি। (৫) ৪২৯।
এনাকাডিয়াম্। (১) ৪০০। (৪) ৩৫৭।
এন্টিম জু। (৩) ১৪২, ১৫৬।
এপিস। (৪) ৩৫৭।
এলুমিনা। (৫) ৮২।
ওলিয়েগার। (৫) ৪৫৫।
কটিকাম। (৩) ৫২।
কিউরেয়ার। (২) ৩১৫।
ক্যাছারিস। (৪) ৩৫৭।
ক্যালি আই। (৫) ১২৮।
ক্যালি ব্রোমেটা। (৫) ১৫৩।
ক্যাঙ্ক কার্ব। (৩) ২৯২।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৭।
ক্রোটন টিগ। (৪) ৩৫৭। (৫) ৪২৭,
৪২৮।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।
ইবাক্স'লিনাম। (৫) ৩২৯।
টেলুরিয়াম। (২) ৩৭৯।
ডলিকস। (৪) ৩৫৭।
ডাক্সামারা। (৩) ৪৫৮।
থুজা। (৪) ২৮০।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩১৪।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮, ২৬৭।
স্ফালিয়াম। (৫) ১০৮।
পেটোলিয়াম। (২) ২২৮।
ফর্সিকা ব্লফ। (৫) ৩০৭।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
ক্লোরোরিক এসিড। (৫) ৭২।
বেলাডোনা। (১) ৫৪, ১১৩।
বোরাকস। (২) ৩১৪।
বারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৮।
মাকু'রিয়ান্স। (৩) ৫১।
মেজিরিয়াম। (২) ৩১৫।
রানটক্‌স। (৪) ৩৫৭।
রেণাক্স বাবো। (৫) ২১।
রেণাক্স স্কি। (৫) ৩২।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ৩১৫।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।
সাইকুটা। (৫) ২৩৫।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২১।
সাল্ফার। (২) ২৭৫, ৩১৫। (৩) ৬, ৭,
৫১, ৫২।
সিপিয়া। (২) ২৭৪, ৩১৩, ৩১৪
(৩) ৫১, ৫২।
সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭।
সরিণাম। (৩) ৪৪১।
হাইড্রোকোটাইল। (৫) ২৩৬, ২৩৭।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

১২। স্বক্‌র কড়া বা করণ, কাঠিনা,

কর্কশতা এবং পুঞ্জটিকা প্রভৃতি

কুদ্ররোগ।

এন্টিম জু। (৩) ১৫৬। (৫) ২১।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৭।
থুজা। (৪) ২৮০।
রেণাক্স স্কি। (৫) ৩২।
হাইড্রোকোটাইল। (৫) ২৩৬।

১৩। দক্ষ বা রিংওয়ারম, হার্পিস্ । ১৭। পাকুই, শীতফোটক বা
সার্বিনেটাস । চিলড্রেন ।

কষ্টকাম । (৩) ৫২ ।
টবাকু লিগাম । (৫) ৩২২ ।
টেলুরিয়াম । (২) ৩১৫ ।
বারাইটা কার্ব । (৫) ১৭৮ ।
মাকু রিয়ার । (৩) ৫১ ।
সার্সিপেরিলা । (৫) ৪৮৩ ।
সাল্ফার । (৩) ৫১, ৫২ ।
সিপিরা । (২) ৩১৩, ৩১৪ । (৩) ৫১, ৫২ ।
সরিগাম । (৩) ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৪১ ।

১৪। দুগ্ধপীড়কা বা ক্রান্তা ল্যাক্টিয়া ।

গুলিহেস্তার । (৫) ৪৫৫ ।
ক্রোটোন টিগ । (৫) ৪২৭, ৪২৮ ।
গ্র্যাকাইটিস । (৪) ৪২ ।
ভায়োলা টিক । (৫) ৪৫৫ ।
ষ্ট্যাক্সিসগ্রিয়া । (৫) ৩০ ।

১৫। নথরোগ বা ডিজিজ্জেন্ড অব

দি নেল্‌স ।

এণ্টিম ক্রু । (০) ১৫৬ ।
ক্রুরোরিক এসিড । (৫) ৭২ ।

১৬। পাদমূলের(Heels) ক্ষতাদি ।

এণ্টিম ক্রু । (৫) ৯৭ ।
এমলিয়ার মিউ । (৫) ২৬, ২৭ ।
এরানিরা ডাই । (৫) ৩১৮ ।
এলিয়ার সেপা । (৫) ৯৭ ।
কষ্টকাম । (৫) ২৭ ।
নেট্রাম কার্ব । (৫) ২৭ ।
পালসেটিল । (৫) ২৭ ।
ম্যাড্র্যানাম । (৫) ২৬ ।
সিকিলিয়ার । (৫) ৩৪১ ।
স্ত্রাবাইনা । (৫) ২৬ ।

এমারিকাস । (৫) ৩৬২ ।

১৮। পৃষ্ঠত্রণ, দাহিকা বা
কার্বাক্কল; আন্ডুলহাঁড়া বা হুইটলো,
প্যানারিটাম, প্যানারিস ; চুষ্ত্রণ বা
ম্যালিগন্যান্ট পাশ্চুল ; শব্দেহদ-
সংশবীয় বা ডিসেক্টিং উণ্ডু বা
ক্ষত এবং বিষধর কীটদংশন জনিত
ক্ষত প্রভৃতি ।

আর্গিকা । (৪) ১২৩ ।
আসেনিকাম । (২) ৮৯ । (৩) ৪১৩ । (৫)
৩২৪, ৩২৫ ।
এষ্ট্রসিনাম । (২) ৮৯ । (৪) ১২৩ । (৫)
৩২৪ ।

এপিস । (৪) ৩১০ ।
কার্ব স্লেজ । (২) ৮৯ । (৩) ৪১৩ । (৪) ৬৩ ।
কার্বলিক এসিড । (৫) ৩২৫ ।
টারেন্টুলা ক্রু । (৪) ৬৩, ১২৩ । (৫) ৩২৫ ।
নাইট্রিক এসিড । (৪) ১২৩ ।
ফাইটলেকা । (৪) ১২৩ ।
রাসটক্‌স্ । (২) ৮৯ ।
ল্যাকেসিস । (২) ৮৯ ।
(৪) ৬৩, ৬৪,
১২৩ । (৫) ৩২৫ ।

ষ্ট্র্যামোনিয়ার । (১) ৩০৮ ।
সাইলিসিয়া । (৪) ১২৩ ।

১৯। পোড়া নারাজ বা পেশিক্‌গাস ।

রাসটক্‌স্ । (৪) ৩৫৭ ।
রেশাক্কুলাস্ বাছো । (৫) ২১ ।
রেশাক্কুলাস্ ফি । (৫) ৩২ ।

২০। বয়োত্রণ, বয়সফোড়া বা একনি।

- এণ্টিম জু। (৩) ১৫৬।
 এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৫৬, ১৭৭।
 ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫৩।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৯২।
 থুজা। (৫) ১৫৬।
 স্ত্রাক্যালিয়াম। (৫) ১০৮।
 স্ত্রাক্সইনেরিয়া। (৪) ৪৭৭।

২১। বিচর্চিকা বা সোরিয়াসিস্।

- আর্সেনিকাম। (২) ৩১৪।
 আর্সেনিকাম আই। (২) ৩১৪।
 বোরাক্‌স্। (২) ৩১৪। (৫) ৫৩৭, ৫৫৭।
 সিপিয়া। (২) ৩১৪।

২২। বিসর্প বা ইরিসিপেলাস।

- আইণ্ডিয়াম। (৪) ৪১৯।
 আর্গিকা। (৪) ৩৫৫।
 আর্সেনিকাম। (৪) ৬৩।
 ইউক্কিয়াম রেজি। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪।
 (৫) ৪২৯।
 এপিস। (১) ১২০। (৪) ৩১৩, ৩১৪, ৩৫৪,
 ৪১৯।
 ক্যাঙ্কারিস্। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪।
 ক্যান্সরা। (৪) ৩৫৫।
 ক্যালোজুলা। (৪) ৩৫৫।
 গ্রাফাইটিস। (৩) ৩২০। (৪) ৪১৯।
 বেলাডোনা। (১) ৯৩, ১১৯, ১২০, ৩০৮।
 (৪) ৩১৩। (৫) ৯০।
 বোরাক্‌স্। (৫) ৫৫৭।
 ভেরেটাম ভিরিডি। (৪) ৬৩।
 রাসটক্‌স্। (১) ১১৯, ১২০, ৩০৮। (৪)
 ৩১৩, ৩১৪, ৩৫৪।
 রেণাক্সুলাস বাঘো। (৫) ২১।

- ল্যাকেসিস। (৪) ৬২, ৩১৪।
 স্ত্রাক্সইনেরিয়া। (১) ৩০৮। (৪) ৩২, ৬০।
 সাল্ফার। (৩) ৫০। (৪) ৬৩।

২৩। মেছেতা, ছল্লি প্রভৃতি
 নানাবিধ ত্বক্ কলঙ্ক।

- কিউরেয়ার। (২) ৩১৫।
 নাক্স ভমিকা। (২) ৩১৫।
 ন্যাক্যালিয়াম। (৫) ১০৮।
 লাইকোপোডিয়াম। (২) ৩১৫।
 সাল্ফার। (২) ৩১৫।
 সিপিয়া। (২) ৩১৪।

২৪। ফোটক বা বয়েল্‌স্।

- আর্গিকা। (৩) ১০৮।
 আর্সেনিকাম। (৪) ১২২।
 একোনাইট। (১) ৯১, ৯২।
 এণ্ড্রুসিনাম। (৫) ৩৮১।
 কার্ব ভেজ। (৩) ৪১৩। (৪) ১২২।
 ক্যাক্সে সাল্ফুরিকা। (৪) ১২২। (৫) ১৯১।
 ফাইটলেকা। (৫) ৩৮১।
 বাবে'রিস। (৫) ৩৮১।
 বেলাডোনা। (১) ৯১, ৯২।
 লাইকোপোডিয়াম। (৫) ৩৮১।
 সাইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (৪) ১২১, ১২২,
 ২৫৪।
 সাল্ফার। (৩) ৩৪। (৫) ৩৮১।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬। (৪) ১২২।

২৫। হার্পিস্ জষ্টার বা বর্জুলাকার
 বিসর্পিকা।

- আর্সেনিকাম। (৫) ২১।
 ডলিকস্। (৫) ২০৯।
 মিনিয়াসিস্। (৫) ২১।
 রাসটক্‌স্। (৫) ২১।
 রেণাক্সু বাঘো। (৫) ২১।

২৬। ক্ষতরোগ বা আলসার।

- আসেনিকাম। (৫) ১৭৬, ৪৩০।
 ইউফর্বিয়া কর। (৪) ৪০০।
 ইউফর্বিয়াম রেজি। (৪) ৪৩০।
 কার্ক ভেজ। (৩) ৪১২। (৫) ৪৩০।
 ক্যাক্বেয়িয়া সাল্ফ। (৫) ১২১।
 ক্যান্ডর ইকুই। (৫) ২৮০।
 ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
 বাফো রেণা। (৫) ২২৪।
 মার্কুরিয়াস। (১) ১২৬।
 সাইলিসিয়া। (৫) ৪৩০।
 সিকেলি। (৫) ৩৭৬, ৪৩০।
 সিপিয়া। (২) ৩১৪।
 সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
 সিমেক্স ল্যান্ট। (৫) ৩০৬।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬, ১৮৭।

২৭। ক্ষতাক বা সিকেকট্রাক্স।

- ক্যালি আই। (৫) ১২৮।
 গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১২৩।
 স্ফালিগ্রাম। (৫) ১০৮।
 ফাইটলেকা। (৪) ১২৩।
 ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
 রোমিয়াম। (৫) ৪৮, ৪৯।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১২৩।
 সাল্ফার। (৪) ১২৩।

৬। নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্ররোগ।

১। ইডিয়া প্র্যাটিডিস বা স্বর যন্ত্র
 দ্বার-শোথ।

- এপিস। (৪) ৩০২।
 ক্লোরিগ। (৪) ৩০২।

২। ইডিয়া পাল্মনাম বা ফুস্ফুসের
 শোথ।

- ক্যালি আমণ্ডিগ্রাম। (৫) ২২৬, ২২৭।

৩। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশবা্যাপক

প্রতিশ্রায়।

- আসেনিকাম। (২) ৯১।
 ইউপেটোরিয়াম পাক। (৪) ৩৩৯। (৫) ১১৫।
 ইউফর্বিয়াম রেজি। (৫) ১৬২, ৪২৯।
 এলিয়াম সেপা। (৫) ১২৫।
 কার্ডাস নোর। (৫) ১০৭।
 জেলুমিয়াম। (৪) ৮৩।
 ডাক্সামারা। (৩) ৪৫৪।
 ফস্ফরাস্। (৩) ৪৫৪।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৮৩।
 ব্রায়নিয়া। (৩) ৪৫৪।
 ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪২
 রাসটক্স্। (৪) ৩১৯।
 সাইক্লেমেন। (৫) ১৬৩।
 স্ত্রাবুইনোরিয়া। (৫) ৪৭৮
 স্ত্রাবাডিলা। (৫) ১৬৩।

৪। এশ্ফিসিয়া বা ফুস্ফুসের
 বায়ুক্ষীতি।

- এমনিয়াম কার্ক। (৫) ৮৭, ৮৮।
 কার্ক ভেজ। (৩) ৪০০।
 ক্যাফের। (৪) ৪৪৫।
 লাহকোপোডিয়াম। (৩) ২৮৩।

৫। এশ্ফিক্সিয়া এবং স্প্যাঞ্জম অব দি
 লান্গ্ বা শ্বাসরোধ এবং ফুস্ফুস
 ও অন্ননালীর আক্ষেপ।

- আর্গিকা। (৩) ৩৭৩।
 ইপিক্যাক। (৩) ৩৭৩।
 ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩।
 প্র্যাটিনাম্। (৫) ৫২৩।
 বন্ডিষ্ট। (৩) ৩৭৩।
 মস্কাস। (৩) ৩৭৩।

৬। কাসি বা কফ।

আর্গিকা। (৩) ৩৪২।
 আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৫।
 ইউপোটোরিয়াম পার্ফ। (২) ৩৮০। (৫) ১১৫।
 ইগ্নেসিয়া। (২) ৩২০, ৩২৮, ৩৪৫।
 ইগুগো। (২) ৩৭২।
 ইগ্গাষ্টি ফ্লো। (৫) ২৮০।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮০। (৩) ১৭০।
 একটয়া রেসি। (৫) ৮।
 এন্টিম টার্ট। (৩) ১৭০।
 এপিস। (৪) ৩০।
 এমনিয়ান কার্ব। (৫) ৮৭, ৮৮।
 এমনিয়াম রোম। (৫) ৯৯।
 এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।
 এম্ফ্রিসিয়া। (২) ৩৪৫। (৫) ৩২২।
 এরালিয়া রেসি। (৩) ৩৭২।
 এলিয়াম সেপা। (৪) ২৪২।
 এলুমিনা। (৫) ৭২।
 ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
 কল্টিকাম। (২) ২৫২। (৩) ৩৪১, ৩৪২।
 কুপ্রাম। (৩) ৩৪১।
 কনায়াম। (৩) ৩৭২। (৫) ২২৬, ২২৭।
 ক্যামফিলা। (২) ৩৬৯। (৪) ৩০৫।
 ক্যান্ডর। (৫) ৪৪৫।
 ক্যালি কার্ব। (৩) ৩৪২। (৪) ৩৭৪। (৫) ১৩৩, ১৩৪।
 ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৪।
 ক্যাঙ্ক আই। (৫) ১২০।
 চেলিডোনিয়াম। (২) ৩৫২, ৩৬৭, ৩৭৯।
 জিঙ্কাম। (৫) ৫২, ৫৩১।
 টুবাকু লিনাম। (২) ৩৮০।
 ডাকামারা। (৩) ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮। (৪) ১।
 ড্রিসিয়া। (৩) ৩৪২। (৫) ১০৮, ১১৫।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ৩৭৪।
 নাক্স ডমিকা। (৪) ২৪২, ৩০৫, ৩।
 নাক্স মস। (৫) ৫৫৪।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫২। (৩) ৩৪২।
 পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৬০।
 ফসফরাস। (৪) ১১৬, ২৪২।
 ফসফরিক এসিড। (৪) ২০২।
 বেলাডোনা। (৪) ২৪২, ৩৭৪।
 বোরাক্স। (৫) ৫৫৭।
 ব্রায়নিয়া। (২) ২৫২। (৪) ৩৭৫।
 ডাক্সেসাম। (৫) ২৫২।
 ডেরেটাম এল। (৫) ৩২২।
 মার্কুরিয়াস। (২) ১৯৫। (৪) ৩৭৫।
 রুমেন্স ক্র। (৪) ১১৫, ১১৬। (৫) ৪৩২, ৪৪০।
 লরসিরেসাস। (৩) ৩৭২।
 লাইকোপোডিয়াম। (৪) ১১৬।
 ল্যাক কেলিনাম। (২) ৩৮০।
 ল্যাকেসিস। (৩) ৩৫৬। (৪) ২২।
 ল্যাক্টিকা। (৫) ১০৮।
 স্টিক্টা। (২) ৩৪৫।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১৫। (৫) ৪৪০।
 সালফুরিক এসিড। (৫) ৩২২।
 সিনা। (২) ৩৯৬।
 সিমিয়া। (৩) ৩৪২।
 সিল। (২) ২৫২। (৩) ১৭১, ৩৪২। (৫) ২১০।
 স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৩, ৬৪।
 স্ত্রাক্সুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
 স্ত্রাক্সুয়াস। (৫) ৬৪, ৪৩৪।
 হায়োসায়ামাস। (২) ৩১৪, ৩৫৫।
 হিপার সালফ। (৩) ১৭১।
 ৭। ঘুরিকার্শি বা ক্রুপ—সহজ ও
 পর্দাজনক বা মেম্ব্রেনাস।
 আইওডিয়াম। (৫) ৪৭, ৫৫, ৫৬।
 একোনাইট। (১) ৩২, ৪০, ১৬৯, ১৭০,
 ১৭১। (৫) ৬৪, ১৬৭।

এক্টিম টার্ট। (১) ১৭২। (৩) ১৭১। (৫)
৪৭।

এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৮।

কষ্টিকাম। (১) ১৭২।

ক্যালি বাই। (১) ২৫৯। (৪) ৩৭৩,
৩৭৪, ৩৭৭।

ফস্ফরাস। (৪) ২৪১, ২৪২।

ফেরাম্ কস। (৫) ১৬৭, ৫১৯।

ব্রোমিয়াম। (১) ১৭০। (৫) ৪৬, ৪৭, ৫৬।

ভেরেট্রিম ভি। (৫) ১৬৬, ১৬৭

মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৯, ২৬০। (৪)
৩৭৪

মার্ক বিগ-আই। (১) ২৫৯, ২৬০।

ল্যাকেসিস। (৪) ৩৭৪।

সাইয়ানাইড অব মার্ক্যুরি। (১) ২৫৯।

শ্লিফ্রিয়া। (১) ৪০, ১৭০, ১৭১।

স্ট্রুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৫।

স্ট্রুকাস। (১) ৪০। (৫) ৪৩৪।

হিপার সাল্ফ। (১) ৪০, ১৬৯, ১৭
(৫) ৪৭, ৫৬।

৮। জাণে অসহিষ্ণুতা ও মূচ্ছার ভাব।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

নাস্ত্র ভনিকা। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

কস্ফরাস। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

ড্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

স্ট্রুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।

৯। নাসিকাগ্রের ক্ষতি।

অরান। (৪) ৪৬৪।

১০। নাসিকাপ্রদাহ ও ক্ষত।

বোরাকস্। (৫) ৫৫৭

হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৭, ১৬৮।

১১। নাসিকারক্তস্রাব বা

এপিষ্ট্যাক্সিস্।

আর্গিকা। (৫) ৪৬৬।

এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।

ক্যান্থর। (৫) ৪৪৪।

কার্ক ভেজ। (৫) ৪৪৪

টিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

পালসেটিল। (২) ১২০। (৫) ৪৬৬।

বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ৩১০। (৪) ২৫৩।

মার্কুরিয়াস্। (৫) ৪৬৬।

সায়ানাইড অব মার্ক্যুরি। (৫) ৪৪৪।

সিপিয়া। (২) ৩১০।

হেমামেলিস্। (৫) ৪৬৬।

১২। নাসিকার নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ।

অরান। (৪) ৪৬৪।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪।

ক্যাঞ্চে ক্রুরোরিকা। (৫) ১৮৯

নাসিকাসর্দি বা কন্সাইজা।

আর্জেন্টাম নাই। (১) ১৬৯।

আসেনিকাম। (২) ৫৩, ৫৪, ১৫৬। (৫)
১২৪, ১২৫, ২৪৯।

ইউপে পার্ফ। (৫) ১১৫।

। (৫) ১২৪, ১২৫, ২৪৮, ২৪৯।

ইগ্নেসিয়া। (৪) ২৪১।

একোনাইট। (১) ৪৮। (২) ১৫৭।

এক্টিম জ্। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫।

এপিস। (৫) ১৩৩।

এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৮৮।

এমনিয়াম কার্ক। (৫) ৮৭, ৮৮।

- এমনিয়াম মিউ। (৫) ২৪।
- এম্বাগ্রিসিয়া। (৫) ৮৭।
- এরাম টি। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫। (৫) ১২৫, ২৪২, ৪৬২।
- এলিয়াম সেপা। (২) ৫৪। (৫) ১২৪, ১২৫, ২৪৮, ২৪২।
- এলুমিনা। (১) ১৬২। (৫) ৭২।
- কার্বি ভেজ। (৩) ৩২২। (৫) ৮৮।
- কুইলোরিয়া। (৪) ৮৩।
- কোকাস কাঙ্কি। (৫) ৩০৪।
- কেরেলিয়াম ক্লব। (৫) ৩০০।
- ক্যামিলা। (২) ১৫৬, ৩৬২।
- ক্যান্ডর। (২) ১৫৭। (৫) ১২৫, ৪৪৩, ৪৪৪।
- ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৬।
- ক্যালি বাই। (৪) ২২, ৩৭২। (৫) ৮৭, ১২৬।
- ক্যালি মিউ। (৫) ৫১৮।
- ক্যাক্সে কার্বি। (৩) ১৫১, ২৭৮, ৪৫৪। (৪) ৪১৫। (৫) ৫১২।
- ক্রোরিয়। (৪) ৪২।
- গ্রাফাইটিস। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫।
- চামনা। (১) ৪৮।
- জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮২, ৮৩।
- ডাকামারা। (৩) ৪৫৪।
- ড্রিসিয়া। (২) ২০২।
- নাইট্রিক এসিড। (১) ১৬২।
- নায়্ জমিকা। (১) ৪৮, ১৩২, ১৪০, ২৫২। (২) ১৫৫, ১৫৬, ৩৭০। (৩) ২৭৮, ৪৫৪। (৪) ২৪১। (৫) ৫১২।
- নেট্রাম কার্বি। (৫) ৩০০।
- নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৮, ২৫৯।
- পালসেটোলা। (১) ২৫২। (২) ১৫৬, ২০০।
- পেছোরাম মিউ। (২) ২০১।
- ফক্ষরাস। (২) ৫৩, ১৫৬। (৪) ২৪১। (৫) ১২৪।
- ফেরাম ফস। (৫) ৫১২।
- বেলাডোনা। (১) ৪৮, ১০২, ১৬৭।
- ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৮৩।
- ব্যারাইটা কার্বি। (৩) ২৭৮।
- ব্রায়নিয়া। (১) ১৩২। (৫) ১১৫।
- ব্রিমিয়াম্। (৫) ৪৫।
- ভ্যালেরিয়ান। (৪) ২৪১।
- মার্ক কর। (১) ২৫২।
- মার্ক ভাইভাস। (১) ২৫১।
- মাকু রিয়াস। (১) ১৬৭, ১৬২, ২৫১। (২) ৫৩, ১৫৬। (৫) ১২৫।
- রাস্টম্। (৪) ৩৩২।
- রেণাক্স ক্রি। (৫) ৩২।
- লরসিরেসাস। (৫) ৮৮।
- লাইকোপোডি। (৩) ২৪১। (৫) ৪৬২।
- ল্যাক্সেসিস্। (১) ১৩২। (৪) ২৮, ২৯, ৮৩।
- লিট্টা। (২) ২৫২, ৩৭০।
- সাইক্রেমেন। (২) ২০১।
- সাইলিসিয়া। (৪) ১১৫।
- সালফার। (৩) ৩৫।
- সিনাবেরিস। (১) ২৫৩। (রেড-আই মার্ক।)
- সিনিসিগু অরি। (৫) ১১১।
- সিপিরা। (২) ৩০৩। (৪) ৮৩।
- স্পাইজিলিয়া। (২) ২০২।
- স্ত্রাকুইনেরিয়া। (৪) ২৪১। (৫) ৪৭৮।
- স্ত্রাকু কাস। (২) ৩৬২।
- হাইড্রাটিস্। (২) ২০২।
- হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৭, ১৬৯।

১৪। নিউমোনিয়া, প্রুরো-নিউমোনিয়া, রেণাক্কুলাস বাষো। (৫) ২০।
 বিলিয়াস নিউমোনিয়া, ব্রংকো-লাইকেপোডিয়াস। (১) ১৪১, ৩৮০। (৩)
 নিউমোনিয়া প্রাত্তি। ৩৭, ২৪২, ২৪৩।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৩০, ৩১।
 সাল্‌কার। (৩) ৩৬, ৩৭। (৪) ৩১।
 (৫) ৪৭৫।
 । (১) ১৭২।

আরডিয়াস। (৫) ৫৬।
 ইপিক্যাক। (৩) ১৭৪।
 ইলাপ্‌সু। (৪) ৩১।
 একনাইট। (১) ৩২, ১৪০। (৫) ৫৬,
 ১৬৭, ১৬৮।
 এক্টিম টাট। (১) ১৪০, ১৪১, ৩৮০, ৩৮১।
 (৩) ১৭৪। (৪) ২৪৫।
 এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮৮।
 কার্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
 কার্ব শুজ। (৫) ৫০৯।
 কুপ্রাম। (৩) ২১৫।
 ক্যালি আই। (৫) ১২৬, ১২৭।
 ক্যালি কার্ব। (১) ৩৮০, ৩৮১। (৩)
 ১৭৪।
 ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
 ক্যালি বাই। (৩) ১৭৫।
 চেসিডোনিয়াম। (১) ১৪১, ২৬৯, ২৭০,
 ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৮০।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৪।
 ছ্বাকু লিনাম। (৪) ২৪৫।
 পাল্‌সেটলা। (৫) ২০।
 ক্‌স্‌ফরাস। (১) ১৪০। (৪) ২৪৩, ২৪৪,
 ২৪৫। (৫) ৪৭৫।
 ফেরাম ফস। (৫) ১৬৭, ৫১৯।
 বেলাডোনা। (১) ৩৭৪। (৫) ১২৭।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪০, ১৪১, ৩৭৪। (৩)
 ১৭৪। (৪) ২৪৩, ২৪৪।
 ব্রমিয়াম। (৫) ৪৭।
 ভেরেটাম ভিরি। (৫) ১৬৬, ১৬৭, ৪৭৫।
 মাকু রিয়াস। ১৯৬, ২৬৯, ৩৮০, ৩৮১।
 মাস্‌টক্‌সু। (৪) ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩।

স্‌ক্‌ইনেরিয়া। (১) ১৪১। (৩) ৩৭, ১৭৫।
 (৫) ১৬৭, ৪৭৫।
 হায়নারামাস। (৪) ২৪৫।
 হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭২।

১৫। পিনস, পুতিনস, পুরাতন
 সদিরোগ বা অজিনা।

অরাম। (৪) ৪৬৪, ৪৬৫।
 আসে নিকাম। (২) ৫৪।
 ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৬।
 ক্যালি বাই। (৪) ২৯, ৩৭২। (৫) ১২৬।
 গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫।
 গিরিডিয়ন। (৫) ৩১৬।
 থুজ। (৪) ২৭৬।
 নাইটি ক এসিড। (৪) ২৯।
 ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪১।
 মার্ক কর। (১) ২৫২।
 মাকু রিয়াস। (৪) ২৯।
 ম্যাগ্নেসিয়া নিউ। (৫) ৩৫৫।
 ল্যাকু কেনিনাম। (৪) ২৯। (৫) ২৮৭।
 ল্যাকেসিসু। (৪) ২৮, ২৯।
 সাইলিসিয়া। (৫) ৩৫৫।
 সাল্‌কার। (৩) ৩৫।
 সিপিয়া। (২) ৩০৩।

১৬। প্রুরিসি, প্রুরাইটাস বা ফুস্‌ফুস-

বেষ্ট-ক্লি-প্রদাহ।

আর্গিকা। (৩) ১২৯।
 আস আয়ডেটাম। (২) ২০।

আসেনিকাম । (২) ৮২ ।
 একোনাইট । (১) ৩৯, ১৩৮ । (৩) ৩৬ ।
 (৪) ৩০৪ ।
 এপিস । (৩) ৩৬ । (৪) ৩০৩ । (৫) ২০ ।
 এব্রোটেনাম । (৫) ১০২, ১০৩ ।
 কাঙ্সারিস । (৩) ৩০৬ ।
 চেলিডনিয়াম । (১) ৩৭৩ ।
 ফেরাম ফস্ । (১) ১৩৮ ।
 বেলাডনা । (১) ৩৭৪ ।
 ব্রায়নিয়া । (১) ১৩৬, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯ ।
 (৩) ৩৬ । (৪) ৩০৪ । (৫) ২০, ২০২ ।
 রেণাকুলাস বালো । (৫) ২০, ২১ ।
 সালফার । (৩) ৩৬ । (৪) ৩০৩ ।
 হিপার সালফ্ । (৪) ৩০৪ ।

১৭ । ফুসফুস-প্রদাহ বা ইন্ফ্রামেশন
 অব দি লাজ্‌স্ ।

আসেনিকাম । (৩) ৩০৭ ।
 কাঙ্সারিস । (৩) ৩০৭ ।
 মেলিলোটাস্ । (৫) ২৪৪ ।

১৮ । ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব বা
 হিমরেজ ফ্রম দি লাজ্‌স্ ।

অক্টিলেগা । (৫) ৪৬৮ ।
 ইপিক্যাক । (৩) ৪১২ ।
 একালিকা ইণ্ড্ । (৫) ৪৩২ ।

১৯ । ফুসফুসে গুটিকাজনন বা টুবাকু-
 গোসিস্ অব দি লাজ্‌স্ ।

সিনিসিও অরি । (৫) ১১২ ।
 ক্যাঙ্কে আই । (৩) ২৮১ ।

২০ । ফুসফুসে পুয়সঞ্চারণ বা সাপুৱেশন
 অব দি লাজ্‌স্ ।

ওপিয়াম । (৩) ৩৭২ ।
 ক্যাপ্‌সিকাম । (৩) ২৪ ।

কার্ক ভেজিটেবিলিস্ । (৩) ২৩ ।
 চাইনি সালফ্ । (৩) ২৩ ।
 লাইকোপোডিয়াম । (৩) ২৪৩ ।
 সিন্ধনা । (৩) ২৩ ।
 স্ত্রান্স্‌ইনেরিয়া । (৩) ২৪ ।

২১ । ফুসফুসে আক্ষেপ বা স্পাঞ্জম
 অব দি লাজ্‌স্ ।

ইপিক্যাক । (৩) ৩৭৩ ।
 মস্কাস । (৩) ৩৭৩ ।

২২ । ফুসফুসের পচন, ধ্বংস বা
 গ্যাংগ্রিণ অব দি লাজ্‌স্ ।

আসেনিকাম্ । (২) ২০ ।
 ল্যাকেসিস । (৪) ২০ ।

২৩ । ফুসফুসে পক্ষাঘাত বা
 প্যারালিসিস্ অব দি লাজ্‌স্ ।

ইপিক্যাক । (৩) ১৭১ ।
 এটিম টার্ট । (৩) ১৭১, ১৭২ ।
 এমনিয়াম কার্ক । (৩) ১৭২ । (৫) ৮৯ ।
 কার্ক ভেজ্ । (৩) ১৭২, ৪০১ ।
 ক্যালি আয়ড্ । (৩) ১৭২ ।
 ডাকামারা । (৩) ৪৫৬ ।
 মস্কাস্ । (৩) ১৭২ । (৫) ২৮২, ২৮৩ ।
 ল্যাকেসিস্ (৩) ১৭২ ।

২৪ । ফুসফুসে পুয় বা ত্রণ-শোধ বা
 এব্‌সেস্ অব দি লাজ্‌স্ ।

আসেনিকাম । (৩) ২৪ ।
 কার্ক ভেজ্ । (৩) ২৩ ।
 কুইনি সালফ্ । (৩) ২৩ ।
 ক্যাপ্‌সিকাম । (৩) ২৪ ।
 ক্যালি কার্ক । (১) ১২৬ ।
 ক্যাঙ্কেরিয়া সালফ্ । (৫) ১২১ ।
 মাকু রিয়ার । (১) ১২৬ ।

ল্যাকেসিস্ । (৪) ৩১ ।

সিক্কোনা । (৩) ৯৩ ।

শ্রামুইনেরিয়া । (৩) ৯৪ ।

হিপার সাল্ফ । (১) ১৭২ ।

২৫। কুস্কুসের প্রসারণ বা

ডাইলেটেশন অব দি লাক্স্ ।

লাইকোপোডিয়াম । (৩) ২৪৩ ।

২৬। কুস্কুসের রক্তাধিকা বা

কঙ্কেশন ।

ক্যান্ডর ; (৫) ৪৪৫ ।

সাল্ফার । (৬) ৩৫, ৩৮ ।

২৭। বক্ষরোগ বা ডিজিজেক্ অব

দি চেষ্ট্ ।

লাইকোপোডিয়াম । (৩) ২৪২, ২৪৩ ।

সিমিসিফুগা । (৫) ৮ ।

২৮। বক্ষ-শূল, বক্ষের বেদনা বা

আর্গিকা । (১) ১৪১, ১৪২ । (৩) ১২৭ ।

(৫) ১৯ ।

ক্যালি কার্ব । (১) ১৯৫ ।

গল্ থেরিয়া । (৩) ১২৭ ।

গুয়েইয়াকাম । (৪) ৩৩৯ ।

চেলিডোনিয়াম । (১) ১৪১, ১৯৫ ।

টিকোলিয়াম ষ্য়াটেন্স্ । (৩) ১২৭ ।

ব্রায়নিয়া । (১) ১৩৮, ১৪১ । (৩) ১২৭ ।

মাকু রিয়ার্স । (১) ১৯৫ ।

বাসটক্স । (৩) ৩৩৯ ।

বাস্ রেডি । (১) ১৪১, ১৪২ । (৪) ৩৩৯ ।

(৫) ১৯ ।

ক্লমেন্স্ । (১) ১৪১, ১৪২ ।

রেণাকুলাস বাছো । (১) ১৪১ । (৩) ১২৭ ।

(৫) ২০ ।

রেণাকুলাস স্কি । (৫) ৩২ ।

সিমিসিফুগা । (১) ১৪১, ১৪২ । (৫) ৮ ।

সেনেগা । (১) ১৪১, ১৪২ । (৫) ১৯ ।

২৯। বক্ষ-সর্দি বা ক্যাটার্

অব দি চেষ্ট্ ।

সিপিয়া । (২) ৩০৪ ।

৩০। বায়ুনালী-প্রতিশ্রায় বা ক্যাটার্

অব দি ব্রংকাই ।

ইরিঞ্জিয়াম । (৫) ২১৬ ।

কোকাস ক্যাক্টাই । (৫) ৩০৪, ৩০৫ ।

৩১। ব্রঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপালারি-

ব্রঙ্কাইটিস্—তরুণ ও প্রবল ; পুরাতন

এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রভৃতি ।

আর্সেনিকাম । (৩) ৪০১ ।

ইপিক্যাক্ । (১) ১১০, ১১২, ১৫০ ।

(২) ৩৮১ । (৩) ১৭৪ ।

একোনাইট । (১) ১১০, ১১১ । (৪) ৮৩,

৮৪ । (৫) ১৬৭ ।

টার্ট । (১) ১১০, ১১১ । (২)

৩৯০ । (৩) ১৭৩, ১৭৪ । (৫) ৯৮,

১৭৬ ।

এমনিয়াম কষ্ট । (৫) ৯৮ ।

এমনিয়াম কার্ব । (৫) ৮৭, ৮৮ ।

এমনিয়াম ফস্ । (৫) ৯৮ ।

এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৪ ।

এলিয়াম সেপা । (১) ১১০, ১১২ ।

এলুমিনা । (৪) ১৪২ ।

কলচিকাম। (৪) ১৪২।
 কটিকাম। (১) ১১০, ১১২। (৩) ৩৪১,
 ৩৪২। (৪) ১৪২।
 কার্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
 কার্ব ভেজ। (৩) ১৭৩, ৪০০। (৫) ৫০৯।
 কোকাস ক্যাঙ্ক। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬।
 ক্যাঙ্ক এসেট। (৫) ১৮৮।
 ক্যাঙ্ক কার্ব। (১) ১১০, ১১২।
 চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৯।
 জেলুসিনিয়াম। (১) ১১১। (৪) ৮৩, ৮৪।
 টেরিবিছ। (৫) ৫৫৫।
 ডাল্‌কামারা। (৩) ৪০১, ৪৫৪।
 নেট্রাম সাল্‌ফ। (১) ১৪২।
 পাল্‌সেটিল। (২) ২০২।
 পিক্‌স্‌ লিকুইড। (৩) ৩৬।
 ফস্‌ফরাস্‌। (১) ১১০, ১১২। (২) ৩৯৯।
 (৪) ২৪৩।
 ফেরাম ফস। (৪) ১১০, ১১১। (৪) ৮০।
 (৪) ১৬৭, ৫১৯।
 বাল্‌সাম পেরু। (৩) ৩৬।
 বেগাডোনা। (১) ১০৪, ১০৯, ১১০, ১১২,
 ১১৩। (৪) ২৪৩।
 ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৫, ১৭৬।
 ব্রয়নিয়া। (৩) ১১০, ১১১, ১৪২।
 ভেরেটাম এল্‌। (৪) ১৪২।
 ভেরেটাম স্টি। (১) ১১০, ১১১। (৪) ৮৪।
 (৫) ১৬৬, ১৬৭।
 রিউমেক্‌স্‌। (১) ১১০, ১১২।
 লাইকোপোডিয়াম। (১) ৩৭৯। (২) ৩০৩।
 (৩) ২৪২, ২৪৩।
 ল্যাকেসিস্‌। (১) ১১০, ১১৩। (৩) ৪০১।
 (৪) ৩০।
 সাল্‌ফার। (৩) ৩৬।
 সিল। (৩) ৪০১। (৫) ২১০।

সেনেগা। (৩) ৪০১।
 হিগার সাল্‌ফ। (১) ১৭১।

৩২। ব্রকোরিয়া বা বায়ু-নালীর শ্লেষ্মা-শ্রাবাধিকা।

কার্ব ভেজ। (৩) ৪০১

৩৩। বস্মাকাস বা থাইসিস্‌।

আয়ডিয়াম। (৫) ১১৭
 আসেনিকাম। (৪) ২৪৬।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।
 এপিক্টিয়া রেসি। (৫) ৮।
 এনাকার্ডিয়াম। (৫) ৬৫।
 এনিসাম ষ্টিল। (৫) ৩১৬।
 এমনিয়াম মিউ। (৪) ২৪৮। (৫) ৯৪
 কার্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
 কার্ব ভেজ। (৫) ৫০৯।
 কোকাস ক্যাঙ্ক। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
 ক্যানাবিস স্ফাটি। (৫) ১৩৪।
 ক্যাপ্‌সিকাম। (৪) ১১৬।
 ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৭, ১৩৪।
 ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৪।
 ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
 ক্যাঙ্কোরিয়া। (২) ২১৩, (৩) ২৭৮, ২৭৯,
 ২৮০। (৪) ১৬৭, ২৪৬, ২৪৭।
 ক্যাঙ্ক আই। (৩) ২৮১।
 ক্যাঙ্ক ফস। (৩) ২৮১।
 টুবাঙ্কু লিনাম। (৩) ২৮১। (৫) ৩২৯।
 ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৫।
 ড্রিসিরা। (৪) ১১৭। (৫) ৫০৪।
 গিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫, ৩১৬।
 নাইটিক এসিড। (৪) ১১৬৬, ১৬৭। (৫)
 ১৩৪।
 পাল্‌সেটিল। (২) ২০২, ২১৩। (৩) ১৬৭।
 পিক্‌স্‌ লিকুইড। (৫) (সম্বন্ধাস)। ৫৫০।
 ফস্‌ফরাস্‌। (৩) ২৭৯, ২৮০, ২৮১। (৪)
 ২০২, ২৪৫—২৪৮।

কস্করিক এসিড। (৪) ২০২।
 ফেরাম মেট। (৫) ৪৭৬, ৫১৪।
 ফেলাণ্ডিয়াম। (৪) ১১৬।
 বোরাকস্। (৪) ৫৫৭।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৬১।
 ব্রায়নিয়া। (৫) ১৩৪।
 মার্টাস্ কস্। (৫) ৩১৬।
 মিলিকোলিয়াম। (৫) ১১০।
 মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
 লাইকোপোডিয়াম। (২) ২০২। (৩) ২৪৩,
 ৪৫৫। (৪) ১৬৭।
 ল্যাক্ ডিফ্লে। (৫) ২২২।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৩১, ৩২। (৫) ৪৭৬।
 কস্কস্ ক্। (৫) (কস্কাস।) ৪৪০।
 । (৩) ৪৫৫।
 স্টেনাম। (৩) ৩৮।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১৬, ১১৭। (৫) ৪৪০।
 সাল্ফার। (৩) ২৭২, ২৮০। (৪) ২৪৬,
 ২৪৭।
 সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
 সিপিয়া। (২) ২২৮, ২২৯, ৩০৪।
 সেনেগা। (৩) ৪৫৫।
 স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৫, ৬৬।
 স্ত্রানুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৬।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৭২। (৫) ১৬৫।

৩৪। রক্তকাস বা হিমপ্টিসিস্

একালিকা ইণ্ড। (৫) ৪৩২।
 এণ্টিম টার্ট। (৩) ৩৭২।
 শুপিয়াম। (৩) ৩৭২।
 কার্ব ভেজ। (৩) ৪১১।
 ক্যান্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ৫৪৮।
 পাল্ সেটলা। (২) ২১৩, ৩১০। (৪) ২৪৩।
 কস্করাস। (২) ২১৩, ৩১০। (৪) ২৪৩।
 সাল্ফার। (৩) ৩৮।

৩৫। ল্যারিজিমাস্ ট্রাইডুলাস বা কর্ণনালী-দ্বার-আক্ষেপ।

আয়ডিয়াম। (৫) ৪৬।
 ইথেনিয়া। (৫) ৪৬।
 ইপিক্যাক। (৫) ৪৬।
 কুপ্রাম মেট। (৫) ৪৬।
 ক্যালকেরিয়া ফস। (৫)
 ফ্লোরিগ। (৫) ৪৬, ৪২।
 বেলাডোনা। (৫) ৪৬।
 ব্রমিয়াম। (৫) ৪৩।
 মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।
 স্ত্রানুস। (৫) ৪৬।

৩৬। স্বাসকৃচ্ছ বা ডিফিকার্ট রেম্পিরেশন।

আসেনিকাম। (২) ৮৫।
 টেবেকাম। (৫) ২৭১।
 সাল্ফার। (৩) ৭।

৩৭। স্বাস-যন্ত্র-রক্ত-শ্রাব।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

৩৮। স্বাসযন্ত্ররোগ।

কোকাস ক্যান্টাই। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
 চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮, ৩৭৯।
 কস্করাস। (৪) ২০২।
 কস্করিক এসিড। (৪) ২০২।
 বেলাডোনা। (১) ১০২।
 লোবেলিয়া। (৫) ৪২৪।
 স্পঞ্জিয়া। (১) ১৭১।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৮।

৩৯। স্বাসরোধ—সাধারণ এবং নব- জাত শিশুর (এস্ফিকসিয়া নিয়ো নেটোরাম।

আর্গিকা। (৩) ৩৭৩।
 এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭১।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩।
 ম্যাটিনাম। (৫) ৫২৩।
 বভিষ্টা। (৩) ৩৭৩।
 লরসিরোসাস্। (৩) ১৭২।

৪০। সেনাইল ক্যাটার্ বা বৃদ্ধ-
 দিগের বায়ুনালীর সর্দি।

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।

৪১। স্বরভঙ্গ বা হোর্সনেস্।

আর্জেন্টাম মেট। (৫) ৪৭২, ৫০৬।
 আণিকা। (৩) ৩৪১।
 ইউপে পার্ফোলি। (৩) ৪০০।
 এরাম টি। (৫) ৪৬২।
 ওপিয়াম। (৩) ৪০০।
 কলিকাম। (৩) ৩৫, ৩০০, ৩৪০, ৪৪১।
 কার্ক ভেজ। (৩) ৩৯২, ৪০০।
 গ্রাফাইটিস। (৩) ৩৪১।
 জেল্‌সিমিয়াম্। (৩) ৪০০।
 নাক্‌স্ মফেটা। (৩) ৪০০।
 ম্যাটিনাম। (৩) ৪০০।
 ফস্‌ফরাস্। (৩) ৩৪১, ৩৯২। (৪) ২৪২।
 রুমেক্‌স্ কুম্প। (৫) ৪৪০।
 সালফার। (৩) ৩৫, ৩৪১, ৪০০।
 সিলিনিয়াম। (৩) ৩৪১। (৫) ৪৬২।
 সেনেগা। (৩) ৪০০।

৪২। স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্

—তরুণ ও পুরাতন; ল্যারিঞ্জিয়াল

ক্যাটার্ বা স্বর-যন্ত্র-প্রতিশ্রায়

এবং স্বর-যন্ত্র-যক্ষ্মা।

আর্জেন্ট নাই। (৪) ৪৪৩।

আর্জেন্টাম মেট। (৫) ৪৬২, ৫৩৬।
 আর্সেনিকাম। (৪) ৩৭৩।
 ইউপে পার্ফো। (৫) ১১৫।
 ইন্ডুলাস হাই। (১) ১০২। (৫) ৫০২।
 একোনাইট। (১) ১০২। (৫) ৬৪।
 এপিস। (৪) ৩০২। (৫) ৪৩৪।
 এমনিয়াম ব্রোম। (৫) ৯২।
 কোকাস ক্যাষ্টাই। (৫) ৩০৪।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৩।
 ক্রোরিন। (৫) ৪৩৪।
 টুবাক্। (১) ১৮০। (৫) ৩২২।
 ডাক্‌মারা। (১) ১৮১। (৩) ৪৫৪।
 ড্রিসরা। (৫) ৪৩৪।
 প্যারিস কোয়া। (৪) ৪৩৪।
 ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৪১।
 ফেরাম ফস। (১) ১০২। (৫) ৫১২।
 বেলাডোনা। (১) ১০২।
 ব্রমিয়াম। (৪) ৩০২।
 ম্যাঙ্গানিস। (৪) ৪৪৩।
 স্টিলিজিয়া। (৫) ৪৩২।
 সালফার। (৪) ৩৭৩।
 সিলিনিয়াম। (৪) ৪৪৩।
 স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৪, ৬৫।
 স্ত্রাম্‌কাস। (৪) ৩০২। (৫) ৪৩৪।
 হিপার সালফ। (১) ১৬৮। (৪) ৩৭৩।

৪৩। স্বরযন্ত্র (ল্যারিঞ্জস্) রোগ।

আর্জেন্টাম। (৪) ৪৪৩।
 এরাম টি। (৫) ৪৬২।
 টুবাক্ লিনাম। (১) ১৮০। (৫) ৩২২।
 ড্রিসরা। (ক্ষত) (৫) ৪৩৪।
 ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৪১, ২৪২।
 সিলিকিনিয়াম। (ক্ষত) (৫) ৩৪১।
 স্ত্রাম্‌কাস্। (যক্ষ্মা) (৫) ৪৩৪।

৪৪। স্বর লোপ (পক্ষাবান্তিক),

এফনিয়া।

- ইউপে পার্কে। (এ) ১১৫।
 এফনিয়াম কষ্ট। (এ) ২৮।
 কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৩৯।
 জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১।
 নেটাম মিউ। (৪) ৮১।
 ফস ফরাস্। (৪) ২৪১।
 সালফার। (৩) ৩৫।
 সিকিলিনাম। (এ) ৩৪১।
 স্ত্রান্নুইনেরিয়া। (এ) ৪৭৮।
- ৪৫। হাঁপানি, হাঁপ-রোগ বা এড্‌মা।
 আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৩।
 আর্সেনিকাম। (২) ৫৫, ৩৮৯। (৪) ৩০৩।
 (এ) ৩৭৫। (এ) ৪২৪।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮৯। (৪) ৩০৩। (এ)
 ৪২৪।
 এপিস। (৪) ৩০৩।
 এষাগ্রিসিয়া। (এ) ৩২২।
 কার্ব ভেজ। (৩) ৪০১।
 কুপ্রাম। (২) ৩৮৯।
 ক্যাপ্সিকাম। (এ) ২৬৬।
 ক্যাম্ফর। (এ) ৪৪৫।
 ক্যালি কার্ব। (৪) ৩৭৫।
 ক্যালি নাই। (এ) ১৪১, ১৪২।
 ক্যালি ফস্। (৪) ৩৭৫।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫।
 ড্রিসিরা। (এ) ২৮৪।
 নাকস ভমিকা। (৩) ৪০২।
 নেটাম সাল্ফ। (১) ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬।
 ব্রমিয়াম। (৪) ৩০৩।
 ব্রাটা অরি। (এ) ৩০৭।
 মন্ডাস। (এ) ২৮২, ২৮৩।
 মেকিটিস্। (এ) ২৮৪, ২৮৫।

- রমেকেস কু। (এ) ২৮৫।
 লাইকোপাস। (এ) ২০১।
 লোবেলিয়া। (২) ৩৮৯। (এ) ৪২৪।
 ল্যাকেসিস্। (৪) ৩০।
 স্ট্রিটা। (এ) ২৮৫।
 স্ট্রামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
 সালফার। (১) ১৭৩—১৭৬।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৭২, ১৭৩, ১৭৪,
 ১৭৬।

৪৬। ছপশব্দক কাসি বা ছপিং কফ।

- আগিকা। (৩) ১২৯।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮৯।
 কুপ্রাম। (২) ৩৮৪। (৩) ২১৩।
 কোকাস ক্যাস্ট্। (৪) ৩৭৫। (এ)
 ৩৫।
 কোরেলিয়াম কুব্। (৩) ২১৪, ২৮৫, ৩০
- ক্যালি কার্ব। (এ) ১৩৩, ১৩৪
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫।
 ক্যালি সাল্ফ। (এ) ৩৫০।
 (৩) ২১৪। (এ) ৩০১।
- ড্রিসিরা। (৩) ২১৩, ২১৫। (এ) ৫০৪।
 গ্রাফ্থ্যালিন। (৩) ২১৪। (এ) ২৮৪।
 ব্রায়নিয়া। (৪) ১৪৩।
 ভেরেটাম এল্। (৪) ১৪৩।
 মন্ডাস্। (এ) ২৮২, ৩৮৩।
 মেকিটিস্। (৩) ২১৪। (এ) ২৮৪, ৩০১।
 ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (এ) ৩৫০।
 লিডাম। (৩) ২১৫। (এ) ২৮৪।
 সিনা। (২) ৩৮৮, ৪০৭।
 স্ত্রান্নুইনেরিয়া নাইট্রেট্। (এ) ৩৫০।
 স্ত্রান্নুকাস। (এ) ৪৩৪।
 হিপার সাল্ফ। (৪) ৩৭৫।

- ৭। পরিপাক-যন্ত্র এবং মুখ-
গহ্বরাদি উদর-যন্ত্র-
রোগ।
- ৯। অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিস্-
পেপ্‌সিয়া, ইন্টিজেশ্বন।
- আর্জেন্টাম নাই। (৩) ৪০। (৪) ৪৪৪,
৪৪৫
- আর্ণিকা। (৩) ১৩১।
- আসেনিকাম। (২) ২০৫, ৩২১। (৩)
২৪৭।
- ইয়েসিয়া। (২) ৩০৫, ৩৪৬। (৪) ৪৪৫।
(৫) ৩৫।
- ইপিক্যাক। (২) ২০৫, ৩২১।
- এক্টিয়া স্পাইকেটা। (৫) ১৩।
- এনাকার্ডিয়াম। (১) ১৮২, ১৮৩। (৩)
২৪৬। (৪) ৪১৬।
- এ'টম ফ্রুড। (২) ৩২১। (৩) ১৪১, ১৫২,
১৫৩।
- এবিস্ কেনাডেনসিস। (৫) ২৫৫।
- এবিস্ নাইগ্রা। (২) ১৫৮, ২০৫। (৩) ২৫,
২৬। (৫) ২৫৭।
- এলুমিনা। (৫) ৮৩।
- কল্‌চিকাম। (৩) ৬৫, ৯৫।
- কার্ব'এনিমেলিস। (৫) ৫০২।
- কার্ব'ভেজ। (২) ১৫২, ২০৫। (৩) ৩২,
২৪, ২৫, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪। (৪)
৪১৬। (৫) ৫০২।
- ক্যান্টাস গ্রাণ্ড। (৩) ২৪৮।
- ক্যামিলা। (২) ৩৭২।
- ক্যালি কার্ব। (৩) ২৬, ৪০৩।
- ক্যালি ক্লোর। (৫) ১৩২।
- ক্যালি বাই। (২) ১৫২। (৪) ৩৭৭।
- ক্যাঙ্ক কার্ব। (৩) ২৮২—২৮৪।
- ক্রিয়োজোট। (২) ১৫৮।
- চেলিডনিয়াম। (৪) ৪১৬।
- টেবেকাম। (২) ৩২০।
- থেইন। (২) ৩২৬।
- নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫, ১৮৩। (২) ১৫৮,
১৫৯, ২০৫। (৩) ৩২, ২০৪, ৪০৩।
(৪) ৪১৬।
- নাক্স মস্কেটা। (২) ১৫৮। (৩) ২৪৬, ৪০৩।
- নেট্রাম কার্ব। (৩) ৪০।
- নেট্রাম মিউ। (২) ২৬০। (৪) ২৪২।
- নেট্রাম সাল্ফ। (৩) ৪০।
- পাল্‌সেটিলা। (১) ১৪৫, ১৮৩, ১৮৪। (২)
২০৪, ২০৫, ৩২১। (৩) ২৫, ২৪৬।
- ফস্‌ফরান্। (৪) ২৪২।
- ফেরাম। (৪) ৪১৬।
- ফ্ল'য়োরিক এসিড। (২) ২৬০।
- বিস্মাথ। (২) ১৫৮। (৪) ২৪২।
- ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫। (৪) ২৪২। (৫) ৮০।
- মিউরেক্‌স্। (২) ৩০৫।
- ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৪, ৩৪৫।
- লাইকপডিয়াম। (১) ১৮৩। (২) ১৫৮,
৩০৬। (৩) ৩২, ২৫, ২৪৫—২৪৮,
৪০৩। (৪) ৪১৬।
- লোবেলিয়া। (২) ৩২০।
- ল্যাক্সিস্। (২) ২৬০। (৩) ২৪৭। (৪) ৪০।
- ষ্ট্যাক্সিসেগিয়া। (২) ৩২০।
- সাল্‌ফার। (২) ১৫২, ৩০৫, ৩০৬। (৩) ৩৮,
৩২, ৪০, ২৪৭। (৪) ২৪২।
- সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৪০৩।
- সিঙ্কনা। (৩) ২৪, ২৫, ২৪৭, ৪০৩।
(৪) ৪১৬।
- সিপিয়া। (২) ৩০৪, ৩০৫। (৩) ২৪৭।
(৪) ২৪২। (৫) ৩৫।
- হাইড্রাষ্টিস্। (২) ৩০৫। (৫) ৩৬, ৩৭।
- হিপর সাল্ফ। (১) ১৮৩, ১৮৫। (২) ২৬০।

২। অল্প-প্রদাহ বা এন্টারাইটিস্।

- কল্‌চিকাম। (৪) ৪৮।
 বাবে'রিস ভ্‌নারিস। (৫) ৩৮১।
 বেলাডোনা। (৪) ৪৮।
 মার্কু'রিয়াস। (৪) ৪৮।
 রাস্‌টল্‌। (৪) ৪৮।
 ল্যাকেসিস্। (৪) ৪৮।
 হিপার সাল্‌ফ্। (২) ১৬৮।

৩। অল্প-বেষ্ট-বিল্লি-প্রদাহ বা
 পেরিটনাইটিস্।

- আর্গিকা। (৪) ৫১।
 একনাইট। (২) ১০১। (৩) ৪৩।
 কল্‌চিকাম। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।
 টেরিবিল্‌। (৪) ১৪৩। (৫) ৫৫৫।
 ডিজট্যালিস্। (৫) ৩৮১।
 প্লাস্‌ম। (৪) ৫০।
 ফেরাম ফস্। (৫) ৫১৯।
 বাবে'রিস ভ্‌নারিস। (৫) ৩৮১।
 বেলাডোনা। (২) ১০৩, ১০১, ১১২, ২৬৮।
 (৪) ৪৮।
 ব্রাঙ্কনিয়া। (২) ১০২, ১০২, ১৩৮।
 (৩) ৪৩। (৪) ৩৪২।
 মার্কু'রিয়াস। (২) ১০২, ১০২, ২৬৮।
 (৪) ৪৮।
 মার্কু'রিয়াস কর। (২) ১০১, ১০২।
 রাস্‌টল্‌। (৪) ৪৮, ৫০, ৩৪২।
 রেনাস্কুলাস বাধো। (৫) ২০।
 ল্যাকেসিস্। (২) ১০১, ১০২। (৪) ৪৮,
 ৫০, ৫১।
 সাল্‌ফার। (৩) ৪৩।

৪। অল্প-রক্তশ্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম
 দি বায়ুয়েল্‌স্।

- টেরিবিল্‌। (৫) ৫৫৫।
 ট্রিলিয়াম। (১) ৫৪৩।

৫। অঙ্গাবরোধ বা অবষ্ট্রাক্‌শন
 অব্‌ দি বায়ুয়েল্‌স্।

- ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬।

৬। অঙ্গের পক্ষাবাতিক দুর্বলতা বা
 প্যারালিটিক উইকনেস্‌ অব্‌ দি
 বায়ুয়েল্‌স্।

- প্লাস্‌ম। (৫) ৫৪১।
 সিকেলি। (৫) ৩৭৪।

৭। অন্ধাঙ্গাদি-প্রদাহ বা টাইফি-
 লাইটিস্‌ ও পেরিটাইফিলাইটিস্
 প্রভৃতি।

- ক্যালি মিউরিয়েটিকাম। (৫) ৫১৯।
 ফেরাম ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
 রাস্‌টল্‌কোডেগুন। (৪) ৩৪৩।

৮। অন্ন-নালী-প্রদাহ বা
 ইস্‌ফেগাইটিস্‌।

- আসেনিকাম। (২) ৯৯।
 বেলাডোনা। (২) ৯৯।
 ভেরেট্রাম ভিরিডি। (১) ৯৯।
 রাস্‌টল্‌। (২) ৯৯।

৯। অর্শ-রোগ বা হিমরয়েডস্‌,
 পাইল্‌স্‌।

- আসেনিকাম। (২) ২০৭।
 ইগেসিয়া। (২) ৩৩০।
 ইস্‌কুলাস হাইপ। (২) ২০৩। (৫) ৫০২।
 এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৯।
 এণ্টিম কুডাম। (৩) ১৫৫।
 এটেনাম। (৫) ১০২।
 এমনিয়াম কার্ব। (২) ২০৭। (৩) ৪১০।
 এলুমিনা। (৩) ৪১০। (৫) ৮১।
 এলো। (৫) ১৯৯।
 কলিন্দনিয়া। (৫) ১৯৯।

কার্ব এনি। (৫) ৫০৯।	আর্সেনিকাম। (২) ৫৭। (৪) ৪৩, ৪৪,
কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৯, ৪১০। (৫) ৫০৯।	৪৫।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ১৯৯।	ইপিক্যাক। (১) ২৬৮। (২) ৩২২। (৩)
ক্রোমাইটিস। (৪) ৪১৬, ৪১৭।	৪২।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪১০।	একনাইট। (৪) ৪১, ২৬৪, ১৬৫, ২৬৭।
নাক্সভমিকা। (২) ১৬০, ১৬১। (৩)	(৫) ১৪২, ৫১৯।
৪১০। (৫) ৫০২।	এলো। (৩) ৪২, ৬৬।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪১০।	ককুলাস ইণ্ড। (৪) ৪৭।
পাল্মেটোলা। (২) ২০৭। (৫) ৫০২।	কলসিহু। (১) ২৬৮। (৩) ১৯৬।
পিওনি। (২) ২০৭, ২০৮।	৩১০।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৫) ১৮৩। (৫) ১৯৯।	কলচিকাম। (২) ৩০৮। (৩) ৬৬, ৬৭,
মিলিফোলিয়াম। (৫) ১১০।	৩১০। (৫) ৪৭।
রেটানিয়া। (৫) ১৯৯।	। (১) ২৬৮।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১।	কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৮, ৪০৯। (৪) ৪৫,
সাল্‌ফার। (২) ১৫৯। (৩) ৪৩, ৪৪।	৪৬, ৪৭।
সিপিয়া। (২) ৩০৭।	ক্যাডমিয়াম। (৪) ৪৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৫।	কাস্থারিস। (১) ২৬৫। (৩) ৬৭, ১৯৬,
হেনামেলিস। (৫) ৪৬৪, ৪৬৫।	৩১০, ৩১১।

১০। অসাড় ও অনৈচ্ছিক বা
ইন্ডল্যাণ্টারি মল-ত্যাগ।

আয়ডিনাম। (২) ২২৭।
এলো। (২) ২২৭।
ওলিয়েগোর। (২) ২২৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
পডফাইলাম। (২) ২২৭।
মিউরিয়েটিক এসিড। (২) ২২৭।
হায়সায়মাস। (১) ৩৫৪।

১১। আমরজুরোগ, রক্তমাশয়
বা ডিসেন্টারি—তরুণ ও প্রবল বা
একুট, নাতিপ্রবল বা সাব-একুট।
পুরাতন বা ক্রনিক সন্নিপাতিক
বা টাইফইড।

আর্গিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৩) ৩১০।
ক্যালি ফ্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৬৭, ৩১১।
(৪) ৪৭।
ক্যাকেরিয়া। (১) ২৬৩।
জিঙ্কাম্‌ সাল্‌ফ। (৩) ৩১১।
ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
ডাক্সানারা। (৩) ৪৫৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮।
নাক্স ভমিকা। (১) ২৬৮। (৩) ৪২, ১৯৬।
পডফাইলাম। (৩) ১৯৬।
ফেরাম ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
বেলাডনা। (১) ২৬৪, ২৬৫।
ব্যাণ্টিসিয়া। (৩) ৪২।
মাকুরিয়াস্‌। (১) ৪১, ১০৪, ১৯৪, ২৬২
—২৬৮। (২) ৩২২। (৪) ৪৩।

মাকু'রিয়াস্ কর। (১) ২৬৩—২৬৭।
(৫) ১৩৯।

মাকু'রিয়াস্ ডাল'সিস্। (১) ২৬৩।

মাকু'রিয়াস্ ভাইভাস। (১) ২৬৩, ২৬৭।

মেক্সিরিয়াম। (৪) ১৬৮।

মাসটক্স। (১) ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮। (৩) ৪২।

(৪) ৩৪৩, ৩৪৪। (৫) ৪৬১।

ল্যাক্সেসিস। (৩) ৪২। (৪) ৪১—৪৭।

মিলিসিয়া। (১) ২৬৩।

সালফার। (৩) ৪২, ৩১০।

সিঙ্কনা। (৪) ৪১, ৪২।

সিপিয়া। (২) ৩০৮।

হিপার সালফ। (৪) ৪১, ১৬৮।

হেমামেলিস। (৩) ৪২।

১২। আমাশয়-কর্কট রোগ বা ক্যান্সার অব দি ষ্টম্যাক্।

কাভুরেস্কো। (৫) ২২৯।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।

ফস্ফরাস্। (৫) ২৪৯।

১৩। আমাশয়-প্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাস্ট্রাইটিস্ ও গ্যাস্ট্রিক্ আল্‌সার।

আর্জেন্টাম নাই। (২) ৫৬, ৫৭। (৪) ৪৪৪,
৪৪৫।

আর্সেনিকাম। (২) ১৪, ১৫, ৫৫, ৫৬,
৫৭। (৩) ৩০৯। (৪) ৩৭৮।

একনাইট। (১) ৪১।

কার্বি ডেজ। (২) ৫৬, ৫৭।

ক্যান্থারিস। (২) ৫৬, ৫৭। (৩) ৩০৯।
(৫) ১৩৯।

ক্যালি বাই। (২) ৫৬, ৫৭। (৪) ৩৭৭।

ফস্ফরাস্। (৪) ২৪৯।

লাইকপডিয়াম। (২) ৫৬।

ল্যাক্সেসিস। (২) ৫৬, ৫৭।

১৪। আমাশয় রোগ বা গ্যাস্ট্রিক্ ডিভের্জমেন্টস্।

আয়ডিয়াম। (১) ৩৮৬।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৪, ৪৪৫।

ইথেরিয়া। (২) ৩৪৬, ৩৪৭। (৪) ৪৪৫।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮২, ৩৮৬। (২) ১৮৪।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।

ক্যাল'কেরিয়া কার্বি। (১) ১০০।

গ্র্যাফাইটিস্। (১) ৩৮২।

চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮১, ৩৮২।

ডায়স্করিয়া। (৪) ৪৪৫।

নাল্ল ভমিকা। (১) ৩৮৬। (২) ৩৪৭। (৪)
৪৪৫।

পালসেটোলা। (২) ২০৩, ২০৪।

পেট্রিলিয়াম। (১) ৩৮২।

ফস্ফরাস্। (৪) ২৪৯।

বিস্‌মাথ। (৪) ২৪৯, ৪৪৫।

বেলাডনা। (১) ৯৯।

ব্রায়নিয়া। (৪) ২৪৯।

১৫। আমাশয়শুল্কতা বা ড্রাইনেস্ অব দি ষ্টম্যাক্।

নাল্ল ভমিকা। (১) ১৪৫।

পালসেটোলা। (১) ১৪৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫।

১৬। আমাশয় হইতে রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি ষ্টম্যাক্।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

১৭। আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ বা

গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টাইন্সিয়াল ইনফ্লামেশন।

ইউকর্কিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।

১৮। আমাশয়ের তুর্ললতা বা উইক্-

নেস্ অব দি ষ্টম্যাক্ ।

এনাকার্ডিয়াম । (১) ৩৯৬, ৩৯৮ ।

গ্র্যাফাইটিস । (২) ৩৯৭ ।

চেলডনিয়াম্ । (২) ৩৯৭ ।

পাল্‌সেটীলা । (২) ৩৯৮ ।

পেট্রিলিয়াম্ । (২) ৩৯৭ ।

১৯। আমাশয়ের শূল বা

গ্যাষ্ট্র্যাল্‌জিয়া ।

অর্জেণ্টাম্‌ নাই । (৪) ৪৪৪ ।

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪০ ।

এরটেনাম । (৫) ১০৩ ।

ক্যামমিলা । (২) ৩৭২ ।

গ্র্যাফাইটিস্ । (৪) ৪১৫ ।

চেলডনিয়াম্ । (৪) ৪১৬ ।

পেট্রিলিয়াম্ । (৪) ৪১৬ ।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ । (৫) ৩৫১ ।

ক্লেমেক্‌স্ । (৫) ৪৪০ ।

২০। উদরযন্ত্রাদিপ্রদাহ—অন্ত্র-বেষ্ট

শ্মিল্পপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্, ডাইসেন্টারিাইটিস্ এবং অক্ষাঘ্রাদি প্রদাহ বা টিফলোইটিস্ প্রভৃতি ।

আর্গিক্‌ । (৪) ৫১ ।

কলচিকাম্ । (৪) ৪৮, ৪৯, ৫১ ।

ক্যাপ্টাস্‌ গ্র্যাণ্ড্ । (৫) ২১ ।

টেরিবিল্‌ । (৪) ৩৪৩ । (৫) ৫৫৫ ।

ডিজিট্যালিস্ । (৫) ৩৮১ ।

প্লাস্মাম্ । (৪) ৫০ ।

বার্কেরিস্‌ জল্ । (৫) ৩৮১ ।

বেলাডনা । (১) ১০০, ১০২ । (৪) ৪৮ ।

ড্রায়নিয়া । (১) ১০১, ১০২, ১৩৮, ১৪৬ ।

(৩) ৪৩ । (৪) ৩৪২ ।

মাক্‌ রিয়াস্ । (১) ১০২, ২৬৮ । (৪) ৪৮ ।

মার্ক্‌ কর্‌ । (১) ১০২ ।

রাসটক্‌স্ । (৪) ৪৮, ৫০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫১ ।

রেনাক্কু বাঘো । (৫) ২১ ।

ল্যাক্সেসিস্ । (১) ১০২ । (৪) ৪৮, ৫০, ৫১ ।

সাল্‌ফার্‌ । (৩) ৪৩, ৪৪

২১। উদর-রোগ বা ডিজিজেক্‌

অব দি এব্‌ডমেন্‌ ।

ইগ্নেসিয়া । (৫) ৪৮৯ ।

একনাইট্‌ । (১) ৪০ ।

এলুমিনা । (৫) ৮১ ।

ডাল্‌কামারা । (৩) ৪৫৬ ।

পাল্‌সেটীলা । (২) ২০৬ ।

প্লাস্মাম্‌ । (৫) ৫৩২

২২। উদরশূল, অন্ত্রশূল, শূলবেদনা

বা কলিক্‌ ।

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪৭ । (৫) ৪৮৯ ।

ইপিক্যাক্‌ । (২) ৩৯১ ।

একনাইট্‌ । (৩) ১২৪ ।

এলাম্‌ । (৩) ৩৭৩ ।

এলুমিনা । (৩) ২১৭ । (৫) ৮১ ।

ওপিয়াম্‌ । (৩) ২১৬, ৩৭৩ ।

ককুলাস্‌ ইণ্ড্‌ । (২) ৩৪১ । (৩) ১২৫ ।

(৫) ৪৮৯ ।

কলসিস্থ্‌ । (১) ১০৩ । (৩) ১৯৩, ১২৪,

১২৫ । (৪) ২৭৮, ৩৪৩ । (৫) ৩৭৫,

৩৪১, ৪২৬, ৪২২ ।

কষ্টিকাম্‌ । (৩) ১২৪ ।

কুপ্রাম্‌ আস্‌ । (৩) ২১৬ ।

কুপ্রাম্‌ মেট্‌ । ২১৬ ।

ক্যামমিলা । (২) ৩৬১ । (৩) ১২৫ ।

ক্যাষ্ট্রিয়াম্‌ । (৫) ২৭৯ ।

ক্রোটন্‌ টিগ্‌ । (৫) ৪২৬, ৪২৭ ।

জিঙ্কাম্‌ । (৫) ৫৩২ ।

ডায়স্করিয়াম্‌ । (৩) ১২৪ । (৫) ৪২২ ।

ডাল্‌কামারা । (৩) ৪৫৬ ।

নাকস্ ভমিকা । (৩) ২১৬, ৩৭৩ ।
পালসেটোলা । (২) ২০৬ ।
প্লাস্ভাম । (৩) ২১৬ । (৫) ৩৫১, ৫৪০ ।
প্লাটিনাম । (৩) ৩৭৩
ভষ্টা । (৫) ৩৬৫ ।
বেলাডনা । (৫) ১০৩ । (৩) ১২৪, ২১৬,
৩৭৩ ।

বয়াক্‌স্ । (৫) ৫৫৭ ।
ভেরেটাম এল্ । (৩) ১২৪ ।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব । (৩) ১২৪, ১২৫ ।
(৫) ৩৪৫ ।
ম্যাগ্নেসিয়া ফ্‌স্ । (৩) ১২৪ । (৫) ৩৫০,
৩৫১ ।

রাস্‌টক্‌স্ । (৪) ৩৪৩ ।
ষ্টেনাম । (৩) ২১৬ ।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া । (৩) ১২৫ । (৫) ২৮ ।
সিঙ্কনা । (৩) ৭৬ ।
হায়সা । (১) ৩২২ ।

২৩। উদরাধান, উদর-ক্ষীতি বা টিম্প্যানাইটিস।

ওপিয়াম । (৩) ৩৭৩, ৩৭৬ ।
কল্‌চিকাম । (৩) ৫৫, ৩৭৭ ।
কার্‌ভেজ । (১) ১০০ । (৩) ২৩৬, ২৩৭,
২৪৮, ৩৭৭ । (৫) ৪৫৪ ।
গ্যাকাইটিস । (৩) ২৪৮ ।
চায়না । (১) ১০০ ।
টেরিবিস্থ । (৩) ৩৭৭ । (৫) ৫৫৫ ।
নাকস্ ভমিকা । (৫) ৫৫৪ ।
নাকস্ স্‌স্টেটা । (৫) ৫৫৪ ।
বেলাডনা । (১) ১০০, ১০৪ ।
রাফেনাস । (৩) ২৪২, ৩৭৭ ।
রাস্‌টক্‌স্ । (১) ১০০ ।

লাইকপডিয়াম । (১) ১০০ । (৩) ২৩৬,
২৩৮, ২৪৮, ৩৭৭ । (৫) ৫৫৪ ।
সাল্‌ফার । (৩) ২৪২ ।
হায়সা । (১) ৩২২ ।

২৪। উদরাময় বা ডাইয়ারিয়া— তরুণ এবং পুরাতন।

আয়ডিয়াম । (৫) ৫৭ ।
আইরিস্ ভাস । (৩) ২৬ ।
আর্জেন্টাম নাই । (৪) ৮৫, ৪৪৫ । (৫)
আর্শিকা । (৩) ১৩১, ১৩২, ৪৩২ ।
আসে নিকাম । (২) ৫২, ১৬৮ । (৩) ২৬-খ ।
(৪) ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১৪৩, ৪৪৫ । (৫) ৪৫৫ ।
ইউফর্কিয়াম রেজি । (৫) ৪২২ ।
ইথুসা সাই । (৩) ২৮৩, ২৮৪ ।
ইলেটেরিয়াম । (৫) ২৫১, ৪২৬, ৪২৭ ।
ইল্যাপ্‌স্‌ কর । (৪) ৪৭ ।
একনাইট । (৪) ৪৪৫ ।
এর্‌ফ্টম ক্রুড । (৩) ১৫৩, ১৫৪, ২৮৩, ২৮৪ ।
এপিস । (৪) ২৫০ ।
এব্রটেনাম । (৫) ১০৩ ।
এরানিয়া ডাই । (৫) ৩১৮ ।
এস্মিনা । (৩) ৪৪০ ।
এলো । (৩) ৪১, ৪৪০ । (৪) ২০৩, ২৫০ ।
(৬) ১২৮, ১২৯, ৩৮৮ ।
ওপিয়াম্‌ (৩) ৩৭৭ । (৪) ৮৫, ১৪৩ ।
ওলিয়াম্‌ মিসিনি । (৫) ৫৬৩ ।
ওলিয়েগার । (৩) ২৬-খ, ৪৪০ ।
ককুলাস্‌ ইণ্ড । (৪) ৪৭ ।
কলসিস্থ । (৩) ১২৫, ১২৬ । (৫) ৩৮৮ ।
কল্‌চিকাম । (২) ৩০৮ । (৩) ২৬-ক ।
(৪) ৪৭ ।

- কার্বন ডাইক্সাইড। (৩) ২৬-ক, ৪০৮, ৪০৯।
 (৫) ৪৫, ৪৬, ৪৭।
 কুপ্রাম। (৪) ১৪৪।
 কাডামিয়াম। (৪) ৪৪।
 কামিল্লা। (১) ১০৩। (২) ৩৬১। (৫)
 ২৮, ৩৪৫।
 ক্যাফরা। (২) ১৭২।
 ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
 ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
 ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৪১,
 (৪) ৪৭।
 ক্যাকেরিয়া। (২) ১৭১। (৩) ২৮২, ২৮৩,
 ২৮৪। (৪) ২০৩। (৫) ৩৮৯, ৪৩৮।
 ক্যাকেরিয়া এসেট। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
 ক্যালকেরিয়া ফস্। (৩) ২৮৩। (৪)
 ৪৪৫।
 কাষ্ট্রিয়াম। (৫) ২৭৯।
 ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
 ক্রোটন টিগ্। (৫) ২৫১, ৪১৬, ৪২৭।
 গ্রাফাইটস। (২) ৩০৮।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৯, ৩৬৭।
 জিঙ্কাম। (৫) ১০৩।
 জেল সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ১৪৩, ৪৪৬।
 জ্যাট্রফা। (৪) ১৪৪। (৫) ৪২৭।
 টুবাকুলিনাম। (৫) ৩২৯।
 টেব্রিবিছ। (৩) ২৬-ক।
 টারাক্সেসকাম। (৫) ১১৯।
 ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
 ডায়ক্সেরিয়া। (৩) ৪১। (৫) ৪২২।
 ডাল কামরা। (৩) ৪৫৬।
 থুজা। (৫) ১২৮।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮।
 নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৭। (৩) ১২৬,
 ৩৭৭।
 নাক্স মস্কেটা। (৩) ৪৪০।
 নিকোটিনা। (২) ১৭১।
 নেট্রাম কার্ব। (২) ১৭১।
 নেট্রাম মাল্ফ। (৩) ৪১। (৫) ১০৩।
 পডফিলাম। (৩) ৪১, ২৬-ক, ১২৬। (৪)
 ২০৩। (৫) ২৫১, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯।
 পালসেটলা। (১) ১৪৩। (২) ২০৬, ২০২।
 (৪) ৮৫, ১৪৩।
 পেট্রিলিয়াম। (৩) ৪১।
 ফস ফরাস্। (৩) ৪১। (৪) ৩৫০।
 ফসফরিক এসিড। (৩) ২৬-ক, ২৮৩।
 (৪) ১২৯, ২০২, ২০৩। (৫) ৩৮৯।
 ফেরাম। (২) ৫৮। (৩) ২৬-খ।
 ফেরাম আর্স। (৩) ২৬-খ।
 ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
 ফেরাম মেট। (২) ৫৮।
 (৫) ৩৮৮, ৪৫৫।
 বেলাডনা। (১) ১০৩, ১০৪।
 বরাক্স। (৫) ৫৫৭।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭। (২) ১৭১, ৩৫৭।
 (৩) ৪১, ২৬, ২৬-ক। (৫) ১২৮।
 ব্রমিয়াম। (২) ১৭১।
 ভেরেট্রাম এল্। (২) ১৭১। (৪) ৮৫, ১৪৩,
 ১৪৪।
 মাকুরিয়াস। (১) ২৬১। (২) ৩৭২।
 (৫) ৩৮৯।
 মাকুরিয়াস কর। (১) ২৬১।
 মাকুরিয়াস কর। (১) ২৬১। (২) ৩৭২।
 (৫) ৩৮৯।
 মেজিরিয়াম। (৪) ১৬৮।
 ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৫।
 রাসটক্স। (৪) ৩৪৩, ৩৪৪।
 রিয়াম। (৩) ২৮৪। (৫) ৪৩৮, ৩৪৫।
 রুমেক্স কু। (৩) ৪১।
 লাইকপডিয়াম। (২) ১৭১।
 লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৬।

লেপ্টাণ্ডা। (৫) ২৫৪
 ল্যাকডিলেপ্স। (৫) ২২২
 ল্যাকেসিস। (৪) ৪১—৪৭।
 স্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৩) ৪৩২। (৫) ২৮।
 স্ট্যামনিয়াম। (১) ৩০২।
 সিলিসিয়া। (৩) ২৮৩। (৪) ১১৭, ১১৮।
 স্মালফার। (২) ১৭২, ৩৭২। (৩) ৪১,
 ২৮২, ২৮৩, ৪৫০। (৫) ১৯৮, ২০৬।
 সিন্ধনা। (৩) ৯৬, ৯৬-ক, ৯৬-খ,
 ১৯৬। (৪) ৪১, ৪২, ২০২। (৫)
 ৩০৮, ৪৫৫।
 সিনা। (২) ৪০৫।
 সিপিয়া। (২) ৩০৭।
 সরিনাম। (৩) ৪৩৯, ৪৪০।
 হাইড্রকুবিলাম। (১) ৩৪৯।
 হিপার সাল্ফ। (৪) ৪১, ১৬৮। (৫) ৪৩৮।

২৫। উদরাময়—প্রাত্যহিক বা মর্নিং ডাইয়ারিয়া।

এলো। (৩) ৪১। (৫) ১৯৮।
 ক্যালি বাই। (৩) ৪১।
 ডায়করিয়া। (৩) ৪১।
 বুজা। (৫) ১৯৮।
 নেটাম সাল্ফ। (৩) ৪১।
 পডফিলাম। (৩) ৪১।
 পেটলিয়াম। (৩) ৪১।
 ফস্ফরাস্। (৩) ৪১।
 ব্রামনিয়া। (৩) ৪১।
 ক্রমেক্স কু। (৩) ৪১।
 সাল্ফার। (৩) ৪১। (৫) ১৯৮।

২৬। উদরাময়—মানসিক বিকার

বশতঃ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৮৫।
 ওপিয়াম। (৪) ৮৫, ১৪৩।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ৮৫, ১৪৩।
 পাল্‌সেটিলা। (৪) ৮৫, ১৪৩।
 ভেরেট্রাম এল্। (৪) ৮৫, ১৪৩।

২৭। কলেরা বা ওলাউঠা— এসিয়াটিকা প্রভৃতি।

আইরিস ভাস'। (৫) ৩৮৯।
 আর্জেণ্টাম নাই। (৩) ২১৮, ২১৯।
 আর্গিকা। (৩) ৪০৮।
 আসে'নিকাম। (১) ৪৩, ৪৪, ৪৬। (২)
 ৫৮—৬৫, ৩২২। (৩) ২১৮, ৪০৬,
 ৪০৭, ৪০৮। (৫) ১৪৪—১৪৭।
 (৫) ৩৭৪।

ইউফ্রাসিয়া কর। (৫) ৪৩০।
 ইউফ্রাসিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
 ইপিক্যাক। (২) ৩২২। (৫) ৩২০।
 ইলেটেরিয়াম। (২) ৩২২। (৫) ৩৮৯।
 একনাইট। (১) ৪২—৪৬। (২) ৬২, ৬৩।
 (৩) ৪০৭। (৪) ১৪৫, ১৪৫, ১৪৬।
 এন্টিম টার্ট। (৩) ১৮২, ১৮৩।

এথা-গ্রিসিয়া।
 ওপিয়াম। (৩) ৪০৮।
 ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
 ক্যাথারিস্। (৩) ৩২২।
 কল্‌চিকাম। (৩) ৬৭, ৬৮। (৪) ৪৮।
 কার্প' ভেজ। (১) ৪৬। (৩) ৯৬-খ, ৪০৪,
 ৪০৮।

কুপ্রাস আর্স'। (৩) ২১৮।
 কুপ্রাস এসেট। (৩) ২১৬।
 কুপ্রাস নেট। (৩) ১৭৫, ২১৬—২২০,
 ৪০৬। (৪) ১৪৪।

কোবরা বা স্মাজা। (৩) ৪০৭।
 ক্যাঙ্করা। (২) ৫৯। (৩) ২১৮, ৪০৬, ৪০৭।
 (৪) ১৪৪, ১৪৫। (৫) ২৭১, ৪৪৪।

- ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৫) ১৮৬।
 ক্যাকেরিয়া ফস। (৫) ১৫২, ১৮৬।
 ক্রোটন টিগ। (৫) ৩৯০।
 জিকাম। (৫) ৫২২, ৫৩২।
 জ্যাট্রফা। (৪) ১৪৫, ১৪৭।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
 টেবেকাম। (৫) ২৭১।
 পডফিলাম। (২) ৩৯২। (৩) ৬৮। (৪)
 ১৪৭। (৫) ৩৮৯।
 প্রনাস স্পাই। (৫) ২৭১, ৪৪৪।
 ফেরাম ফস। (৫) ৫২৯।
 ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬।
 ভেরেট্রান এম্। (২) ৩২, ৬৩, ৬৫।
 (৩) ১৭৫, ১৭৬, ২১৮, ২১৯, ৪০৬।
 (৪) ১৪৪—১৪৭। (৫) ২৭১।
 রাস্টক্‌স্। (১) ৪৬।
 রিসিনাস কন্। (৫) ৫৬৩।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৪৮।
 ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ১০৫।
 সাল্‌ফার। (৩) ৪২, ৪৩। (৫) ৪৪৪।
 সিকেলি। (২) ৬২, ৬৩, ৬৪। (৩) ২১৮,
 ২১৯, ২২০, ৪০৬। (৪) ১৪৫।
 (৫) ২৭১, ৩৭৪।
 সিঙ্কনা। (২) ৬০। (৩) ৯৬-খ। (৫) ১৫২।
 হাইড্রো এসি। (৩) ৪০৭। (৫) ২৭১, ৪৪৪।
 হায়দায়ামাস। (১) ৪৬।
- ২৮। কলেরা—রক্তময় বা ব্লাডি
 কলেরা।
 কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৫, ৪০৬।
- ২৯। কুচকির ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ
 বা ষ্ট্রাম্‌গুলেটেড্‌ ইন্ডুইথ্রাল হাণিয়া।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৬০।
 লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০।

৩০। কুমিরোগ বা ওয়ারম্‌স্।

- ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩০, ৩৪৭। (৫) ৪০২।
 ইঞ্জিগো। (২) ৩৪৮। (৫) ৪০২।
 ক্যালাড়িয়াম। (২) ৪০৯।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (২) ৪০৯।
 টিউক্রিয়াম। (২) ৪০৯।
 ডলিকস্। (৫) ২৩৯।
 সাইকুটা। (৫) ২৩৫।
 সিনা। (২) ৪০৮, ৪০৯।
 সিলেপিস নাইগ্রা। (২) ৪১০।
 স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০। (৫) ৪০২।
 স্মাণ্টনাইন। (২) ৪০৮, ৪০৯।
 স্মাবাইনা। (৫) ৪০২।
 স্মাবাডিলা। (২) ৪১০। (৫) ১৬৩।
 হায়দায়ামাস। (১) ৩১৩।

৩১। কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেশন।

- ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯। (৫) ৫২৪।
 ইন্সুলাস হাই। (৫) ৫০২।
 এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৮, ৩৯৯।
 এন্টিম কুড। (৩) ১৫৪।
 এরটেনাম। (৫) ১০৪।
 এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪১০।
 এমনিয়াম দিউ। (২) ২৬১। (৫) ৯৫।
 এম্‌থ্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
 এলুমিনা। (৩) ৩৯, ৪১০। (৪) ১৪৯। (৫)
 ৮১।
 ওপিয়াম। (২) ১০৩, ১৬০। (৩) ৩৭৩,
 ৩৭৪, ৩৭৫। (৪) ১৪৯। (৫) ৩৪৭,
 ৩৯০।
 কষ্টিকাম। (৪) ১১৮। (৫) ৯৫।
 কার্ব ভেজ। (২) ১৫৯। (৩) ৪০৯, ৪১০।
 কোনায়াম। (৫) ২২৭।
 গ্র্যাফাইটিস্। (২) ৩০৮। (৪) ১১৮, ৪১৬,
 ৪১৭।

জিঙ্কাম। (৫) ১০৩।
 টুবাঙ্কু লিনাম। (৫) ৩৪০।
 থুজা। (৪) ১১১।
 নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪১০। (৪) ৪১৭।
 নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫, ১৪৬, ৩২৮,
 ৩২৯। (২) ১০৩, ১৫২, ১৬৭, ২০৭,
 ২৬০, ৩০৭। (৩) ৪৩, ২৫০, ৪০২,
 ৪১০। (৪) ১৪২। (৫) ৪২৭।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬০। (৩) ৪১০।
 নেট্রাম সাল্ফ। (৫) ১০৩।
 পডফিলাম। (৫) ৩২০।
 পালসেটিল। (১) ১৪৬। (২) ২০৭।
 পিণ্ডনি। (৪) ৪১৭।
 প্লাসাম। (৩) ৩৭৫। (৪) ৫৪১, ৫৪২।
 প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।
 ফস্ফরাস। (৩) ৩৭৫। (৪) ২৫১।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫, ১৪৬। (২) ১০৩,
 ১৬০, ২২৭। (৩) ৩৭৫। (৪) ১৪৮।
 ভেরেট্রাম এল্। (২) ১৬০। (৪) ১০৮।
 (৫) ৩২০।
 ম্যাথ্রেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
 ম্যাথ্রেসিয়া মিউ। (২) ২৬১। (৫) ৪০২।
 রেট্যানিয়া। (৪) ৪১৭।
 লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০। (৩) ২৫০।
 ল্যাক ডিক্লোরটাম। (৫) ২২১, ২২২,
 ৩৪০।
 ল্যাকেসিস। (২) ৪১—৪৭।
 সিলিসিয়া। (৩) ২৫০। (৪) ১১১, ১১৮,
 ৪১৮।
 সাল্ফার। (২) ১০৩, ১৬০। (৩) ৪৩,
 ৩৭৫।
 সিপিয়া। (১) ৩২৮, ৩২৯। (২) ২৭১,
 ৩০৭, ৩০৮।
 সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
 স্ত্রানিকুলা। (৪) ১১১।

হাইড্রাটস। (২) ১৫২। (৫) ৩৬।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৮২। (৪) ৪১।

৩২। ক্যাক্সাম-অরিস বা পচিচ মুখ ক্ষত, মামুর্কির ঘা।

আর্সেনিকাম। (২) ২১। (৪) ৩৫।
 ক্রিয়োজোট। (৪) ৩৬।
 থুজা। (৪) ৩৬।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ৩৫, ৩৬।
 নেট্রাম হাইপক্লোর। (৪) ২৬।
 ফাইটলেকা। (৪) ৩৬।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৩৪।
 মিউরিয়টিক এসিড। (৪) ৩৫।
 লাইকপডিয়াম। (৪) ৩৬।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪, ৩৫, ৩৬।
 স্টাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৫।
 সাল্ফুরিক এসিড। (৪) ৩৬।
 ম্যালিসিলিক এসিড। (৪) ৩৬।
 হেলবোরাস। (৪) ৩৬।

৩৩। গল প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা সোর থোট।

অরাম। (৪) ৪৬৫।
 অয়ডিয়াম। (১) ২৪৬।
 আর্জেন্টাম নাই। (৫) ৮০।
 ইথ্রেসিয়া। (২) ৩৪৫।
 এপিস। (১) ২৮। (২) ২০৩। (৩) ৩০৮।
 এমনিয়াম মিউ। (৪) ৩৭৬। (৫) ২৪।
 এলুমিনা। (৫) ৭২, ৮০।
 ক্যাস্থারিস। (৩) ৩০৭।
 ক্যাপ্‌সিকাম। (৩) ৩০৮।
 ক্যালি কার্ব। (২) ৩৪৫।
 ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭, ৩৭৬। (৫) ১২৮।

ক্যাক্সে ফস । (৪) ৩৭৭ ।
 জেলুমিমিয়াম । (৫) ৮০ ।
 নাইট্রিক এসিড । (২) ৩৪৬ । (৫) ৮০ ।
 নাক্স ভমিকা । (৫) ৮০ ।
 নেট্রাম আর্স । (৫) ৪২৮ ।
 নেট্রাম মিউ । (২) ৩৪৬ ।
 পালসেটিল । (২) ২০৩ । (৫) ৪৮০ ।
 ফাইটলেকা । (৫) ৪২৮ ।
 ফেরাম ফস্ । (৫) ৮০ ।
 বেলাডনা । (১) ২৭, ২৮, ১৭৭ ।
 ব্যাপ্টিসিয়া । (৫) ৪২৮ ।
 জালেয়ানা । (২) ৩৪৬ ।
 মার্ক কর । (১) ২৫৬ ।
 মার্ক প্রোটো-আই । (১) ২৫৬ ।
 মার্ক বিন-আই (১) ২৫৬ ।
 মার্কুরিয়াস । (১) ২৮, ২৯, ২৫৫ । (৪) ৩৭ ।
 লাইকপডিয়াম । ২২, ১৭৮ ।
 ল্যাক কেলিয়াম । (১) ১৭৮ । (৫) ২৮৮ ।
 ল্যাকেসিস । (১) ২২, ১৭৮ । (৪) ৩৭ ।
 ষ্ট্রামনিয়াম । (১) ৩০৬ ।
 সালফার । (১) ২৮ ।
 সিফিলিনাম । (৫) ৩৪১ ।
 স্ফাইনেরিয়া নাই । (৪) ৩৭৭ ।
 হিপর সালফ । (১) ২৮, ২৯, ১৬৮ ।
 (২) ৩৪৫ । (৪) ৩৭ । (৫) ৮০ ।

৩৪ । গলক্ষত বা কুইঞ্জি, সাইয়ানাঙ্কি টনসিলারিজ্ ।

বেলাডনা । (১) ১৭৭ ।
 মার্ক প্রোটো-আই (১) ১৭৮ ।
 মার্ক ভাইবাস । (১) ১৭৭ ।
 লাইকপডিয়াম । (১) ১৭৮ ।
 ল্যাক্ কেলিনাম । (১) ১৭৮ । (৫) ২৮৭ ।

ল্যাকেসিস । (১) ১৭৮ ।
 হিপর সালফ । (১) ১৭৭, ১৭৮ ।

৩৫ । শুদভ্রংশ, হালিশ বা প্রোল্যাপ্সাস রেষ্ঠাই ।

ইয়েসিয়া । (২) ৩৪৮ । (৫) ৩৮৮ ।
 ইন্সুলাস হাই । (২) ২৬১ ।
 এলুমিনা (এলাম ?) । (২) ২৬১ ।
 কলিনিয়া । (২) ২৬১ ।
 কার্ব শেজ । (৫) ৩৮৮ ।
 নেট্রাম মিউ । (২) ২৬১ ।
 পডফিলাম । (৫) ৩৮৮ ।
 রেট্যানিয়া । (২) ২৬১ ।
 সিপিয়া । (২) ২৬১, ৩০৭ ।
 হেমামেলিস । (৫) ৩৮৮ ।

৩৬ । শুভ্রদ্বারের সঙ্কোচন বা কন্ট্রাকশন অব দি এনাস্ ।

ইয়েসিয়া । (৪) ৪২ ।
 ওপিয়াম । (৪) ৪২ ।
 কষ্টিকাম । ৫২ ।
 নাইট্রিক এসিড । (৪) ৪২ ।
 নেট্রাম মিউ । (৪) ৪২ ।
 দ্রাঘাম । (৪) ৪২ ।
 বেলাডনা । (৪) ৪২ ।
 মেজিরিয়াম । (৪) ৫২ ।
 ল্যাকেসিস্ । (৪) ৪৮, ৪২ ।

৩৭ । ডিক্ থিরিয়া বা দুষ্ট-গল-ক্ষত
 আসেনিকাম । (২) ৫৫ । (৩) ৩০২ ।
 ইয়েসিয়া । (২) ৩৪৫ ।

এপিস। (৪) ৩৯, ৩০৬, ৩০৭। (৫) ১৪৩।
 এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৭।
 এরাম টাই। (৩) ৩০৯। (৫) ১৬৮।
 এলাস্টাস। (৫) ৪৭১।
 কার্কলিক এসিড। (৪) ৩৯।
 ক্যাথারিস। (৩) ৩০৮, ৩০৯। (৪) ৩০৭।
 ক্যাম্পসিকাম। (৩) ৩০৮।
 ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
 ক্যালি পামাক্স। (৫) ১৪০।
 ক্যালি বাই। (১) ২৫৯। (৪) ৩৭৭।
 ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৪।
 ক্রোটেলাস। (৪) ৩৯। (৫) ২৭৪।
 ডিফেনবেকিয়া। (৩) ৩০৯।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৭, ১৬৮।
 স্ফাঙ্কা টি। (৪) ৩৯। (৫) ২৭৬, ২৭৭।
 ফাইটলেক্স। (৫) ৪৯৮, ৪৯৯।
 বেলাডন। (১) ৯৭।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) :
 ব্রমিয়াম। (৫) ৪৭।
 মার্ক কর। (৩) ৩০৯।
 মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৮, ২৫৯, ২৬০।
 মার্ক বিন-আই। (১) ২৫৮, ২৫৯, ২৬০।
 মার্কুরিয়াস। (১) ২৫৭—২৬০।
 মিউ এসিড। (৪) ১৬৮, ১৮২।
 রাস্টকস্। (৪) ৪০, ৩৫১।
 রেনাক্স ফি। (৫) ৩১।
 লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪৩—২৪৫।
 (৪) ৩৯।
 ল্যাক্সেনিনাম। (৩) ৩০৯। (৪) ৩৯, ৩০৬
 ৩০৭। (৫) ২৮৭।
 ল্যাক্সেসিস্। (৩) ২৪৪, ২৪৫। (৪) ৩৭, ৩৮,
 ৪৯। (৫) ১৪৩, ২৭৬।
 সামানাইড অব মার্কোরি। (১) ২৫৮, ২৫৯।
 সালফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
 হাইড্রসায়্যা এসিড। (১) ২৫৮।

৩৮। ডিস্ফেজিয়া বা গল-রোধ।
 কষ্টিকাম। (৩) ৩০৮
 জেলসিমিয়াস্। (৪) ৮৩।

৩৯। দস্তমাড়িরোগ বা ডিজিজ্জেজ
 অব দি গাম্‌স্।

(৫) ৫৪৩।

মার্কুরিয়াস্। (১) ১৯৬, ২০২, ২০১।

৪০। দস্তরোগ।

আর্গিকা। (৩) ১৩১।

কফিয়া ক্রু। (৫) ২৭।

ক্যাকেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৫, ১৮৬।

ক্যাকেরিয়া ফ্লুয়ো। (৪) ১১৭। (৫) ১৭১।

ক্রিয়োজোট। (৫) ২৭।

ফ্লুয়োয়িক এসিড। (৫) ৭১।

মার্কুরিয়াস্। (১) ১৯৬, ২৫৪। (৪) ৩৩,
 ৩৪। (৫) ৩১৮।

নেজিরিয়াম। (১) ১৯৪।

ন্যাগ্বেসিয়া কার্ক। (৫) ১৮৬।

ল্যাক্সেসিস্। (৪) ৩৩, ৩৪।

প্ল্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭

সিলিসিয়া। (৪) ৩৩, ১১৭।

সিফিলিনাম্। (৫) ৩৪০।

হিপার সাল্ক। (৪) ৩৩।

৪১। দস্তশূল বা টুথ্-এক্।

আর্সেনিকাম্। (২) ৭৮।

ইউফ্রিসিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।

একনাইটাম্। (১) ৩৩।

এরানিয়া ডায়। (৫) ৩১৮।

কফিয়া ক্রু। (৫) ৫৫২।

ক্যামমিলা। (১) ২৫৫। (২) ৩৭০, ৩৭১।
 (৫) ২৭, ৩৪৬।

ক্রিয়াজোটি । (১) ২৫৫ । (৫) ২৭ ।

থুজা । (৪) ২৭৭ ।

নাক্স ভমিকা । (৫) ৩৪৬ ।

প্ল্যাণ্টেগো মেজর । (২) ১২৮ ।

ব্রায়নিয়া । (১) ১৪৯ ।

মাকু'রিয়ান্স । (১) ২৫৪ । (৪) ৩৩ ।
(৫) ৫২৩ ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব । (৫) ৩৪৪, ৩৪৬ ।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ । (৫) ৩৫০, ৩৫১ ।

রাস্টকস । (৪) ৩৪২ ।

রেটারনিয়া । (৫) ৩৪৬ ।

ল্যাক্সেসিস্ । (৬) ৩৩ ।

হায়না । (১) ৩২৯ ।

৪২ । দস্তুর স্কত বা কে'রিজ, নালীস্কত

বা ফিশ্চুলা এবং ক্ষয় বা ডিকে

প্রভৃতি রোগ ।

এণ্টিম জু । (৬) ১৫১ ।

ক্যাঙ্কেরিয়া ফুয়ে । (৫) ৭১ ।

থুজা । (৪) ২৭৭ ।

সিফিলিনাম । (৫)

৪৩ । দস্তোৎপাটন জন্তু শোণিত-

শ্রাব ।

আর্গিকা । (৩) ১৩১ ।

ট্রিলিয়ান । (৫) ৫৪৪ ।

৪৪ । দস্তোত্তেদ (শিশুর) বিকার ও

তন্দ্রাটিত জর এবং আক্ষেপাদি

রোগ ।

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৩৮ ।

ইথুসা সাই । (৫) ২১৩ ।

ইপিক্যাক । (২) ৩৮৮ ।

একনাইট । (২) ৩৭০ । (৫) ২৩৮, ২৩৯ ।

এগারিকাস । (৫) ৩৬৩ ।

ক্যামমিলা । (১) ১০৩ । (২) ৩৬৮, ৩৭০ ।

(৫) ২৭ ।

ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব । (১) ১০৪ । (২) ৩৭১ ।

(৩) ২২৩ ।

ক্যাল্কেরিয়া ফস । (৩) ২৮২ ।

ক্রিয়াজোটি । (৫) ৫৩৫ ।

জিঙ্কাম । (৫) ৫৩৫ ।

ডলিকস্ । (৫) ২৩৮, ২৩৯ ।

পডফাইলাম । (৫) ৩৮৭ ।

ফেরান ফস । (২) ৩৭০ ।

বেলাডনা । (১) ৭৬, ৯০, ১০৩, ১০৪ ।

(২) ৩৭১ । (৩) ২৮১ । (৫) ৩৫১ ।

মাকু'রিয়ান্স । (১) ১০৪ । (২) ৩৭১ ।

মিলিলোটাস । (৫) ২৪৪ ।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস । (৪) ৩৫০, ৩৫১ ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ । (৫) ৩৫৬ ।

৪৫ । ছা'বা, পাণ্ডু, কামলা বা

জগ্গিস্ ।

কার্ডাস নেরি । (৫) ১০৬, ১০৭ ।

ক্যামমিলা । (১) ১৪৬ । (২) ৩৭২ ।

ক্যালি কার্ব । (১) ১৪৬ ।

ক্রোটোনাস । (৫) ২৭৪ ।

চেলিডনিয়ান । (১) ১৪৬, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৭৪

ডলিকস্ । (৫) ২৩৯ ।

ডিজিট্যালিস । (২) ৩০৬ । (৪) ৩২৪ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ৩৭২ । (৩) ৯৬-গ ।

পডফাইলাম । (৫) ৩৮৭ ।

প্লাস্ফাম । (৫) ৫৬৪ ।

ফস্ফরাস । (৪) ২৫১ ।

বার্বে'রিস ভজা । (১) ১৪৭ ।

ব্রায়নিয়া । (১) ১৪৬ । (২) ৩৭২ ।

মার্ক ভাইভাস । (১) ২৬০ ।

মাকু'রিয়ান্স । (১) ২৬০, ২৬১ । (৫) ৩৮৮,

যাকাফিলা । (১) ১৪৭ ।
লেপ্টোগ্রা । (১) ২৬১ ।
ল্যাকেসিস । (৪) ৪০ ।
সাল্ফার । (৩) ৪০, ৯৬-গ ।
সিঙ্কনা । (৩) ৪০, ৯৬-গ ।

৪৬। পরিপাক যন্ত্র-রোগ ।

এপ্টিম জুড । (৩) ১৫২ ।
ক্যাস্টারিস । (৩) ৩০২ ।
জিঙ্কাম । (৫) ৫৩০, ৫৩৩ ।
ব্রায়নিয়া । (২) ১৪৫ ।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস । ৩৫০, ৩৫১
হিপার সাল্ফ । (২) ১৭৭ ।

৪৭। পিত্ত-শিলা বা গল্‌ষ্টোন,
বিলিয়ারি কাল্কুলাই এবং
পিত্ত-শূল বা বিলিয়ারি
কলিক প্রভৃতি ।

ক । (৩) ৪০, ৯৬-গ ।
কার্ডাস মেরি । (৩) ৭৬, ১০৭ ।
চেলিডনিয়াম । (২) ৩৭৪ ।
। (৫) ৪২২ ।
পডফাইলাম । (৫) ৩৮৭ ।
ম্যাথাম । (৫) ৫৬৪ ।
বার্কেরিস ভুজা । (৩) ৪০, ৯৬-গ ।
(২) ৩৭২ ।
লাইকপডিয়াম । (৩) ২৪২ ।
সাল্ফার । (৪) ৪০ ।
সিঙ্কনা । (৩) ৪০, ৭৬, ৯৬-গ ।
হাইড্রাষ্টিস । (৩) ৪০, ৯৬-গ ।

৪৮। প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ ।
ফসফরাস । (৪) ২৫১ ।

৪৯। প্রদাহিক উদরশূল বা
ইনফ্রামেটরি কলিক ।

একনাইটাম । (২) ৪১ ।

৫০। প্রদাহিক উদরাময় বা
ইনফ্রামেটরি বা সামার
ডাইয়ারিয়া বা ইংলিশ
কলেরা ।

একনাইটাম । (১) ৪১, ৪২ ।
ফেরাম ফস । (৫) ৫১২ ।
মার্ক করসাইভাস্ । (৫) ৫৬৩ ।
মার্কুরিয়াস । (২) ২৬১ ।
রিসিমাস কম্ । (৫) ৫৬৩ ।

৫১। প্লীহারোগ বা এন্‌লার্জমেন্ট
অব স্প্লিন ।

আর্গিকা । (৩) ১০৪ । (৫) ২৬৬ ।
এরানিয়া ডায়া । (৩) ১০৪ ।
কোনায়াম । (৩) ১০৫ ।
ক্যাপসিকাম । (৩) ১০৫ । (৫) ২৬৬ ।
চাইনিয়াম সাল্ফ । (৩) ১০৪ ।
চেলিডনিয়া । (৩) ১০৫ ।
নেট্রাম মিউ । (২) ২৬৬ । (৩) ১০৫ ।
পিণ্ডোরিয়া রোবাষ্টা । (৩) ১০৫ ।
ফেরাম মেট । (৩) ১০৬ । (৫) ২৬৬ ।
বার্কেরিস ভুজা । (৩) ১০৫ ।
বেলিস । (৩) ১০৫ । (৫) ২৬৬ ।
সাল্ফার । (৩) ১০৫ ।
সিঙ্কনা । (৩) ১০৪ ।
সিড্রন । (৫) ৫৫৮ ।
সিয়ানোথাস । (৩) ১০৫ ।
সিনা । (৫) ২১০ ।

৫২। ফাঁসবন্ধ-অস্ত্র-বৃদ্ধি-রোগ বা

স্ট্রাঙ্কুলেটেড হার্শিয়া।

- একনাইটাম। (১) ৪৬।
ককুলাস ইণ্ড। (২) ১৬০।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬০।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০।

৫৩। ফিলার অব দি এনাস্ বা মল-
দ্বারের বিদারণ এবং ফিশ্চু লা অব দি
এনাস্ ও রেঙ্কাম বা মলদ্বার এবং
সরলাঙ্গের নালীক্ষত।

- গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৬, ৪১৭।
থুজা। (৫) ৩৪০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮, ৪১৭।
পিওনি। (৪) ৪১৭।
প্যাটিনাম। (৫) ৫২৫।
বার্কেরিন্স ভঙ্কা। (৫) ৩৭৯।
রেট্যানিয়া। (৪) ১৬৯, ৪১৭।
সিলিসিয়া। (৪) ১১৮, ৪১৭, ৪১৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
স্ট্রাঙ্কু নাইট্রেট্। (৪) ১৬৯।

৫৪। ফ্যারিঞ্জাইটিস্ বা গলকোষ-
প্রদাহ।

ইন্ফুলাস্ হাই। (৫) ৫০২।

৫৫। বমন বা ভমিটিং এবং
বিবমিষা বা নসিয়া—মদ্যপায়ী এবং
গর্ভিনীর প্রাত্যহিক ও অস্থায়

নানাবিধ বমন।

- আইরিস ভাস্। (৫) ৩৯৬।
আসেনিকাম। (২) ২৭৪।

কর। (৫) ৪৩০।

- ইথুসা। (৩) ২৮৪। (৫) ২১২, ২১৩।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৭।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৯।
এন্টিম ফ্রুড। (৩) ১৫২, ২৮৪।
কল্চিকাম। (২) ২৭৪।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।
ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৮২। (৪) ২৫০।
ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৪। (৫) ৫৩০,
৫৩৬।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স ভমিকা। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯,
২৭৪।

- পেট্‌লিয়াম। (৫) ৫৬০।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৫০।
বিসমাথ। (৪) ২৫০।
লোবেলিয়া। (৫) ৪৯৪।
স্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৮১।
সিপিয়া। (২) ২৭৪।

৫৬। মুখ-গহ্বরের প্রদাহ ও
ক্ষত বা সোরযাউথ, এফথি বা
জাড়ী যা এবং লালাস্রাব বা
শ্যালিভেশন প্রভৃতি রোগ।

- এরাম ট্রাই। (৫) ৫৫৭।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮, ১৩৯।
ক্যালি বাই। (৫) ১২৮।
ক্রুরিণ। (৫) ৪৯।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
নাইট্রিক এসিড। (১) ২৫৩, ২৫৪। (৪)
১৬৭।
বরাক্‌স্। (৫) ৫৫৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৩০, ৪৩১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (৫) ৫৫৭।

মাকু'রিয়াস্। (১) ১২৪, ১২৬, ২০২, ২০৩, ২৩১, ২৩৩, ২৫৩, ২৫৪।

মিউ'রিয়েটিক এসিড। (৪) ১৬৭।

য়েনাক্স্ ফি। (৫) ৩১।

ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৪।

সাল ফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

হাইড্রাটিস কেনা। (৫) ৪৬১।

৫৭। যকৃতের অপকৃষ্টতা—

বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি অপকৃষ্টতা-

রোগ বা ডিজেনারেশন।

অরাম। (৪) ৪৬৬।

ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।

৫৮। যকৃতের পীতক্ষয় বা

ইয়োলো এট্রফি অব দি লিভার।

ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।

৫৯। যকৃতের প্রদাহ, রক্তা-

ধিক্য, বিবৃদ্ধি, ব্রণশেথ বা পূয়-

শেথ বা এবসেস এবং শ্রাবা

প্রভৃতি নানাবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৬।

আইরিস ভাস'। (৫) ৩২৬।

আসেনিকাম। (২) ১৮৮।

ই। (৩) ১৫৪।

ইপিক্যাক। (৩) ৪০, ১৫৪।

এটিস জুড। (৩) ১৫৪, ১৫৫।

এমনিয়াম মিউ। (৫) ২৪, ২৫।

এলো। (৫) ১০৭, ১২২।

কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৬, ১০৭।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫,

৩৮১। (৩) ২৪২।

টিলিয়া টি'ফো। (৫) ৩৫৬, ৪০২

ডিজিট্যালিস। (২) ৩০৬। (৪) ৩২৪, ৩২৫।

নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।

নাক্স্ ভনিকা। (২) ২০৮। (৩) ৪০

২৬-গ। (৫) ৪০২।

নেট্রাম সাল্ফ। (৩) ২৫০।

পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।

পালসেটিলা। (২) ২০৮। (৩) ১৫৪।

ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।

বার্কে'রিস। (৩) ৪০, ২৬-গ। (৫) ৩৭২।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩। (৩) ১৫৪। (৫) ৪০২।

মাকু'রিয়াস। (১) ২৬০। (৫) ৩৫৫,

৩৫৬, ৩৮৮, ৪০২।

মাকু'রিয়াস ভাই। (১) ২৬০।

মিউ'রি এসিড। (৪) ১৮৩।

ন্যাগেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৫, ৩৫৬, ৪০২।

য়েনাক্স্ ফি। (৫) ৩২।

লাইকপড। (২) ২০৮। (৩) ২৪২, ২৫০।

ল্যাকেসিস। (৩) ৪০। (৪) ৪১।

ল্যাক্টিকা। (৫) ১০৮।

সাল্ফার। (৩) ৪০, ৪১, ২৬-গ।

সিঙ্কনা। (২) ২০৮। (৩) ৪০, ২৬-গ।

সিড্রন। (৫) ৫৫৮।

সিপিয়া। (২) ৩০০, ৩০৬। (৪) ৩২৫।

(৫) ১২২।

সিলিনিয়াম। (৩) ৪০।

হাইড্রাটিস। (৩) ৪০, ২৬-গ। (৫) ৩৬,

১০৭।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৫।

৬০। যকৃতের ক্ষয়রোগ বা

সিরোসিস অব দি লিভার।

অরাম। (৪) ৪৬৬।

চেলিডনিয়াম। (৪) ২৪২।

নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।
নেটাম সালফ। (৩) ২৪৯।
ফসফরাস। (৪) ২৫১।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ২৮৩।
লাইকপড। (৩) ২৪৯।

৬১। রক্তাতিসার বা ব্লাডি ডাইয়ারিয়া।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।
কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৫।

৬২। শিশু-কলেরা।

আইরিস ভাস। (৪) ১৪৮।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৫।
আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।
ইপিক্যা। (২) ৩৮৩।
ইলেটেরিয়াম। (৪) ১৪৮।
একনাইট। (৫) ৫১৯।
এম্বাগ্রিসিয়া। (৩) ৩৭৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩, ৩। (৪) ৪৪৬।
কার্ব ভেজ। (৩) ৩৭৭।
ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২।
ক্যাঙ্ক কার্ব। (৩) ২৮৩।
ক্যাঙ্ক ফস। (৫) ১৫২।
ক্রেটিন টিগ। (৪) ১৪৮। (৫) ৩৯০।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯, ৫৩২।
জেল্ সিমিয়াম। (৪) ৪৪৬।
পলক্কাইলাম। (৪) ১৪৮। (৫) ৩৮৯।
পাল্‌সেটিল। (৪) ১৪৮।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৪৫৬।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪৮,
।। (৩) ৩৭৮।
সিঙ্কনা। (৫) ১৫২।

সরিনাম। (৩) ৩৭৮, ৪৫৫।
হিপার সালফ। (৩) ৪৩৮।

৬৩। সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্।

এপমর্ফিয়া। (৫) ৩১৫।
ককুলাস ইও। (৫) ৪৮৯।
টেবেকাম। (৫) ২৭০, ২৭১।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫।
পেটুলিয়াম। (৫) ৫৬০।

৬৪। হিকা বা হিকাফ, সিঙ্ক্যান্টাস্।
ইয়েনিয়া। (২) ৩৪৭।
মস্কাস। (৫) ২৮২।

৬৫। হিমোটিমিসিন্ বা রক্ত-বমন।
আইলেগো। (২) ২১৩।
পাল্‌সেটিল। (২) ২১৩।
ফসফরাস। (২) ২১৩, ৩১০।
মিলিফোলিয়াম। (২) ২১৩।

৮। পুং-জননেদ্রিয়রোগ।

১। অণ্ডকোষ বা মুক্-প্রদাহ বা
অর্কাইটিস এবং অণ্ডকোষ-সংশ্লিষ্ট
বিবিধ রোগ।

অরাম। (২) ২১০। (৪) ৪৬৭। (৫) ১,
৪১৫।
এব্রটেনাম। (৫) ১০২।
কোনায়াম। (২) ২১০।
ক্লিমেন্টিস্। (৫) ১৫।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫, ৪১৬।
জেল্ সিমিয়াম। (২) ২১০। (৪) ৮৬।
।। (৪) ২৭৭, ২৭৮।
পাল্‌সেটিল। (২) ২০৯, ২১
(৪) ৪১৬। (৫) ৬৭, ৪০২

পেটোলিয়াম। (৪) ৪১৬।
 রডডেওন। (৪) ৪৬৭। (৫) ৪১৫।
 হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।
 ষ্ট্যাফিসেথ্রিয়া। (২) ২১০। (৫) ৪১৫।
 সাসাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
 স্পঞ্জিয়া। (২) ৪১০। (৫) ৬৬, ৬৭।
 হেমামেলিস। (২) ২, ১০। (৫) ৬৭।

২। জলদোষ বা হাইড্রসিল।
 (জলশোথরোগ দেখ)।

৩। ধ্বজভঙ্গ বা ইস্পোটেন্স্‌।

এগ্রাস ক্যাস্টাস্‌। (৫) ৪০৪।
 এভিনা স্টাটিভা। (৫) ৪৫৬।
 কোনায়াম। (৪) ২৫৩।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৮৫।
 গ্র্যাফাইটিস্‌। (৪) ৪১৮।
 প্রাশাম। (৫) ৫৪০।
 ফসফরাস। (৪) ২৫৩।
 ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৫৬।
 সরিনাম। (৩) ৪৪০।

৪। পুং-জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ।

রোগ।

অরাম। (৪) ৫৬৭।
 এগ্রাস্‌ ক্যাস্টাস্‌। (৫) ৫০৪।
 রডডেওন। (৪) ৪৬৭।
 ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৫৬।
 সরিনাম। (৩) ৪৪০।

৫। প্যারাক্রাইমোসিস্‌ বা
 উন্টামুদা।

কলসিছ্‌। (৩) ১২৩।
 মাকু'রিয়াস্‌ সল। (১) ২৭৩।

৬। প্রাষ্টেটগ্রাহিপ্রদাহাদিরোগ।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৬।
 ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
 খুজা। (৪) ২৭৭।
 পাল্‌সেটলা। (২) ২১০।

৭। ফাইমোসিস্‌ বা মুদারোগ।

কলসিছ্‌। (৪) ৩৯৭।
 মাকু'রিয়াস্‌ সল। (১) ২৭৩। (৪) ৩৯৭।
 সাল্‌ফার। (৩) ৪৬।

৮। ভেরিকোসিল বা অণু-

শিরার্কুদ।

পাল্‌সেটলা। (২) ২১০।
 হেমামেলিস্‌। (২) ২১০।

৯। শুক্র-মেহ বা স্পার্মা-

টোইরিয়া—স্বপ্নদোষ।

অরাম। (২) ৩০৮। (৩) ৪৬৭।
 ইরিঞ্জিয়াম। (৫) ২১৬।
 এগ্রাস্‌ ক্যাস্টাস্‌। (৬) ৪৫। (৪) ৮৭।
 (৫) ৪০৪।
 কোনায়াম। (২) ৩০৮। (৫) ২২৭, ২২৮,
 ৫৩৩।

কোবাল্ট। (২) ১৬২।
 ক্যাস্থারিস। (৩) ৩১১।
 ক্যাল্যাডিয়াম। (৩) ৪৫। (৪) ৮৭। (৬) ২৮।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক। (২) ১৬২। (৩) ৪৪,
 ২৮৪

গ্র্যাফাইটিস্‌। (২) ৩০২।
 জিঙ্কাম। (২) ৩০৮। (৫) ২২৭, ৫৩৩।
 জেল'সিমিয়াম। (৩) ৪৪। (৪) ৮৬।
 ডারফ'রিয়াম। (৩) ৪৪। (৪) ৮৬।
 ডিজিট্যালিস। (৪) ৮৬, ৩৯৭।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬২। (৩) ৪৪।
 (৪) ২০৫।
 নাক্স লুটিয়া। (৫) ৪০৪।
 নেটাম কস্। (২) ২৬২।
 নেটাম মিউ। (২) ২৬২।
 পিক্রিক এসিড। (৪) ২০৫।
 প্লাটিনাম। (৫) ২৮।
 ফসফরাস্। (৪) ২০৫।
 ফসফরিক এসিড। (৩) ২৬-গ। (৪) ২০৪,
 ২০৫।

মাক্স রিয়াম্। (১) ১২৬। (৩) ৩২৪।
 লাইকপেডিয়াম। (২) ১৬২। (৩) ৪৫,
 ২৫৩।
 লিডাম। (২) ১২৬।
 স্ট্যাফেসেপ্টিয়া। (২) ১৬২। (৩) ৪৫।
 (৫) ২৮।
 স্ট্রিক্মিয়া। (২) ১৬২।
 সাল্ফার। (২) ১৬২। (৩) ৪৪।
 সাসপেন্শিয়াল। (১) ১২৬।
 সিঙ্কনা। (৩) ২৬-গ। (৪) ২০৫।
 সিপিয়া। (২) ৩০৮। (৫) ২২৮।
 সিলিনিয়াম। (৩) ৪৫।

৯। প্রদর্শক লক্ষণ এবং
 চিকিৎসাসৌকর্যার্থ অন্যান্য

জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। অনিদ্রা ও অস্থিরতা

প্রভৃতি।

আসেনিকাম। (২) ৩৬৬।
 একনাইটাম। (২) ৩৬৬।
 এপিস। (২) ৪০৩।
 কামমিলা। (২) ৩৬৫।
 রাসটক্‌স্। (২) ৩৬৬।

চ

সিনা। (২) ৪০৩।
 স্টাটনাইন। (২) ৪০৩।

২। আঘাত বা ইঞ্জুরি—রোগ-
 কারণ।

আর্গিকা। (১) ২২। (৩) ১১৩, ১২৩।
 একনাইটাম। (১) ২২।
 রাসটক্‌স্। (৪) ৩৩১।
 কামমিলা। (২) ৩৫৩।

৩। অভিসম্পাত ও শপথ করিবার
 অদম্য ইচ্ছা।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩২১।
 নাইট্রিক এসিড। (১) ৩২২।
 লিলিয়াম টাই। (১) ৩২২।
 ল্যাক্‌ কেবিনাম্। (১) ৩২২।

৪। অগ্নাতিশযা এবং অল্পবিষ্ঠা।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (১) ১৮৫। (৩) ২৭১।
 ম্যাগ্নেসিয়া কার্ক। (১) ১৮৫।
 রিয়াম্। (১) ১৮৫।
 হিপর সাল্ফ্। (১) ১৮৫।

৫। অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনা প্রবণতা
 —মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং
 স্নায়বীয়।

আর্গিকা। (৩) ২০, ২১।
 আসেনিকাম। (২) ৪১, ৩৬৬।
 ইথ্রেসিয়া। (২) ১৩২, ৩১২, ৩৩১।
 (৪) ২২৮।
 একনাইটাম। (২) ৪১, ৩৩১, ৩৬৬।
 এন্টিম ক্রুড্। (২) ৪০৩। (৩) ১৪১, ১৪২,
 ১৫০।
 এপিস। (৪) ২০, ২২৬।
 কফিয়া। (২) ১৩৩, ১৩৪, ৩৫২।

কলচিকাম । (৩) ৫৫ ।
 ক্যাপসিকাম । (৩) ৯১ ।
 ক্যামিলা । (২) ১৩১, ১৩৩, ২৯৫, ৩৫১,
 ৩৫২, ৩৬৩, ৩৬৬, ৪০৩ । (৩) ৯০ ।
 ক্রিনোজোটিম । (২) ৩৫২, ৩৬৪ ।
 ট্যারেন্টলা । (৪) ২২৮ ।
 নাকস ভমিকা । (২) ১০১, ১০২, ১৩১,
 ১৩২, ১৩৩, ৩৩১, ৩৬৩ । (৩) ৫৫ ।
 (৪) ২২৮ ।
 প্লাথাম । (৩) ৯১ ।
 ফস্ফরাস । (৪) ২২৮ ।
 ফস্ফরিক এসিড । (২) ২৯৬ ।
 বার্কেরিস । (২) ২৯৫ ।
 বেলডিনা । (১) ৬৬ । (২) ১৩৩ । (৩) ৯০ ।
 (৪) ২০ ।
 ব্যাণ্টিসিয়া । (৩) ৯১ ।
 ব্রায়নিয়া । (২) ১৩২, ২৯৫, ৩৫১, ৩৬৩ ।
 রাস্ টকস্ । (২) ৩৬৬ ।
 ল্যাকেসিস । (৩) ৯১ । (৪) ২০ ।
 ট্রাক্সিসেগ্রিয়া । (২) ১৩২, ৪০৪ । (৩) ৫৫ ।
 ট্র্যামনিয়াম । (২) ১৩৩ ।
 সিঙ্কনা । (২) ১৩৩, ১৩৪ । (৩) ৯০, ৯১ ।
 সিনা । (২) ১৩১, ৩৫২, ৩৬৪, ৪০৪ ।
 সিপিয়া । (২) ২৯৫ । (৩) ৯০ ।
 স্ট্যান্টনাইন । (২) ১৩১, ৪০৪ ।
 হিপার সাল্ফার । (২) ১৬০ ।

৬। অস্থিরতা এবং উৎকর্ষাদি ।

আর্সেনিকাম । (১) ১৭ । (২) ৪০, ৪১ ।
 একনাইটাম । (১) ১৬, ১৭ । (২) ৪১ ।
 রাস্ টকস্ । (১) ১৬ । (৪) ৩৩১ ।

৭। আত্মহত্যা করণেচ্ছা ।

অরাম । (৪) ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২ ।

আর্সেনিক । (৪) ৪৬২ ।
 নাইট্রিক এসিড । (২) ১১৪, ১১৫ । (৪) ৪৬১ ।
 নাকস ভমিকা । (২) ১১৪ । (৪) ৪৩১ ।
 নেট্রাম সাল্ফ । (২) ১১৪, ১১৫ ।
 স্ট্রাজা । (৪) ৪৬১ ।
 হিপার সাল্ফ । (৪) ৪৬১ ।

৮। আশ্রয়মধ্যে কখন ভয়কর
 জালা, কখন বরফবৎ শীতলতা ।
 কল্চিকাম । (৩) ৬৩ ।

৯। আহারান্তে রোগের হ্রাস অথবা
 বৃদ্ধি ।

এনাকার্ডিয়াম । (১) ৩৯৩ ।
 ক্যালি বাই । (২) ১৩৯ ।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক । (২) ১৩৯ ।
 নাকস ভমিকা । (২) ১৩৯, ১৮৯ ।
 নাকস মস্ফেটা । (২) ১৩৯ ।
 পালসেটলা । (২) ১৮৯ ।
 লাইকপডিয়াম । (২) ১৩৯ ।
 ল্যাকেসিস । (২) ১৩৯ ।

১০। ইচ্ছা ও ঘৃণা এবং মুখাশ্বাদ ও
 মুখ এবং নিশ্বাসের দুর্গন্ধ প্রভৃতি ।

আর্জেন্টাম নাই । (৪) ৪৩৭, ৪৩৮ ।
 আর্সেনিকাম । (২) ৫১ ।
 এটিম ক্রুড । (৩) ১৬৯ ।
 এটিম টার্ট । (৩) ১৬৯ ।
 এলো । (৩) ১৬৯ ।
 ককুলাস । (৩) ৬৪ ।
 কল্চিকাম । (২) ৫১ । (৩) ৫৫, ৬১, ৬৪ ।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক । (৩) ২৭১ ।
 নেট্রাম মিউ । (২) ২৫০, ২৬৫ ।
 মার্কুরিয়াস । (১) ২৩১ ।
 সিপিয়া । (২) ৫১ ।

১১। উদর অথবা বস্তি-কোটর-
যন্ত্রের কিছা উভয়ের ঠেলামারা বা
ঝুলিয়া পড়া।

এগারিকাস। (২) ২৭৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩।
নেটাম মিউ। (২) ২৬৩, ২৬৪।
প্লাটিনাম। (২) ২৬৪।
বেলাডনা। (১) ১০০। (২) ২৬৪।
মিউরেক্স। (২) ২৭৩।
লিলিয়াম। (২) ২৬৪, ২৭৩।
সিপিয়া। (২) ২৬৪, ২৭৩, ২২১, ২২২।

১২। উদরাদিমধ্যে ক্রণাদি জীবন্ত
পদার্থের বা কোন আগন্তুক পদার্থের
বর্তমানতা বা সঞ্চালনের অনুল্লভি।

ক্রোকাস। (৩) ৭।
। (৩) ৭। (৪) ২৭৪।
সাল্ফার। (৩)।

১৩। উদরাদি যন্ত্রাভ্যন্তরে খালি,
কিছু না থাকে অথবা শূন্য বোধ।

ইথেসিয়া। (২) ৩০২।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ২২২, ২২৩।
কার্ক ডেজ। (২) ২২২।
চেলডনিয়াম। (২) ২৭২।
নেটাম কার্ক। (২) ২২৩।
কস্করাস। (২) ২৭২, ২২৩।
(৪) ২২২।
মিউরেক্স। (২) ২৭৩।
ষ্টেনাম। (৪) ২২২।
সাল্ফার। (২) ২২৪। (৩) ২৭।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ২২২, ২২৪।
সরিলাম। (৩) ২৭।

১৪। উদরায়ান বা পেটকাঁপা।

অর্জেস্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৭৪। (৩) ৬৪।
কলচিকাম। (৩) ৬৪।
কার্ক ডেজ। (১) ১০০। (২) ৭৪। (৩)
২৩৬, ২৩৭, ৩২৬, ৩২৭।
চায়না। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, ২৩৭,
৩২৭।
ফস্ফরাস। (৪) ১২২।
বেলাডনা। (১) ১০০। (৩) ৬৪।
রাস্টক্স। (১) ১০০।
লাইকপডিয়াম। (১) ১০০। (৩) ৬৪,
২৩৬, ৩২৭।

১৫। উদ্বেদ বসিলে বা অস্তম্মুখী
হইলে এবং শ্রাব বসিলে রোগ।

আর্সেনিকাম। (২) ৬৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১১১।
থুজা। (৪) ২৭৩।
বারাইটা কার্ক। (৪) ১১১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১০, ১১১।
সাল্ফার। (৩) ৪। (৪) ১১১।
সরিলাম। (৪) ১১১।
স্তানিকুলা। (৪) ১১১।

১৬। ঋতু সন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষি-

য়সীদিগের শেষ ঋতুরোধকালের
অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিত-
শ্রাব, তাপোচ্ছাস, তপ্তবর্ষ এবং
মূর্দ্ধার জ্বালা ও শিরঃশূল প্রভৃতি।

ক্যালি বাই। (২) ২২০।
নাইটেট্‌ অব এমিল। (২) ২২০।
মেডরাইনাম। (৩) ৫।

ল্যাকেসিস। (২) ২২০। (৪) ১৮, ১৯। | ১৮। কৃশতা এবং রক্তহীনতা।
 সাল্ফার। (২) ২৮৯। (৩) ৫।
 সাল্ফুরিক এসিড। (২) ২৮৯।
 সিপিয়া। (২) ২৮৯। (৪) ১৯।
 স্ফালুইনেরিয়া। (৩) ৫। (৪) ১৯।
 স্তানিকুলা। (৩) ৫।

১৭। ঔষধ ও তাম্রকূট, মজা এবং
 অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যাদির
 অপব্যবহার এবং অত্যাগ্র বিবিধ
 কারণজনিত বিষক্রিয়া।

আর্গিকা। (৫) ৮৯।
 আর্সেনিকাম। (২) ৬। (৫) ২৬৭।
 ইগ্নেসিয়া। (৫) ২৬৭।
 ইপিকাক। (৫) ২৬৭।
 এন্টিমকুড। (৩) ১৪২।
 এমনিরাম কার্ব। (৫) ৮৯।
 ক্লিমেটিস। (৫) ২৬৭।
 ক্লরিণ। (৫) ৪৯।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬০।
 জেলসিমিয়াম। (৫) ২৬৭।
 টুবাকু লিনাম। (৩) ৭।
 টেবেকাম। (৫) ২৬৭।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১০৪। (৫) ২৬৭।
 প্লাটেগো। (৫) ২৬৭।
 ফস্ফরাস। (৫) ২৬৭।
 স্কুমোরিক এসিড। (৫) ৭১।
 বভিষ্টা। (৫) ৮৯।
 লাইকপডিয়াম। (৫) ২৬৭।
 লিডাম। (৫) ৪২৩।
 স্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১।
 সাল্ফার। (৩) ৭, ৮।
 সিল্কনা। (৩) ৭৭।
 সিপিয়া। (৫) ২৬৭।
 সয়নিয়াম। (৩) ৭।

আয়ডিয়াম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 আর্সেনিকাম। (২) ২৪৪।
 এত্রটোনাম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 এসেটিক এসিড। (২) ২৪৪।
 ক্যালি কার্ব। (২) ২৪৫।
 গ্র্যাফাইটস্। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 চায়না। (২) ২৪৫।
 নেট্রাম নিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 পাল্‌সেটোলা। (২) ২৪৫।
 ফস্ফরাস। (২) ২৪৪, ২৪৫।
 ফস্ফরিক এসিড। (২) ২৪৫।
 ফেরাম। (২) ২৪৪।

১৯। “কোমার্ভিজিল বা টাইফ-
 মেনিয়া”, অচেতনাবস্থায় উন্নীলিত
 চক্ষু সহ অস্পষ্ট কথন।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৪।
 ভেরেটাম এল। (১) ৩৩৪।
 হায়সারামাস। (১) ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭।

২০। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা
 এক্শন ও রি-এক্শন।

একনাইটাম। (১) ১৪, ২৭, ৪৫।
 ওপিয়াম। (১) ১৪৩।
 বেলাডোনা। (১) ৪৫।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪২।
 ভেরেটাম ভিরি। (১) ২৭।

২১। ক্রোধ, শোক, হুঃখ, ভীতি
 অথবা নৈরাগ্র প্রভৃতি মানসিক
 উপশান্ত—রোগ-কারণ।

ইগ্নেসিয়া। (১) ২১। (২) ৩২০, ৩৩৭,
 ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৪৪, ৩৮০।

একনাইট। (১) ২১। (২) ৩৬৪। (৪)
১২৮।

এনকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৭।

ওপিয়াম। (১) ২১। (২) ৩৩৭, ৩৩৯।

(৩) ৩৫০, ৩৭১, ৩৭২। (৪) ১২৮।

কুপ্রাম। (২) ৩৩৯।

ক্যামসিলা। (২) ৩৩৯, ৩৫২, ৩৬৪, ৩৬৮,
৩৭২, ৩৭৫।

মোনোইন। (২) ৩৩৯।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৬৭।

নাক্স ডমিকা। (২) ৩৫২, ৩৬৪।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৭২।

বেলাডনা। (১) ৫৪, ১০৭। (২) ৩৩৯।

ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮, ১২৪, ১৪৬। (২)
৩৬৪, ৩৭২।

ভেরেট্রাম এল্। (১) ২১। (২) ৩৩৯। (৪)
১২৮।

ষ্ট্যাক্সেসিগ্রিয়া। (২) ৩৬৪

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১।

হায়দ্রামাস। (১) ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬।
(২) ৩৩৯।

২২। গলমধ্যে “ক্লক্ ক্লক্” শব্দ।

সিন। (২) ৪০৪।

স্ট্যানাইন। (২) ৪০৪।

২৩। গীতি-বাত্ত সহ রোগশব্দক।

একনাইটাম। (১) ৩।

টারেন্টলা। (৫) ৩০৯।

নেট্রাম কার্ব। (১) ৩।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯২।

স্ট্রাইন। (১) ৩।

২৪। শোবাস হিষ্টরিকাস বা গলা

বাহিরা পিণ্ডাকর বস্ত্র উঠা।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৪০।

এসাকিটা। (২) ৩৪১।

ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪১।

২৫। ঘর্মের স্থান ও ঘর্মপ্রকৃতি।

আর্সেনিকাম। (১) ২৩২।

ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫।

কার্ব স্বেজ। (২) ৭৩। (৩) ৩৯৫।

ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭০।

ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ২৭০।

গ্যাকাইটিস। (৪) ১১১।

নাইট্রাম। (১) ২৩২।

বেলাডনা। (১) ৬৮।

ব্যারাইটা কার্ব। (৪) ১১১।

ভেরেট এল। (১) ২৩২। (৪) ১৩৯।

মাক্ রিয়াম। (১) ২৩২, ২৪০।

সিলিসিয়া। (৪) ১১০, ১১১।

সরিগাম। (১) ২৩২। (৪) ১১১।

স্যানিকুলা। (৪) ১১১।

২৬। জাণশক্তির অভাব।

(শুশ্রূ-বায়ু দেখ।)

২৭। জাণশক্তির কষ্টকর প্রথরতাদি।

ককুলাস ইঙ্। (৩) ৬৪।

কল্‌চিকাম। (৩) ৬৪।

২৮। জাণ অসহিষ্ণুতা।

(শুশ্রূ-বায়ু দেখ।)

২৯। চক্ষু ও চক্ষুমণির বা পিউ-

পিলের বিস্তৃতি

বেলাডনা। (১) ৬৭, ২৯৩, ২৯৪।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৩, ২৯৪।

৩০। চাপে রোগের হ্রাস অথবা

বৃদ্ধি।

ক্যালি কার্বনিকাম। (১) ১২৮।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৮৮।

ফস্ফরাস। (৪) ২৩০।

বেলাডনা। (১) ১২৮।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮।

৩১। চিকিৎসা সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিষয়।

আর্সেনিকাম। (২) ৩৯।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৩৪।

ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫, ৩৬৯।

নাক্স ভমিকা। (২) ১২৯।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩।

পাল্মেটোলা। (২) ১৮৫।

সিনা। (২) ৪০৪।

সরিণাম। (৩) ৪৩৫।

স্যাটর্নাইন্। (২) ৪০৪।

৩২। ছিপি, গৌজ, কাঁটা, গোলা বা

গুম্ব, লোহার পতর, ব্যাণ্ডেজ বা

ফিতা এবং জীবন্ত জঁক প্রভৃতি

স্বাস্থ্যবিধি ঔষধক বস্তু

শরীরের স্থানবিশেষে থাকার

জ্ঞান কষ্টপ্রদ লক্ষণ

উৎপাদনের অহুভূতি।

আর্জেন্টাম নাই। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৫।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৭, ৩৯২, ৩৯৩।

এলুমিনা। (১) ১৬৯।

কার্বনিক এসিড। (১) ৩৯২।

ক্যাঙ্কাস। (১) ৩৯২, ৩৯৩।

ক্যালি কার্ব। (২) ৩৪৬।

ডলিকস। (১) ১৭৭, ৩৯২।

নাইট্রিক এসিড। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।

(২) ৩৪৬। (৪) ১৬৩, ১৬৪।

নেট্রাম মিউ। (২) ৩৪৬।

অ্যালুমিনিয়া। (২) ৩৪৬।

সাল্ফুরিয়াস। (১) ১৬৯।

সিলিসিয়া। (১) ৩৯২।

সাল্ফার। (১) ৩৯৩।

সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩, ২৯১, ২৯৪।

হিগার সাল্ফ। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।

(২) ৩৪৫।

৩৩। জলশোধ বা ইডিয়ার

বর্তমানতা।

এপিস। (৪) ২২৭।

৩৪। জলাতরু এবং শ্রোত-জল-শঙ্ক-

শ্রবণ ও জল বা তদ্বৎ চাকচিক্য-

শালী বস্তু-দর্শন রোগের বা

রোগবৃদ্ধির কারণ।

ক্যান্থারিস। (১) ৩৪৯।

বেলাডনা। (১) ২৪৪, ৩৪৯।

ট্রায়নিয়াস। (১) ২২৪, ৩০১।

হাইড্রফিলাম। (১) ৩৪৯।

হায়সারামাস। (১) ৩৪৮, ৩৪৯।

৩৫। জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৮।

আর্সেনিকাম এল। (২) ২৫১। (৫) ৩১৭,

৩৮৮।

একনাইটাম। (৩) ১৪৯।

এন্টিম ক্রুড। (৩) ১৪৯।

এলাস্থাস। (৩) ১৪৯।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭০।

চেলিডনিয়াস। (১) ১৯৫, ২০২, ২৩১,

৩৭৫।

টারাক্সেসকাম। (২) ২৫১। (৫) ৩১।

নাক্স ভমিকা। (২) ১১৭। (৩) ১৪৯।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৫০। (২) ৩১।

পড্কাহিলাম। (১) ১৯৫, ২০২, ২৪১।

(৫) ৩৮৮।

ব্রায়নিয়া। (৩) ১৪৯।

মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৬।
 মার্কুরিয়াস। (১) ১২৬, ২০২, ২৩১।
 (৩) ১৪৯। (৫) ৩৮৮।
 যাক্স ফিলামেন্টস। (৫) ৩৮৮।
 রাসটক্স। (১) ১২৬, ২০২, ২৩১। (৫) ৩১,
 ৩৮৮।

রেণাঙ্কুলাস ফি। (৫) ৩১।
 ল্যাকেসিস। (৪) ১১৪।
 ষ্ট্রামনিয়াম। (৫) ৩৮৮।
 সাল্ফ। (৩) ১৪৯।
 সিপিয়া। (২) ২৭৩।

৩৬। কৈবল্যপালতা ও শীতাহুতুতি।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৭১।
 পাল্‌সেটিলা। (২) ১২০।
 সিলিসিয়া। (৪) ১১০।

৩৭। কৈবল্যসক্ষয়—রোগকারণ।

সিঙ্কনা। (৩) ৭৬, ৮২।
 সিঙ্কনা সাল্ফ। (৩) ৭৫।
 ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১২৮।

৩৮। জালা বা বাণিং।

এম্বুসিনাম। (৫) ৩২৪।
 আসেনিকাম। (২) ৪৬, ৪৭। (৩) ২৭,
 ৩০৩, ৩২৮। (৫) ৩২৪, ৩২৫।
 কার্ক ভেজ। (৩) ৩২৮।
 কার্কলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
 ক্যাঙ্কারিস। (৩) ৩০৩, ৩০৪।
 ক্যামিলা। (৩) ২৭।
 ফসফরাস। (২) ৪৭। (৩) ২৭। (৪) ২২৭।
 মেডরাইনাম। (৩) ২৭।
 টেরেন্টুলা কু। (৫) ৩২৫।
 লাইকপড। (৩) ২৭।
 ল্যাকেসিস। (৫) ৩২৫।
 সাল্ফার। (২) ৪৭। (৩) ২৭।
 সিকেলি। (২) ৪৭।

৩৯। ডিসক্রেশিয়া, ডার্মাটিসিস এবং ক্যাকেক্শিয়া।

আসেনিকাম। (২) ২৫।
 কোকাস ক্যাঙ্ক। (৩) ২৫৩।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৩২।
 মার্কুরিয়াস। (১) ১২৯।
 লাইকপড। (৩) ২৫১।

৪০। তাপোচ্ছ্বাস, ঘর্ষ ও মুচ্ছার ভাব।

এমিল নাই। (২) ২৮২, ২২০।
 ক্যালি বাই। (২) ২৮২, ২২০।
 ল্যাকেসিস। (২) ২৮২, ২২০।
 সাল্ফার। (২) ২৮২। (৩) ২৭।
 সাল্ফ এসি। (২) ২৮২।
 সিপিয়া। (২) ২৮২।

৪১। তৃষ্ণা এবং জলপান।

আসেনিকাম। (১) ৩৫২, ৩৭০, ৩৭১।
 (২) ৫, ৪৪, ৪৫।
 ইউপো পাপু। (১) ৩৫২, ৩৭০, ৩৭১।
 একনাইটাম। (১) ১৬, ১২২। (২) ৪৫।
 এপিস। (২) ১২১। (৪) ৭৭।
 ক্যাঙ্ফর। (১) ৩৫২।
 ক্যান্ডারিলা। (১) ৩৭০, ৩৭১।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭০।
 জেলসিমিয়াম। (৪) ৭৭।
 নাক্স মস্কেটা। (২) ১২১।
 পাল্‌সেটিলা। (১) ২২, ১২৬। (২) ৭১,
 ২১। (৪) ৭৭।
 ফসফরাস। (২) ৪৫।
 বিসমাথ। (২) ৪৫, ৪৬।
 বেলাডনা। (১) ১২২।
 ব্রামনিয়া। (১) ১২২।
 মার্কুরিয়াস। (১) ৩২, ১২৬। (২) ১৮২।
 (১) ৩৫২, ৩৭০, ৩৭১।

৪২। স্বপ্নদেদ-বিশিষ্টতা এবং
কণ্ঠস্বন-প্রকৃতি।

- ইয়েসিয়া। (৩) ২৪।
এলুমিনা (এলাম)। (৩) ২৪।
এসফিটিডা। (৩) ২৪।
কার্ক এনি। (৩) ২৪।
ক্যামিলা। (৩) ২৪।
ক্রোটন টিগ্। (৩) ২৪।
গ্র্যাফাইটিস্। (৩) ২৪, ৪৩২, ৪৩৩। (৪)
৪১২, ৪১৩।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩২০।
পালসেটিলা। (৩) ২৪।
বোরাক্স। (৩) ২৪।
মাকু রিয়ার। (৩) ২৪।
মেজিরিয়াম। (৩) ২৪।
রাস্টক্স। (৩) ২৪।
লাইকপড। (৩) ২৪।
সালফার। (৩) ২৪, ২৫, ৪৩২, ৫৩৩।
সিলিকন। (৩) ২৪।
সরিনাম। (৩) ২৫, ৪৩২, ৪৩৩।
হাইড্র্যাট্টিস্। (৩) ১৪।
হিপার সাল্ফ। (৩) ২৪।

৪৩। হর্বলতা বা ডিবিলিটি এবং
নিম্ন-চূরাল ঝুলিয়া পড়া প্রকৃতি।

- আয়ডিয়াম। (২) ২৪৫।
আসেনিকাম। (২) ৪১, ৪২, ২৪৪।
(৩) ৬৩, ৩২৬। (৪) ১৮১।
এব্রটেনাম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
এসেট এসিডাম। (২) ২৪৪।
ওপিয়ার্। (৪) ১৮১।
কলচিকাম। (৩) ৬৩।
কার্ক ভেজ। (৩) ৩২৬।
ক্যালি কার্ক। (২) ২৪৫।
গ্র্যাফাইটিস্। (২) ২৪৪, ২৪৫।

- জেঞ্জিমিয়াম। (৪) ৭৬, ৭৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
পালসেটিলা। (২) ২৪৫।
ফস্ফরাস্। (২) ২৪৪, ২৪৫। (৪) ২২৭।
ফস্ফরিক এসিড। (২) ২৪৫।
ফেরাম। (২) ২৪৪।
মিউরিব্রেটিক এসিড। (৩) ৩২৬। (৪) ১৮০
১৮১।
ল্যাকেসিস। (৪) ১৮১।
সিঙ্কনা। (৩) ২৪৫। (৩) ৮২।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৫।

৪৪। ধাতু বা কনস্ট্রিক্টিউশন্।

- আর্গিকা। (৩) ১১২।
আসেনিক। (২) ৪, ১৩।
ইয়েসিয়া। (২) ৩১৮, ৩১৯।
একনাইট। (১) ৩, ৪, ৪৩, ৪৪।
এনকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৫।
কলচিকাম। (৩) ৫৫।
ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৬৯।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৮।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১০—৪০২, ৪১১, ৪১২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৬।
পালসেটিলা। (২) ১৬৮, ১৬৯, ১৭০।
ফস্ফরাস্। (৫) ২১০, ২২৬, ২২৭।
নাক্স-ডমিকা। (২) ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৮।
বেলাডনা। (১) ৫১, ৫২, ৬৩।
ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭২, ১৭৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৩।
ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৭৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ৯৫, ১০৮, ১০৯, ১১১।
সালফার। (৩) ৩, ৪, ৪৩১।
সিকেলি। (৫) ৩৭০।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৫।
সিনা। (২) ৩২৬।
সিপিয়া। (২) ২৭০।

সোরিনাম। (৩) ৪৩২।
হায়সায়ামাস্। (১) ৩১৩।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৩, ১৫৪।

৪৫। নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও
বিস্তার।

এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮।
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮০।
লাইকপডিয়াম্। (১) ৩৮০। (৩) ২৪২।

৪৬। নিদ্রা, তামসী নিদ্রা ও
নিদ্রালুতাদি এবং নিদ্রাস্তে রোগের
হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯।
এপিস। (৩) ১৬৯।
ওপিয়াম্। (৩) ১৬৯, ৩৬৪।
নাক্স মস্কেটা। (৩) ১৬৯। (৫) ৫৫৪।
ফসফরিক এসিড। (৪) ১২৮।
বেলাডনা। (৩) ৩৬৪।
ল্যাকেসিস্। (৩) ২০।
ট্র্যাননিয়াম্। (৩) ৩৬৪।
হায়সায়ামাস্। (৩) ৩৬৪।

৪৭। পতন, হিমাক্ত বা কোল্যাপ্স-
লক্ষণাদি।

আসেনিকাম। (৪) ১৩৯।
একনাইটাম্। (১) ৪৫। (৪) ১৪০।
কার্ব ভেজ্জ। (৩) ৪০৫। (৫) ৩৩৭।
কুপ্রাম মেট। (৪) ১৩৯, ১৪০।
ক্যান্ফরা। (১) ৪৫। (৪) ১৩৯, ১৪০।
(৫) ৩৩৭, ৪৪২, ৪৪৪।
ক্যালি কেরো-সায়। (৫) ১৪৭।
ল্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৩৯, ১৪০।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬, ৩৩৭।
সিকেলি। (৫) ৩৩৭।

৪৮। পুরাতন রোগ-বিষ-বান্ধ বা
ক্রনিক-ডিজিজ-মায়াক্রম—সোরা,
মাইকোসিস্ এবং সিকিলিস্।

একনাইটাম্। (১) ২৪।
ক্যালি কার্ব। (১) ১৫২।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৬৩, ৩৭৮।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। (১) ১৫৮, ১৫৯।
টুবার্কু লিনাম্। (১) ১৮০।
ডাক্কারা। (১) ১৮১। (৩) ৪৪৫।
থুজা। (৪) ১৫৬, ২৬৪, ২৬৫, ২৮০,
৩৭৮।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৪, ২৮০।
পাল্‌সেটিল। (৪) ৩৭৮।
মাকু রিয়াস্। (১) ১৫৮। (৪) ১৫৬, ২৮০।
মেডরাইনাম্। (৫) ৩৩১।
রাস্টক্‌স্। (৩) ৪৪৫।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ১৮০।
সার্স পেরিলা। (৪) ৩৭৮।
সাল্ফার। (১) ১৫৮, ১৫৯, ১৭৩, ১৭৪,
১৭৫। (৩) ৭, ৯—১২। (৪) ২১৪।
সিপিয়া। (২) ২৭৪, ২৭৭।
সোরিনাম্। (৩) ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭।
(৫) ৩৩১।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৮, ১৬৭, ১৭২—
১৮০।

৪৯। প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে
বিশেষ বিবরণ।

আর্শিক। (৩) ১২৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১২৯, ১৮৫, ১৮৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩।
পাল্‌সেটিল। (২) ১৮৫, ১৮৬।

সাল্‌ফার। (৩) ২৪।

সিঙ্কনা। (৩) ৮২।

সিমা। (২) ৪০২।

৫০। প্রোডাহের অভাবাদি।

বেলাডনা। (১) ২২১, ৩৩২।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২২১, ৩৩২।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

৫১। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম।

এনাকার্ভিয়াম। (১) ৩২২।

কুপ্রাম। (৩) ২০৪।

থুজা। (৪) ২৭৪।

বেলাডনা। (১) ৬৬, ২২১। (৩) ২০৪।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২২১, ২২৩।

হায়সায়ামাস। (১) ২২১, ৩৩৩। (৩) ২০৪।

৫২। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের

পর রোগের বৃদ্ধি।

আসেনিক। (২) ১৩৬।

এগারিকাস। (২) ১৩৬।

এনাকার্ভিয়াম। (২) ৩৬১, ১৩৭।

কষ্টিকাম। (২) ১৩০, ১৩৭।

প্র্যাকাইটিস। (২) ১৩৭।

নাক্স' ডমিকা। (২) ১৩৫—১৩২।

নেট্রাম মিউ। (২) ১৩৭, ১৩৮।

ব্রায়নিয়া। (২) ১৩৮।

সাল্‌ফার। (২) ১৩৮।

৫৩। প্রেমবিষয়ক নৈরাশ্র ও

দেহাদি।

কস্‌ফরিক এসিড। (১) ৩৩৪।

হায়সায়ামাস্। (৪) ১২২।

৫৪। বস্তুরিবেশ ভক্ষণে রোগোৎ-

পত্তি।

আসেনিকাম। (২) ৬, ১৭১।

ক্যাঙ্কর। (২) ১৭২।

ক্যাল্‌কেরিয়া। (২) ১৭১।

চায়না। (২) ১৭১। (৩) ২৪।

থুজা। (২) ১৭১।

নিকোটিনা। (২) ১৭১।

নেট্রাম কার্ব। (২) ১৭১।

নেট্রাম মিউ। (২) ১৭১, ২৬০।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৭১, ১৭২, ১৮২।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭। (২) ১৭১।

ব্রমিয়াম। (২) ১৭১।

লাইকপড। (২) ১৭১, ১৭২।

ষ্ট্র্যাক্সিডেসিগ্রিয়া। (২) ১৭২।

সাল্‌ফার। (২) ১৭২।

৫৫। বহুভাষিতা, অত্যাধিক

কথাবলা বা লোকোয়াসিটি।

এগারিকাস। (৪) ২১।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা। (৫) ৪৪৮।

বেলাডনা। (১) ৬৬।

ল্যাকেসিস। (১) ২২৩, ২২৬, ৩৩৩।

(৪) ২০, ২১।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৭৭, ২৭৮, ২২৩, ২২৬,

৩৩৩। (৪) ২১।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৩। (৪) ২১।

৫৬। বক্ষমধ্যে স্নেহায় ঘড় ঘড়

শব্দাদি।

এন্টিম টার্ট। (৩) ১৬৭, ১৬৮।

ওপিয়াম। (৩) ১৬৮।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৮০।

৫৭। বিবাহবিধা বা স্লিয়না ও

বমন।

ইপিক্যাক। (২) ৩৭২, ৩৮৭।

এন্টিম টার্ট। (২) ৩৮৭।

এপোমাক্সিয়া। (২) ৩৮৭।
জিঙ্ক। (২) ৩৮৭।
ডিজিট্যালিস। (২) ৩৮৭।
পালসেটলা। (২) ৩৮৭।
লোবেলিয়া। (২) ৩৮৭।
সাল্‌ফার। (২) ৩৮৭।

৫৮। বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা

এবং মলদ্বারের সংকোচনাধি।

আর্গিকা। (৩) ১১৩।
ইয়েসিয়া। (২) ৩১৯, ৩৩০।
ইপিক্যাক। (২) ৩৭৯।
ইস্কুলাস। (২) ২৩১।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৬।
এমনিয়াম মিউ। (২) ২৪৯।
এলুমিনা। (২) ২৩১।
ওপিয়াম। (১) ৩৫৯। (২) ১০৩।
কলিন্দুনিয়া। (২) ২৩১।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬১।
গ্যাফাইটিস। (২) ৩৯৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৯।
থুজা। (৪) ১১১, ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২৪৯।
নাক্স স্তমিক। (১) ১৩০, ৩৮৭। (২) ১০৩,
১২৩, ১৩৪, ১৩৫। (৩) ১৪১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৮, ২৪৯, ২৩১।
গ্লাসাম। (১) ৩৫৯।
ব্রাসনিয়া। (১) ১২৯, ১৩০। (২) ১০৩,
২৪৮।
রিয়াম। (১) ১৮৫। (৫) ৪৩৮।
রেট্যানিয়া। (২) ২৬১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ১৪৭, ১৪৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১১।

সাল্‌ফার। (২) ১০৩। (৩) ৬, ১২, ২০।
সিঙ্কনা। (৩) ৮৭।
সিপিয়া। (২) ২৬১, ৩০৭, ৩০৮।
স্যানিকুলা। (১) ৩৫৯। (৪) ১১১।

৫৯। বেদনার প্রকৃতি, তাহার
হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার
অভাব।

আর্গিকা। (৩) ১২৩, ১২৫।
আসেনিক। (১) ১৯। (৩) ৩০৩। (৪) ২,
২২৬।
একনাইট। (১) ১৮, ১৯। (৩) ১২৪।
এপিস। (৪) ২২৫, ২২৬।
ওপিয়াম। (১) ২২৪। (৩) ৩৬৪।
কক্ষিয়া। (২) ১৯।
কলসিঙ্ক। (১) ৩৬৯। (৩) ১৮৮, ১৮৯।
ক্যাথারিস। (৩) ৩০৩, ৩০৪।
ক্যাথমিলা। (১) ১৯। (২) ৩৫২, ৩৫৭,
৩৬৪, ৩৬৫।
চেনপডিয়াম। (১) ৩৬৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯।
নাক্স স্তমিক। (২) ১০২।
পালসেটলা। (২) ১৭১।
ফসফরাস। (৪) ২২৫, ২২৬।
ফাইটলেকা। (৩) ১২৪।
বভিষ্টা। (৩) ১৮৯।
বেলাডিনা। (১) ৬৭।
ব্যাণ্টিসিয়া। (৩) ১২৪।
ব্রাসনিয়া। (১) ৩৬৮, ৩৬৯। (৩) ১৮৯।
ভেরেট্রাম এল্‌। (৩) ১৮৯।
রাস্‌টকস। (১) ১৯। (৩) ১২৪।
কুটা। (৩) ১২৪।
গ্লেগু বাব। (১) ৩৬৮।
লাইকপড। (১) ৩৬৯।

লোবেলিয়া । (১) ৩৬৮ ।
 ষ্ট্যাকিসেড্রিয়া । (১) ১৩০ ।
 ট্র্যামনিয়া । (১) ২২৪ । (৩) ৩৬৪ ।
 সালফার । (৪) ২২৬ ।
 সিঙ্কনা । (১) ১৫২ । (৩) ৭৫, ২৫ ।
 হিপার সাল্ফ । (১) ১৫২ ।

৬০ । ভক্ষ্যবস্তু দর্শনে অথবা
 তাহার আত্মাণে বমনোদ্বেক ।

আর্সেনিকাম । (২) ২৭৪ ।
 কল্‌চিকাম । (২) ২৭৪ ।
 নাস্ত্র ভমিকা । (২) ২৭৪ ।
 পালসেটিল । (২) ১৭১ ।
 সিপিয়া । (২) ২৭৪ ।

৬১ । ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং
 ভীতি বশতঃ রোগ ।

আর্সেনিকাম । (১) ১৮ । (২) ৪২, ৪৩, ৪৪ ।
 ইয়েসিয়া । (১) ২১ ।
 একনাইটাম । (১) ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ৩৪ ।
 (২) ৪২ ।
 ওপিয়ারাম । (১) ২১ ।
 কফিয়া । (১) ১৮ ।
 স্কেনেট্রাম এল্ । (১) ২১ ।
 ট্র্যামনিয়ারাম । (১) ৭২, ৩০২ ।
 সর্দিনাম । (৩) ৪০৪ ।
 হায়সায়ামাস । (১) ৩, ৩১৪ ।

৬২ । ভূতপূর্ব্বে কারণসম্ভূত রোগ ।

কার্বি স্কেন্জ । (৩) ৩২৪ ।

৬৩ । মনুষ্যসঙ্গ এবং আলোক
 ভালবাসা ।

ট্র্যামনিয়ারাম । (১) ২২৩ ।

৬৪ । মলদ্বার, গলদেশ এবং উদর
 প্রভৃতিতে স্ফোচনের অমৃতুতি ।

ল্যাকেসিস । (৪) ২১ ।

৬৫ । মলদ্বার, নাসিকারন্ধ্র এবং
 কর্ণকুহর প্রভৃতি শরীর-বাহ্য-
 দ্বারের রক্তিমতা ও ক্ষতাদি ।

নাইট্রিক এসিড । (৪) ১৬৪ ।
 সাল্ফার । (৩) ২৬ ।

৬৬ । মলদ্বারের শিথিলতা এবং
 অনৈচ্ছিক রূপে বা অসাড়
 মলতাগ ।

এপিস । (৪) ২২৩ ।
 এলো । (৩) ৪২ । (৪) ২০৩, ২৫০
 (৫) ১২৮ ।
 ওলিয়েগার । (৩) ২৬, ৫১ । (৫) ৪৫৫
 চায়না । (৩) ৪৪০ ।
 ফস্ফরাস । (৪) ২২২, ২৩০, ৪৫০ ।
 ফস্ফরিক এসিড । (৪) ২০৩ ।
 ব্রায়নিয়া । (১) ১২৫, ১৪৭ ।

৬৭ । মস্তিষ্ক ও মানসিক লক্ষণের
 তুলনা ।

ইয়েসিয়া । (২) ১৩২ ।
 ক্যামিলা । (১) ১৪৭, ১৪৮, । (২) ১৩১,
 ৩৬৩—৩৬৬ ।
 বাক্স ভমিকা । (১) ১৪৭, ১৪৮ । (২)
 ১৩১, ৩৬৩ ।
 ব্রায়নিয়া । (১) ১৪৭, ১৪৮ । (২) ১৩২,
 ৩৬৩ ।

ষ্টাক্সিসেগ্রিয়া। (২) ১৩২।
সিনা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩১।

৬৮। মস্তিষ্কে জলপতন (swashing) বৎ অমুভূতি।

কার্ক এনি। (৪) ৩৩৩।
বেলাডনা। (৪) ৩৩৩।
রাস্টকস্। (৪) ৩৩৩।
সালফুরিক এসিড। (৪) ৩৩৩।
সিঙ্কনা। (৪) ৩৩৩।
স্পাইঞ্জিলিয়া। (৪) ৩৩৩।

৬৯। মানসিক দৌর্কলাবাজক লক্ষণ—অবসাদ, বিষন্নতা, কোমলতা, পরিবর্তনশীলতা এবং

ক্রন্দনাদি।

ইগ্রেসিয়া। (২) ১৮৭, ২৪৬, ২৪৭, ৩৩১।
এপিস। (২) ১৮৭।
নাকস্ ভমিকা। (২) ২৪৭।
নাকস্ মস্কেটা। (২) ১৪৮, ২৪৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৮৮, ২৪৬, ২৪৭।
পালসেটিলা। (২) ১৮৬, ১৮৭, ২৪৭।
ফস্ফুরিক এসিড। (৪) ১২২।
রাস্টকস্। (২) ২৪৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ১৮৭।
সার্নাম। (৩) ৪৩৪।

৭০। মানসিক ভাবোত্তেজনা (ভীতি প্রভৃতি) বশতঃ রোগ।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৬।
ইগ্রেসিয়া। ২১। (২) ৩২০।

ইপিক্যাক। (২) ৩৬৪।
একনাইটাম। (১) ২১। (২) ৩৬৪।
ওপিয়াম। (১) ২১। (৪) ৪৪৬।
কামমিলা। (২) ৩৫৩, ৩৬৪।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৪৪৬।
নাকস্ ভমিকা। (২) ৩৬৪।
ব্রায়নিয়া। (২) ৩৬৪।
ভেরেট্রাম এল্। (২) ৩৩২। (৪) ৪৪৬।

৭১। মুক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।

পালসেটিলা। (২) ১৮২।
রাস্টকস্। (২) ১২০।
সাল্ফার। (৩) ২৫।

৭২। মুখগহ্বর—দন্ত, দন্তনাড়ি ও জিহ্বাদির লক্ষণ।

কার্লি বাই। (৪) ৩৭০।
চেলিডনিয়াম। (১) ২৩১।
থুজা। (৪) ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৮২।
পডফাইলাম। (১) ২৩১।
মার্ক প্রোটো-আই। (৪) ৩৭০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩০, ২৩১। (৪) ১৮২।
মিউরিয়টিক এসিড। (৪) ১৮২, ১৮২।
রাস্টকস্। (১) ২৩১। (৪) ৩৩২।

৭৩। মুখমণ্ডল, নাসিকা ও গুণ্ডাদি স্থানে রক্তিমতা, কলঙ্ক এবং রস-

বিশ্বিকা প্রভৃতি।

আসেনিকাম। (২) ৪০২।
এক্টিম ফুড। (২) ২৪৮।
এক্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫।
কোনায়াম। (২) ২৪৭।

কামমিলা । (২) ৩৫২, ৪০৩ ।
 ক্যানফর । (২) ৪০২ ।
 জেল্‌সিমিয়াম । (৪) ৭৫ ।
 টেবেকাম । (৩) ১৬৮ ।
 টেলুরিয়াম । (২) ২৭২ ।
 নাইট্রিক এসিড । (২) ২৪৮ ।
 নেটাম মিউ । (২) ২২৭, ২৪৭, ২৪৭ ।
 বেলাডনা । (২) ৩৫ ।
 ভেরেটাম এল্ । (২) ৪০২ ।
 রডডেগুন । (২) ২৪৭ ।
 লাইকপড । (২) ২৪৮ । (৩) ১৬৮ ।
 সাল্‌ফার । (৩) ২৬ ।
 সিনা । (২) ৪০২ ।
 সিপিয়া । (২) ২৭২, ১২৪ ।
 স্ট্যানাইন । (২) ৪০২ ।
 হেলিবোরাস । (২) ৩৪৭ ।

৭৪ । মূত্র-লক্ষণের বিশিষ্টতা ।

ক্যাছারিস । (৩) ৩০৪ ।
 নাইট্রিক এসিড । (৪) ১৬৪ ।
 বেঞ্জোইক এসিড । (৪) ৫২, ১৬৪ ।
 লাইকপড । (৩) ২৪০ ।
 সাল্‌ফার । (৩) ৬ ।
 সিপিয়া । (৪) ১৬৪ ।

৭৫ । যে কোন প্রকার শযায় শয়ন

করুক না কেন তাহার অসহনীয়
 কাঠিঠামুভূতি প্রযুক্ত কোমল
 শয্যাংশের অমুসন্ধানে রোগীর
 অনবরত শয্যার চতুর্দিকে
 স্থান পরিবর্তন ।

আণিকা । (৩) ১২৩ ।
 একনাইট । (৩) ১২৪ ।

চায়না । (৩) ১২৫ ।
 ফাইটলেকা । (৩) ১২৪ ।
 ব্যাপ্টিসিয়া । (৩) ১২৪ ।
 রাস্‌টক্‌স্ । (৩) ১২৪ ।
 রুটা । (৩) ১২৪ ।
 ট্র্যাকিসেগ্রিয়া । (৩) ১২৪ ।

৭৬ । রস বা লসীকাগ্রস্থির স্ফীতি ও বিবৃদ্ধি ।

ক্যাকেরিয়া কার্ক । (৩) ২৭০ ।

৭৭ । রোগলক্ষণের পর্যায়ক্রমিকতা ।

ইগ্লেসিয়া । (২) ৩৩২
 ট্র্যামনিয়াম । (২) ২৯২ ।

৭৮ । রোগলক্ষণের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতা ।

ইগ্লেসিয়া । (২) ১৮৭, ৩১৮, ৩৩৩ ।
 একনাইটাম । (২) ৩৩৩ ।
 ককুলাস ইণ্ড্ । (২) ৩১৮ ।
 কফিয়া ক্জ্ । (২) ৩৩৪ ।
 নাক্‌স্ মস্কেটা । (২) ১৮৮, ৩৩৩ ।
 পাল্‌সেটীলা । (২) ১৭১, ১৮৭
 সাল্‌ফার । (৪) ৪১ ।

৭৯ । রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাব ।

ইগ্লেসিয়া । (২) ৩১৮, ৩২৬ ।

৮০ । রোগের পক্ষাঘাতিক বা রস- বাতিক মৌলিকতা ।

কষ্টিকাম । (৩) ৩৩৪ ।
 রাস্‌টক্‌স্ । (৩) ৩৩১ ।

৮১। রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্তন
সাল্ফার। (৩) ২৬।

৮২। রোগের প্রাচুর্য কাল।

একনাইটাম। (১) ২০, ৪১, ১৭০।
কল্‌চিকাম। (৩) ৫৬।
কষ্টিকাম। (১) ২০।
ক্যামিলা। (২) ৩৭৫।
ডাল্‌কামারা। (১) ২১। (৩) ৪৪৪, ৪৫১
নেটাম সাল্‌ফ। (১) ১৭৫।
মার্‌ক্লিয়াস। (১) ১২৭, ২৬৭।
রাস্টক্স। (১) ২১। (৪) ৩১২।
ল্যাকেসিস। (২) ৮১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ২০, ১৭০।

৮৩। শরীর চালনায় অথবা
বিশ্রামে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি।

কল্‌চিকাম। (৩) ৬৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩, ৩৭৪।
পাল্‌সেটলা। (১) ৩৭৩। (২) ১২০।
বেলাডনা। (১) ২৭৩, ৩৬৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮, ৩৭৩। (৩) ৬৩।
(৪) ৩৩২।
রাস্টক্স। (১) ৩৭৩। (২) ১২০। (৪) ৩৩২।

৮৪। শরীর বা শরীরাংশবিশেষের
গঠনবিশিষ্টতা এবং শরীরাবয়ব
সম্বন্ধে রোগীর অন্তত কল্পনা।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
ক্যাকেরিয়া কার্‌ক। (৩) ২৭০। (৪) ১০২,
২২৬।
ক্যাকেরিয়া ফ্‌স্‌। (৩) ২৭০।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (৪) ৪১১, ৪১২।

। (১) ২২২, ২২৩। (৪) ২৭৪।

কস্‌ফরাস। (৪) ২২৬।
ব্যাক্টিসিয়া। (১) ২২২, ২২৩।
ট্রান্সমিলাম। (১) ২২২।
সাইলিসিয়া। (৪) ১০৮, ১০৯।
সাল্‌ফার। (৪) ২২৬।

৮৫। শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা
শয়নোপবেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা
রোগের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ।

একনাইটাম। (১) ২।
পাল্‌সেটলা। (২) ১৮৮।
বেলাডনা। (১) ৬৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮।
হায়সারামাস। (১) ৩৩৪।

৮৬। শরীরের এক পার্শ্ব বা স্থান
আক্রমণ অথবা আক্রমণের পর
রোগের পার্শ্বান্তরে বা স্থানান্তরে
গতি।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭১, ৩৭২।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৩০।
বেলাডনা। (১) ৬৮। (৩) ২৩৯।
ব্রিয়াম। (৩) ২৩৯।
মার্‌ক্‌ প্রোটো-আই। (৩) ২৩৯।
রাস্টক্স। (৪) ২০।
লাইকপড। (১) ৩৭১, ৩৭২। (৩) ২৩৯।
(৪) ২০।
ল্যাকেসিস। (৪) ১২, ২০, ৩০২।

৮৭। শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও
অপবিভ্রতা।

সাল্‌ফার। (৩) ২৪, ২৫, ৪৩৪।
সোরিনাম। (৩) ২৫, ৪৩৩।

৮৮। শৈত্য, তাপ, সিক্ততা
এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন
প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের
হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ।

- আর্সেনিকাম। (১) ১৫২। (২) ৪৫।
একনাইটাম। (১) ২০, ২২, ৩০, ৩১, ৩৩,
৪১, ৭৭, ১২৫, ১৫৬। (৩) ৩৩৪, ৪৫১,
৪৫২।
এণ্টিন ক্রুড। (৩) ১৪২।
কল্‌চিকাম। (৩) ৫৬।
কষ্টিকাম। (১) ২০, ১৫৬। (৩) ৩৩৪
ক্যামফিলা। (২) ৩৫০।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৮, ৩৬০।
টুবাকু লিনাম। (১) ১৫২, ১৬০, ১৬১।
ডাল্‌কামারা। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১,
৪৫২।
নাক্‌স শুমিকা। (১) ১৫২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।
নেট্রাম সাল্‌ফ্‌। (১) ১৭৪, ১৭৫।
পাল্‌সেটীলা। (২) ১৭২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১।
বেলাডনা। (১) ৫৪।
ব্যারাইটা। (৩) ৪৫১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৫।
মাকু রিয়াম। (১) ১২৭।
রাসট্রু। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১।
(৪) ৩৩১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৩৯।
সাইলিসিয়া। (১) ১৫২।
সাল্‌কার। (৩) ৭১।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৭।
সরিনাম। (১) ১৫২, ১৬০, ১৬১।
(৩) ৪৩৪।
হিপার সাল্‌ফ্‌। (১) ২০, ১২৫, ১৫৪, ১৫৯,
১৬০, ১৬১, ১৭১। (৩) ৩৩৪, ৪৩৪।

৮৯। শোণিতস্রাব এবং শোণিত-
সঞ্চালন বিশৃঙ্খলা।

- ক্যালিবাই। (২) ২২০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৫।
নাইট্রেট্‌ অব এমিল। (২) ২২০।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৩০।
সাল্‌কার। (২) ২৮২।
সিপিয়া। (২) ২২০।

৯০। শ্বাসকৃচ্ছ এবং পাখার
বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি।

- কার্বি ভেজ। (৩) ৩২৭।
ডিজিটালিস। (৪) ৩২৩।
ল্যাকেসিস। (৪) ২১।

৯১। শ্লেষ্মা গুটিকা ও চর্মকীলের
বর্তমানতা।

- কষ্টিকাম। (৪) ২৭৩।
থুজা। (৪) ২৭৩, ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬২।

৯২। শ্লেষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা।

- নেট্রাম মিউ। (২) ২৩৭।
পাল্‌সেটীলা। (১) ১২২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২২।

৯৩। সন্দিগ্ধতা।

- হায়দ্রায়ামাস। (১) ৩৩৪।

৯৪। সন্নিপাত বা টাইফয়েড
অবস্থা।

- আর্সেনিকাম। (১) ২, ৪২। (২) ৭১,
৭২।
কল্‌চিকাম। (২) ৭১, ৭৩।

কার্ব ডেজ। (১) ৪৬। (২) ৭২, ৭৩।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৩, ২৭৪।
ফসফটিক এসিড। (২) ৭২, ৭৪।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ১০।
ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬।
মিউরিয়োটিক এসিড। (১) ১০।
রাস্টক্‌স্। (১) ৪৬। (২) ৬৯। (৪)

রেণাক্কুলাস ফি। (৫) ৩১।
ল্যাকেনিস। (৫) ২৭৪।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৯।
সিঙ্কনা। ৭০, ৭৪।
হায়সায়ানাস। (১) ১০, ৪১।

**৯৫। সময়ানুসারে রোগের হ্রাস
অথবা বৃদ্ধি।**

আসেনিকাম। (২) ৪৭, ১৩৫।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এগারিকাস। (২) ১৩৬।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ১৩৬, ১৩৭।
কলিকাম। (২) ১৩৬।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৩৭।
নাক্‌স্ ভমিকা। (২) ১৩৫, ১৩৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৩৭, ১৩৮, ২৫১।
পাল্‌সেটিল। (২) ১৮৮।
ট্রায়নিয়া। (২) ১৩৮।
মাক্‌রিয়াস। (১) ২৩২, ২৩৩।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৮৮। (৩) ২৩২।
সাল্‌ফার। (২) ১৩৮। (৩) ৫, ৬।
হিপার সাল্‌ফ্। (১) ৪০।

**৯৬। সরলান্ন বা রেস্তোঁমমধ্যে
বিবিধ ক্লেসান্নভূতি।**

ইগ্লেসিয়া। (২) ৩২০, ৩৩০।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২২৭, ২৭৩, ৩২০।

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
রেট্যানিয়া। (২) ২৭৩, ৩২০।
সাল্‌ফার। (২) ২৭৩, ৩২০।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।

৯৭। সাংঘাতিকতা।

আসেনিক। (২) ৪২।

**৯৮। সাময়িকতা বা পিরিয়-
ডিসিটি।**

আসেনিকাম। (২) ৪৭, ৪৮।
এরানিয়া। (২) ৪৮।
কুইনাইন। (২) ৪৮।
জেল্‌সিমিয়াম। (২) ৪৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৯১।

**৯৯। সূর্যাতাপ- রোগের বা রোগ-
বৃদ্ধির কারণ।**

একনাইটাম। (১) ২২।
এক্টিম ফ্রুড। (৩) ১৪৯।
গ্লোনোইন্। (৩) ১৪৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (৩) ১৪৯।
নেট্রাম কার্ব। (৩) ১৪৯।
ব্রায়নিয়া। (৩) ১৪৯।

**১০০। স্নান অথবা গাত্রধোতকরণে
অনিচ্ছা অথবা তাহা রোগের বা
রোগবৃদ্ধির কারণ।**

এক্টিম ফ্রুড। (৩) ২৫, ১৫০।
ডাক্‌মারা। (১) ২১।
রাস্টক্‌স্। (৩) ১৫০।
সাল্‌ফার। (৩) ২৫, ১৫০।

১০১। স্নায়বীয় আঘাত বা শক।

একনাইটাম। (১) ২২।

১০২। স্মরণশক্তির হ্রাস বা

অভাব।

এনাকার্ডিয়াম। (৪) ৩৯১।

১০৩। শ্রাব অথবা ক্ষুষ্টিত উদ্ভে-

দের হঠাৎ লোপ কিম্বা উদ্ভেদের

অনুদগম বা অসম্পূর্ণ উদগম

বশতঃ রোগ।

আর্সেনিক। (২) ৮৪।

ইপিক্যাক। (১) ১৫০। (২) ৩৮

এন্টিম ক্রুড। (৩) ১৪২।

এন্টিম টার্ট। (১) ১৫০।

এপিস। (৪) ২৮৪।

কার্ব ভেজ। (৩) ৩৮৫।

কুপ্রাম। (১) ১৫০। (৩) ১৯৯, ২০৩।

ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩।

গ্র্যাকাইটিস। (৪) ৪০২।

জিঙ্কাম। (১) ১৫০।

ডাকামারা। (৩) ৪৪৪।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৪।

ফসফরাস। (৪) ২১২।

ফসফরিক এসিড। (৪) ১৯১।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৫০।

মিউরিয়টিক এসিড। (৪) ১৭৪।

রাসটক্স। (৪) ৩১৯।

লাইকপেডিয়াম। (৩) ২২৬।

ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৮১, ৩০৭।

সাইলিসিয়া। (৪) ৯৭।

সাল্ফার। (৩) ৮, ২০৩।

সিঙ্কনা। (৩) ৭৭।

সিপিয়া। (২) ৩০৪।

সরিণাম। (৩) ২০৩।

১০৪। শ্রাবের প্রকৃতি।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৬৯।

গ্র্যাকাইটিস। (৩) ৪৩৪।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৯১।

লাইসিন। (৪) ৩৭০।

ল্যাকেসিস। (৩) ৪৩৪।

মাস্কার। (৩) ২৬।

সরিণাম। (৩) ৪৩৪।

১০৫। হাস্ত এবং ক্রন্দন।

ইয়েনিয়া। (৩) ৩৩৩।

একনাইট। (২) ৩৩৩।

একনাইট। ৩৩৩।

কফিয়া। (৩) ৩৩৪।

নাক্স মস্কেটা। (২) ৩৩৩।

১০৬। জ্বপিণ্ড ও নাড়ী-লক্ষণ।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৮৯, ৩৯০।

জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৭।

১০৭। ক্ষিপ্রতা অথবা মত্তরতা।

পাল্‌সেটিল। (২) ১৯০।

বেলাডনা। (২) ১৯০।

১০৮। ক্ষুদ্রাক্ষেপ, খল্লী, পেশী-

আনর্জন এবং সাবস্যাণ্টাস

টেঞ্জিনামাদি।

এগারিকাস। (১) ৩৩২।

ককুলাস ইণ্ড। (৩) ২১০।

কুগ্রাম। (৩) ২১০।

ক্লরিন। (৫) ৪৯।

নাক্স ভম্বিকা। (৩) ২১০।

বেলাডনা। (১) ৬৬, ৩৩২।

হায়দ্রাম্যামাস। (১) ৩৩২।

১০। বিবিধ সাধারণ রোগ।

১। অগ্নিদাহ বা বাণিঃ।

আর্গিকা। (৩) ৩২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪।
কাক্বলিক এসিড। (৩) ৩২০।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩২০।

২। অর্কুদরোগ বা টিউমার।

ক্যান্থেরিয়া কার্ব। (৩) ২৮২।
ক্যান্থেরিয়া ফ্রুয়ো। (৫) ২৮২,
প্রাথম। (৫) ৫৪০।
সাইটলেকা। (৫) ২৩০।
বারাইটা কার্ব। (৫) ২৩০।
মিউরেক্ন্স। (৫) ২২৬।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
সিকুটা ভিয়ো। (৫) ২৩৫।
নাল্ফার। (৩) ২৮২।
স্রাবাইনা। (৫) ২৬১।
হাইড্রোকোটাইল। (৫) ২৩৭।

৩। অস্ত্রচিকিৎসাত্তিক রোগ।

আর্গিকা। (৩) ২২০।
একনাইট। (১) ৩০।
এলিয়াম সেপা। (৫) :
হাইপেরিকাম। (৫) ৩৫০।

৪। অভিজাতিক রোগ বা

ইঞ্জুরিজ্—শ্লেণ্ন বা মচ্‌কান প্রভৃতি।

আর্গিকা। (১) ১৬৭। (৩) ১৩২—১৩৫।
(৪) ৩৪৫। (৫) ৮২, ৪০৭, ৪২৪
আসেনিকাম। (৪) ৩৪৫।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭।
একনাইটাম। (১) ৩০।
এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮২।

এমনিয়াম মিউ। (৫) ৮২, ২৬।
এরানিয়া ডায়া। (৪) ৩৪৫।
কোনায়াম। (৩) ১২২। (৪) ৩৪৫।
ক্যালেলুলা। (৩) ১২১। (৫) ৪২৪।
ক্যান্থেরিয়া ফস। (৩) ১২২।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৬।
রাস্‌টক্ন্স। (৩) ১৩৪। (৪) ৩৪৪, ৩৪৫।
কুটা গ্র্যাভি। (৩) ১৩৫। (৫) ৪০৭।
লিডাম। (৩) ১২১। (৫) ৪২৪।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪৫।
সাল্ফুরিক এসিড। (৩) ১২২। (৫) ৩৪৫।
(৪) ৮২।
সিনেক্ন্স ল্যাঙ্কু। (৫) ৩০৬।
সিন্ফাইটাম। (৩) ১৩৫। (৫) ১৮৮।
হাইপোরিকাম। (৩) ১৩৫। (৪) ১৬৬, ৪২৪।

৫। উদ্ভেদিক জ্বর বা এক্‌
ম্যাটিক ফিবার।

১। আরক্তজ্বর বা স্ক্যালোটিনা।

আসেনিকাম। (৪) ৩২, ১৮৬।
ইপিক্যাক। (১) ১১৪।
একনাইটাম। (১) ২২, ৪৮। (৪) ২০।
এপস্। (৪) ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৬।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ২৮।
এমনিয়াম কার্ব। (৫) ২০।
এরাম ট্রাই। (৪) ৩৫৬।
এলাস্থাস। (৪) ৩৫৫। (৫) ৪৭১।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
ক্যালি পামারগ্যানিকাম। (৪) ১৮৬।
(৫) ১৪৩।
ক্যান্থেরিয়া। (১) ১১৫, ১১৮।
ক্রোটেলাস হরি। (৫) ২৭৪।

জিঙ্কাম। (৫) ৫২২।
 জেলসিমিয়াম। (৪) ২০।
 নেট্রাম আসে নিকাম। (৪) ১৮৬।
 বেলোডনা। (১) ১১৩—১১৮, ৩৩২, ৩৪০।
 (৪) ২০, ৩১৩।

মার্ক সায়ানেটাস। (৪) ১৮৬।
 মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৬১, ১৮৫, ১৮৬।
 রাসটক্স। (১) ১১৫, ১১৭। (৪) ৬১, ১৮৫,
 ৩৫৫, ৩৫৬।

ল্যাকেসিস। (১) ১১৫, ১১৬। (৪) ৬১,
 ১৮৫, ৩৫৫।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩৩২, ৩৪০।
 সাল্ফার। (১) ১১৫, ১১৭, ১১৮।
 (৪) ১৮৫।

সাল্ফুরিক এসিড। (৪) ১৮৬।
 হাইড্রোস এসিড। (৪) ৬১, ১৮৬।
 হায়দ্রোয়ামাস। (১) ১১৫, ১১৭, ৩৩২,
 ৩৪০।

হিপমেনস। (৫) ২৮০।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।

২। উদ্ভেদিক জর বা একজ্যাঙ্কি-
 নেটা।

কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
 হায়দ্রোয়ামাস। (১) ৩৩২।

৩। উদ্ভেদিক জরে উদ্ভেদের অনুদগম
 বা অন্তর্গমন (বসিয়া যাওয়া)

বশতঃ রোগ।

ইপিক্যাক। (১) ১৫০।
 কুপ্রাম। (১) ৩০৩।
 জিঙ্কাম। (১) ৩০৪।
 বেলোডনা। (১) ৩০৩।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০২, ৩০৩, ৩৩২।
 হায়দ্রোয়ামাস। (১) ৩৩২।

৪। পানিবসন্ত বা ভেরিসিলা,
 চিকেন্ পক্‌স্।

ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৮।
 ৫। বসন্তজর বা ভেরিয়োলা,
 স্মল পক্‌স্।
 আসে নিকাম। (৪) ৬২।
 একনাইটাম। (১) ২২, ২৩, ২৪।
 (৪) ৮২, ২০।

এনাকাডিয়াম। (১) ৩২৪, ৪০০।
 এন্টিম টাট। (৩) ১৭৭।
 এপিসু। (৪) ৩১৪।
 ফ্রোটেলাস হরি। (৪) ৬২।
 জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২, ২০।
 থুজা। (৪) ২৭২।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৬২।
 ভেরিয়োলিনাম। (৪) ২৮০।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৬২।
 সাল্ফার। (৩) ৫০।
 হাইড্র্যাঙ্টিস। (৪) ২৮০।
 হেমামেলিস। (৪) ৬২। (৫) ৪৬৬।

৬। হামজর বা মিজলস্।

আসে নিকাম। (৪) ৬২।
 ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৯২।
 একনাইটাম। (১) ২২, ২৩, ২৪, ৪৮।
 (২) ২১২। (৪) ৮৮, ৮২।
 এনাকাডিয়াম। (১) ৩২৪।
 এন্টিম টাট। (৩) ১৭৬।
 এলিয়াম সেপা। (৫) ২৪২।
 কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
 ক্যান্ফর। (৫) ৪৪৫।

ক্যালি বাই। (২) ২১৯।
 ক্রোটেলাস হরি। (৪) ৬২।
 জেল্‌সিমিয়াম। (২) ২১৯। (৪) ৮৮, ৮৯।
 ডাকামারা। (৪) ৮৯।
 ড্রুসেরা। (৩) ১৭৬।
 পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৯। (৪) ৮৯।
 ফস্‌ফরাস। (৩) ১৭৭। (৪) ২৫৮।
 বেলাডনা। (৪) ৮৯।
 ব্রায়নিয়া। (৩) ১৭৬। (৪) ২৫৮।
 ক্লেমেক্‌স্‌ ক্লম্প্‌। (৩) ১৭৭। (৪) ২৫৮।
 ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৬২।
 ষ্টিষ্টা। (৩) ১৭৬।
 সাল্‌ফার। (৩) ৫২।
 স্ত্রাবাডিলা। (৪) ২৫৮। (৫) ১৬৩।
 হেমানেলিস। (৪) ৬২।

৬। কলিফ্লায়ুয়ারগ্রোথ্‌ বা ফুল-
 কপিবৎ উপমাংস, কণ্ডুলমা বা
 শ্রেখাশুটী এবং তজ্জাতীয়
 অগ্রবিধ মাংসরন্ধি, অর্ক্বুদ
 বা টিউমার।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।
 কটিকাম। (৩) ৩৪৫।
 খুজা। (৪) ২৮০।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৮০।
 ফস্‌ফরাস। (১) ১০৮।
 মাকু'রিয়াস। (৪) ২৮০।
 ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ২৮০।

৭। ক্যান্সার বা কর্কটরোগ।
 (এপিথিলিয়োমা)।

আয়ডিয়াম। (৫) ৫৮।
 ইউকর্কিয়াম রেজি। (৫) ৪৩০।
 কাণ্ডরেন্ডো। (৫) ২২৯।

কার্ব এনি। (৫) ৮, ৫১০।
 কার্ব ভেজ। (৩) ৪১৩।
 কার্বলিক এসিড। (৫) ৫১০।
 কোনায়াম। (৫) ২২৮, ২২৯।
 ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
 ক্রিয়োগেট। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
 ব্রমিয়াম। (৫) ৪৮।
 মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
 ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৬৪।
 সিকুটা ভিরো। (৫) ২৩৫।
 সিড্রন। (৫) ৫১০।
 হাইড্র্যাটিন্‌। (৫) ৩৬।

৮। কার্বাকুল বা দাহিকা, দন্ধ-
 ব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ।

আর্নিকা। (৩) ১৩৪। (৪) ১২৩।
 আর্সেনিকাম। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩।
 (৫) ৩২৪।
 এম্ব্রাসিনাম। (২) ৮৯। (৪) ১২৩।
 (৫) ৩২৪।
 কার্ব ভেজ। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩।
 (৪) ৬৩।

টারেন্টুলা কুবেন্‌স্‌। (৪) ১২৩।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১২৩।
 ফাইটলেকা। (৪) ১২৩।
 রাস্‌টম্‌। (২) ৮৯।
 ল্যাকেসিস্‌। (২) ৮৯। (৪) ১২৩।
 সিলিসিয়া। (৪) ১২৩।

৯। কোষময়-ঝিল্লি-প্রদাহ বা
 সেলুলাইটিস্‌।

এপিস। (৪) ৩৪৯।
 রাস্‌টম্‌। (৪) ৩৪৯।
 সিলিসিয়া। (৪) ৯৯, ১০০।

১০। ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ।

ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ক। (৩) ২২১।
পাইনাস্ সিল্। (৩) ২২১।

১১। গ্যাংগ্রিন বা নৃনাধিক

শরীরাত্শের মুত্ভা বা পচন ও

বিগলন।

আর্গিকা। (৩) ১৩৪।
আসে নিকাম। (২) ২১।
ইউফর্কিয়াম রেজি। (৫) ৪৩০।
এস্ সিনাম। (২) ২১।
ক্রোটেলাস হরি। (২) ২১।
ল্যাকেসিস্। (২) ২১।
সিকেলি। (২) ২১। (৫) ৩৭৬।

১২। জড়-রোগ বা ইম্বেসিলিটি।

কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ক। (২) ২৩৯।
কস্ ফরাস্। (২) ২৩৯।
মাকু রিয়াস্। (২) ২৩৬—২৩৯।

১৩। জলশোথ বা ড্রপ্সিস্।

১। উদরি বা এসাইটিস্।

আসে নিকাম। (৩) ২৫৫।
এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২।
রাস্ টম্ব। (৩) ২৫৫।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫।
মাল্ ফার। (৩) ৪০।
মিনিসিমো অরি। (৫) ১১২।
হিয়ার মাল্ ক্। (১) ১৭১।

২। এনাসার্কি বা ত্বকশোথ,

বাহুশোথ।

এপসাইনাম। (৫) ৪৫২।

৩। জলদোষ বা হাইড্রসিল্।

ডিজিটালিস। (৪) ৩২৮।
পাল্ সেটিল। (২) ২১০।

৪। জলশোথ বা ড্রপ্সিস্।

আসে নিকাম। (২) ৮৪, ৮৫। (৩) ২৫৫।
(৪) ৫২, ৫৪, ৩০৪, ৩১১। (৫) ৪৫৩।
ইউপেটারি পাপু। (৫) ১১৮।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এডনিস ভার্গেলিস। (৫) ১৬।
এপসাইনাম কেনা। (৪) ৩০৪। (৫) ২০২,
৪৫২, ৪৫

এপিস। (৩) ৩২। (৪) ৫৩, ৫৪, ২২৭,
২২৮, ৩০৪, ৩১১। (৫) ৪৫৩।

এম্পারেগাস্। (৪) ৩০৫।

কল্ চিকাম। (৩) ৭২। (৪) ৫২। (৫) ৪১।

কষ্টিকাম। (৪) ৫৪।

ক্যাঙ্কারিস্। (৩) ৩১২।

ক্যালি আয়। (৫) ১২৫।

ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ক। (৩) ২৭২। (৫) ১
৫৩০।

ক্যাঙ্কেরিয়া ফস্। (৩) ২৩। (৫) ৫৩০।
(৫) ১৮৫, ৫২৯, ৫৩০।

টেরিবিহ্। (৪) ৫৩। (৫) ৪০, ৫৫৫।

ডিজিটালিস। (৪) ৫৩, ৩২৮।

নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।

প্রাথম। (৫) ৫৪২।

বেলাডনা। (৩) ৩২, ২৭২।

বারাইটা কার্ক। (৪) ১১৩।

মার্ক মাল্ কুরেট। (৪) ৩২৮।

মিউরিয়টিক এসিড। (৪) ১৮৩, ৩২৮।

রাস্ টম্ব। (৩) ২৫৫।

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫। (৫) ৪১।

ম্যাক্ ডিক্লোরোটােম। (৫) ২২১, ২৯২।

ল্যাকেসিস। (৪) ৫২, ৫৩, ৫৪। (৫) ৪০।
 টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১২।
 সাল্ফার। (৩) ৩২, ৪০, ২৭২।
 সিল্কনা। (৩) ৯২। (৫) ১৮৫।
 সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
 স্ত্রাশুকাস। (৫) ৪৩৪।
 হিপর সাল্ফ। (১) ১৭১।
 হেলিবোরাস। (৪) ৫২। (৫) ৩৯, ৪০।

৫। হাইড্রকেফেলাস বা
 মস্তিষ্কোদক।

এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২।
 এপিস। (৩) ৩২। (৪) ২৯৭, ২৯৮।
 ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৫।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৭২। (৫) ১৮৫,
 ৫৩০।
 ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ৯৩। (৫) ১৮৫,
 ৫৩০।
 জিকাম। (৫) ১৮৫, ৫২৯, ৫৩০।
 বেলাডনা। (৩) ৩২, ২৭২।
 ব্যারাইটা কার্ক। (৪) ১১৩।
 সিলিসিয়া। (৪) ১১২।
 সাল্ফার। (৩) ৩২, ২৭২।
 সিল্কনা। (৩) ৯২, ৯৬-গ। (৫) ১৮৫।
 হেলিবোরাস। (৫) ৩৯, ৪০।

৬। হাইড্রথোরাক্স বা
 বক্ষ-শোধ।

আর্সিনিকাম। (৪) ৩১১।
 একনাইটাম। (৪) ৩১১।
 এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২
 এপিস। (৪) ৩১১।
 কল্‌টিকাম। (৩) ৭১।

৭। হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম
 বা হৃদযন্ত্র-শোধ।

আর্সেনিকাম। (৩) ২৫৫। (৪) ৩০৪।
 এপসাইনাম কেনা। (৪) ৩০৪।
 এপিস। (৪) ৩০৪।
 এম্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
 লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫।

১৪। জ্বর-রোগ বা ফিবার

১। অভিজাতিক এবং অন্ত্র-
 চিকিৎসাস্থিক জ্বর।

আর্গিকা। (১) ১৬৭।
 একনাইট। (১) ২২, ৭৭, ২৩৪।
 ক্যামিলা। (২) ১৫০, ১৫২।
 ব্রান্নিয়া। (১) ১৩০।

২। কুইনাইন-রক্ত ম্যালেরিয়াদি-
 জ্বর এবং ছদ্মজ্বর বা মাস্ক্‌ড্
 ফিবার প্রভৃতি।

আর্গিকা। (২) ৭৮।
 আর্সেনিক। (১) ৭৬, ৭৭।
 ইপিক্যাক। (২) ৭৮, ৮০, ৮১।
 এপিস। (২) ৭৮, ৭৯।
 কার্ক ভেঞ্জ। ৭৮, ৭৯।
 চাইনি সাল্ফ। (২) ৭৬—৮২। (৩) ১০২
 জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৯১।
 নেট্রাম মিউ। (২) ৭৮, ৮১, ৮২, ২৬৬।
 মিনিয়াস্টিস। (৩) ১০২।
 ল্যাকেসিস। (২) ৭৮, ৮১।

৩। জ্বর-রোগ—অজীর্ণ-জ্বর,
আম-জ্বর বা গ্যাস্ট্রিক ফিবার, পিত্ত-
জ্বর বা বিলিয়াস ফিবার, পিত্ত-
শ্লেষ্মা-জ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেন্ট
ফিবার, বাত-জ্বর বা নার্ভাস ফিবার,
বাত-পৈত্তিকজ্বর বা নার্ভো-বিলিয়াস্
ফিবার প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (১) ২৫, ২২,
ইউপেটরি পার্ফ। (৫) ১১৫, ১১৬।
ইপিক্যাক। (২) ১৫০, ১৫৩।
একনাইটাম। (১) ২২—৩০, ৪৬, ৫৮, ৮৮,
১০০, ১৩১। (২) ১৫০, ১৫১, ৩৭৬।
(৩) ৪২।
এন্টিম টার্ট। (১) ১৩০।
এপিস। (১) ২৫, ২৮, ২৯।
এবিস কেনা। (৫) ২৫৫।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
ক্যামফিলা। (২) ১৫০, ১৫২, ৩৭৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (১) ২৫, ২৮, ২৯। (৪)
২০, ২১, ২২।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (১) ১৩০, ১৩২। (২)
১৫০—১৫৪, ৩৭৬।
পডকাইলাম। (৫) ৩২০।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
পাল্‌সেটীলা। (২) ১৫০, ১৫৩, ৩৭৬।
ফেরাম ফস। (১) ২৫, ২৬।
বেলাডনা। (১) ২৫, ২৬, ২৭, ৫৮, ৭৬,
৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০৪, ১০৬, ২৪১।
(২) ৩৭৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ২৫, ২৮, ১৩০, ১৩১,
১৩৫, ১৩৬। (২) ১৫০, ১৫১, ১৫২।
ভেরেট্রাম ভি। (১) ২৫, ২৭।

মাক্‌ রিয়াস। (১) ২৪১।
নাস্টকস্। (১) ২২, ৩০।
লেপ্ট্যাণ্ডা। (৫) ২৫৪।
সাল্‌ফার। (৩) ৪২, ৫০।
হায়সাম্যানাস। (১) ৩৩৫।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ২৩।

৪। পীত-জ্বর বা ইয়োলো ফিবার।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৫২।
ইপিক্যাক। (৪) ২২।
একনাইট। (৪) ২২।
কার্ল ভেজ। (৩) ৪১৪।
কাড্‌মিয়াম। (৫) ২৭৪।
ক্যাম্পের। (৪) ২২।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ২২।
বেলাডনা। (৪) ২২।
ব্রায়নিয়া। (৪) ২২।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫২।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৪) ৫২।

৫। প্রদাহিক জ্বর বা ইনফ্লামেটরি
ফিবার।

একনাইটাম। (১) ২৭, ৪৫, ১৩৪, ১৩৫,
১৩৬।
ফেরাম ফস। (১) ১৩৬। (৫) ৫১৭, ৫২৮।
বেলাডনা। (১) ৫৮, ১৩৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ২৮, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (১) ২৭।
মাক্‌ রিয়াস। (১) ১৩৬।

৬। ভ্যাক্সিনেশন বা গো-বীজটিকা
জনিতজ ও অন্যান্য রোগ।

থুজা। (৪) ১২১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২০, ১২১।
সাল্‌ফার। (৪) ১২১।

৭। মতিয়াবিন্দু বা কাটারক্তি
প্রভৃতির অস্ত-চিকিৎসা ক্ষুদ্র জ্বর।

(চক্ষু রোগ দেখ।)

৮। ম্যালেরিয়া-জ্বর।

আর্সেনিকাম। (১) ২৪৪। (২) ৭৪—৮০।
ক্যাকেরিয়া কার্ক। (১) ২৪৪।
ক্রোটেলাস হরি। (৫) ২৭৪।
নেট্রাম মিউ। (১) ২৪৪।
মাকু'রিয়াস। (১) ২৪৪।
ল্যাকেসিস। (১) ২৪৪।

৯। রসবাতিক জ্বর বা রিউমাটিক
ফিবার।

ক্যাকেরিয়া। (৩) ২২১।
ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ২২১।
বেলাডনা। (৩) ২২১।
বায়নিয়া। (২) ১৩০।

১০। শিশুর সবিরাম জ্বর।

(শিশুরোগ দেখ।)

১১। শোণিতসঞ্চয়ী বা কঞ্জেষ্টিভ
সবিরাম জ্বর।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ৩৭২।
ব্যাণ্ডিসিয়া। (৩) ৩৭২।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ৩৩৮।
স্ক্যামনিয়াম। (৩) ৩৭২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৮।

১২। মল্লিপাত জ্বরবিহার বা

টাইফয়েড, টাইফাস, রেমিটেন্ট

এবং লো-রেমিটেন্ট প্রভৃতি জ্বর।

আর্গিকা। (৩) ১৩৫—১৩৮। (৫) ২৬১।

আসেনিকাম। (১) ২২, ২৪২, ৩৩৮।
(২) ৬৬—৭৪। (৪) ১৭১, ১৮৪, ২০৭,
২৫৭, ৩৫৩।

একনাইটাম। (১) ২২, ২৮, ২৯, ১৩৪,
১৩৫। (৪) ৩৫১।

এপিস। (৩) ৩৮০। (৪) ৫২, ৩১২, ৩১৩।

এব'সিহিয়াম। (৫) ১০৫।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ১৩৮, ৩৮০।
(৪) ৫৮।

কল্‌চিকাম। (২) ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪।
(৩) ৭২। (৪) ২০৭।

কার্ক ভেজ। (২) ৬৮, ৭২, ৭৩। (৩) ৪১৪।
(৪) ২৫৭, ৩৫৩।

ক্যাঙ্ক-কার্ক। (৩) ২২২।

ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।

ক্লরিণ। (৫) ৪২।

জেল্‌সিমিয়াম। (১) ২৪২। (৪) ২২।

টেরিবিস্থ। (৪) ১৮৫। (৫) ৫৫৫।

টারাকসেসকাম। (৪) ৩৫৪। (৫) ১২২।

নাইটিক এসিড। (৪) ১৭০, ১৮৫।

নাকসু ভর্মিকা। (২) ১৪২।

পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।

ফসফরাস। (৪) ২০৭, ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৩।

ফসফরিক এসিড। (২) ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩।

(৪) ১৮৪, ২০৬, ২০৭, ২৫৭, ৩৫৪।
(৫) ৫৪৬।

বেলাডনা। (২) ৮২, ৯০, ১৩৩, ১৩৪,
১৩৫, ২৪২, ৩০৭, ৩৩৫। (৪) ১৮৫,
৩৫১।

ব্যাণ্ডিসিয়া। (৩) ১৩৬, ১৩৭। (৪) ২২,
২০৭, ৩৫৩। (৫) ৪৬১, ৪৬২।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০, ১৩২—১৩৬,
২৪২, ৩৩৬। (৬) ১৮৪।

ভেরেট এল্। (৩) ৭২।

মার্ক ডাল্‌সিস। (১) ২৪২, ২৪৩।

মাকু'রিয়াস । (১) ২৪২, ২৪৩ ।
 মিউরি এসিড । (১) ২৪২, ৩৩৮ । (৪)
 ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৩ ।
 মিলিফলিয়াম । (৪) ১৮৫ ।
 রাস্টক্‌স্ । (১) ২২, ২০, ১৩৩—১৩৬,
 ২৪২ । (২) ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২ ।
 . (৩) ১৩৬, ১৩৭ । (৪) ১৮৪, ১৮৫,
 ২০৭, ২৫৭, ৩৫০—৩৫৪ ।
 লাইকপডিয়াম । (১) ৩৩৮ । (৩) ২৫৪
 ২৫৫, ২২২ ।
 লেপ্ট্যাণ্ড্রা । (৫) ২৫৪ ।
 ল্যাকেসিস । (১) ২০, ৩৩৮ । (৩) ১৩৬,
 ১৩৭, ২৫৫, ৩৮০ । (৪) ৫৮, ৫৯, ৩১৩ ।
 স্ট্রামনিয়াম । (২) ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩৩৫ ।
 (৩) ৩৮০ । (৪) ৩০৭ ।
 সালফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৬ ।
 সিঙ্কনা । (২) ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৪ । (৪)
 ১৮৫ ।
 সুইট্‌ স্পিরিট অব নাইটার । (৪) ২০৭ ।
 হায়দ্রোজেনাম । (১) ২০, ১৭৯, ৩৩৫, ৩৩৭,
 ৩৩৮ । (৩) ১৩৭, ৩৮০ । (৪) ৫৯, ৩৫২ ।
 হেমামেলিস । (৪) ১৮৫ ।

**১৩। সবিরাম জর ইন্টার-
 মিটেন্ট ফিবার ।**

আসেনিকাম । (২) ৭৫—৮০, ১৫৪, ২৬৭ ।
 (৩) ১০৩ । (৪) ৩০, ৭১
 ইউক্যালিপ্টাস । (৩) ১০৩ ।
 ইউপে পাপু' । (৫) ১১৮ ।
 ইউপে পাক' । (৩) ১০৩ । (৪) ৩৫০ । (৫)
 ১১৫, ১১৬, ১১৮ ।
 ইথেনিয়া । (২) ২১৮, ৩৪৮ । (৩) ১০৩ ।
 ইপিক্যাক । (২) ৩৯৩ ।
 একনাইটাম । (১) ২৩, ২৮ ।
 এপিস । (৪) ৩১১, ৩১২ । (৫) ১১৬ ।

ওপিয়াম । (১) ৩৩৮, ৩৯৪ ।
 কর্ণাস ফ্লুরিডা । (৩) ১০২ ।
 কার্ডাস মেরি । (৫) ১০৭ ।
 কার্ব' ভেজ । (৩) ১০৩, ৪১৪ । (৪) ৬০ ।
 কুইনাইন । (২) ৭৬—৮২ । (৩) ১০০—
 ১০৩ ।
 কেফালাগুয়া । (৩) ১০৩ ।
 ক্যাপ'সিকাম । (৩) ১০৩ । (৫) ২২৬, ২৬৭ ।
 ক্যামিনা । (২) ৩৫৭ ।
 ক্যাফর । (৪) ৬১ ।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব' । (৩) ২২১, ২২২ ।
 জেলুসিমিয়াম । (৪) ৬০, ২০, ৯১ ।
 নাক্‌স্ জমিকা' । (২) ১৫৪ ।
 নেট্রাম মিউ । ২৬৬, ২৬৭ । (৪) ৩৫০ ।
 পালসেটিলা । (২) ২১৭ ।
 কসফরাস । (৪) ২৫৭ ।
 ফেরাম । (৩) ১০৩ ।
 বেলাডনা । (৪) ৩২২ ।
 ব্রায়নিয়া । (২) ১৩০ ।
 ভেরেট্রাম এল' । (১) ৩৩৮ । (৪) ৬০ ।
 মাকু'রিয়াস । (১) ২৪৩ ।
 মিনিয়াফ্লিস । (২) ১৫২ । (৪) ৩০ ।
 রাস্টক্‌স্ । (৪) ৩৪৯ । (৫) ১১৬ ।
 লাইকপডিয়াম । (৩) ২৫৪ । (৪) ৬১ ।
 ল্যাকেসিস । (৩) ১০৩ । (৪) ৫৯, ৬
 ৬১ ।
 স্ট্রামনিয়াম । (৩) ৩৭৯ ।
 সাল্‌ফার । (৪) ৩৫০ ।
 সিঙ্কনা । (৩) ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২ ।
 (৪) ৩৫০ ।
 সিড্রন । (৫) ৫৫৮ ।
 সিনা । (২) ১৫৪, ৪১ ।
 সিমেকস ল্যাষ্ট । (৫) ৩৬৬ ।
 হায়দ্রোজেনাম । (১) ৩৩৮ ।
 হেলিবোরাস । (৫) ৪১ ।

১৪। সূতিকাজর বা পিয়র্পিরাল
ফিবার।

(গর্তীগীরোগ দেখ।)

১৫। সেপ্টিক ফিবার এবং
পারিমিয়া—দুষ্ট, পচা ক্ষত হইতে
ক্রেদ, শবচ্ছেদ করিতে হস্তাদির ক্ষত
(ডিসেক্টিং উণ্ড্) হইলে শব
ক্রেদ এবং বিষধর-কীট-দংশন বশতঃ
বিষ শরীরে প্রবেশ ও পুয় শোষণাদি
জন্ম জর।

আসেনিকাম। (৫) ৩২৪, ৩২৫।
এস্থিসিনাম। (৫) ৩২৪।
কার্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
ফ্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
ট্যারেন্টল। (৫) ৩২৫।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
ল্যাকেসিস। (৫) ৩২৫।

১৬। স্বল্পবিরাম জর বা রেমিটেন্ট
ফিবার।

আসেনিকাম। (২) ৭৪।
একনাইটাম। (১) ২৮, ১৩৪, ১৩৫। (২)
৭৪।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৫।
পালসেটিলা। (২) ২১৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।
ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৬।
হায়সায়ানাস। (১) ৩৩৫।

১৭। হে-ফিবার বা ওষধি-গন্ধজ
জর।

এরাম ট্রাই। (৫) ১৯।
এলাস্থাস। (৫) ৪৭১।

নেটাম মিউ। (২) ২২৭।
মার্ক প্রোটো আই। (৫) ২০।
রেণাক্কুলাস্ বাব। (৫) ১৯।
সিলিসিয়া। (৪) ১১৫। (৫) ১৯।
সোরিনাম। (৫) ২০।
স্ত্রাবাডিলা। (৫) ১৩২, ১৩৩।

১৮। হেপ্টিক ফিবার বা
প্রলেপক জর।

আসেনিকাম। (৩) ৯৮।
কার্ব শ্বেজ। (৩) ৯৮, ৪১৪।
ফসফরাস। (৪) ২৫৭।
রেণাক্কুলাস বাবো। (৫) ১৯, ২০।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৮।
সোরিনাম। (৫) ২০।

১৫। টুবাকুলোসিস বা
গুটিকোৎপাদক রোগ।

একনাইটাম। (১) ২৪।
ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৯। (৫) ১৩৪।
ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৪।
ক্যাল্কে ফস্। (৩) ২৮১।
টুবাকুলিনাম। (৩) ২৮১।
ডাক্সামারা। (৩) ৪৫৫।
পালসেটিলা। (২) ২০২।
ফসফরাস। (৩) ২৭৯। (৪) ২৪৫।
(৫) ৫১৪।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৭।
ষ্টেনাম। (৩) ৩৮।
সাল্ফার। (৩) ৩৭, ৩৮, ২৭৯।
(৫) ৬৫, ৩৬।

১৬। পলিপাস বা বহুপাদার্কুদ।

ক্যালি আয়ডি। (৫) ১৯০।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪১, ১৪২।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৭৬, ২৯০

(৪) ২৫৬।

টিউ ক্রিয়া। (৩) ২৯০। (৪) ২৫৬।

ফস্ফরাস্। (৩) ২৯০। (৪) ২৪১, ২৫৬।

(৫) ৪২৪।

ভিক্স মাইনর। (৫) ৪২৪।

লিডাম। (৫) ৪২৪।

স্ফালুইনেরিয়া। (৩) ২৯০। (৫) ৪৭৮।

১৭। পারদ ঘটিত রোগ বা

মাকু'রিয়েল ডিজিজ্, (মাকু'রিয়েল

ট্রেমর ও মাকু'রিয়েল পল্‌জি

প্রভৃতি), ইন্‌ এফেক্টস্ অব

মার্কারি।

অরাম। (১) ১২৭।

আয়ডিয়াম। (১) ২২৮।

আর্সেনিকাম। (১) ২২৮।

এসফিটিডা। (১) ২২৮।

ক্যালি আয়ডি। (১) ২২৬।

ক্যালি ক্লোরিকাম। (১) ২২৭।

ডাক্সানারা। (১) ২২৬।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭১।

মাকু'রিয়াস। (১) ১৬৮, ২২২, ২২৩

মেজিরিয়াম। (১) ২২৮।

ল্যাকেসিস্। (১) ২২৮।

টিলিঞ্জিয়া। (১) ২২৯।

ষ্ট্যাফিগ্রেসিয়া। (১) ২২৮।

সিকনা। (১) ২২৬।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৬০, ১৬৮, ১৮৪,

১৮৫, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২৩০।

১৮। পূয়-শোথ, ত্রণ-শোথ

বা এব্‌সেস্।

অরাম। (৪) ১৭১।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৮। (৪) ১২৩।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬৪, ৩৫৬।

ইউকর্কিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।

একনাইটাম। (১) ২১।

এসফিটিডা। (৪) ১২২, ১৭১।

কার্ক ভেজ। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৪, ৩৫৬।

ক্যানমিলা। (২) ৩৭৬।

ক্যালি আয়ডি। (৪) ১৭১।

ক্যালেক্সলা। (৪) ১২২।

ক্যাকেরিয়া আই। (৪) ১২২, ১৭১।

ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৪) ১২২, ১২৩।

ক্যাকেরিয়া ফস্। (৪) ১৭১।

ক্যাকেরিয়া ফ্লুয়ো। ১৮৯

ক্যাকেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১২১।

ক্যাকেরিয়া হাইপ-ফস। (৫) ১২০

গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ১২৩।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭১। (৫) ২৬৬।

পালসেটিলা। (৪) ১৭১।

ফস্ ফরাস। (৪) ১৭১।

ফ্লুরোরিক এসিড। (৪) ১২২।

বেলাডনা। (১) ২১, ২৩।

মাকু'রিয়াস সল্। (১) ১০৮, ১২৪।

ম্যাঙ্গানাম। (৪) ১৭১।

রাস্ টঞ্জ। (৪) ৬৪, ৩৫৬।

ল্যাকেসিস। (৪) ৬৪, ৩৫৬।

ষ্ট্র্যাননিয়াম। (১) ৩০৮।

সাইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (৪) ১২২, ১২৩।

সালফার। (৩) ৩৪।

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

হিপার সাল্ফ। (১) ১০৮। (২) ৩৭৬।

(৪) ১২৩।

১৯। পেশী প্রদাহ বা মায়ি-

আইটিস্।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩।

২০। প্রতিফ্রিয়াহীনতা বা

ঔষধের ক্রিয়াভাব।

- এথ্রাগ্রিসিয়া। (৩) ৩০৪, ৩৭৮। (৫) ৩২০।
 ওপিয়াম। (৩) ২০৪, ৩৬৫, ৩৭৮।
 কার্ক ভেজ। (৩) ২০৪, ৩৭৮, ৪৩০।
 কুপ্রাম। (৩) ২০৩, ২০৪, ২০৫, ৩৬৫,
 ৪৩০।
 ক্যাফর। (৫) ৪৪৫।
 জিকাম। (৫) ৫২৭, ৫৩২।
 প্রনাস্ স্পাই। (৫) ৫৫০।
 ভ্যালেরিয়ানা। (৩) ২০৪, ৩৭৮।
 লরসিরেসাস। (৩) ২০৪।
 সাল্ফার। (১) ১৭৫। (৩) ২৬, ২০৩,
 ৩৬৫, ৪১৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২।
 সিঙ্কনা। (৩) ২০৩, ৪৩০।
 সরিনাম। (৩) ২৬, ২০৩, ২০৪, ৩৭৮,
 ৪১৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২।

২১। প্রতিশ্রায়, সর্দি বা

ক্যাটার।

- ইউপেটরিয়াম পার্ফে। (৩) ৪০০।
 কষ্টিকাম। (৩) ৪০০।
 কার্ক ভেজ। (৩) ৪০০।
 ক্যালি মিউরিয়েট। (৫) ১৫৩।
 ফস্ফরাস। (৩) ৩৯৯।
 মিলিকলিয়াম। (৫) ১১০।
 সাল্ফার। (৩) ৪০০।
 সেনেগা। (৩) ৪০০।

২২। প্রদাহ ও পৃথকজনন বা

ইনফ্লামেশন।

- আর্গিকা। (১) ১৬৭।
 আর্সেনিকাম। (১) ১২৭।

- একনাইটাম। (১) ৬, ৯২, ১২৭, ১৫৮,
 ১৬৭। (৩) ৩২৬। (৫) ৫১৭, ৫১৮।

এপিস। (১) ১২৭।

কার্ক ভেজ। (১) ১২৭।

ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩।

ক্যালি সাল্ফ। (৫) ১৫৪।

ফস্ফরাস। (১) ৬, ১২৬, ১২৭।

ফেরাম ফস। (৫) ৫১৭, ৫১৮।

বেলাডনা। (১) ৬, ১৪, ৯০—৯৩, ১২৬,
 ১২৭, ১৫৮, ১৬৭, ২৪৪, ২৪৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ৬, ১৪, ৯১, ১২৬, ১২৭,
 ১৫৮। (৩) ৩২৬।

মার্কুরিয়াস্। (১) ৯৩, ১২৬, ১৫৮, ১৬২—
 ১৬৮, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ৩০৮।

রাস্ টঙ্ক্। (১) ১২৭।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯১, ৩০৮।

সাইলিসিয়া। (১) ১৬৮, ২৪৫, ৩০৮।
 (৩) ৩৪।

সাল্ফার। (১) ৩০৮। (৩) ৩৪, ৩২৬।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩, ৩৩০, ৩৩২।

হিপার সাল্ফ। (১) ৯৩, ১৫৮, ১৬০,
 ১৬২—১৬৮, ২৪৪, ২৪৫, ৩০৮।
 (৩) ৩২৬।

হেলিবোরাস। (১) ১২৭।

হোলিথোরাস। (১) ১২৭।

২৫। রত্নজ রোগ বা ভিনি-
রিয়েল ডিজিজ।

১। উপদংশরোগ বা সিফিলিস—
তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতি তরুণ
বা সেকেন্ডারি
এবং পুরাতন বা
টার্শিয়ারি।

আসে নিকাম। (৪) ৫৫।
এসাকিটিড। (৫) ২২১, ২২২।
কার্ব এনিম্যালিস্। (৫) ৫১০।
কার্ব ভেজ। (৪) ৫৫।
কোরেলিরাম স্কব। (৫) ৩০১।
ক্যালি আই। (৫) ১২৭।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
থুজা। (৫) ৫০০।
নাইটিক এসিড। (৪) ৫৬, ১৭০।
ফাইটলেকা। (৫) ৫০০।
মাকু রিয়াস। (১) ১২৮, ২৭০—২৭৩।
মাকু রিয়াস কর। (১) ২৭৩।
মাকু রিয়াস ডাল (শিশু)। (১) ২৭৩।
মাকু রিয়াস প্রোটো-আই। (১) ২৭১, ২৭২।
মাকু রিয়াস বিন-আই। (১) ২৭১, ২৭২।
মাকু রিয়াস ভাইভাস। (১) ২৭০।
মাকু রিয়াস সল। (১) ২৭০, ২৭১।
১) ৫৪।
মেক্সিরিয়াম। (৫) ২২১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৩। (৪) ৫৬,
১৭০।
ল্যাক কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৭।
ল্যাক ডিফো। (২) ২১৭।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৪, ৫৫, ৫৬।

টিলিজিয়া। (৫) ২২২, ৪৩২।
ট্যাকসেসিয়া। (৫) ৫০০।
সাইলিসিয়া। (৫) ৫০০।
সাল্ফার। (৪) ১৭০।
সিকোল। (৪) ৫৫।
সিঙ্কনা। (৪) ৫৫।
সিনেবেরিস। (১) ২৭৩।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৮, ১৭৯।
(৪) ৫৬।

২। কণ্ডিলমা বা প্লেয়াগুটিকা এবং
চর্মকীল বা ওয়াটস্।

ইউক্রেসিয়া। (৫) ২৪২।
কটিকাম। (৩) ৩২৪, ৩৪৫।
থুজা। (৪) ৩৭৮।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
নাইটিক এসিড। (৪) ১৫৩, ১৬২, ১৭০।
নেট্রাম সাল্ফ। (৪) ২৭৮।
পাল্বেটিল। (৪) ৩৭৮।
সাসাপেরিলা। (৪) ৩৭৮।

৩। কডি বা লিম্বোচ্চাস

ক্যান্থারিস। (৩) ২২৫, ৩১৫।
ডিজট্যালিস। (৪) ৩২৬।
নাইটিক এসিড। (৩) ২২৫।
মাইগেল। (৫) ৩১২।
মার্ক সল। (১) ২৭৩।

৪। গ্লিট বা পুরাতন পূয়-মেহ

ইরিজিরন। (৫) ১১৩।
এলুমিনা। (৩) ৪৪০।
ক্যালি আয়ডি। (২) ২৭৩। (৩) ৪
(৪) ১৬৯। (৫) ১২৭।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।

ইসিলেগো। (৫) ৪০৪।
 থুজা। (৩) ৪৬, ৪৪০। (৪) ১৬৯,
 ৩৭৮। (৫) ১২৭।
 নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪৬। (৪) ১৬৯।
 (৫) ১২৭।
 নাক্স ভমিক। (৩) ৪৬। (৪) ১৬৯।
 (৫) ১২৭।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৬১।
 পাল্‌সেটলা। (৩) ৪৬। (৪) ৩৭৮।
 পেট্রসিলিয়াম। (৫) ২৩১।
 মাকু'রিয়াস। (৩) ৪৬।
 সার্মাপেরিলা। (৪) ৩৭৮।
 সাল্‌ফার। (৩) ৪০, ৪৪০।
 সিপিয়া। (২) ২৭৩। (৩) ৪৪০।
 সোরিনাম। (৩) ৪৪০।
 হাইড্রাসিট। (৫) ৩৬।

৫। পারদোপদংশজ যৌগিক বিবেচনাপন্ন রোগ।

ক্যালি আইওড। (১) ২২৬।
 নাইট্রিক এসিড। (১) ২২৬।
 হায়সায়ানাস। (১) ১৭৯।
 হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭৯, ২২৩, ২২৪।

৬। পৃথমেহ বা গনরিয়া।

আর্জেন্টাম নাই। (২) ২০৮। (৪) ৪৪৬।
 (৫) ৪৫০।
 ইউপে পাপু'। (৩) ৩১৫।
 ইউভা আসাই। (৩) ৩১৮।
 ইকুইসিটাম হাই। (৩) ৩১৫।
 ইপোমিয়া নিল। (৩) ৩১৮।
 ইরিজিরন (এরি)। (৩) ৩১৭।
 একনাইট। (৩) ৩১৯। (৪) ৮৫, ৮৬।
 একনাইটিন্। (৪) ৮৬। (৫) ৪৫০।
 এগ্রাস্‌ ক্যাস্ট। (৫) ৪০৪।

ওসাইনাম। (৩) ৩১৮।
 কক্লিয়ারিয়া আর্দো। (৩) ৩১৮।
 কলসিছ। (৪) ৩৯৭।
 কিউবেবা। (৩) ৩১৬।
 কোনায়াম। (৩) ৩১৬।
 কোপেবা। (৩) ৩১৬।
 ক্যানাবিস ইণ্ডু'। (৩) ৩১৫।
 ক্যানাবিস স্কাট। (৩) ৩১৪, ৩১৫। (৪)
 ৪৪৭। (৫) ৪৫০।
 ক্যান্‌সারিস। (৩) ৩১৪—৩১৯। (৫)
 ৪০৪।
 ক্রিনেটিস ইরেস্ট। (৩) ৩১৬।
 চিমাফিলা। (৩) ৩১৭।
 জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৫, ৮৬।
 টুসিলেগো। (৫) ৪০৪।
 টেরিবিছ। (৩) ৩১৮।
 ডিরিফোর। (৩) ৩১৬।
 ডিজিট্যালিস। (৩) ৩১৮। (৪) ২৭৮,
 ৩৯৬, ৩৯৭।
 থুজা। (৩) ৩১৭। (৪) ২৭৭, ২৭৮।
 নেট্রাম সাল্‌ফ। (৪) ২৭৮।
 পাল্‌সেটলা। (২) ২০৮। (৩) ৩১৭।
 পেট্রসিলিয়াম। (৩) ৩১৫। (৪) ৩৯৭।
 (৫) ২৩১, ৪৫০।
 প্যারিস ব্রাভ। (৩) ৩১৮।
 ফেরাম কস। (৩) ৩১৭।
 বার্কেবরিস ভল্‌গ্যা। (৩) ৩১৯।
 মাকু'রিয়াস। (৫) ৪৫০।
 মাকু'রিয়াস কর। (১) ২৭৩। (৩) ৩১৭।
 (৪) ৩৯৭।
 মাকু'রিয়াস সল। (১) ২৭৩। (২) ২০৮।
 (৩) ৩১৬, ৩১৭। (৪) ৩৯৭।
 লাইনেরিয়া। (৩) ৩১৫।
 স্টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।
 স্টিলিজিয়া। (৪) ৪৩২।

সার্সাপেল্লা । (৩) ৩১৮ ।
সাল্ফার । (৩) ৪৬, ৩১৮ । (৪) ৩৯৭ ।
সিপিয়া । (৫) ৪০৪ ।
হাইড্রাক্সিমা । (৩) ৩১৮ ।
হায়সায়ামাস । (৩) ৩১৬ ।

৭। বাঘী, ব্রহ্ম বা বিউবো, বিউবন ।

এলুমিনা । (৩) ৪১৩ । (৫) ৮১ ।
কার্ব এনি । (৫) ৩০২, ৫১০ ।
ব্যাডিয়াগা । (৩) ৪১৩ । (৫) ৩০২ ।
মার্ক কর । (১) ২৭৩ ।
মার্ক বিন-আই । (১) ২৭২ ।

২৬। রসবাতাদি রোগ ।

১। গাউট বা ক্ষুদ্রবাত ।

আণিকা । (৩) ৭০ ।
একটয়া স্পাই । (৩) ৭০, ৭১ । (৫) ১৩ ।
এস্টিম ক্রুড । (৩) ১৫৫
এমনিয়াম ফয় । (৫) ২২ ।
কলফাইলাম । (৩) ৭০, ৭১ । (৫) ১২,
৪২২
কলসিস্ত । (৩) ১২৬ ।
কল্ চিকাম । (২) ২২০ । (৩) ৬৮, ৭১
(৪) ৩৪৮ । (৫) ৪২২ ।
কষ্টিকাম । (৩) ১৯৬ ।
কাল্কেরিয়া কার্ব । (৩) ২৯১ ।
ক্যাক্সিয়া ল্যাটি । (৩) ৭০, ৭১ ।
গুয়েইয়াকাম । (৩) ১৯৬ ।
নাক্ স্ ভমিকা । (৩) ৭০ ।
পাল্ সেটিলা । (৩) ৭০ ।
বেঞ্জোইক এসিড । (৫) ২২ ।
ব্রায়নিয়া । (৩) ৭০ ।

মেডরাইনাম । (৫) ৩৩৬ ।
রডডেগু ন । (৩) ৭০, ৭১ ।
রাসটকস । (৩) ২২১ ।
লাইকোপড । (৫) ২২ ।
লিডাম । (৩) ৭০, ৭১, ১২৬ । (৫) ৪২২,
৪২৩ ।

ষ্টার্কসেগ্রিয়া । (৫) ২২ ।
সিপিয়া । (২) ২৯২ ।

২। গ্রীবাস্তস্ত বা টাটকলিস ।

কষ্টিকাম । (৩) ৩৩৭ ।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব । (৪) ৩৪৮ ।
ডাল্ কামরা । (৩) ৪৫৭ ।
নাক্ স্ ভমিকা । (৩) ৩৩৭ ।
পেট্রিনিয়াম । (৫) ৫৬০ ।
বেলাডনা । (৩) ২৯১, ৩৩৭ ।
রাসটকস্ । (৪) ৩৪৮ ।

৩। জানুসক্রিরোগ বা ডিজিজেক

অব দি নি-জইন্ট—সাইনতাইটিস

বা শিবামুণ্ড প্রভৃতি ।

এনয়াডিয়াম । (২) ৪০০ ।
এপিস । (২) ১৩৯ ।
কল্ চিকাম । (৫) ৪২৪ ।
ক্যাল্কে হাইপ-ফস । (৫) ১৯০ ।
পাল্ সেটিলা । (২) ৪০০ ।
ফস্ ফরাস । (৪) ২৫৫ ।
সাইলিমিয়া । (৪) ২৫৫ ।
সাল্ ফার । (৩) ৩৮ ।

৪। পৃষ্ঠ-শূল, পৃষ্ঠ-বেদনা বা

ব্যাক-এক ।

ইস্কুলাস হাইপ । (৫) ৫০২ ।
একনাইটাম । (৪) ৩৩৬ ।

এব্রোটোনাম । (৫) ১০৩ ।
 ক্যালি কার্ব । (৪) ৩৩৬ ।
 কাল্কে ফ্লুয়োরিকা । (৫) ১৮৯, ১৯০ ।
 চাইনি সাল্ফ । (৪) ২৩৬ ।
 নাক্স ভমিকা । (৪) ২৩৬ ।
 নেট্রাম মিউ । (৪) ২৩৬ ।
 পালসেটোলা । (১) ৪০০ । (২) ১২৭ ।
 পেট্রলিয়াম । (৪) ৩৩৬ ।
 ফসফরাস । (৪) ২৩৫, ২৩৬ ।
 রডডেঞ্জেন । (৪) ৩৩৬ ।
 রাসটক্স । (৪) ৩৩৫, ৩৩৬ ।
 রুটা গ্র্যান্ডি । (৪) ৩৩৬ ।
 লাইকোপড । (৪) ২৩৬ ।
 লিডাম । (৪) ৩৩৬ ।
 স্ট্রাক্সিসেগ্রিয়া । (৪) ৩৩৬ ।
 সিকেলি । (৪) ২৩৬ ।
 সিলিয়া । (২) ৩০০ ।
 হাইপেরিকাম । (৪) ৩৩৬ ।

৫। পেশীবাত এবং পেশীশূল ।

এক্টিয়া রেসি । (৫) ১১, ১২ ।
 নাক্স ভমিকা । (৫) ১১ ।
 ব্রায়ওনিয়া । (১) ১৪৩ ।

৬। রসবাত বা গিউম্যাটিজম—

তরুণ এবং পুরাতন (কণ্ডুরা
 সংকোচনাদি ।)

আর্গিকা । (৩) ৭০, ২২১ । (৪) ৩৪৭ ।
 একনাইটাম । (১) ৩৬, ৩৮, ৩৯ । (৫)
 ১২ ।
 এক্টিয়া রেসি । (৫) ১১, ১২ ।
 এক্টিয়া স্পাই । (১) ১৪৪ । (৩) ৭০, ৭১ ।
 (৫) ১২, ১৩ ।

জ

এনাকার্ডিয়াম । (৪) ৩৪৭ ।
 এটিম ক্রুড । (৩) ১৫৫ ।
 এশিস । (৪) ৩১০ ।
 এমনিয়াম কষ্টি । (৫) ২৮ ।
 এমনিয়াম ফস । (৫) ২৮ ।
 এমনিয়াম মিউ । (৫) ২৬ ।
 কলফাইলাম । (১) ১৪৪ । (৩) ৭০, ৭১ ।
 (৫) ১২, ৪২২ ।
 কলসিন্দ্ব । (৩) ১২২, ১২৬, ৩৪৪ ।
 কল্চিকাম । (১) ১৪৪, ১৪৫ । (২) ২২০ ।
 (৩) ৬৮—৭১ । (৪) ৩৪৮ । (৫) ৪১৬,
 ৪১৯, ৪২২ ।
 কষ্টিকাম । (৩) ১২৬, ৩৪৪, ৩৪৫ । (৫)
 ৩০৬, ৪৮১ ।
 কোনায়াম । (৪) ৩৪৭ ।
 কামমিলা । (২) ৩৭৬ ।
 ক্যালি নাই । (৫) ১৪২ ।
 ক্যালি বাই । (২) ২২০ ।
 ক্যালি সাল্ফ । (২) ২২০ ।
 কাল্কেরিয়া আই । (৫) ৫০ ।
 ক্যাল্কেরিয়া কার্ব । (৩) ২৯১ । (৪) ৩৪৮ ।
 ক্যাল্কেরিয়া ফস । (৫) ১৮৭, ১৮৮ ।
 ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুরো । (৪) ৩৪৯ ।
 ক্যান্থিয়া ল্যাটি । (২) ২২০ । (৩) ৭০,
 ৭১ । (৪) ৩৪৮ । (৫) ৪১৯, ৪২০ ।
 গুয়েইয়াকাম । (৩) ৩৪২ । (৫) ৩০৬ ।
 চেলিডনিয়াম । (১) ৩৮২ ।
 জেল্ সিমিয়াম । (৪) ৮৬ ।
 ডাল্ কামারা । (৩) ৪৫৭ । (৫) ৪২০ ।
 থুজা । (২) ২২১ ।
 নাক্স ভমিকা । (৩) ৭০, ৭১
 নাক্স মস্কোটা । (৫) ৪৭৭ ।
 নেট্রাম মিউ । (৫) ৩০৬ ।
 স্ট্রাক্সিয়াম । (৫) ১০৭ ।

পালসেটলা। (২) ২১৯, ২২০। (৩) ৭০,
৭১। (৫) ১২।

পেট্রিলিয়াম। (৫) ৫৬০।

ফাইটলেঙ্কা। (৫) ৪৯৯, ৫০০।

ফেরাম। (২) ২২১, ৩৭৬। (৪) ৩৪৮। (৫)
৪৭৭।

ফেরাম ফস। (৫) ৪৭৭।

ফেরাম মেট। (৫) ৪৭৭।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩, ১৪৪। (২) ২২০।
(৩) ৭০। (৪) ৩৪৫, ৩৪৬।

ভায়লা ওড। (১) ১৪৪।

ভেরেট এল্। (২) ৩৭৬।

মাকু'রিয়াস। (৫) ৫০০।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৪৭৭।

রডডেগুন। (৩) ৭০, ৭১। (৪) ৩৪৬।
(৫) ৪১৯, ৪২০।

রাস্টক্‌স্। (১) ১৪৪। (২) ৩৫৩, ৩৭৬।
(৩) ২২১, ৩৪৪। (৪) ৩৪৫—৩৪৯।
(৫) ১১, ৪১৯।

রাস্ রেডি। (৪) ৩৪৮।

রেণাকুল বাল্। (৫) ১২।

লাইকোপড। (২) ২২১। (৪) ৩৪৮।

লিডাম। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ১৯৬।
(৪) ১২০, ৩৪৮। (৫) ৪১৯, ৪২০,
৪২২, ৪২৩।

লিথি কার্ব। (৫) ৪১৯।

ল্যাক্‌ ফেনি। (৫) ২৮৭।

ল্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।

সাইলিসিয়া। (৪) ১২০। (৫) ১৮৮,
৫০০।

মার্সা পেরিলা। (৫) ৪৮৩।

মাল্‌ফার। (২) ২২০। (৩) ৪৯।

মিঙ্কনা। (৩) ৯৭।

মিকিলিনাম। (৫) ৩৪০, ৩৪১।

সিমেক্‌স্‌ ল্যাক্ট। (৫) ৩০৫, ৩০৬।
সাকুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৬, ৪৭৭।

৭। লাষেগো বা কটিবাত।

আর্গিকা। (৪) ৩৩৬।

আসেনিকাম। (২) ৭৮।

একনাইটাম। (৪) ৩৩৬।

এস্টিম টার্ট। (৪) ৩৩৬।

ক্যালি কার্বনিকাম। (৪) ৩৩৬।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯, ১৯০।

নেটাম মিউ। (৪) ৩৩৬।

বেলাডনা। (১) ৭৫।

ব্রায়নিয়া। (৪) ৩৩৭।

ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৫।

রডডেগুন। (৪) ৩৩৬।

রাস্টক্‌স্। (৩) ২২১। (৪) ৩৩৫, ৩৩৬।

লিডাম। (৪) ৩৩৬।

ষ্ট্যাক্সিসগ্রিয়া। (৪) ৩৩৬।

মাল্‌ফার। (৪) ৩৩৬।

হাইপেরিকাম। (৪) ৩৩৬।

৮। সন্ধি-বাত বা আর্থু'ইটিক

ইনফ্রামেশন-হিপ্ ডিজিজ্ ও

নি-ডিজিজ্ প্রভৃতি।

এপিস। (১) ১৩৯।

কলসিস্থ। (৩) ১২২।

কল্‌টিকাম। (১) ১৪৪, ১৪৫। (৫) ৪২৩

পালসেটলা। (২) ২২০।

ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪। (৫)
৪২৩।

ভায়লা ওড। (১) ১৪৪।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।

লিডাম। (১) ১৪৪। (৫) ৪২৩।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ২৫৫।
সালফার। (৩) ৩৮।
সিকিলিয়ার। (৫) ৩৪০, ৩৪১।

৯। সন্ধিরোগ - সন্ধির দুর্বলতা
এবং নিয়ন্ত্রণালয়গুলি পড়া
প্রভৃতি সন্ধিচলন।

ইথেরিয়া। (৪) ৩৪২।
এনকার্ডিয়াম। (১) ৪০০।
পেটুলিয়াম। (৪) ৩৪২। (৫) ৫৬০।
মাসাম। (৫) ৫৪১।
বাস্টকুস। (৪) ৩৪২।

১০। সাইনভাইটিস বা মাস্কক-
প্রদাহ।

আইণ্ডিয়াম। (৪) ৩১০।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এপিস। (১) ১৩৯। (৪) ৩১০, ৩
কলুচিকাম। (৫) ৪২৪।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫।
ক্যালি আই। (৪) ৩১০।
ক্যাঙ্ক কার্ব। (৩) ২২১।
ক্যাঙ্ক হাইপ-কস। (৫) ১২০।
পালসেটিল। (১) ৪০০।
বেলাডনা। (৪) ৩১১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৭, ১৩৩, ১৩৯। (৪)
৩১০, ৩১১।

লিডাম। (৩) ৩৪৫। (৫) ৪২৩, ৪২৪।
সালফার। (১) ১৩৯। (৩) ৪২।

২৭। ক্ষয়রোগ বা ওয়েষ্টিং
ডিজিজ্‌।

আইণ্ডিয়াম। (৫) ১০৪।
আর্জেন্ট নাই। (৫) ১০৪।

এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩, ১০৪, ১৭৮, ৪৮৩।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ১০৪।
এসেটিক এসিড। (৫) ১০৪।
ওলিয়েগার। (৫) ৪৫৫।
ক্যালি ফস্ফরিক। (৫) ১৪৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া আই। (৫) ১৮৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৮। (৫) ৩৪৭
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস্ফ। (৫) ১৮৭।
ট্রাবাকু লিনাম। (৫) ১০৪।
নেট্রাম মিউ। (৫) ১০৪।
ফস্ফরাস। (৩) ৪৮।
লাইকপেডিয়াম। (৫) ১০৪।
মার্সপেরিলা। (৫) ১৪০।
সালফার। (৩) ৪৮।
সিকেলি। (৫) ৩৭৩, ৩৭৪।
সেনিকুলা। (৫) ১০৪।

১১। মস্তিষ্ক-মেরুমাঞ্জাদি
স্নায়বীয়রোগ।

১। মানসিক রোগ বা মেন্টাল
ডিরেঞ্জমেন্ট

১। অবসাদবায়ু, চিন্তোদ্ভবেগ বা
হাইপকণ্ড্রিয়াসিস।

আর্সেনিকাম। (২) ১৪৪।
ইথেরিয়া। (২) ১৪৪, ১৪৬।
ইথুসা সাই। (২) ২৫২।
এস্ট্রিয়া রেসি। (৫) ৬, ৭।
এনকার্ডিয়াম। (১) ৩২৫, ৩২৬।
এপিস। (২) ২৫২।
এলুমিন। (৪) ২৭। (৫) ৭।
ক্যামোমিলা। (৫) ২৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।

নাক্স ভমিকা । (২) ১৪৩, ১৪৪,
২৫৩ ।

নেট্রাম কার্ব । (২) ২৫৩ ।

নেট্রাম মিউ । (২) ১৪৪, ২৫২ ।

পালসেটোলা । (৪) ২৭ ।

প্ল্যাটিনাম । (৩) ২৪১ ।

ফস্ ফরাস্ । (৪) ২৩৩ ।

। (২) ২৫২ ।

বেলাডনা । (৩) ২৪১ ।

ভিরেট্রাম এল্ । (৩) ২৪১ ।

মাক্স রিয়াস । (২) ১৪৪ ।

বেজিলোটাস । (৫) ২৪৪ ।

লাইকোপডিয়াম । (২) ১৪৪ । (৩) ২৪০ ।

ল্যাকেসিস । (৪) ২৪, ২৫, ২৬ । (৫) ৭৮ ।

ষ্ট্যাক্সিসেগ্রিয়া । (৫) ২৭ ।

সাল্ফার । (২) ১৪৪ । (৩) ২৮, ২৪১,
২৭৩, ৪৩৬ । (৫) ৭৮ ।

সিপিয়া । (৪) ২৭ ।

সোরিনাম । (৩) ৪৩৬ ।

২। আঅহত্যাকরণেচ্ছা বা স্ফুই- সাইড্যাল মেনিয়া ।

অরাম । (১) ২২৭ । (২) ৪২ । (৪)
৪৬১, ৪৬২ ।

অরাম মিউ । (৪) ৪৬১ ।

আসেনিকাম । (২) ৪২ । (৪) ৪৬২ ।

এক্টিয়া রেসি । (৫) ৬ ।

এক্টিম ক্রু । (৪) ১৬৫ ।

নাইট্রিক এসিড । (২) ১১৫ । (৪) ১৬৫,
৪৬১ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ১১৪ । (৪) ৪৬১ ।

নেট্রাম সাল্ফ । (২) ১১৪ ।

স্ফাজা টিপু । (৪) ৪৬১ ।

মাক্স রিয়াস । (১) ২২৩ ।

সিপিয়া । (৪) ৪৬২ ।

হায়ড্রায়ামাস । (১) ৩৪৪ ।

ইপার সাল্ফ । (১) ১৫২ । (৪) ৪৬১ ।

৩। উন্নাদরোগ বা ইন্স্থানিটি—

এক্ট মেনিয়া, মনোমেনিয়া বা

একাশ্রয়োন্নাদ, ধর্মোন্নাদ,

কামোন্নাদ এবং ডিমেন্-

সিয়া বা বুদ্ধি-হ্রাসতা

প্রভৃতি ।

অরাম । (২) ৪২ ।

আক্টোম নাই । (৪) ৪৬৮ ।

আসেনিকাম । (২) ৪৮ ।

ইগ্নেসিয়া । (২) ১২৪ । (৪) ২৭৫ ।

একনাইট । (১) ১৮ । (২) ৪২ ।

এগারিকাস মাক্স । (১) ২২৬ । (৪) ২৭,
(৫) ৩২৩ ।

এগ্রাস ক্যাষ্ট । (১) ৩৪৬ ।

এনাকার্ডিয়াম । (১) ৩২৬ । (৪) ২৭,
১৬৫ ।

এক্টিম ক্রু । (৪) ১৬৫ ।

ওপিয়াম । (৩) ৩৬২ ।

কুপ্রাম । (৪) ১৪২ ।

ক্যানাবিস ইণ্ডু । (৫) ৪৪৮ ।

ক্যাথারিস । (১) ৩২৬, ৩৪৭ । (৩) ৩০৪,
৩০৫ । (৪) ১৪২ ।

ক্যাথর । (৫) ৪৪৫ ।

ক্যালি ব্রোম । (৫) ১৫১ ।

ক্যাঙ্কেরিয়া ফস্ । (৫) ৭ ।

ট্যারেন্টক কুবেনস্ । (৫) ৩১১ ।

থুজা । (৪) ২৭৫ । (৫) ১৬২ ।

নাইট্রিক এসিড । (৪) ১৬৫ ।

পাইক্রিক এসিড । (৪) ২০০ ।

পাল্‌সেটলা । (২) ১২৩, ১২৪ ।
 প্যারিস কোয়া । (৪) ২৭ ।
 প্যাটিনাম । (১) ৩৪৭ । (৪) ১৪২ । (৫)
 ২২৮, ৫২২, ৫২৩ ।
 ফস্‌ফরাস্ । (১) ৩৪৭ ।
 (৪) ২৩২, ২৩৩, ২৭৬ ।
 ফস্‌ফরিক এসিড । (৪) ২০০, ২০১ ।
 বেলোডোনা । (১) ৭৩, ২৩৬, ২২৫, ২২৭,
 ৩২৫, ৩৪০—৩৪৩ । (৪) ১৪২, ১৪২ ।
 ব্যাপ্‌টিসিয়া । (৪) ২৭৬ ।
 স্তেরেটাম এল্ । (২) ১২৭, ৩২৫, ৩৪৭ ।
 (২) ৪২ । (৪) ১৪০, ১৪১, ১৪২ ।
 মস্‌কাস । (৫) ২৮১ ।
 মাক্‌রিয়াম । (১) ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭ ।
 মিউরেক্‌স্ । (৫) ২২৬, ২২৮ ।
 মিলিফোলিয়াম । (৫) ২৪৪ ।
 মেলিলোটাস । (৫) ২৪৪ ।
 লিলিয়াম টাই । (৫) ২২৮ ।
 ল্যাকেসিস । (১) ২২৬ । (৪) ২৪, ২৫,
 ২৬, ১৪২ ।
 স্ট্র্যামনিয়াম । (১) ৫৭, ৭৩, ২৮৪, ২২৫,
 ২২৬, ২২৭, ৩২৫, ৩৪০—৩৪৩, ৩৪৭ ।
 (৪) ২৬, ১৪০, ১৪২, ২৭৬ ।
 সাল্‌ফার । (৩) ৩৮, ২২ ।
 সিলিনিাম । (৫) ৩৪১ ।
 স্ত্রাবাডিল । (৫) ১৬২ ।
 হায়দ্রোম্যাস । (১) ৭৩, ২২৭, ৩৩২, ৩৪০
 —৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮ । (৪) ২৭, ১৪২ ।
 (৫) ১৫১, ৫২৩ ।

৪। শুষ্ক-বায়ু, মুচ্ছাবায়ু, অপস্মার
 বা হিষ্টিরিয়াম ।

আসেনিকাম । (৫) ১৫৫ ।
 ইথ্রেসিয়া । (২) ১২৫, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৪,

৩৪৭ । (৫) ২৮১, ৩০২, ৪৭৭, ৪৮৫,
 ৫২৩, ৫৫২ ।

একনাইট্ । (১) ১৮, ৩২, ৩৩ ।
 এঁক্টিয়া রেসি । (৪) ২৭ ।
 এগারি মাস্ক । (৪) ২৭ ।
 এগ্রাস ক্যাষ্ট । (৫) ১৪৫ ।
 এনকার্ডিয়াম । (১) ৩২৫ । (৫) ১৪৫ ।
 এপিস । (৪) ৩০০ ।
 এলুমিনা । (৫) ৭৮, ৭৯ ।
 এসাক্টিডা । (২) ৩৪১ । (৫) ২১৯,
 ২২০, ২৮১ ।

ককুলাস ইণ্ড । (৫) ১৪৫, ২৮১ ।
 কফিয়া । (১) ৩২ । (৫) ৫৫২ ।
 কলফাইলাম । (৫) ১৪৫ ।
 কষ্টিকাম । (৩) ৩৩৬ ।
 ক্যাস্টাস গ্র্যাণ্ড । (৫) ১৪৫ ।
 ক্যালি ফস্ । (৫) ১৪৫ ।
 ক্যাস্টরিয়াম । (৫) ২৮১ ।
 ক্রোকাস স্ফাট । (৫) ৩২২, ৩২৩ ।
 জিঙ্ক ভারিয়ারি । (৫) ৩১১ ।
 জেল্‌সিমিয়াম । (৪) ৭২ ।
 ট্যারেন্টুলা কুবেনস্ । (৫) ৩১০
 ৩২৩, ৪৮৫ ।

থিরিডিয়ন । (৫) ৩১০ ।
 থুজা । (৫) ৫৫২ ।
 নাক্‌স্ স্তম । (২) ১৪৪ । (৫) ৪৭৭,
 ৪৮৫ ।

নাক্‌স্ মস্ক । (২) ৩৪২ । (৫) ২৮১, ৫৫৪ ।
 পাল্‌সেটলা । (২) ১২৪, ১২৫ । (৫) ৭৮ ।
 প্যারিস কোয়া । (৪) ২৭ ।
 প্যালাডিয়াম । (৫) ২৮২ ।
 প্যাটিনাম । (১) ৩৫২ । (৫) ৫২২, ৫২৩ ।
 ফস্‌ফরাস্ । (২) ৩৪৫ । (৫) ৪৭৭, ৪৮৫ ।
 স্পেনাস স্পাই । (৫) ৫৪২ ।

বেলাডনা। (১) ৭৪। (২) ৩৪২।
 ডেরেটাম এল্। (৪) ১৪২।
 ড্যালেরিয়ান্না। (২) ৩৪১, ৩৪৫। (৫)
 ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৫।
 ড্যালেরিয়ানেট অব জিঙ্ক। (২) ৩৪২।
 মফাস। (২) ৩৪১। (৫) ২৮১, ২৮২।
 মাইগেল। (৫) ৩১০।
 মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৫।
 ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ২২০।
 ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৭।
 ল্যাকেসিস। (৪) ২৪।
 টিষ্টা। (৫) ১৪৫।
 ট্রামনিয়াম। (১) ৭৪, ২৮৪, ৩০২, ৩৪৮,
 ৩৯৫। (৪) ২৭।
 সাইকুটা ভি। (৫) ৩২৩।
 সালফার। (৩) ২২। (৪) ৭২। (৫) ৭৮।
 সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
 সিপিয়া। (২) ১২৫, ২২৬, ২২৭। (৫) ৭৮।
 স্ত্রাবুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮৫।
 হায়দ্রায়ামাস। (১) ৭৪, ৩৫২। (২) ৩৩৮।
 (৪) ২৭।

৫। গৃহবিরহাতুরতা বা হোম-
 সিকুনেস।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৫।
 ক্লিমেটসাই। (৫) ১৪।
 কস্কুরাস। (৬) ৪৭৭, ৪৮৫।
 কস্করিক এসিড। (২) ২২৬। (৪) ২০০।
 বেলাডনা। (১) ২৩৬।
 মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৬।

৬। জলাতঙ্করোগ বা হাইড্র-
 ফবিয়া।

ক্যাস্‌ত্রিস। (১) ৩৪২। (৩) ৩০৪, ৩০৫।
 বেলাডনা। (১) ৭৪, ২৮০, ২২৪, ৩০০,
 ৩৪২।

লাইমিন (খেপাকুকুরের মূথের লাল)।
 (১) ২৮৫।

ল্যাকেসিস। (৪) ২৪।

ট্রামনিয়াম। (১) ২৮০, ২৮৪, ২২৪, ৩০০,
 ৩০১, ৩৪২।

। (১) ৩৪২।

হায়দ্রায়ামাস। (১) ৩২১, ৩৪৮, ৩৪২।
 (৪) ২৭।

৭। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬।

এগারিকাস মাস্ক। (১) ২২৬। (৫) ৩৬১।

কুপ্রাম। (৩) ২০৪।

ক্যাঙ্কর। (৫) ৪৪৫।

থুজা। (১) ৩০৪।

পালসেটিল। (১) ৩০৪।

পেট্রিলিয়াম। (১) ৩।

প্লাসাম। (৫) ৫৪০।

বেলাডনা। (১) ৫৩, ৬৬, ৭১, ১৩৩, ১৩৪,
 ২৭৭, ২২১, ৩১৪। (৩) ২০৪। (৫)
 ৫৪০।

ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ৩০৪।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫।

ল্যাকেসিস। (১) ২২৬।

ট্রামনিয়াম। (১) ৭১, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮,
 ২৮০, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২২১,
 ২২৩, ২২৫, ২২৬, ৩০৪, ৩১৪, ৩৩৩।

সিকোজ। (১) ২৭৬।

হায়দ্রায়ামাস। (১) ৭১, ১৩৪, ২৭৭, ২২১,
 ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৫।
 (৩) ২০৪।

৮। বিষাদোন্নততা বা মেলাঙ্কলিয়া।

অরাম। (৪) ৪৬১, ৪৬২।

আইণ্ডিয়াম। (৫) ৭৮।

আর্কেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৮, ৪৬২।

আসেনিকাম । (২) ৪২ । (৪) ৪৬২ ।
 ইয়েসিয়া । (৫) ২০০ ।
 এন্টিগ্না রেসি । (৫) ৬ ।
 এনাকাডিয়াম । (১) ৩২৩ ।
 এন্টিক ফু । (৩) ১৫১ ।
 এলুমিনা । (৫) ৭৮, ৭৯ ।
 কোনায়াম । (৫) ২২৬ ।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব । (৩) ২৭৩ । (৫) ৫৮ ।
 প্লোনোইন । (৪) ৪৬৩ ।
 জিকাম অক্সাইড । (৫) ২২৬ ।
 পালসেটলা । (২) ১২৪ । (৫) ৭৮ ।
 প্ল্যাটিনাম । (৩) ২৫০ । (৫) ৫২৩ ।
 ফস্ফরিক এসিড । (৪) ২০০ ।
 বেলাডনা । (৩) ২৫০ ।
 ভেরেটাম এ । (৩) ২৫০ । (৪) ১৪৩ ।
 লাইকপডিয়াম । (৩) ২৪০ ।
 ল্যাকেসিন্ । (৪) ২৪ । (৫) ৭৮ ।
 স্ট্রামনিয়াম । (১) ২২৮ ।
 সাল্ফার । (২) ১৪৪ । (৩) ২৮, ২৯, ২৫১, ২৭৩ ।
 সিপিয়া । (৪) ৪৬২ । (৫) ৭৮ ।
 সিকিলিনাম । (৫) ৩৪১ ।
 সোরিণাম । (৩) ৪৩৬, ৪৩৭ ।

ক্যানাবিস ইণ্ড । (৫) ৪৪৮ ।
 ক্যাপসিকাম । (৩) ৩৭১ । (৫) ৫৪৬ ।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব । (১) ৭৪, ২২৯ । (৩) ২৭৩ ।
 নাক্ন্ ডমিক । (২) ৫০, ১৪৫ । (৫) ৫৪৫ ।
 বেলাডনা । (১) ৭৩, ৭৪, ২২৯, ৩০০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০ । (৩) ২৭৩ ।
 মাক্ন্ রিয়ার্ । (১) ২১৪ ।
 রেপাক্ন্ বাথো । (৩) ৩৭১ । (৫) ১৮ ।
 ল্যাকেসিন্ । (১) ২২৯ । (৩) ৩৭০ । (৪) ২৪ ।
 স্ট্রিকনিয়া । (১) ১৪৫ ।
 স্ট্রামনিয়াম । (১) ৭৪, ২২৮, ২২৯, ৩০০ । ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০ । (২) ৫০ । (৩) ২৭৩ ।
 সাল্ফার । (২) ৫০ । (৫) ৫৪৫ ।
 সাল্ফুরিক এসিড । (৩) ৩৭১ । (৫) ৫৪৫, ৫৫৩ ।
 সিকিলিয়াম । (৫) ৩৩৯ ।
 সিমিসিফুগা । (১) ৩৫০ । (৫) ৬ ।
 সোরিণাম । (৫) ২৩৯ ।
 হায়সারামাস । (১) ৭৪, ২২৯, ৩০০, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০ । (৪) ২৭ ।

১০। মানসিক জড়ত্বাদি বিকার

বা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেন্ট ।

৯। মদাত্যয়রোগ বা ডিলিরিয়াম ।

ট্রিমেন্স্ ।

আসেনিকাম । (১) ২২৯ । (২) ৫০ । (৫) ৫৪৫ ।
 একনাইট । (১) ৭৪ ।
 এগারিকাস মাস্ক । (৪) ২৭ ।
 এন্টিম টার্ট । (৩) ৩৭১ । (৫) ৫৪৬ ।
 এন্ড্রিনা স্কাট । (৫) ৪৫৬ ।
 ওপিয়াম । (১) ৭৪, ২২৯, ৩০০, ৩৫০ । (৩) ৩৭০ । (৪) ২৭ ।

আয়ডিয়াম । (৫) ৭, ৭৮ ।
 ইয়েসিয়া । (৪) ২০০ । (৫) ৫৫২ ।
 একনাইট । (৩) ২৮ ।
 এন্টিগ্না রেসি । (৪) ২৭ । (৫) ৬, ৭ ।
 এগারিকাস মাস্ক । (৪) ২৭ ।
 এনাকাডিয়াম । (৪) ২৭ ।
 এলুমিনাম । (৪) ২৭ । (৫) ৭, ৭৮, ৭৯ ।
 ওপিয়াম । (৪) ২৭ ।
 কাছারিস । (৩) ৩০৪, ৩০৫ ।
 ক্যামিলা । (২) ৩৩৬, ৩৬৭ । (৫) ৫৫২ ।

ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৫) ৬, ৭৮।
 ক্যাকেরিয়া কস। (৫) ৭।
 ক্রোকাস স্ট্রাট। (৫) ৩২৩।
 ট্যারেন্টুলা কুবেনস্। (৫) ৩৯৩।
 নাইট্রিক এসিড। (৫) ৫৫১।
 নাক্‌স্‌ ভমিকা। (৫) ৭৮।
 পাইক্রিক এসিড। (৪) ২০০।
 পাল্‌সেটীলা। (৪) ২৭।
 প্যারিস কোয়ার্ট্‌জ। (৪) ২৭।
 প্ল্যাটিনাম। (৩) ২৪১। (৫) ৫২২, ৫২৩।
 ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৩২।
 ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০০, ২০১।
 বেলাডনা। (৩) ২৪১।
 ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৪।
 ভেরেট্রাম এল। (৩) ২৪১।
 লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪০।
 ল্যাকেসিস্। (৪) ২৪—২৭। (৫) ৭৮।
 স্ট্রামনিয়াম। (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩।
 সাল্‌ফার। (৩) ২৮, ২৯, ২৪১। (৫) ৪৮।
 সিপিয়া। (৪) ২৭।
 সিঙ্কলিনাম। (৫) ৩৪১।
 হায়দ্রোজেন। (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩।

১১। স্বভিকোয়াদ বা পিয়র্পিরাল- মেনিয়া।

একনাইট। (১) ৩৪৮।
 একট্রিয়া রেসি। (৫) ৬।
 প্ল্যাটিনাম। (১) ৩৪৭।
 বেলাডনা। (১) ৩৪৪, ৩৪৮।
 ভেরেট্রাম এল। (১) ২৯৮। (৪) ১৪২।
 ল্যাকেসিস্। (৪) ২৪, ২৫।
 স্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৮, ৩৪৪, ৩৪৮।
 হায়দ্রোজেন। (১) ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৮।

১২। স্মরণশক্তির হানি।

এনাকার্ভিয়াম। (১) ৩৯৪।
 ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।

২। স্নায়বীয় রোগ বা নার্ভাস্‌ ডিরেঞ্জমেন্ট।

১। আতপাঘাত বা সান্ট্রোক।

একনাইট। (১) ৩১।
 মোনোইন্। (৪) ৭২।
 জেলুমিনিয়াম। (৪) ৭৮, ৭৯।
 বেলাডোনা। (৪) ৭৮।

২। খল্লী, খাইল, স্থানিক আক্ষেপ বা ক্র্যাম্পস্‌।

ইগেসিয়া। (২) ৩৩৪।
 কুপ্রাম মেট। (৫) ৫৪২।
 ক্যালি কস। (৫) ১৪৩।
 জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

৩। তাণ্ডব, নৃত্যরোগ বা কোরিয়া।

আসেনিকাম। (২) ৩৯। (৫) ৩০৯।
 ইগেসিয়া। (২) ৩৪২, ৩৪৩। (৫) ৩০৫।
 একট্রিয়া রেসি। (৫) ৮, ৩৬২।
 এগারিকাস মাস্ক। (১) ৮২।
 এগারিসিন। (৫) ৩৬১, ৩৬২।
 এসাকিটিডা। (২) ৪০৭।
 ওপিয়াম। (৫) ৫৩০।
 ককুলাস ইণ্ড। (৩) ২১৩।
 কটিকাম। (৩) ৩৩৬।
 কুপ্রাম। (৩) ২১৩।
 ক্যামমিলা। (২) ৪০৭।
 ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব। (১) ৮০। (৩) ২৭৫
 ক্রোকাস্‌। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১০।

চায়না। (৩) ২৭৫।
 জিকাম। (১) ৮২। (৫) ৫৩০।
 জিকাম ভ্যালেরি। (৫) ৫৩০।
 জিজিয়া। (৫) ৩০৯, ৩১০।
 ট্যারেন্টুলা কুবেন্স্। (২) ৩৪৩। (৫) ৩০৯,
 ৩১০, ৩৬১।
 নাক্স ভমিকা। (৩) ২১৩।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৬।
 পালসেটোলা। (২) ২৫৬।
 ফস্ফরাস্। (৩) ২৭৫।
 বেলাডোনা। (১) ৮০, ৮১, ৩০৪।
 ভেরেট্রাম ভিরি। (১) ৮১, ৮১, ৩৫৩।
 মাইগেল। (৫) ৩১২।
 মাকু'রিয়াস। (১) ২৩৭, ২৩৮।
 লরসিরেসাস। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১০।
 স্কটিলেরিয়া। (২) ৩৪৩।
 স্কিষ্টা। (২) ২৫৬।
 স্ট্রামনিয়াম। (১) ৮০, ৮১, ৮২, ৩০৪,
 ৩৫৩।
 সাইকুটা। (৩) ২১৩। (৫) ৩৬২।
 সালফার। (১) ৮০। (৩) ২৭৫।
 সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
 সিনা। (২) ৪০৬, ৪০৭।
 সিপিয়া। (৫) ৩১০।
 সোরিনাম। (৩) ২৭৫।
 স্যাটোনাইন। (২) ৪০৬।
 হায়সামামাস। (১) ৮০, ৮২, ৩৫৩।

৪। তোতলামী বা স্ট্রামারিং।

ইয়েসিয়া। (১) ২৮১।
 বডিষ্ট। (১) ২৮১, ৩০৫।
 স্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১, ৩০৪, ৩০৫।
 স্পাইজিগিয়া। (১) ২৮১।

৫। দুর্সলতা বা ডিবিলিটি এবং পেশীদৌর্বল্য।

আর্সেনিকাম। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০।
 এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪। (৫) ৪৮৯।
 এতিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৫৬।
 এম্মাগ্রিসিয়া। (৪) ২০৬।
 এলাস্থাস ম্যাগ্ড। (৫) ৪৭০।
 ককুলাস ইঙ্। (৫) ৪৮৯।
 কল্চিকাম। (৩) ৬৪। (৪) ১৮০।
 (৫) ৪৮৯।
 কার্ক ভেজ। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০।
 ক্যালি কার্ক। (৫) ১৩৫।
 ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬।
 নাক্স ভমিকা। (৩) ৬৫।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ১০৮।
 ফস্ফরাস্। (৩) ১০৮।
 ফস্ফরিক এসিড। (৩) ১০৮। (৪) ২০৬।
 ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৮৬।
 মিউরিয়েটিক এসিড। (১) ১০। (৪) ১৮০,
 ১৮১, ১৮৬।
 লরসিরেসাস। (৪) ২০৬।
 সালফুরিক এসিড। (৪) ১৮৬। (৫) ৫৪৫।
 সিন্ধনা। (৩) ১০৮, ৪০৫। (৪) ১৯১।
 সিলিনিয়াম। (৫) ৪৮৯।
 সোরিনাম। (৫) ২০৬।
 হায়সামামাস। (১) ১০।

৬। ধমুষ্ঠকার বা টিটেনাস।

ইয়েসিয়া। (২) ১৪৭।
 একনাইট। (১) ৭৭। (৫) ১৬৬।
 এক্সটুরা। (৫) ১৬৬।
 কুপ্রাম। (১) ৭৭। (২) ১৪৭।
 ক্যান্ফারা। (৫) ৪৯৭।
 টেবেকাম। (৫) ২৭০।

নাক্স ভমিকা । (২) ১৪৬ ।
 নিকটনা । (৫) ২৭০ ।
 প্রনাস শ্পাই । (৫) ২৭০, ৫৪২, ৫৫০ ।
 কাইজলিগমা । (৫) ২৪২ ।
 কাইটলেকা । (৫) ৪২৭ ।
 বেলাডনা । (১) ৬০, ৬১, ৭৭, ৭৮ । (৫)
 . ১৬৬ ।
 ভেরেটাম ভিরিডি । (৫) ১৬৬ ।
 ম্যাগ্নেটিকা ফস । (৫) ৩৪২, ৩৫০ ।
 স্ট্রিক্সিয়া । (২) ১৪৭ । (৫) ২৭০, ৪২৭,
 ৫৫০ ।
 ট্র্যামনিয়া । (১) ৩০২ । (৫) ৩৪২ ।
 সাইকুটা ভিরোসা । (২) ১৪৭ । (৫) ১৬৬,
 ২৩৪ ।
 হাইড্রুসা এসিড । (২) ১৪৭ । (৫) ২৭০ ।
 হাইপেরিকাম । (৫) ১৬৬, ৩৫০ ।
 হায়দ্রায়াস । (১) ৩২৮, ৩৫১ ।

৭। নিউরেস্থিনিয়া বা স্নায়বীয়

ক্রিয়াদৌর্কল্যা ।

আর্জেন্টাম নাই । (৪) ২০১ ।
 এনাকাডিমাস । (৪) ২৩৮ ।
 এলুমিনা । (৪) ২০১ ।
 কাকা । (৪) ২৩৮ ।
 জিঙ্কাম । (৫) ২০১ । (৫) ৫৩১ ।
 জিঙ্কাম পাইফ্রেট । (৫) ৫৩১ ।
 জিঙ্কাম ফস । (৫) ৫৩১ ।
 নাক্স ভমিকা । (২) ১২৬ ।
 নেট্রাম মিউ । (২) ২৫৫ ।
 পাল্‌সেটিল । (২) ১২৬ ।
 ফস্‌ফরাস । (৪) ২৩৭, ২৩৮ ।
 ফস্‌ফরিক এসিড । (৪) ২০১ ।
 রাস্‌টক্‌স্‌ । (৫) ১৫৭ ।
 সাইলিসিয়া । (৪) ১১৩ ।

সিপিয়া । (২) ১২৬ ।
 হেলোনিয়াস । (৫) ১৫৭ ।

৮। নিদ্রাহীনতা বা শিপ্পুলেস্‌নেস্‌ এবং নিদ্রাবিকার ।

আর্গিকা । (৫) ৪৪২ ।
 ইগ্নেসিয়া । (৩) ৩২০, ৩৩০, ৩৩১ ।
 একনাইট । (১) ৩৫৪ ।
 এভিনা স্যাটিভা । (৫) ৪৪৮ ।
 এষাগ্রিসিয়া । (৪) ৮০ ।
 ওপিয়াম । (২) ৩৩৭, ৩৫৩ ।
 ককুলাস ইণ্ড । (২) ৩৩৭ । (৩) ৩০ ।
 কক্ষিয়া । (১) ৩৫৫ । (২) ৩৩৭ । (৪)
 ৫৫১, ৫৫২ ।
 কল্‌চিকাম । (৩) ৫২ ।
 কল্‌চিকাম । (২) ৩৫৩ ।
 কুপ্রাম । (৩) ২০৫, ২৪১ ।
 কোকা । (৫) ৪৪৮ ।
 ক্যানাবিস্‌ ইণ্ড । (৫) ৪৪৮, ৪৪২ ।
 ক্যামমিলা । (২) ৩৫৩, ৩৬৮ ।
 ক্যান্থর মনরোম । (৫) ৪৪৮ ।
 ক্যালি ব্রোমেটাম । (৫) ১৫২ ।
 ক্যাক্সেরিয়া কার্ব । (৩) ২৭৩ ।
 জিঙ্কাম । (৩) ২৪১ ।
 জেল্‌সিমিয়াম । (১) ৩৫৪ । (৪) ৭২ ।
 (৫) ৪৪২ ।
 নাক্স ভমিকা । (১) ৩৫৪ । (২) ১০২,
 ১১৬ । (৩) ২৪১ ।
 নাক্স মস্কেটা । (৫) ৫৫৪ ।
 নেট্রাম মিউ । (২) ২২৮ ।
 পাল্‌সেটিল । (২) ১৭২, ১২৫ । (৩) ৩০ ।
 প্যাসিসফ্লোরা । (৫) ৪৪৮ ।
 প্যাটিনাম । (৫) ৫২৩ ।
 বেলাডনা । (১) ৩৫৪ । (২) ৩৫৩ ।
 ব্রাইওনিয়া । (৪) ৮০ ।

নাইকোপাডিয়াম। (৩) ২৪১।
 ল্যাকটুকা ভিরোসা। (৫) ১০৮।
 স্ট্রামনিয়াম। (৩) ২৪১।
 সাল্‌ফার। (৩) ৭, ৩০।
 সিঙ্কোনা। (৩) ৭৬, ৮৩।
 সিফিলিয়াম। (৫) ৩৪১।
 সিলিনিয়াম। (৩) ৩০।
 হায়সায়ামাস। (২) ৩১৫, ৩৫৪।

৯। নিস্পন্দ-বায়ু বা ক্যাটা-
 লেপ্‌সি।

ক্যানাবিস ইণ্ড। (৫) ৪৪৭।

১০। পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্‌।

অর্জেন্টাম নাই। (৪) ৮১।
 ইগ্রেসিয়া। (২) ৩৪২।
 একোনাইট। (১) ৩৩। (৩) ৩৩৮।
 এপিস। (৪) ৩০০।
 এলুমিনা। (৪) ২৩৬।
 এমনিয়াম ফস্‌। (৫) ৯৮।
 ওলিগোথার। (৫) ৪৫৪।
 ককুলাস ইণ্ড। (২) ২৫৬, ৩৪২। (৪) ৩৩৪।
 কলিন্সোনিয়া। (২) ৩৪২।
 কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯।
 (৪) ৩৩৪।
 কুগ্রাম মেট। (৫) ৪৪১।
 কোনারাম। (৪) ৮১।
 ক্যানাবিস ইণ্ড। (১) ৩৪।
 ক্যালি ফস্‌। (৫) ১৪৬।
 ক্যাল্মিমা ল্যাটি। (৩) ৩৩৮।
 চাইনি সাল্‌ফ। (৪) ২৩৬।
 জিক্কাম। (৪) ২৩৭। (৫) ৫২৯, ৫৩১।
 জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮০, ৮১।

ডাক্‌মারা। (৩) ৩৩৮, ৪৫৩। (৪) ৩৩৪।
 নাক্‌স ভমিক। (৪) ৮১, ২৩৬।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫, ২৫৬, ৩৪২।
 (৪) ৮১, ৩৩৪।
 গ্লাষাম। (৪) ২৩৭। (৫) ৫৩১, ৫৪০,
 ৫৪১।
 ফস্‌ফরাস। (২) ৩৪২। (৪) ২৩৫, ২৩৬,
 ২৩৭। (৫) ৫৩১।
 ব্যারাইটা কার্ব। (৩) ৩৩৯। (৫) ১৭৫।
 মার্কু'রিয়াস। (১) ২৩৭, ২৩৮।
 মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
 রাস্‌টক্‌স। (৩) ৩৩, ৩৩৮, ৪৭০। (৪)
 ৩৩৩, ৩৩৪। (৫) ৫২৯।
 স্টেনাম। (২) ৩৪২।
 স্ট্রাক্সিসেগ্রিয়া। (১) ৩৪।
 স্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৩।
 সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
 সাল্‌ফার। (৩) ৩৩, ৩৩৮। (৪) ৩০০,
 ৩৩৪।
 সিকেলি। (৫) ৩৭২, ৩৭৩।
 সিফিলিয়াম। (৫) ৩৪১।
 হায়সায়ামাস। (১) ৩৫৩।

১১। পক্ষাঘাত—চক্ষু-পুট-পতন।
 (চক্ষুরোগ দেখ।)

১২। পক্ষাঘাত—জিহ্বা, ওষ্ঠ
 গলদেশ প্রভৃতির স্থানিক।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮।
 জেলসিমিয়াম। (৪) ৮০।
 ডাক্‌মারা। (৩) ৪৫৩।
 গ্লাষাম। (৫) ৫৪১।
 ব্যারাইটা কার্ব। (৩) ৩৩৯।

ক্যালি ব্রোমেটাম । (৫) ১৫১, ১৫২ ।
 ক্যালি মিউ । (৩) ৩৩৬ ।
 ক্যাকেরিয়া । (২) ১৪৬ । (৩) ৩০, ২৭৪,
 ৩৩৬, ১১৩ । (৪) ২২৪ ।
 চাইনিয়াম আর্স । (৫) ২৩৪ ।
 নাক্স ভমিকা । (২) ১৪৬ । (৪) ১১৩ ।
 (৫) ২২৪ ।
 প্রিনাস । (৫) ৫৪৯, ৫৫০ ।
 প্লাস্লাম । (৫) ৫৫০ ।
 বাফো য়েনা । (২) ১৪৬ । (৪) ১১৩ । (৫)
 ২২৩, ২২৪ ।
 বেলাডনা । (১) ৭৮, ৭৯ ।
 জার্কিনা । (৫) ২১৫ ।
 স্টেনাম । (৫) ২২৪ ।
 । (২) ১৪৬ । (৫) ২৩৪ ।
 স্ট্র্যামনিয়াম । (১) ৭৮, ৮৯, ৩০২ ।
 সাইকুটা ভি । (১) ৩৫২ । (৩) ২১২ । (৫)
 ২৬৪, ২৩৫ ।
 সাইলিসিয়া । (২) ১৪৬ । (৫) ১১৩ । (৫)
 ২২৪ ।
 সাল্ফার । (৩) ৩০, ২৭৪ ।
 সিকেলি । (৫) ৩৭২, ৩৭৩ ।
 সন্নিনাম । (৩) ৩০ ।
 সোলেনাম কেরো । (৫) ২১৫ ।
 হাইড্রো এসিড । (১) ৭৮, ৭৯, ৮০ ।
 হায়সায়ামাস । (১) ৭৮, ৭৯, ৩৫১, ৩৫২ ।
 হিপার সাল্ফ । (৩) ৩৩৬ ।

২৫। মেরুমজ্জা ও তৎসংসৃষ্ট

রোগ—প্রদাহ ও দৌর্বল্যাদি ।

এনাকার্ডিয়াম । (১) ৪০০ ।
 ডাকামারা । (৩) ৪৫৩ ।
 মেডোরাইনাম । (৫) ৩৩৬ ।
 সাল্ফার । (৩) ৩৩ ।

২৬। মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক-কোমলত-

বা সফুনিং

এম্মাগ্রিসিয়া । (৫) ৩২১ ।
 জিঙ্কাম । (৫) ৫২৯ ।
 নাক্স ভমিকা । (২) ১৪২ । (৪) ২৫
 পাইক্রিক এসিড । (৪) ২৩৫ ।
 ফস্ফরাস্ । (২) ১৪২ । (৪) ২৩৫ ।
 বাফো য়েনা । (৫) ২২৪ ।

২৭। মেরুমজ্জায় উত্তেজনা বা

স্পাইন্ডাল ইরিটেশন ।

ইগ্রেসিয়া । (২) ৩৪২ ।
 এগারিকাস মাঙ্ক । (২) ১৪৮ । (৫) ৩৬১
 ককুলাস ইণ্ড্ । (২) ২৫৫ । (৫) ৪৮৮
 ৪৮৯
 কোবার্ট । (২) ১৪৮, ১২৭ ।
 ক্যানাবিস ইণ্ড্ । (২) ১২৭ ।
 ক্যালি কার্ক । (৫) ১৩২, ১৩৩ ।
 চাইনিয়াম সাল্ফ । (৪) ২৩৬ । (৫) ৫৩০
 জিঙ্কাম । (২) ১২৭ । (৫) ৫৩০ ।
 জিঙ্কাম ভ্যালেরি । (৫) ৫৩০ ।
 জেলসিমিয়াম । (৫) ৭ ।
 ট্যারেন্টুলা কুবেনস্ । (৫) ১৩৩, ৩১১ ।
 থিরিডিয়ন । (৫) ২৪২ ।
 নাক্স ভমিকা । (২) ১৪৮ । (৪) ২৩৬ ।
 নেট্রাম মিউ । (২) ২৫৫ । (৩) ৩৩৬ । (৫)
 ১৬৭ ।
 পালসেটীলা । (২) ১২৭ ।
 ফস্ফরাস্ । (২) ১৪৮ । (৪) ২৩৫, ২৩৬
 (৫) ৫৩০ ।
 ফাইজিষ্টগুমা । (৫) ২৪১, ২৪২ ।
 বেলাডনা । (৫) ৭ ।
 রডেডগুন্ন । (২) ১৪৮ । (৪) ৩৩৬ ।

লাইকোপডিয়াম। (৪) ২৩৬।
 ট্রিকনিয়া ফস্ফরিকা। (৫) ১৩৩, ৩১১।
 ট্র্যাফিসোগ্রিয়া। (২) ১৪৮।
 সাল্ফার। (২) ১৪৮। (৩) ৩২। (৫) ৭।
 সিকেলি। (৪) ২৩৬। (৫) ৩৭২, ৪৮২।
 সিপিয়া। (২) ১২৭। (৫) ১৩৩, ৫০২,
 ৫৩০।

সিমিসিকুগা। (২) ১৪৮, ২৫৫। (৫) ৭,
 ১৩৩।

২৮। রাইটান ক্র্যাম্প বা লেথকের

হস্ত-কম্প।

এনাকাডিয়াম। (১) ৩২৫।
 জিক্সাম। (৫) ৫২৭।

২৯। লোকো-মোটর-এটাক্সিয়া বা কশেরুকা মজ্জায় ক্ষয়- রোগ।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪০, ৪৪১।
 (৫) ৭২।
 ইস্কুলাস হাইপ। (৪) ৪৪১।
 এমনিয়াম মিউ। (৪) ৪৪১।
 এলুমিনা। (৫) ৭২।
 ক্যালি ব্রোমটাম। (৫) ১৫২।
 ক্যালি হাইড্রয়ডিকাম। (৪) ১৬৬।
 জিক্সাম। (৪) ৪৪১।
 থুজা। (১) ৩০৪।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৬।
 নাকস ভমিকা। (৪) ২৩৭।
 পাল্‌সেটিলা। (১) ৩০৪।
 পেট্রলিয়াম। (১) ৩০৪।
 স্নাখাম। (৫) ৫৪০।
 ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৭।
 ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ৩০৪।

মাকু রিয়াম। (১) ২১৯।
 ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৪।
 সাইলিনিয়া। (৪) ১১৪।
 সাল্ফার। (৪) ৪৪১।
 সিকেলি। (৫) ৭২, ৩৭২, ৩৭৩।

৩০। শিরঃশূল বা হেডেক—সর্দিজ শোণিতসঞ্চয়ী এবং স্নায়বীয়।

আইরিস ভাস। (২) ২৫৩, ২২৮। (৩)
 ৪৩৮। (৫) ৩২৫, ৩২৬।
 আর্জেন্টাম নাই। (১) ৩৮৬। (৪) ৪৩৯,
 ৪৪০।
 আর্সেনিকাম। (২) ৫০, ৫১, ৭৮, ২২২।
 ইগ্রেসিয়া। (২) ৩১২, ৩৩৫, ৩৪০।
 (৪) ১১২, ২৭৪, ৪৪০। (৫) ৫৫২।
 থুসা সাই। (২) ৩৮৮।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮। (৫) ৪০২।
 একনাইট। (২) ৩৩৬।
 এন্টিয়া রেসি। (৫) ৫, ৬, ২৪৪।
 এনাকাডিয়াম। (১) ৩৮৬, ৩২৩।
 এন্টিম টার্ট। (২) ৩৮৮। (৩) ৩১, ১৬৯।
 এলো। (৫) ১২৮।
 ওমোস্‌মডিয়াম। (৪) ৭৮।
 ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
 কক্কুলাস ইণ্ড। (২) ১২৩। (৪) ৭৮।
 (৫) ৪৮৮।
 কফিয়া। (৪) ৪৪০। (৫) ৫৫২।
 কলসিঙ্ক। (৩) ১২০, ১২১।
 কষ্টিকাম। (২) ১৪০, ২৫৪।
 কার্ব্ব এনি। (২) ১২৩।
 কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩২৮।
 কার্ব্বলিক এসিড। (৩) ৩১।

- কুইনাইন। (১) ৫১।
 (চাইনি সালফ।)
 ক্যানাবিস ইঞ্জ। (৫) ৪৮৮।
 ক্যামফিলা। (২) ৩৬৭। (৩) ১৯০।
 ক্যালি আইওডেটাম। (৩) ৩৯৯। (৫)
 ১২৪, ১২৫।
 ক্যালি বাইক্রম। (২) ২৫৪। (৩) ৩৯৯,
 ৪৩৮। (৪) ৭৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৭।
 ক্যাকেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৫।
 ক্যাপ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯।
 গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৪০।
 প্রোনোইন। (১) ৭০। (২) ২৫৩।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩।
 জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯।
 জেলুসিনিয়াম। (২) ২৫৩, ৩৩৬। (৩)
 ৩১, ১৭০। (৪) ২৩, ৭৭, ৭৮, ১১২।
 (৫) ৩৯৬, ৪০০।
 টিলিয়া ট্রিফোলি। (৫) ৪০৯।
 টুবাকু লিনাম। (৫) ৩২৮।
 ট্যারেন্টুলা কুবেনস্। (৫) ৩১৫, ৩২৫।
 থিরিডিয়ন। (২) ২৯৮, ২৯৯। (৫) ৩১৪,
 ৩১৫।
 থুজা। (৪) ২৭৪, ২৭৫, ৪৪০। (৫) ৫৪২।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৩৯, ১৪০, ১৪১,
 ২৫৩, ২২৭, ২৯৮। (৩) ৩৯৮। (৫)
 ০৯
 নেটাম মিউ। (১) ১৪৮। (২) ১৪০
 ২২৬, ২৫৩। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১
 (৫) ৪০০।
 পলিনিয়া। (৫) ৩৯৬।
 পালসেটিলা। (২) ১৯২, ১৯৩, ২৯৮,
 ২৯৯। (৪) ২৩। (৫) ৩৫৫।
 পাইক্রিক এসিড। (৪) ২৩৫।
 পেট্রিলিয়ান। (৫) ৫৬০।
 প্যারিস কায়ডি। (৪) ১১২।
 প্রনাস স্পাই। (৩) ১২১।
 প্র্যাটিনাম। (৫) ৫২৫।
 ফস্ফরাস। (৪) ২৩১।
 ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১৯৯।
 ফেরাম মেট। (১) ৭০। (৫) ৫১৩, ৫১৪।
 ফেলাঞ্জিয়াম। (৫) ২৩১।
 বেলাডনা। (১) ৫৩, ৬৮, ৬৯, ৭০, ২০৩,
 ২২৫। (২) ২৯৮, ৩৩৫। (৩) ৯২।
 (৫) ৪০০, ৪৭৫, ৫১৪।
 ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৪।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৮, ১৬৬। (২) ১৪০।
 (৪) ২৩। (৫) ২৪৪।
 ভেরেট্রাম এল। (২) ১২৩, ৩৩৬।
 মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৩, ২৩৪। (৩) ৩১,
 ১৭০
 মার্কুরিয়াস আই। (১) ২৩৪।
 মিনিয়াস্ফিস। (২) ১২৩। (৪) ১১২।
 মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
 ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৪৯।
 ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৪) ৩৫৪, ৩৫৫।
 রেনাকুলাস বাবো। (২) ১২৩। (৫) ১৯।
 রেণাকুলাস স্কিলা। (২) ১২৩।
 ল্যাক্ ডিক্রোয়েটাস। (৫) ২২০।
 ল্যাকেসিস। (৫) ২১, ২২।
 ল্যাস্টিকা ভিরোসা। (৫) ১০৮।
 স্ট্রনসিয়ানা কার্ব। (৪) ১১২।
 স্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৪।
 সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৩) ৪৩৮। (৪)
 ১১১, ১১২, ৩৭১। (৫) ৩৪৯, ৩৫৫।
 সার্স'প্যারিলা। (৫) ৪৮৩।
 সালফার। (৩) ৫, ৩১, ১৭০।
 সালফুরিক এসিড। (২) ৩৩৫।
 সিঙ্কনা। (১) ৭০। (৩) ৭৬, ৯২। (৪)
 ২৩।
 সিডন। (৩) ১২০।

সিনা। (২) ৪০৫, ৪০৬।
 সিপিয়া। (২) ২২৭, ২২৮, ২২৯। (৩)
 ৩২২। (৫) ৬।
 সিকিলিনাম। (৫) ৩৪০।
 সোরিনাম। (৩) ৪৩৬, ৪৩৭। (৪) ৩৭১।
 স্পাইজিলিয়া। (২) ১২৩। (৩) ১২০।
 (৪) ২৭৫। (৫) ৪০০।
 স্ত্রাহুইনেরিয়া। (১) ৭০, ৭১। (২) ২২৮,
 ৩৩৬। (৪) ৭৮। (৫) ৩৪২, ৪০০,
 ৪৭৪, ৪৭৫।
 হাইড্রকবিনাম। (৫) ৩৪১।

৩১। শিরঃশূল—অর্ধশিরঃশূল,
 আধকপালি মাথাব্যথা বা
 হেমিক্রেনিয়া বা মেগ্রিম।

আইরিস ভাস। (২) ২২৮। (৫) ৩২৫,
 ৩২৬।
 আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৯, ৪৪০।
 আর্সেনিকাম। (২) ৫১, ৭৮, ২২৯।
 ইথুসা সাই। (২) ৩৮৮।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮। (৪) ৪০৯।
 কফিয়া। (৫) ৫৫২।
 থিরিডিয়ন। (২) ২২৭।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৪১, ১৪৫, ২২৭।
 পালসেটোলা। (২) ১২২, ১২৩, ২২৮।
 প্ল্যাটিনাম। (১) ৭১।
 বেলাডনা। (২) ৬৯, ৭০, ৭১। (২) ২২৮।
 মার্কুরিয়াস। (১) ৭১, ২৩০।
 সাইলিসিয়া। (১) ৭১।
 স্ত্রাহুইনেরিয়া। (১) ৭০, ৭১। (২) ২২৮।
 (৫) ৩৪২।
 সিপিয়া। (১) ৭১। (২) ২২৭, ২২৮,
 (৫) ৬।
 ছিপার সালক্। (১) ৭১।

৩২। শিরঃশূল—বমন বা প্রকোষ
 হইলে উপশম।

ইথেসিয়া। (২) ৩৩৫। (৪) ১১২। (৫)
 ৪৭৫।
 একনাইট। (২) ৩৩৬।
 জেলুসিমিয়াম। (২) ৩৩৬। (৪) ৭৮,
 ১১২। (৫) ৪৭৫।
 বেলাডনা। (২) ৩৩৫।
 ভেরেট্রাম এলু। (২) ৩৩৬।
 সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৪) ১১২।
 সালফুরিক এসিড। (২) ৩৩৫।
 স্ত্রাহুইনেরিয়া। (২) ৩৩৬। (৫) ৪৭৫।

৩৩। শিরঃশূল—বমনঘূত্ বা
 সিক-হেডেক।

আইরিস ভাস। (২) ২২৮। (৫) ৩২৬।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
 থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৪, ৩১৫।
 পলিনিয়া। (৫) ৩২৬।
 সিপিয়া। (২) ২২৭।
 স্ত্রাহুইনেরিয়া। (৪) ৪৪৭, ৪৭৮।

৩৪। শিরঃশূলসংশ্রবে দৃষ্টিবিকার
 বা অন্ধত্ব।

আইরিস ভাস। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।
 (৫) ৩২৬।
 ক্যালি বাই। (৩) ৪৩৮। (৪) ৭৮, ৩৭১।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
 জেলুসিমিয়াম। (৩) ১৭০। (৪) ৭৮। (৫)
 ৩২৬।
 নেট্রাম মিট। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।
 সিলিকন। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৮১।
 সোরিনাম। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।

৩৫। শিরোমূৰ্চন বা ভাটিগো।

- আইওডিয়ায়। (৪) ২২৬।
 আর্কেটাম নাই। (৪) ৩৩৩।
 এথ্ৰাগ্ৰিসিয়া। (৫) ২২৬, ৩২২।
 গুলিমেণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
 ককুলাস ইণ্ড। (৪) ২৩৪।
 কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৫। (৪) ৩৩২, ৩৩৩।
 কোনামায়। (৫) ২২৬।
 চাইনিয়াম সাল্ফ। (৪) ৩৩৩।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
 জেলসিমিয়ার। (৪) ৩৩৩।
 থিরিডিয়ন। (৪) ৩৩৩। (৫) ৩১৫।
 নাক্স ভমিক। (৪) ২৩৪।
 নেটাম স্ক্যালিসিলিকাম। (৪) ৩৩৩।
 পালসেটোলা। (৪) ২৩৪।
 কসকরাস। (৪) ২৩৩, ২৩৪।
 কেরাম মেট। (৫) ৫১৪।
 বেলাডনা। (১) ৫৩।
 ব্রায়নিয়া। (৪) ২৩৪।
 রাসটক্স। (৪) ৩৩২।
 ল্যাক কেনিয়াম। (৫) ২৮৬।
 ল্যাকেসিস। (৫) ২৮৬।
 সিঙ্কনা। (৪) ২৩৪।
 স্কালুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮।

৩৬। শিরোমূৰ্চন বা রোলিং

অব দি হেড।

- বেলাডনা। (১) ৮৪, ১৩৮।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮।

৩৭। সফল পক্ষাঘাত বা প্যারা-

লিসিস এজিট্যান্স।

- কুপ্রাম। (৫) ৫৪১।
 ক্লাবাম। (৫) ৫৪১।

মাক্সিমিয়াস। (১) ২১৪, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১।
 (৫) ৫৪১।

হায়সাম্যানাস। (৫) ৫৪১।

৩৮। সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি।

- আর্পিকা। (৩) ১২৫, ১২৬।
 একনাইট। (৩) ১২৬।
 এপিস। (৩) ৩৭০।
 গুপিয়ার। (১) ৭৩। (২) ১৪২, ৩০০,
 (৩) ১২৬, ৩৬২, ৩৭০।
 কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭।
 মনোইন। (৩) ১২৬।
 নাক্স ভমিক। (২) ১৪১, ১৪২, ৩০০।
 (৩) ৩৭০।
 প্রনাস স্পাই। (৫) ৫৪২, ৫৫০।
 বেলাডনা। (১) ৭২, ৭৩, ২৩৪। (৩)
 ১২৬, ৩৭০।
 ব্যারাইটা কার্ক। (৩) ৩৩২। (৫) ১৭৪।
 মাক্সিমিয়াস। (১) ২৩৫।
 সিপিয়া। (২) ১৪২, ২২২, ৩০০।
 (৩) ৩৭০।
 হেলিবোরাস। (৫) ৩৮।

৩৯। সর্বাঙ্গীন আক্ৰেপ বা

কনভালশন (বিবিধ প্রকার)।

- ইয়েসিয়া। (২) ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯,
 ৩৪৮।
 ইঞ্জিগো। (২) ৩৪৮।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৪৮।
 এথ্ৰিস্থিয়ারাম। (৫) ১০৫।
 গুপিয়ার। (১) ২৭২। (২) ৩৩২, ৩৫২।
 (৩) ৩৭১, ৩৭২।
 কুপ্রাম। (১) ৩০৩। (২) ৩৩২। (৩)
 ২২০। (৫) ৫৪২।

- ক্যান্সারিস। (১) ২৭২।
 ক্যান্সারিলা। (১) ৭৬, ৭৭। (২) ৩৩৯।
 ৩৫২, ৩৬৮, ৩৭০।
 ক্যান্সারি। (৫) ৪৪৫।
 ক্যালি কার্ক। (৫) ১৩৫।
 ক্যাঙ্ক কার্ক। (৬) ২৭৫।
 গোনোইন। (২) ৩৩৯।
 জিঙ্কাম। (১) ৩০৩, ৩০৪।
 জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৮।
 নাক্স ভমিকা। (১) ২৭২। (২) ১০৩,
 ৩৫২।
 পডক্কিলাম। ৩৮৭।
 প্লাঙ্কাম। (৫) ৫৪২।
 বেলাডনা। (১) ৪৫, ৬১, ৩৬, ১০৪, ১০৬,
 ২৭৯, ৩০৩, ৩২৬, ৩৫১। (২) ৩৩৮,
 ৩৩৯। (৩) ২৭৫।
 ভেরেট্রাম এল। (২) ৩৩৯।
 মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
 ট্রেনাম। (২) ৪০৬।
 ট্রিকনিয়া। (২) ১০৩।
 ট্রাননিয়াম। (১) ২৭৯, ৩০২, ৩০৩, ৩২৬।
 (২) ৩৩৮।
 সাইকুটা। (৪) ২৭২। (২) ৪০৬। (৫)।
 ২৩৫।
 সিকেলি। (৫) ৩৭২।
 সিনা। (২) ৪০৬।
 হাইড্রক্বিনিাম। (৫) ৩৪১।
 হায়সায়ামাস। (১) ৭৬, ৭৭, ২৭৯, ৩১৩,
 ৩১৪, ৩১৭, ৩২৬, ৩৫১। (২) ৩৩৮,
 ৩৩৯।
 ৪০। সাইরাটিকা বা গুঞ্জসী।
 জার্ণিকা। (৫) ৩৩৫।
 জার্সিকার। (২) ৭৮, ৩৩৮। (৩)
 ১২২।
 ইউপেটোরিয়াম পাপু। (৫) ১১৮।
 এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৩।
 এলো। (৩) ১৯৩।
 ককিয়া। (৫) ৫৫২।
 কলসিঙ্ক। (২) ৩৬৮। (৩) ১২১, ১২২,
 ১২৩। (৫) ১০৭।
 কলচিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ১২৫।
 ক্যামমিলা। (২) ৩৬৮। (৩) ১২৩।
 ক্যালি আইওডেটাম। (৫) ১২৫।
 ক্যালি ফসফরিকাম। (২) ২৫৪।
 ক্যালি বাই। (৪) ১২৫।
 গ্র্যাকাইটিস। (২) ১২৭।
 জেলসিমিয়াম। (২) ৩৬৮।
 টেরাপাইনি। (৩) ১২৩।
 টেরিবিঙ্ক। (৩) ১২৩।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৮। (৩) ১২৩।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৪।
 স্ত্রাক্যালিয়াম। (২) ৩৬৮। (৩) ১২৩।
 (৫) ১০৭।
 পালসেটিল। (২) ১২৬।
 ফসফরাস্। (২) ২৫৪।
 ফাইটলেঙ্ক। (২) ১২৫।
 ফেরাম। (২) ১২৭।
 বেলাডনা। (১) ৭৫। (২) ১২৭।
 ব্রায়নিয়া। (৪) ৩০৫।
 ভেরেট্রাম এল। (৩) ১২৩।
 মাকু রিয়াস। (২) ১২৭।
 ম্যাগ্নেসিয়া কস। (২) ২৫৪।
 রাস্টক্‌স্। (৫) ৩৩৪।
 রুটা গ্র্যান্টি। (৪) ৩৬৫।
 লিডাম। (৪) ৩৩৫।
 স্ট্রিক্কিয়াম। (৫) ৪৩২।
 সাইলিসিয়া। (২) ২৫৪।
 সাল্‌কার। (২) ১২৭, ২৫৪। (৩)
 ৩৩।

মিগিরা। (২) ১২৭।
হিগার সালক। (৩) ১৮৫।

৪১। দ্বারবীয় আঘাত বা শক্।

বার্ণিকা। (৫) ৪০।
একনাইট। (১) ২২।
হেলিবোরাস। (৫) ৪০।

৪২। দ্বারবীয় রোগ।

ভালকামার। (৩) ৪৫৩।
এনাস প্লাইনোসা। (৫) ৫৪৯, ৫৫০।
রাস্টক্‌স্। (৩) ৪৫৩।

৪৩। দ্বারু-শূল বা নিউরেলজিরা।

আর্কেটাম নাই। (৪) ৪৪০।
আর্কেটাম মেট। (৫) ৫০৬।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১, ৫২। (৩) ৩৩,
২৩।
একনাইটাম। (১) ৩৩, ৭৫।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৮।
এমনিরাম মিউ। (৫) ৯৩।
এলিরাম সেপা। (৫) ৩৫০।
কলকাইলাস। (৫) ৩৮৫।
কলসিহ। (৩) ১১১।
কলটিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ৪০১।
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৩।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২১৩।
ক্যাঙ্কাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭।
ক্যাপসিকাম। (২) ৫২।
ক্যামিলা। (২) ৩৬৮।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১০৮।
ক্যালোরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৫।
ক্যাঙ্কিরা ল্যাটি। (৫) ২৫২, ৪১৭, ৪১৮।
চাইনি সালক। (২) ৫২।

চেলিউনিরাম। (১) ৩৭৭।
জিঙ্কার। (৩) ৫৩২, ৫৩৬।
জেলুমিনিরাম। (৪) ৮১।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
ডলিকস্। (৫) ২৩৯।
নাল্ল ভমিকা। (৩) ১২১।
নেট্রাম মিউ। (২) ৫২, ২৫৪।
পালসেট্টা। (২) ১২৬।
প্লাটিনাম। (৪) ৫২৩, ৫২৪।
বেলাডনা। (১) ৭৫, ১৬১, ২৪০। (৩) ২৩।
ব্যারাইটা এসেটিকা। (৫) ১৭৯।
ভার্বেকাম। (৫) ২৫২, ৪১৮।
মাকুরিয়ারাস। (১) ২১৯, ২৪০। (৫) ৫২৩।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কস্। (৫) ৩৫০, ৩৫১।
রাস্টক্‌স্। (৩) ১২১।
রেণাঙ্কুলাস বাছো। (৫) ১৯১।
ষ্টেনাম। (৩) ১৯১। (৫) ৫২৩।
সাইলিদিরা। (১) ১৬১।
সালফার। (১) ১৬১। (২) ৫২। (৩) ৩৩।
সিঙ্কনা। (৫) ৫২। (৩) ২৩।
সিডন। (২) ৫২। (৩) ২৩। (৫) ৫৫৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্পাইজিদিরা। (১) ২৩। (৩) ৬৫। (৫)
৪০০, ৪০১।
হাইপেরিকাম। (৫) ৩৫০।
হিগার সালক। (১) ১৬১।

৪৪। দ্বারু-শূল, মুখমণ্ডলের বা

ক্লোরোপ্যালজিরা, ফেসিয়াম

নিউরেলজিরা।

আর্কেটাম নাই। (৪) ৪৪০।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১।

কলচিকাম। (৩) ৬৫।
 ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।
 জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২, ৫৩৩।
 জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮১।
 টেবেকাম। (৫) ২৭১।
 পালসেটিলা। (২) ১৯৬।
 জার্বেকাম। (৫) ২৫২।
 ল্যাকেসিস। (৪) ২২।
 সালফার। (৩) ৩৩।
 স্পাইজিলিয়া। (৩) ৬৫। (৫) ৪০০, ৪০১।
 হিগার সাল্ফ। (১) ১৬১।

১২। মুত্র ও মুত্র-যন্ত্র-রোগ।

১। অনৈচ্ছিক, অসাড় এবং নির্কীর্ণ
 মুত্রস্রাব বা ইন্ডল্যান্টারি ইউরি-
 নেশন এবং ইমকটিনেন্স
 অব ইউরিগ।

আর্পিকা। (৩) ১১৩।
 আসেনিকাম। (১) ৩৫৪।
 এপিস। (৪) ৩০৮।
 গুপিয়াম। (১) ৩৫৪।
 কষ্টিকাম। (১) ৩৫৪। (৩) ৩৪২, ৩৪৩।
 জিঙ্কাম। (৩) ৩৪২।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১।
 নাইট্রিক মিউ। (২) ২২৭। (৩) ৩৪২।
 পালসেটিলা। ২০৯।
 পেট্রিসিলিয়াম। (৫) ২৩১।
 সিলিয়া। (২) ২৭৩।
 সিলি। (৩) ৩৪২।
 হায়দ্রায়াস। (১) ৩১৪, ৩৫৩।

২। আক্কেপিক বৃক্ষ-নিষ্কাশন বা স্প্যাজমডিক ইউরিনেশন।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১।
 ট্র্যাননিয়াম। (১) ৩০৫।

৩। ইউরিমিয়া বা মুত্র-বিষ-ক্রিয়া।

আর্পিকা। (৫) ৮৯।
 এন্টিম টাট। (৫) ৮৯।
 এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮৮, ৮৯।
 এরামট। (৫) ৪৬৮।

৪। এলবুমিনুরিয়া, ব্রাইটস্ ডিজিজ বা লাল-মেহ।

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭। (৫) ৪৪৫-৭
 আসেনিক। (২) ৮৪, ৮৫।
 ইউপে পাপু। (৫) ১১৮।
 এপিস। (২) ৩১৩। (৪) ৩০৭।
 ক্যাঙ্করিস। (৩) ৩১২।
 ক্যাঙ্করা। (৩) ৩১২।
 ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
 ক্যালি নাই। (৩) ৩১৩।
 টেরিবিষ্ট। (৫) ৫৫৫।
 পালসেটিলা। (৫) ১৫৭।
 কন্ডিকা ক্রকা। (৫) ৩০৭।
 ফস্ফরাস্। (৪) ২৫২।
 ল্যাক ডিক্লো। (৫) ২৪২।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৫১।
 হিগার সাল্ফ। (১) ১৭১।
 হেলোনিয়াম। (৫) ১৫৭।

৫। কিডনি বা বৃক্করোগ

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭।
 আসেনিকাম। (১) ৩৫৫।
 এডনিস আর্পালিস। (৫) ১৭১।

এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ২০২।
এপিস। (৪) ৩০৭।
কন্ড্যালেরিয়া মেজাস। (৫) ২০২।
ম্লোনোইন। (৪) ৩২৫।
ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩২৫।
নেডুসা। (৫) ৩০১।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

৬। কিড্‌নি বা বৃক্কের দানাবুক্ত
ক্ষয় বা গ্র্যামুলার ডিজেনারেশন।

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭।
ক্যালি আইওডি। (৫) ১২৭।
ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩২৫।
প্লাশাম। (৪) ৪৬৭।

৭। কিডনি বা বৃক্কের ফ্যাটি
ডিজেনারেশন বা বসানকৃষ্টতা।

অরাম। (৪) ৪৬৬।

৮। নেফ্রাইটিস্ বা বৃক্ক প্রদাহ।

আসেনিকাম্। (২) ৮৪। (৫) ৫৪২।
ইউপেটোরিয়াম পাপু'। (৫) ১১৭, ১১৮।
ক্যাছারিস্। (৩) ৩১২।
টেরিবিছ্। (৫) ৫৫৫।
প্লাশাম। (৫) ৫৪২।
কস্‌ফরাস্। (৪) ২৫২।
ফেরাম আইওডি। (৫) ৫১৬।
মার্ক সল্। (৩) ৩১২। (৫) ৫৪২।

৯। নেফ্রোলজিয়া বা বৃক্ক-শূল।

আর্জেন্টাম নাই'। (৪) ৪৪৬।
নাইট্রিক এসিড'। (৪) ৪৪৬।

লাইকপডিয়াম। (৫) ৪৮৩।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

১০। বহুমূত্র বা মূত্রমেহরোগ—
মধুমেহ বা ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্ ;
মূত্র-মেহ, মূত্রাধিক্য বা ডায়াবিটিস
ইন্সিপিডাস্।

আর্জেন্টাম নাই'। (৪) ৪৪৭।
আর্জেন্টাম মেট'। (৫) ৫০৬।
আসেনিকাম্। (৪) ২৫৪।
কটিকাম্। (৪) ২০৪।
ক্যালি নাইট্রিক্। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্রিয়োজোট'। (৫) ২২৮।
নেট্রাম সাল্ফ'। (৪) ২৫৪।
প্লাশাম'। (৪) ২০৪।
ফস্‌ফরাস্'। (৪) ২৫৪।
ফস্‌ফরিক এসিড'। (৪) ২০৩, ২০৪।
বার্কেরিস'। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
জ্যালেরিয়ানা'। (৫) ২২৬।
মিউরেকস'। (৫) ২২৬, ২২৮।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্'। (৫) ৩৫২।
ল্যাক্ ডিক্লো'। (৫) ২৯০, ২৯১, ২৯২।
ট্রোক্যাছাস'। (৪) ২০৪।
সিলা'। (৪) ২০৪। (৫) ২১০।

১১। মূত্রকৃচ্ছ বা ডাইসুরিয়া।

আসেনিকাম্। (৪) ৩০৮।
এপসাইনাম ক্যানা'। (৪) ৩০৮।
এপিস'। (৪) ৩০৮।
ক্যাছারিস'। (৪) ৩০৮।
ক্যাফরা'। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি নাইট্রিকাম্। (৫) ১৪২।
চিমাকিলা'। (৫) ৪১৫।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১
জাইবার্গম। (৫) ৪৩৬।
টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।

১২। মূত্র-নাগীর প্রতিশ্রায়,
(ব্যালানোরিয়া) ও প্রদাহ বা ক্যাটার
এণ্ড ইনফ্লমেশন অব দি ইউরিথ্রা।

ইরিঞ্জিয়াম। (৫) ২১৬।
টেরিবিস্‌। (৫) ৫৫৫।
ডরিকোরা। (৫) ৩০৭।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩২৬, ৩২৭।
সাল্‌কার। (৪) ৩২৭।
হায়সামামাস। (৫) ৩০৭।

১৩। মূত্র-পথ হইতে রক্তস্রাব।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

১৪। মূত্র-পথে বেদনাদি কষ্ট।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৪১, ২৫২।
সার্সাপেরিলা। (২) ২২৭। (৩) ২৫২।

১৫। মূত্র-ঘন্ত্ররোগ বা ডিজিজেক্‌
অব দি ইউরিনারি অর্গ্যান্‌স্‌।

এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ৪৫৩।
ওপিয়াম। (২) ১৬১।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৪৩।
কুপ্রাম। (৩) ২৫৩।
কোকাস ক্যাষ্টাই। (৩) ২৫৩।
জিঙ্কাম। (৩) ২৫৩, ৩৪২।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১।
নেট্রাম মিউ। (৩) ২২৫, ৩৪২।

ফেরাম ফস। (৩) ৩৪৩।
বার্বেরিস। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
বেলাডনা। (১) ১০৫। (৩) ২৫৩।
মার্ক সল। (১) ১৯৬।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১, ২৫২, ২৫৩।
ল্যাকেসিস। (৩) ২৫২। (৪) ৫১, ৫২।
ট্র্যাননিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ২৫৩।
সাসপ্যারিলা। (৩) ২৫২।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিরা। (৩) ২৫১, ২৫২।
সিলা। (৩) ৩৪২।
হায়সামামাস। (১) ৩১৪।

১৬। মূত্র-শিলা ও মূত্র-রেণু
প্রভৃতি বা ইউরিনারি ষ্টোন্‌স্‌,

গ্র্যাভেল্‌স্‌ এবং কাল্‌ লাই।
ইউপেটোরিয়াম পাপু। (৫) ১১৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৩।
কোকাস ক্যাষ্টাই। (৩) ২৫৩। (৫)
৩৮০।

ক্যাছারিস। (৩) ৩১৩।
ক্যালি কার্বনিকাম। (৩) ৩৪৩।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১।
প্যারা ব্রাভা। (৫) ৩৮০।
পেট্রিলিয়াম। (৫) ৩৮০।
বার্বেরিস জল্‌গা। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
লাইকোপডিয়াম। (৩) ২৫১। (৫) ৪৮৩।
টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।
সার্সাপেরিলা। (৩) ২৫২। (৫) ৪৮৩।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিরা। (২) ৩০৬। (৩) ২৫১, ২৫২।

১৭। মূত্র-শূল বা ইউরিনারি
কলিক।

টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স উমিক। (২) ১৩১।
ষ্ট্রুগ্ মেটা। (৫) ৪৫৭।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।

১৮। মূত্রস্থালী বা ব্লাডারের
উত্তেজনা বা ইরিটেশন।

পালসেটিলা। (২) ২০৯।

১৯। মূত্রস্থালী বা ব্লাডারের
পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা।

আর্শিকা। (১) ৩১৪।
ওপিয়াম। (১) ৩১৪।
কলিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৪২।
নাক্স উমিক। (৪) ৮১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪।
হায়সামারাস। (১) ৩১৪।
হিপার লাক্। (১) ১৫৫, ১৮৩।

২০। মূত্র-স্থালী-শ্রদ্ধাহ বা
সিষ্টাইটিস।

ইউপেটেরিয়াম পাপু। (৫) ১১৭, ১১৮।
কোনাম। (৫) ২২৮।
ক্যাছারিস। (৩) ৩১৩।
টেরিবিস্। (৫) ৫৫৫।
ডাকামারা। (৩) ৪৫৬।
ডিলিচ্যালিস। (৪) ৩৯৬।
বেলাডনা। (১) ১০৪।
লাইকোপডিয়াম। (৪) ৩৯৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫১।
ষ্ট্রুগ্ মেটা। (৫) ৪৫৭।

২১। মূত্র-স্থালী হইতে রক্তস্রাব
বা হিমরেজ্, ফ্ৰুন্ দি ব্লাডার।

ইরিজিরণ। (৫) ১১৩।

২২। মূত্রাঘাত বা মাপ্রেশন
অব ইউরিন।

আসেনিকাম। (৪) ৩০৮।
একনাইটাম। (১) ৪৫।
এপসাইনাম। (৪) ৩০৮।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ওপিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ৩৭৮।
ক্যাছারিস। (১) ৩০৬। (৩) ৩১৩। (৪)
৩০৮।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
জিল্লিবেরিস। (৩) ৩৭৮।
টেরিবিস্। (৫) ৫৫৫।
পালসেটিলা। (৩) ৩৭৮।
দ্রাখাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা। (১) ৪৫, ৩০৫।
লাইকোপডিয়াম। (৩) ৩৭৮।
ষ্ট্রুগ্ মেটা। (৫) ৪৫৭।
ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ৩৭৮।

২৩। মূত্রোন্নতাজনিত শোথ
বা ড্রপসি।

আসেনিক। (৫) ৪৫৩।
এপসাইনাম কানা। (৫) ৪৫৩।
এপিস। (৫) ৪৫৩।

২৪। মূত্রোব্রোধ বা রিটেনশন
অব ইউরিন।

আর্শিকা। (৩) ১১৩।
এপিস। (৪) ৩০৮।

ওপিয়াম। (১) ৩০৫। (২) ১৩১। (৩) ৩৭৮।
 কলিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৭৮।
 ক্যাকরা। (৫) ৪৪৫।
 চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
 নাক্স ভমিকা। (২) ১৬১। (৩) ৩৭৮।
 টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।
 হায়সাম্যামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৩।

২৫। মূত্রের জাণ ও বর্ণের
 বিকার।

আর্শিকা। (৪) ৫২।
 আসেনিকাম। (৪) ৫২।
 ইন্ডিয়াম। (২) ২৭৩।
 এপিস। (৪) ৫২।
 ওপিয়াম। (৪) ৫২।
 কলচিকাম। (৪) ৫২।
 কার্ক শেঙ্ক। (৪) ৫২।
 কার্কলিক এসিড। (৪) ৫২।
 ক্যালি কার্কলিকাম। (৪) ৫২।
 টেরিবিছ। (৪) ৫২।
 ডিজিট্যালিস। (৪) ৫২।
 নেট্রাম মিউ। (৪) ৫২।
 বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২। (৪) ৫২।
 বেঞ্জোয়েট অব এমন। (৪) ৫২।
 লাইকোপডিয়াম। (২) ৩০৬।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৫২।
 সিপিরা। (২) ২৭৩, ৩০৬, ৩১১।
 হেলিবোরাস। (৪) ৫২।

২৬। মূত্রের শুভানী বা
 সেডিমেন্ট।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩৮০।
 ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।

নেট্রাম মিউ। (৩) ২৫২।
 বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
 লাইকোপডিয়াম। (২) ৩০৬। (৩) ২৫১।
 সার্সাপ্যারিলা। (৩) ২৫২।
 সিনা। (২) ৩৯৬।
 সিপিরা। (২) ২৭৩, ৩০৫, ৩০৬, ৩১০। (৩) ২৫১।

২৭। লিথিমিয়া।

বার্কেরিস ভলগা। (৫) ৩৮০, ৩৮১।

২৮। শযা-প্রস্রাব, রক্তনী-প্রস্রাব
 বা ওয়েটিং দি বেড।

কলিকাম। (৩) ৩৪২।
 ক্যালি নাইটি কাম। (৫) ১৪২।
 ক্যাকেরিয়া কার্ক। (৩) ২৮৪।
 ক্রিয়োকোটে। (২) ২৮৪। (৫) ৫৩৬।
 পালসেটিল। (২) ২০৯।
 বেলাডর্না। (১) ১০৫। (৩) ২৮৪।
 মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
 ম্যাগ্নেসিয়া কস। (৫) ৩৫২।
 সিনা। (২) ৪১০।
 সিপিরা। (২) ২০৯, ২৭৩। (৩) ২৫২।
 হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

২৯। হিমেন্টুরিয়া বা রক্তমেছ
 বা রক্ত-প্রস্রাব।

ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।
 এত্রোটেনাম। (৫) ১০২।
 ক্যাছারিস। (৩) ৩১৩।
 ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
 ক্রোটেলাস। (৪) ৫২।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৫১, ৫২।
 সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

১৩। শিশু-রোগ।

১। অফথ্যালমিয়া

নিরোনেটোরাম।

(চকুরোগ দেখ)।

২। নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ।

(শ্বাসযন্ত্ররোগ দেখ)।

৩। বিবিধ শিশুরোগ।

আর্পিকা। (৫) ৪৬৬।

ইউক্লিরা কর। (৫) ৪৩০।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৪৭।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮, ৩৯২।

এবসিছিরাম। (৫) ১০৫।

এরোটোনাম। (৫) ১০৩।

ওলিয়েগার। (৫) ৪৫৫।

কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫।

ক্যালি ফ্লোরি। (৫) ১৩৮, ১৩৯।

ক্যাঙ্কেরিরা আই। (৫) ১৮৭।

ক্যাঙ্কেরিরা কার্ক। (৫) ৩৮৯।

ক্যাঙ্কেরিরা ফস। (৫) ১৫২, ১৮৭।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।

টুবাঙ্কু লিনাম। (৫) ১০৪।

ডলিকস। (৫) ৩০৭।

পডফিলাম। (৫) ৩৮৯।

কসকরিক এসিড। (৫) ৩৮২।

ব্যারাইটা কার্ক। (৫) ১৭৫।

৪। শিশু-আক্ষেপ বা কন-

ভালশন।

ইয়েসিয়া। (২) ৩৩৭, ৩৩৮।

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৩।

ওপিয়ার। (৩) ৩৭১, ৩৭২।

কুগ্রাম। (১) ৩৩৯।

ক্যানমিলা। (১) ৭৬, ৭৭। (২) ৩৩৯, ৩৬৮, ৩৭০।

বেলাডনা। (১) ৭৬।

ষ্টোনাম। (২) ৪০৬।

সাইকুটা। (২) ৪০৬।

সিনা। (২) ৪০৬।

স্টাণ্টনাইন। (২) ৪০৬।

হারসারামাস। (১) ৭৬, ৭৭

৫। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

(পরিপাকযন্ত্রাদির রোগে কোষ্ঠবদ্ধ দেখ)।

৬। শিশুর সবিরাম জ্বর।

আসেনিকাম। (২) ৮৩। (৪) ৯১।

জেলসিমিয়াম। (৪) ৯১।

সিনা। (২) ৪১০।

৭। শিশু-ক্ষয়-রোগ।

আইগুডিয়াম। (৫) ৫৮, ১০৪, ৪৮৩।

আর্জেন্টাম নাই। (২) ৯২। (৫) ১০৪।

আসেনিকাম। (২) ৯২।

এব্রটোনাম। (৫) ১০৪।

এমন মিউ। (৫) ১০৪।

এসেটিক এসিড। (৫) ১০৪।

ক্যাঙ্কেরিরা কার্ক। (২) ২৬৫। (৩)

৪৮।

ক্যাঙ্কেরিরা ফস। (৫) ১৮৭।

চায়না। (২) ৯২।

টুবাঙ্কু লিনাম। (৫) ১০৪।

থুজা। (৪) ২৭৯।

নাক্সুডমিকা। (২) ৯২।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫। (৫) ৫৮, ১০৪,

৪৮৩।

কস্করাস। (৩) ৪৮।

ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৮।

মাকু রিয়ার। (৫) ৩৪৭।

মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।

ম্যাগ্নেসিরা কার্ব। (৫) ৩৪৭।

লাইকোপডিয়াম। (৫) ১০৪।

সার্সাপেরিলা। (৫) ১০৪, ৪৮৩।

সাল্ফার। (২) ২২। (৩) ৪৮, ৪৪১।

সোরিনাম। (৩) ৪৪১। (৫) ১০৪।

স্থানিকুলা। (৫) ১০৪।

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৫।

১৪। স্ত্রীরোগ বা ডিজি-

জেজ অব দি উইমেন—

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়রোগ এবং

গর্ভিণী, প্রসব ও

প্রসবাস্ত্র রোগ।

১। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়রোগ।

১। অগুধাররোগ বা ডিজিজেজ অব দি ওভারিজ্।

আর্জেন্টাম মেট। (৪) ৫৮। (৫) ৫০৬।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।

এপিস। (৪) ৩০২।

এমনিরাম্ মিউ। (৫) ২৫।

কলসিহু। (৩) ১২৬। (৪) ২৭৮।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৫৮, ৪১৮।

জিঙ্কাম। (৪) ৫৮। (৫) ৫৩৩।

জ্বালা। (৪) ৫৮।

পডকাইলাম। (৪) ২৭২।

পালসেটিল। (৪) ৪১৮।

বডিষ্টা। (৩) ১২৬। (৪) ৩০২।

মাকু রিয়ার। (৪) ৩০২।

ল্যাকেসিস। (৩) ৫৮, ৩০২।

২। অগুধার-শূল বা

ওভারেলজিয়া।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ২, ১০।

কলসিহু। (৩) ১২৬।

জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।

ভাইবার্ণাম। (৫) ৪৩৬।

মাকু রিয়ার কর। (৪) ৩০২।

মিউরেকস্। (৫) ২২৭।

লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৮।

সিপিরা। (৫) ২০৮।

৩। অগুধারের অর্কুদ বা

ওভেরিয়ান টিউমার।

এপিস। (৪) ৩০২।

কলসিহু। (৩) ১২৬।

জিঙ্কাম। (৪) ৫৮।

বডিষ্টা। (৩) ১২৬। (৪) ৩০২।

মাকু রিয়ার। (৪) ৩০২।

ল্যাকেসিস। (৪) ৫৮, ৩০২।

৪। অগুধার বা ওভারির প্রদাহ

ক্ষীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি।

আরাম। (৪) ৪৬৭।

আইওডিয়াম। (১) ১০৭। (৪) ২৭২।

আর্জেন্টাম নাই। (১) ১০৭।

আসেনিকাম। (৪) ২৭৮।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ২, ১০।

এপিস। (১) ১০৭। (৪) ৩০২।

কলসিহু। (১) ১০৭। (৩) ১২৬। (৪)

২৭৮।

গ্র্যাকাইটিস। (১) ১০৭।
জিঙ্কাম। (১) ১০৭। (৪) ৫৮।
টারেটুলা কুবেনস্। (৫) ৩১১।
থুজা। (১) ১০৭।
জাভা। (১) ১০৭।
পডকাইলাম। (১) ১০৭। (৫) ২৭২।
পালসেটিলা। (৪) ৪১৮।
গ্যাটিনাম। (৫) ৪২৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭।
মাকু রিহাস্। (৪) ৩০৯।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ল্যাকেসিস। (৫) ৫৮, ৩০৯।
হেমামেলিস। (৪) ২৭৮, ২৭৯।

৫। অলুকল্প ঋতুশ্রাব বা ভাইকে-
রিয়াম মেনষ্ট্রেশন।

অষ্টলেগো। (২) ২১৩।
ক্যাছারিস্। (৩) ৩৩২।
পালসেটিলা। (১) ১৪৯। (২) ২১৩।
(৫) ৪৬৬।
ফস্ফরাস্। (১) ১৪৯। (২) ২১৩। (৪)
২৫০, ২৫৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ২১৩, ৩০৪।
(৪) ২৫৩।
মিলিফোলিয়াম। (২) ২১৩।
সিনিসিরো অরি। (২) ২১৩। (৫) ১১২।
হেমামেলিস। (২) ২১৩।

৬। আর্ন্তবাহাব, ব্রজোলোপ এবং
আর্ন্তবাহাব বা এমেনোরিয়া এবং
সাপ্রোস্ট মেনসেস্।

আয়ডিয়াম। (৩) ৪৫৭।
একনাইটাস। (২) ২৬৪। (৩) ২৮৭।
এষ্ট্রা স্পাই। (৩) ২৮৭।

এপিস। (৪) ৩০৮।
এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪৫৭।
ওপিয়াম। (৩) ২৯৮, ৩২৪।
ককুলাস ইঞ্জ। (২) ২০৭।
কলিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (২) ২৬৪। (৩) ৪৫৭। (৫)
২১১।
ক্যাছারিস। (২) ২৬৪।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯।
ক্যাফেরিয়া। (২) ২০৮। (৩) ২৯৮, ৪৫৭।
গ্র্যাকাইটিস। (২) ৩০৫। (৪) ৪১৮।
গ্লোনাইন। (৩) ২৯৮।
জেলসিমিয়াম। (৩) ২৯৮। (৪) ৮৭।
ডাক্কায়া। (২) ২০৭। (৩) ৪৭৩, ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৬৪। (৩)
৪৫৭।

পালসেটিলা। (২) ২০৬, ২০৭, ২০৮,
২৬৪, ৩০৪। (৩) ৪৭, ৪৮, ৪৫৭,
৪৭৩। (৪) ৪১৮।
গ্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্ফরাস্। (২) ৩০৫। (৩) ৪৫৭। (৪)
২৫৩। (৫) ২৯১।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬।
ফেরাম মেট। (৫) ৫১৪।
বেলাডনা। (৩) ২৯৮, ৪৫৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ৩০৪।
ভেরেট্রাম এল। (৩) ২৯৮। (৪) ১৪৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৯৮।
ল্যাক্ ডিক্লেপ। (৫) ২৯১।
সাইক্লোমেন। (২) ২০৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সাল্ফার। (২) ২০৭। (৩) ৬, ৪৭, ৪৫৭।
সিনিসিরো অরি। (৫) ১১২, ১১২।
সিপিরা। (২) ২৬৭, ৩০৪, ৩০৫।
সিনিসিকুপা। (২) ২৬৪।

৭। ঋতুরোগ অথবা স্বনঋতু।

- আয়ডিন। (৩) ৪৫৭।
 এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪৫৭।
 কটিকাম। (৩) ৪৫৭।
 কোনায়াম। (৩) ৪৫৭।
 ক্যালকেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৫৭।
 ডাল্‌কামার। (৩) ৪৫৭।
 নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৫৭।
 পালসেটিলা। (৩) ৪৫৭।
 প্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
 ফস্‌ফরাস। (৩) ৪৫৭।
 বেলাডনা। (৩) ৪৫৭।
 সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
 সাল্‌ফার। (৩) ৪৫৭।

৮। ঋতু সন্ধিকাল ও ঋতুসন্ধিকালীন
 রোগ বা ক্লাইম্যাট্টারিক পিরিয়ড্
 এবং ক্লাইম্যাট্টারিক ডিজিজেজ্।

- অক্সিজেনো। (৫) ৩৬৭।
 একনাইটাম। (৪) ৫৭।
 এমিল নাইট্রাস। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৮।
 গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৮।
 ক্যালাডিয়াম। (৪) ৫৭।
 প্লোনোইন। (৪) ৫৭।
 স্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
 টুবাঙ্কু লিনাম। (২) ২৭৪।
 পাল্‌সেটিলা। (৪) ৪১৮।
 স্তেরেটাম ডিরি। (৪) ৫৭।
 মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
 ল্যাকেসিস। (২) ২৭৪। (৪) ৫৬, ৫৭।
 (৫) ৩৬৭, ৪৭৮।
 টুনসিয়ানা কার্ব। (৪) ৫৭।

- সাল্‌ফার। (২) ২৭৪।
 সিপিয়া। (২) ২৭৪, ৩০২, ৩১১।
 স্ত্রাঙ্কুইনেরিয়া। (২) ২৭৪। (৪) ৫৭। (৫)
 ৪৭৭, ৪৭৮।

৯। ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা
 মৃৎপাণ্ডু ও রক্তহীনতা।

- এলুমিনা। (৩) ২২০। (৫) ৮১, ৮২, ১৮৭।
 কুপ্রাম মেট। (৩) ২২২।
 ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৫।
 ক্যাঙ্কেরিয়া। (৩) ২২০। (৫) ১৮৭।
 ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব। (৫) ১৮৭।
 ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৩) ১১৩, ২২০। (৫)
 ১৮৬, ৫১৫।
 গ্রাফাইটিস। (২) ২০২, ২১০। (৪) ৪১২।
 নাক্স ভমিকা। (৩) ২২০।
 পাল্‌সেটিলা। (২) ২০২, ২১০।
 দাশাম। (৩) ২২০। (৫) ১৮৭।
 ফেরাম। (৪) ৪১৬।
 ফেরাম আই। (৫) ৫১৪।
 সিঙ্কনা। (৪) ৪১৬।
 সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
 হেলোনিয়াস। (৫) ১৫২, ১৬০।

১০। জরায়ু মুখ ও গ্রীবা বা অস্ ও
 সার্ভিক্স্ ইউটারাইর প্রদাহ ও
 কৃত।

- আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৭।
 ক্রিয়োকোট। (৫) ৫৩৩, ৫৩৭।
 ক্লিকাম। (৫) ৫৩৩।
 স্লেম্পা। (৫) ৩০৭।
 সিপিয়া। (২) ৩১২। (৫) ২২৭।
 সিক্সিলিনাম। (৫) ৩৪১।

১১। জরায়ু ও যোনি প্রভৃতি
স্ট্রীজনেস্ট্রিরের স্থানচ্যুতি
এবং জরায়ুর আবর্তন ও
বক্রতা বা ভার্শন ও
ফ্লেকশন।

একটিয়া রেসি। (এ) ২।
এমনিরাম মিউ। (এ) ২৫।
ক্যাল্কেরিয়া ক্লুরো। (এ) ১৮২।
ক্রিয়োস্জোট। (এ) ৫৩৬।
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৮, ৬১২।
জিঙ্কাম। (এ) ৫৩৩।
নেটাম মিউ। (এ) ১৫২।
পালসেটিল। (৪) ৪১২।
ফস্ফরাস। (এ) ৪২৫।
ফেরাম আই। (এ) ৫১৬, ৫১৭।
মিচেল। (এ) ৩৬৬।
লিলিয়াম টাই। (এ) ১৫২, ২০৬, ২০৭।
সিকেলি। (এ) ৩৬৫।
সিপিয়া। (২) ৩১১, ৩১২, ৩১৩। (এ) ১৫২।
হেলোনিয়াস। (৪) ১৫৭, ১৫৮, ১৫৪।

১২। জরায়ু-রক্তশ্রাব বা হিমরেজ্
ফ্রম দি ইউটারাস্।

আণিকা। (৩) ১৩২।
আসে নিকাম। (৩) ৪১১।
অক্সিলেগো। (এ) ২৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮।
ইপিক্যাক। (৩) ২৭, ৪১২।
ইরিজিরন। (৩) ২৭।
একনাইটাম। (৩) ২৭।
ওপিয়ারাম। (এ) ৪২৪।
কার্ব ডেজ্। ৩২৭, ৪১১, ৪১২।
ক্যালি কের-সারা। (এ) ১৪৬।

ফোকাস। (এ) ২৬১।
টিলিয়াম। (৩) ২৭। (এ) ২৬১, ৫৪৩।
থ্যাম্পিবাস। (এ) ৩৬৬।
প্ল্যাটিনাম। (এ) ৩৬৬।
ফস্ফরাস। (এ) ৪২৪।
বস্তিষ্ট। (এ) ৩৬৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬। (৩) ২৭।
ভিক্কা মাইনর। (এ) ৪২৪।
মিচেল। (এ) ৩৬৬।
মিলিফোলিয়াম। (৩) ২৭।
মেডরাইনাম। (এ) ৩৩৭।
লিডাম। (এ) ৪২৪।
সাইক্লোমেন। (৩) ২৭।
সিকেলি। (৩) ২৭। (এ) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিঙ্কনা। (৩) ২৬—ঘ, ৪১১।
সিনামন। (৪) ৪৪৫।
স্তান্দুইনেরিয়া। (এ) ৪৭৮।
স্তাবাইনা। (৩) ২৭। (এ) ২৫২।
হেমামেলিস। (৩) ২৭। (৪) ৩৬৫, ৪৬৫।

১৩। জরায়ুর গাব-ইন্ডলিউশন,
ফাইসমেট্রী প্রভৃতি নানাবিধ
রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৭।
আর্জেন্টাম। (৪) ৪৪৭।
ক্যাল্কেরিয়া আই। (এ) ১২০।
ক্রিয়োস্জোটাম। (এ) ২২৭, ২২৮।
নাক্স ভমিকা। (এ) ২৮৭।
প্ল্যাটিনাম। (এ) ২২৭, ৫২৫।
বেলিস। (এ) ১৫২।
ব্রোমিয়ারাম। (এ) ২৮৭।
মিউরেকস্। (৪) ২২৬, ৪২৭।

লাইকপডিয়াম। (৫) ২৮৭।
লিলিয়াম টাই। (৫) ১৫২, ২০
২২৭।
ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৭।
সিপিয়া। (৫) ১৫২, ২২৭, ২২৮।
স্ফালুইনেরিয়া। (৫) ২৮৭, ৪৭৮।
স্ফাবাইনা। (৫) ২৬০।

**১৪। জরায়ু প্রভৃতি স্ত্রীজননেশ্রিয়ের
ক্যান্সার বা কর্কটাদি**

অর্কুদ।

গগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
ক্যান্সারিস। (৩) ৩২০।
ক্যান্সেরিয়া আয়। (৫) ১২০।

টিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
বেলাডনা। (১) ১০৫।
লিডাম। (৫) ৪২৪।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৫) ৩৬।

**১৫। জরায়ু-ভ্রংশ বা প্রোগন্যাপসাস
অব দি ইউটারাস্ ও যোনি**

প্রভৃতির রোগ।

জরাম। (৪) ৪৬৭।
আর্কেন্টাম মেট। (৫) ৫০৬।
এটিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
এবিস কেনা। (৫) ২৫৫, ২২১।
এলোট্টিস। (৫) ২২১।
কলকাইলাম। (৫) ২২১।
ক্যান্সেরিয়া ফস। (৫) ২২১।
ক্যান্সেরিয়া ফ্লুরো। (৫) ১৮২।
ক্রিনোজোটাম। (৫) ৫৩৬।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
নাক্‌স ভমিকা। (২) ১৬৩। (৫) ৫৩৬।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫)
১৫২, ২০৭, ২২১।

নেট্রাম হাইপকোর। (৫) ২২১।
পাল্‌সেটোলা। (৪) ৪১২।
প্যাটিনাম। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫)
৫২৫।

বেলাডনা। (১) ১০৬। (২) ২৬৩, ৩১২।
মিউরেক্স পাপু। (৫) ২০৭, ২২৬, ২২৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫)
১৫২, ২০৬, ২০৭।

ল্যাক ডিক্সো। (৫) ২২১।
ট্র্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২২।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ১৬৩, ২৬৩, ২৭৩, ৩১১,
৩১২, ৩১৩। (৫) ১৫২, ২০৭, ৫৩৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮, ১৫২,
২২১।

**১৬। জরায়ুপ্রদাহ (তরুণ ও
পুরাতন) বা মেট্রাইটিস্, ইন্‌ফ্রা-
শন অব দি ইউটারাস্।**

বার্কেইরিস স্ফা। (৫) ৩৮১।
বেলাডনা। (৫) ১০৫।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪২।
মিউরেক্স। (৫) ২২৭।

১৭। বক্ষাস্থ বা ট্রেরিলিটি।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫৩।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৮।

**১৭। যোনি-ভ্রংশ বা ভ্যাকাইজাল
প্রোগন্যাপসাস্।**

কলকাইলাম। (৫) ২২১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩১১।

১৮। বোনির আফেপিক সঙ্কোচন
বা ভ্যাকুইনিস্মাস্।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫২।

১৯। বোনিপ্রদাহ বা ইনফ্রামেশন
অব দি ভ্যাকুইন।

হেলোনিরাস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২০। রজোবাহুল্য, আর্ন্তবাধিকা
বা মেনরেজিয়া।

আসে নিকাম। (৩) ৪১১, ৪১২।

ইলিক্যাক। (৩) ৪১২।

এয়নিরাম মিউ। (৫) ২৬।

এম্মাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২৩।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮, ২৭৯।

কার্ক ভেজ। (৩) ৪১১, ৪১২।

কোনায়াম। (৫) ২৮৭।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।

ক্যাকেরিরা কার্ক। (৩) ২৮৭।

ক্যাকেরিরা ক্রুয়ো। (৫) ১৮২।

ক্রিনোজোটাম। (৫) ২৬, ৫৩৬।

ক্রোকাস স্তাটি। (৫) ২৮৭।

টুবা কুলিনাম। (৫) ৩২৯।

ট্রিলিয়াম পেজু। (৩) ২৮৭। (৫) ৫৪৪।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩, ২৬৪।

নেটাম মিউ। (২) ২৬২, ২৬৩।

প্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।

ফস ফরাস। (৪) ২৫৩।

ফকিষ্টা। (৫) ৩৬৫।

বেলাডনা। (৩) ৩৭৮।

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪২।

মিউরেক্স। (৫) ২৯৬।

ন্যাগ্নেসিয়া কার্ক। (৫) ৩৬।

লিলিয়াম টাই। (৫) ২৬।

ল্যাক্ কেনি। (৫) ২৮৭।

সালফার। (৩) ৬।

সিকেলি। (৫) ৩৬৫, ৩৭৫।

সিঙ্কনা। (৩) ৪১১, ৪১২।

সিপিয়া। (২) ৩১০। (৫) ২৯৬, ৫৩৬।

স্ত্রাবাইনা। (৫) ৩৬৫।

হারসায়ামাস। (৩) ৩৭৮।

হোমোমেলিস। (৫) ৩৬৫।

২১। রজকৃচ্ছ, বাধক বা ডিস্-
মেনোরিয়া।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৫২।

ইগ্নেসিয়া। (৫) ৪২০।

একনাইট। (১) ৪৬।

একটিয়া রেসি। (৪) ৮৭। (৫) ৯।

ককুলাস ইণ্ডু। (৫) ৪২০।

কলফাইলাম। (৪) ৮৭। (৫) ৩৬৫।

কলসিঙ্ঘ। (৫) ৩৫২।

কলিকাম। (৩) ৩৪৩।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩, ৩৭৪।

ক্যাকেরিরা এসেট। (৫) ১৮৮।

ক্রোকাস। (৫) ৫২৪।

জেলুমিসিয়াম। (৪) ৮৭। (৫) ৪২০।

জ্যাঙ্কুসিলন। (৫) ৪১১।

টুবা কুলিনাম। (৫) ৩২৯।

ট্যারেন্ট কুবেনস। (৫) ৩১১।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।

স্ত্রাকালিয়াম। (৫) ১০৮।

প্যাটিনাম। (২) ৩৭৩। (৫) ৫২৫।

বেলাডনা। (১) ১০৬। (২) ৩১১।

(৫) ৫২৫।

বরাক্স। (৫) ৩৫২।

ব্রানিয়া। (১) ১৪২।

ভাইবার্ণাম অণু। (২) ৩১১। (৫) ৩৫২,

৪৩৫।

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।
 মিউরেক্‌স। (৫) ২৯৭।
 ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫১, ৩৫২।
 ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬, ৩৮৪।
 সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
 সিপিয়া। (২) ৩১০। (৫) ৪৩৬, ৫২৫।
 স্তাবাইন্না। (৫) ১৫৯, ২৬১।

২২। রঞ্জোদোষ বা মেনষ্ট্রুয়েল
 ডিজর্ডার।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭।
 জিঙ্কাম। (৫) ৫১৩।
 পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২।
 মেডুরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
 ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৬।
 সিপিয়া। (২) ২৭৩।
 হায়সায়ামাস। (১) ৩৫২।

২৩। রক্ত-বিকার সম্বন্ধীয় ঔষধের
 তুলনা।

আয়ডিয়াম্। (৩) ৪৫৭।
 এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪৫৭।
 কলিকাম। (৩) ৪৫৭।
 কোনায়াম। (৩) ৪৫৭।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৫৭।
 ডাক্সামারা। (৩) ৪৫৭।
 নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৫৭।
 পাল্‌সেটিলা। (৩) ৪৫৭।
 প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
 ফস্‌ফরাস। (৩) ৪৫৭।
 বেলাডনা। (৩) ৪৫৭।
 সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
 সালফার। (৩) ৪৫৭।

২৪। শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া
 অথবা জরায়ুর অন্তর্কর্ষকপ্রদাহ বা
 মেট্রাইটিস্।

আসেনিকাম। (৫) ৩৭৫।
 অক্সিলেগো। (৫) ৩৬৭।
 এক্টিয়া রেসি। (৫) ৯।
 এন্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
 এমনিয়াম মিউ। (৫) ২৫।
 এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
 এলুমিনা। (৫) ৮১, ৮২।
 কলফাইলাম। (৩) ২৮৮।
 ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।
 ক্যালি কার্ব। (৫) ১৪৭।
 ক্যালি ফেরোসা। (৫) ১৪৬।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
 ক্যাকেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৮, ২৮৭।
 ক্যাকেরিয়া ফস। (৩) ৪৮, ২৮৮।
 ক্রিয়োকোটাম। (৫) ২০৬, ২৯৮, ৫৩৬।
 গ্র্যাকাইটিস। (৪) ৪১৮।
 ডিক্টেইমাস। (৫) ৩৭৫।
 থুজা। (৪) ২৭৮।
 নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৯।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
 পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৩।
 ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
 বার্কেরিস। (৫) ৩৮১।
 মার্কুরিয়াস। (১) ১২৫।
 মিউরেক্‌স। (৫) ২৯৬, ৫৩৬।
 ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।
 লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৬।
 স্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
 সাল্‌ফার। (৩) ৪৮, ২৮৮।
 সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
 সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

সিপিরা। (২) ৩০২, ৩১১, ৩১২। (৫) ১৪৬,
১৪৭, ২০৬, ৫৩৬।
সিকিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিমিসিকুগা। (৩) ২৮৮।
হাইড্রাস্টিস। (৫) ৩৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২৫। সঙ্গম-বৈকারিকভাব—

সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা বা
অনিচ্ছা এবং সঙ্গমে
বেদনা।

এপিস। (৫) ৫২৪।
ক্রিয়াজোট। (৫) ২২৮, ৫২৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
ম্যাটিনাম। (২) ৩১৩। (৫) ৫২৪।
বেলাডনা। (৫) ৫২৪।
মিউরেক্‌স্‌। (২) ৩০৫। (৫) ২৮২।
স্ট্রামনিয়াম। (১) ৩৩৩।
সিপিরা। (২) ২৬৪, ৩১৩। (৫) ২২৮,
৫২৪।
হায়সারামাস। (১) ৩৩২।

২৬। স্তনরোগ বা ডিজিজ্‌জ

অব দি ম্যামারি গ্যাণ্ড—
স্তন প্রদাহ, স্তনশূল ও
স্তনাণ্ডের ক্ষত প্রভৃতি।

কোনায়াম। (১) ১২৪। (৫) ২২৮।
ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্রোটন টিগ। (৫) ৪২২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
কস্করাস। (১) ১০৮।

ফাইটলেকা। (৫) ২৩০, ৪২২।
ফেলাপ্তিগাম। (৫) ৪২২।
বাকো রেনা। (৫) ২২৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭, ১০৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮।
মার্কু রিয়াস। (১) ১০৮, ১২৪।
মিউরেক্‌স্‌। (৫) ৪২২।
ল্যাক্‌ কেবিনাম। (১) ১২৪। (৫) ৩৮৭।
হিপার সাল্‌ক। (১) ১০৮। (৫) ২২২।

২৭। স্তনের কান্‌সার বা কর্কটাদি

অর্কুদ বা টিউমার।

কোনায়াম। (৫) ২২৮।
বাকো রেণা। (৫) ২২৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭।
মিউরেক্‌স্‌। (৫) ২২৬।
হাইড্রাস্টিস্‌। (৫) ৩৬।

২৮। স্ত্রীজননেক্রিয়রোগ বা

ডিজিজ্‌জ্‌ অব দি ফিমেল
জেনারেটিভ অর্গ্যানস্‌।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
আর্গিকা। (৩) ১৩২। (৫) ২৫।
অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
একনাইটাম। (১) ৪৬।
এফিম ক্রু। (৩) ১৫৫।
এপিস। (৪) ৩০৮। (৫) ২৫।
এমনিয়াম কার্ক। (৫) ২৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ২৫।
এম্বাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২।
কলকাইলাম। (৪) ৮৭।
কলিকাম। (৩) (২) ৩৪৩।
কোনায়াম। (২) ২৬৪। (৫) ২২৮।

ক্যাঙ্কারিস। (২) ২৬৪। (৩) ৩২০।
 ক্যামিলা। (২) ৩৭৩।
 ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ক। (৩) ২৮৫, ২৮৬।
 ক্যাঙ্কেরিয়া ফ্রুয়ো। (৫) ১৮৯।
 ক্রিমোজোটিাম। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
 গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮, ৪১৯।
 জিকাম। (৫) ৫৩৩।
 জিকাম অ্যালোর। (৫) ৫৩৩।
 জেল্‌নিমিয়াম। (৪) ৮৭।
 ট্যারেন্ট লা কুবে। (৫) ৩১১।
 ডাকানারা। (৩) ৪৫৬, ৪১৭।
 ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৭।
 থুজা। (৪) ২৭৮।
 নাকস্ ভনিকা। (১) ১৩৩।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬২, ২৬৩,
 ২৬৪।
 পালসেটলা। (১) ১৪৯। (২) ২১১।
 (৪) ৪১৮।
 প্যালাডিয়াম। (৫) ৫২৩।
 প্যাটিনাম। (৫) ৫২৪, ৫২৫।
 ফস্ফরাস। (১) ১৪৯। (৪) ২৫৩।
 ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
 বস্তিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
 বেলাডনা। (১) ৫৪, ১০৫, ১০৬।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
 ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪৯।
 মাকু রিয়াস। (২) ২৬৪।
 মিন্ডরেকস্। (২) ২২৭। (৫) ২২৬, ২২৭,
 ২২৮।
 মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
 ন্যায়েসিয়া কার্ক। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
 লিলিয়াম টাই। (২) ২২৭। (৫) ২০৬,
 ২০৭।
 ল্যাঙ্কেসিস। (৪) ৫৬, ৫৭।
 স্ট্যাকসেসিগ্রিয়া। (৫) ২২।

সাল্ফার। (৩) ৪৭।
 সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
 সিপিয়া। (২) ২২৭, ৩০৯। (৩) ৪৭।
 সিমিসিফিউগা। (৪) ৮৭। (৫) ৯, ১০।
 স্ত্রাবাইনা। (৫) ২৫৯।
 হেলোনিয়াম্। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২৯। ব্রীজননেঞ্জিয়ের চুলকনা।

ক্যানায়াম। (২) ২৬৪।
 ক্যাঙ্কারিস। (২) ২৬৪।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
 মাকু রিয়াস। (২) ২৬৪।

২। গর্ভিনী, প্রসব এবং প্রসবাস্ত্র বা সৃতিকারোগ।

১। অলীক প্রসব-বেদনঃ বা ফলস্ পেন্স্।

এন্টিয়া রেসি। (৫) ১১, ৩৮৪।
 কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
 পালস্। (৫) ৩৮৪।
 হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

২। আউয়ার-গ্যাস-কন্ট্র্যাকশন বা জরায়ুর ডামরিক সঙ্কোচন।

বেলাডনা। (১) ১০৬।
 সিকেলি। (৫) ৩৭৬।

৩। আফ্টার-পেন্স্, প্রসবাস্ত্রিক শূল বা ভ্যাদাল ব্যাথা।

আর্পিকা। (৫) ৪২০।
 ইপিক্যাক। (৫) ১১।
 এন্টিয়া রেসি। (৫) ১০, ১১।

এছ'কিসিনাম । (২) ২১৬ ।

কফুলাস ইণ্ড । (৫) ৪২০ ।

।। (২) ৩৭৪ ।

কলফাইলাম । (৫) ৩৮৪, ৩৮৫ ।

কুশ্রাম । (২) ২১৬ ।

ক্যামমিলা । (২) ৩৬৬, ৭৪

জেলুসিমিয়াম । (৪) ৮৮ ।

অ্যান্থক্স । (৫) ৪২০ ।

নাক্স ভমিকা । (৫) ৪২০ ।

নেট্রাম মিউ । (২) ২৬৫ ।

পালসেটিলা । (২) ২১৬ ।

সিপিয়া । (৫) ২৬০ ।

স্রাবাইনা । (৫) ২৬০ ।

হেমামেলিস । (৫) ৪৬৫ ।

৪ । আক্ষেপিক প্রসবেদনা বা স্প্যাজমডিক লেবর-পেন্‌স্‌ ।

নাক্স ভমিকা । (২) ১৬৩ ।

পালসেটিলা । (২) ১৬৩, ২১৫ ।

আবদ্ধ জরায়ু-কুশ্রম বা

রিটেণ্ড প্র্যাসেণ্টা ।

ইপিফ্যাক । (৩) ২৭ ।

ইরিজিরণ । (৩) ২৭ ।

একনাইট । (৩) ২৭ ।

কার্ব ভেজ । (৩) ২৭ ।

ক্যাঙ্কারিস । (২) ২১৫ । (৩) ২৬-ঘ, ২০ ।

ট্রিলিয়াম । (৩) ২৭ ।

পালসেটিলা । (২) ২১৫, (৩) ২৬-ঘ ।

বেলাডনা । (১) ১০৫, ১০৬ । (৩) ২৭ ।

মিলিফোলিয়াম । (৩) ২৭ ।

সাইক্লোমেন । (৩) ২৭ ।

সিকেলি । (৩) ২৭ । (৫) ৩৭৫, ৩৭৬ ।

সিক্কোনা । (৩) ২৭ ।

স্রাবাইনা । (৩) ২৭ । (৫) ২৫২, ২৬০ ।

হেমামেলিস । (৩) ২৭ ।

৬ । গর্ভস্রাব, গর্ভপাত বা এবর্শন, মিসক্যারেজ ।

আর্পিকা । (৩) ১৩২ । (৫) ২৬০ ।

একনাইটাম । (২) ৩৭৪ । (৫) ১০

এস্ট্রিয়া রেসি । (৫) ১০ ।

ক্যামমিলা । (২) ৩৭৪ ।

ডিজিট্যালিস । (৪) ৩২৭ ।

পালসেটিলা । (২) ১৭২ ।

প্রাখাম । (৫) ৫৪২ ।

বেলাডনা । (৫) ৪৩৬ ।

ভাইবার্শাম । (২) ৩৭৪ । (৫) ৪৩৬

সিনামন । (৫) ২৬০, ৪৪৫

সিপিয়া । (৫) ৪৩৬ ।

স্রাবাইনা । (৫) ২৫২, ২৬০

হেমামেলিস । (৫) ৪৬৫ ।

হেলোনিয়াস । (৫) ১৫৭, ১৫৮ ।

৭ । গর্ভাবস্থায় রোগ—ফাইব্রিনাস

ফিবার, মৃত্যু-ভীতি, জরায়ুবেদনা,

শিরা-ক্ষীতি বা ভেরিকোজ ভেন্‌স্‌

প্রভৃতি বিবিধ রোগ ।

ইস্কুলাস হাই । (৫) ৫০২ ।

একনাইটাম । (১) ৪৬, ৪৭ ।

এলুমিনা । (২) ২৭৩ ।

কলফাইলাম । (৫) ৩৮৪ ।

ক্যামমিলা । (২) ৩৭৪ ।

জ্যাবরেণ্ডাই । (৫) ৪১২ ।

ডায়স্কোরিয়া । (৪) ৪৪৫ ।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
 পালসেটলা। (২) ২১৪, ২১৫। (৫) ৩৮৪।
 পেটুলিয়াম। (৫) ৫৬০।
 মিলিকলিয়াম। (৫) ১১০।
 মাগ্নেসিয়া কার্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
 লাইকপডিয়াম। (৩) ২৬০, ২৬৩।
 সিকেলি। (৫) ৩৭৫।
 সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩, ৩০৭। (৫)
 ৩৪৭।

স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।
 হাইড্রফবিন। (৫) ৩৪১।
 হেমামেলিস। (২) ২১৫। (৫) ৪৬৫, ৪৬৬।

৮। দুগ্ধ-জ্বর, ঠুনকো বা মিল্ক
 ফিবার, ফেব্রিস ল্যাক্টিয়া; স্তন্য-
 ভাব বা স্তন্য-রোধ ও তৎসংস্ফুট
 প্রদাহ এবং পূয়-সঞ্চার প্রভৃতি রোগ;
 স্তন্যধিক্যা।

আটিকা ইউরেনস্। (২) ২১৬।
 একনাইট। (১) ৪৭।
 এসাফিডিডা। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮।
 কোনায়াম। (৫) ২২৮।
 কষ্টিকাম। (২) ২১৭। (৩) ৩৫৭।
 ক্যাস্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
 ক্যামমিলা। (২) ২১৬, ৩৭৫।
 চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
 পালসেটলা। (২) ২১৬।
 ফস্ফরাস্। (৪) ২৫৩।
 বেলান্ডনা। (১) ১০৭, ১০৮।
 ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮, ১৪৯।
 মাক্ রিয়্যাস্। (১) ১০৮।

রিসিনাস। (২) ২১৬। (৫) ৫৬৪।
 ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৭।
 ল্যাক্ ডিক্লোরোটাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮।
 সিলিসিয়া। (১) ১০৮। (৪) ২৫৪
 হিপার সাল্ফ। (১) ১০৮।

৯। প্রসব বা লেবর—কষ্টকর বা
 ডিফিকাল্ট

ইপিক্যাক। (৫) ১১।
 একনাইট। (৫) ১১।
 এন্টিয়া রেসি। (৫) ১০, ১১।
 কফিয়া। (২) ২১৫, ৩৭৪। (৫) ৫৫২।
 কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
 ক্যামমিলা। (২) ২১১, ৩৭৪। (৫)
 ৫৫২।

জেলুমিনিয়াম। (৪) ৮৭, ৮৮।
 নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
 পালসেটলা। (২) ২১৫।
 বেলান্ডনা। (১) ১০৬।
 লাইকপডিয়াম। (৫) ১১।
 সিকেলি। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬।
 হেমামেলিস। (৫) ১১, ৪৬৫।

১০। প্রসববেদনাকালীন
 কন্ডাল্শন বা আক্ষেপ।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৮।
 বেলান্ডনা। (২) ৩৩৮।
 ট্র্যামনিয়াম। (২) ৩৩৮।
 হায়সায়ামাস। (২) ৩৩৮।

১১। প্রসবাস্তিক ক্লেদ বা
 লোকিয়াস্রাবসংস্ফুট রোগ।

একনাইট। (১) ৪৭।
 ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।

বেলাডনা। (১) ১০৫।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৫০।

১২। প্রসবাস্তিক চিকিৎসা।

আণিকা। (৩) ১৩২।

১৩। প্রসবাস্তিক মূত্র রোধ বা

রিটেনশন অব ইউরিন।

আসেনিক। (৩) ৩৭৮।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮।

কলিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৭৮।

হায়দ্রামাস। (৩) ৩৭৮।

১৪। প্রসবাস্তিক রক্তস্রাব।

ইরিজরণ। (৫) ১১৩।

টিলিয়াম। (৪) ৫৪৪।

স্ত্রাবাইনা। (৫) ২৫২, ২৬০।

১৫। ভমিটিং অব প্রোগ্‌নান্দি বা

অন্তঃসত্ত্বার বমন।

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৮।

ডিজিট্যালিস্ : (৪) ৩৯৭।

নাক্‌স্ ভমিকঃ। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯।

১৬। স্মৃতিকাজর বা পিরাপিরালা

ফিবার।

একনাইট। (১) ৪৭।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৯।

কাঙ্কারিস্। (৩) ৩২০।

১৭। স্মৃতিকা (প্রসবাস্তিক) রোগ।

আণিকা। (৩) ১৩২।

এম্ব্‌ গ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।

ক্যালি-ফ্লোরিকাম। (৫) ১৩৮, ১৩৯।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।

সিকেলি। (৩) ৩৬৫, ৩৭৫।

সিপিরা। (২) ২৭১।

স্ত্রাবাইনা। (৫) ২৫২, ২৬০।

হেমা মেলিস। (৫) ৪৬৫।

১৮। স্মৃতিকাস্তম্ব বা মিক্‌লেগ,

ফ্লেগ্‌মাসিয়া ডলেন্‌স্‌।

পালসেটলা। (২) ২১৬।

ন্যাগ্‌সিয়া কার্ক। (৫) ৩৪৪।

হেমা মেলিস। (২) ২১৬। (৫) ৩৪৭, ৪৬৫।

১৯। স্মৃতিকাক্ষেপ বা পিরাপিরালা

কন্‌ভাল্‌শন।

ইগ্‌সিয়া। (২) ৩৩৭, ৩৩৮।

ক্যালি কার্ক। (৫) ১৩৫।

জেস্‌সিয়াম। (৪) ৮৮।

ভেরেট্রাম ভিবিডি। (৫) ১৬৩

মেলিলোটাস্‌। (৫) ২৪৪।

সিকুটা। (৫) ২৩৫।

২০। স্মৃতিকোন্‌মাদ বা পিরাপিরালা

মেনিয়া।

(মানসিক রোগ বা মেণ্টাল ডিজিজ্‌ দেপ্‌)

১৫। ছৎপিণ্ডাদি শোণিত-

যন্ত্র এবং শোণিতসংস্ক

বিবিধ রোগ।

১। শোণিতসংস্কৃষ্ট বিবিধ রোগ।

১। নীলরোগ বা মাগ্নানোসিস্‌।

ডিজিট্যালিস্‌। (৪) ৩৯৮।

২। পার্ণুরা হিমরেজিকা বা

নীতাদরোগ।

হেমা মেলিস। (৫) ৪৬৫।

৩। রক্তশ্রাব বা হিমবহেজ, ব্লিডিং।
 আর্দিকা। (৫) ৪৬৬।
 আসেনিকাম। (২) ৮৮। (৩) ১০৫।
 ষ্টলোগো। (৫) ২৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮।
 ইপিক্যাক। (২) ৩৮০, ৩২৩।
 ইরিক্সিরণ। (২) ৩৮০। (৫) ১১৩।
 একনাইটাম। (১) ৪০। (৩) ১০৬।
 ১১০, ৫৪৮।
 একালিকা ইণ্ড। (৩) ১০৬।
 এষ্ট্রাসিনাম। (৫) ৩২৫।
 এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩।
 এমিল নাইটাস। (৫) ৪৭৮।
 ওপিয়াম। (৫) ৪২৫।
 কার্ক স্বেজ। (৩) ১০৫, ৪১০।
 ক্যাস্টাস গ্র্যান্ডি। (৫) ৫৪৮।
 ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
 ক্রোটেলাস হরি। (৫) ৩২৫।
 ট্রিলিয়াম। (৪) ৫৪৩, ৫৪৪।
 ফসফরাস। (৪) ২৫৪। (৫) ৪২৪।
 ফেরাম। (৩) ১০৫।
 ফেরাম ফস। (৩) ৭৮।
 বডিষ্টা। (৫) ৩৬৫, ৩৬৬।
 ভিক্স মাইনর। (৫) ৪২৫।
 মিচেলা। (৫) ৩৬৬।
 মিলিফোলিয়াম। (১) ৪০। (২) ৩৮০।
 (৫) ১১০।
 মেডুসাইনাম। (৫) ৩৩৭।
 লাইকপডিয়াম। (২) ৩৮০।
 লিডাম। (১) ৪০। (৫) ৪২৪।
 ল্যাকেসিস। (৫) ৪৭৮।
 সাইক্রেমেন। (৩) ১০৬।
 সালফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
 সিকেলি। (৫) ৩৬৮, ৩৭৬, ৫৪৩।
 সিঙ্কনা। (২) ৮৮। (৩) ৭৬, ১০৫।

সিনামনাম। (৩) ১০৬। (৫) ৪৪৫।
 স্নাইইনোরিয়া। (৫) ৪৭৮।
 স্ত্রাবাইনা। (৩) ৯৭। (৫) ২৫২, ২৬০।
 হেমাথেলিস। (৫) ৩৬৫, ৪৬৫, ৪৬৬,
 ৫৪০।

৪। রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।

আসেনিকাম। (২) ৮৬, ৮৭, ৮৮।
 এলুমিনাম। (৫) ৮১, ৮২, ১৮৭।
 এসেটিক এসিড। (৩) ১০৭।
 ক্যালি কার্ক। (৫) ১৩৫, ১৩৬।
 ক্যালি ফের-সায়। (৫) ১৪৬।
 ক্যাক্সেরিয়া কার্ক। (৫) ১৮৭।
 ক্যাক্সেরিয়া ফস। (৩) ১০৭। (৫) ১৮৬,
 ১৮৭, ৫১৫।
 চাইনিয়াম আর্স। (৩) ১০৬।
 নাকস ভমিক। (৩) ৩০২। (৫) ১৮৭।
 নেট্রাম মিউ। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫)
 ৫১৫।
 ফেরাম। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫) ৫১৫,
 ৫১৬।
 ফেরাম এসেট। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।
 ফেরাম প্রোটো-অক। (৩) ১০৫। (৫)
 ৫২৬।
 ফেরাম ফস। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫, ৫১৬।
 ফেরাম রিডাক্ট। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।
 ফেরাম এট-ট্রিক-সাই। (৩) ১০৭। (৫)
 ৫১৫।
 সিকেলি। (৫) ৩৭৬।
 সিঙ্কনা। (২) ৮৮। (৩) ১০৬, ১০৭, ১১৩।
 (৫) ৫১৫।
 সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
 হেলোনিয়াস। (৫) ১৫২, ১৬০।
 ৫। রক্তাধিক্য বা কণ্জেস্টন।
 একনাইট। (১) ৫, ১৫।
 বেলাডনা। (১) ৩৫।

২। হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত-
যন্ত্ররোগ।

১। অণ্ড-শিরার্কুদ বা ভেরি-
কোসিল।

(পুংজননেক্রিয় রোগ দেখ।)

২। এণ্ডটাইটিস বা বৃহদ্ধমনী-
প্রদাহ।

এন্ডনিস ভার্গ্যালিস্। (৫) ১৬।

ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩।

৩। এমুরিজম বা ধমনী-ক্ষীতি এবং
এথারোমা প্রভৃতি ধমনীরোগ।

ব্যারাইটা কার্ক। (৩) ১৭৫।

ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৯।

ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩।

৪। জটুল বা নিভাস (Nævus.)

ক্লোরোরিক এসিড। (৩) ২৫৩। (৫) ৭১,
৭২।

লাইকপড। (৩) ২৫৩।

৫। শিরা-প্রসারণ বা ভেরিকোজ
ভেনুস্।

কার্ক ভেজ্। (৩) ৪১২।

ক্লোরোরিক এসিড। (৩) ২৫৩। (৫) ৭১।

লাইকোপড। (৩) ২৫৩।

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৭।

৬। হৃৎকম্প, হৃৎহেপন বা
প্যালপিটেশন অব দি হার্ট।

একনাইটাম। (১) ৩৪।

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৯।

কফিরা। (৫) ৩০২।

ক্যাষ্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।

জ্জাঙ্কা ট্রিপু। (৫) ২৭৭।

কসকরাস। (৫) ৩০২।

ব্য্যাডিয়াম। (৫) ৩০২।

মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।

রাসটক্‌স্। (৪) ৩৪০, ৩৪১।

স্পাইঞ্জলিয়া। (৫) ৪০১।

৭। হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি
অব দি হার্ট।

অরাম। (১) ৩৬। (৪) ৪৬৫, ৪৬৬।

অরাম মিউ। (৪) ৪৬৬।

আইণ্ডিয়াম। (৫) ৫৬, ৫৭।

আর্গিকা। (১) ৩৬। (৩) ১৩০।

আসেনিকাম। (৩) ১৩০। (৫) ৪০২।

একনাইটাম। (১) ৩৫, ৩৬।

এমনিয়াম কার্ক। (৪) ৪৬৬।

ক্যাষ্টাস গ্র্যাণ্ড। (১) ৩৬। (৩) ১৩০।

(৫) ৫৪৭, ৫৪৮।

ক্যালুমিয়া। (১) ৩৬। (৫) ৪১৮।

পালসেটলা। (৪) ৩৪১।

ব্রিমিয়াম। (৩) ১৩১। (৪) ৩৪১।

ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।

রাসটক্‌স্। (১) ৩৬। (৩) ১৩০। (৪)

৩৪০, ৩৪১। (৫) ৪১৮।

ল্যাকেসিস। (৩) ১৩০।

স্পাইঞ্জলিয়া। (৫) ৫৭, ৪০১।

৮। হৃৎপিণ্ড-রোগ বা হার্ট-

ডিজিজ্—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও

নির্মাণবিকারী বা ফাংশনাল

ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৫। (৫) ২২৭।

আরডিয়াম। (৫) ৫৬, ৫৭।

আর্গিকা। (৫) ৫৪৮।
 আর্সেনিকাম। (২) ৮৩, ৮৪। (৪) ৩০৪,
 ৩২২। (৫) ৬৬।
 ইউক্রেসিমা। (৪) ৩৭৬।
 একনাইটাম। (১) ৩৪, ৩৬—৩৯। (৪)
 ৩৪১, ৩২৪। (৫) ৬৬, ৪১৮।
 এ্যিক্টিয়া রেসি। (৪) ৩৪১।
 এডনিস ভার্গ্যা। (৫) ১৬, ১৭, ২০১।
 এপসাইনন্ কেনা। (৪) ৩০৪। (৫) ৪৫২।
 এপিস। (৪) ৩০৪, ৩২৪।
 এমনিয়াম কার্ক। (৫) ৮২।
 এম্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
 কনভ্যালেরিয়া মেজ। (৫) ২০০, ২০১,
 ২০২।
 কলিন্সনিয়া। (৫) ২০১, ২০২।
 কল্চিকাম। (৩) ৭১।
 কোনায়াম। (৫) ২২৭।
 ক্যাস্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
 ক্যানাবিস স্টাট। (৫) ৪৫০।
 ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬।
 ক্যালি হাই। (৪) ৩২।
 ক্যানিয়া ল্যাটি। (৪) ৩৪১, ৩২৪। (৫)
 ৪১৮।
 ক্র্যাটিগাস অক্সি। (৫) ২০২।
 গ্রিওলিয়া রোবাটা। (৪) ৮৪।
 গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৩৩, ৩৭৬।
 জিঙ্কাম। (৫) ২২৭।
 জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৪, ৩২৩।
 ডিজিট্যালিস। (৪) ৮৪, ৩২১, ৩২২, ৩২৪।
 (৫) ৪১৮।
 নেট্রাম মিউ। (৪) ৩৩।
 স্ফা টিপু। (৪) ৩৩। (৫) ২৭৭।
 পালসেটীলা। (৪) ৩৪১, ৩২৪।
 পেট্রেলিয়াম। (৪) ৩৩।
 প্রনাস্ স্পাই। (৫) ৬৬।

ফস্ফরাস। (৫) ৬৬।
 ফাইটলেকা। (৪) ৩৪১। (৫) ৪১৮।
 ব্রায়নিয়া। (৫) ৬৬।
 ভেরেট্রাম স্তি। (৫) ১৬৮।
 রাষ্টক্স। (৪) ৩৪০, ৩৪১, ৩২৪। (৫)
 ৪১৮।

লাইকপডিয়াম। (৫) ২০১।
 লিডাম। (৫) ২০১।
 লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৫, ২০৬।
 ল্যাকেসিস। (৪) ৩২, ৩৭৬, ৩২২। (৫)
 ৬৬।

ল্যািক্টিয়া। (৫) ৩৭৬।
 স্ট্রোপেছাস্। (৫) ২০২।
 সাল্ফার। (৫) ২০৬।
 স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৪।
 স্পাইজিলিয়া। (৫) ৬৬, ৪০১, ৪০২।
 স্পর্ট সাল্ক। (৫) ২০২।
 হাইড্রসা এসিড। (৫) ৬৬।

৯। হুংপিও-শুল বা এঞ্জাইন পেট্টরিস্।

অরাম। (৫) ১০২।
 আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৪।
 আর্গিকা। (৩) ২১৫।
 আর্সেনিকাম। (২) ৮৬।
 এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।
 কুপ্রাম মেট। (৩) ২১৫।
 ক্যাস্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৩) ২১৫। (৫) ৫৫৭,
 ৫৪৮।
 ক্যানিয়া। (৩) ২১৬।
 টেবেকাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৭১।
 নায়্র ভুম। (২) ২১৫।
 স্ফা টিপু। (৫) ২৭৭।
 নক্সাস্। (৫) ২৮২, ২৮৩।

লিলিয়াম টাই। ২১৬।

রাস্টক্‌স্‌। (৪) ৩৪০, ৩৪১।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিমা। (৩) ২২৪।

১০। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা

পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বা কার্ডিয়াক

ডিবিলিটি, প্যারালিটিক

উইকনেস।

কোনারাম। (৫) ২২৭।

স্বাজা টি.পু। (৫) ২৭৭।

ভেরেট্রাম এল্‌। (৪) ১৪৩।

১১। হৃৎপিণ্ডের রসাপকৃষ্টতা বা

ফ্যাটি ডিজেনারেশন।

আসেনিকাম। (২) ৮৫, ৮৬।

এপসাইনাম। (২) ৮৬।

এপিস। (২) ৮৬।

ফস্‌ফরাস। (২) ৮৫।

মাকু'রিয়াম। (২) ৮৬।

সাল্‌ফার। (২) ৮৬।

১২। হৃৎপেশী-প্রদাহ বা

মায়াকার্ডাইটিস্‌।

একনাইটাম। (৫) ৪০২।

ক্যাঙ্কাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।

স্বাজা টি.পু। ২৭৭।

ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪৮।

ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।

স্পাইজিদিয়া। (৫) ৪০১।

১৩। হৃদাহবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা

পেরিকার্ডাইটিস্‌।

আসেনিকাম। (২) ৮৪। (৪) ৩০৪।

একনাইটাম। (১) ৩৯।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৯।

এপসাইনাম। (৪) ৩০৪।

এপিস। (৪) ৩০৪।

এম্পারেগাস। (৪) ৩০৫।

কল্‌চিকাম। (৩) ৭২।

ক্যাঙ্কাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।

ক্যালিয়া ল্যাটি। (৫) ৪১৮, ৪১৯।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮। (৪) ৩৪০।

ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।

রাস্টক্‌স্‌। (৪) ৩৪০।

স্পাইজিদিয়া। (৫) ৪০১।

১৪। হৃদস্বরবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা

এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌।

আসেনিকাম। (২) ৮৪।

একনাইটাম। (১) ৩৯।

এডনিস ভার্গ্যাল। (৫) ১৬।

কল্‌চিকাম। (৩) ৭২।

ক্যালি নাইট্‌কাম। (৫) ১৪২

ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪৮।

রাস্টক্‌স্‌। ৩৪০, ৩৪১।

স্পাইজিদিয়া। (৫) ৪০১।

চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট-নির্দেশ ।

অগ্নিদাহ বা বাণিং	৬১/০	অকস্মাদি বিবিধ দৃষ্টি বিপর্দায়—	
অঞ্জনিকা, অজ্ঞানাই বা ঠাই	২১০/০	অন্ধত্ব, দৃষ্টিমালিন্য বা ঘোরদৃষ্টি বা,	
অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিম্বেপেপ্সিয়া,		গ্ৰ্যাকমা, দৃষ্টিদৌর্বল্য বা এম্ব্লোপ-	
ইণ্ডিজেশচন	৪/০	পাইয়া, বিষমদৃষ্টি, অন্ধ-দৃষ্টি,	
অণ্ডকোষ-গ্রন্থিরোগ	২১০	দ্বিভদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি বা প্রেসবাইও-	
(পুংজননেলিয়রোগ দেখ)		পাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইওপাইয়া	
অণ্ডকোষ বা মুস্ক-প্রদাহ বা অর্কাইটিস		প্রভৃতি	২১০/০
এবং অণ্ডকোষসংযুক্ত বিবিধ রোগ	৫/০	অকস্মাদি-প্রদাহ বা টাইফলোইটিস ও	
অণ্ড-শিরার্বুদ বা ভেরিকোসিস	২১০/০	পেরিটাইফলোইটিস প্রভৃতি	৪০/০
অণ্ডাধার বা ওভারির প্রদাহ, ক্ষীতি ও		অন্ননালী-প্রদাহ বা ইসফেগাইটিস	৪০/০
দড়কচড়াভাব প্রভৃতি	৮৮/০	অফ্‌থ্যাল্মিয়া, কঙ্ক্যাংটিভাইটিস বা	
অণ্ডাধাররোগ বা ডিজিজেক্‌ অব দি		যোজকঝিল্লিপ্রদাহ—সহজ বা সিম্পল,	
ওভারিজ	৮৮/০	পূরধাতুজ বা গণরিয়েল, গণ্ডমালিয়	
অণ্ডাধারশূল বা ওভারেলজিয়া	৮৮/০	বা ফ্‌ফুলাস, দানাযুক্ত বা গ্র্যানু-	
অণ্ডাধারের অর্কুদ বা ওভারিয়ান্		লার, পুয়জনক বা পুকেলেস্ট, পুর-	
টিউমার	৮৮/০	বা পাশ্চলার এবং	
অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি	৫/০	যোজকঝিল্লি সহ রসবিধিকায়ুক্ত বা	
অশুকজ ক্ষত্‌শ্রাব বা ভাইকোর্‌রয়ান্		ফ্রুক্‌টিনিউলার প্রভৃতি	২১০/০
মেনষ্ট্রুয়েশন ..	৮৮/০	অফ্‌থ্যাল্মিয়া নিওনেটোরাম বা নবজাত	
অম্বুপেকুরোগ বা টেরিজিয়াম	২১০/০	শিশুর চক্ষুপ্রদাহ	২৫০ । ৮৮/০
অনৈচ্ছিক, অসাড় এবং নিকীধ মুত্রশ্রাব		অবসাদবায়ু চিন্তোদ্রোগ বা হাইপকণ্ড্রোয়া-	
বা ইন্ডল্যান্টারি ইউরিনেশন এবং		সিস	৭১/০
ইনকন্টিনেন্স অব ইউরিন্	৮১/০	আঘাত বা ইঞ্জুরি—রোগকারণ	৫/০
অস্ত্র প্রদাহ বা এটোরাইটিস	৪০/০	অভিঘাতিক এবং অস্ত্রচিকিৎসাসম্বন্ধ	
অস্ত্র-বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ বা		জর	৬১/০
পেরিটনাইটিস্	৪০/০	অভিঘাতিক, রোগ বা ইঞ্জুরিজ—শ্রেণ	
অস্ত্র-রক্তশ্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি		বা মচকান প্রভৃতি	৬১/০
বায়ুয়েল্‌স্	৪০/০	অভিসম্পাত ও শপথ করিবার অদম্য	
অস্ত্রাবরোধ বা অবষ্ট্রাকশন্ অব দি		ইচ্ছা	৫/০
বায়ুয়েল্‌স্	৪০/০	অগ্নাতিশয্য এবং অগ্নিবিষ্টা	৫/০
অস্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বা		অরণিকা, ত্বরক্তমা বা ইরিথিমা	৩/০
প্যারালিটিক উইকনেস্ অব দি		অর্কুদরোগ বা টিউমার	৬১/০
বায়ুয়েল্‌স্	৪০/০	অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্, পাইল্‌স্	৪০/০

অলীক প্রসব-বেদনা বা ফলস পেনস	২১/০	আমরক্ত-রোগ, রক্তামাশয় বা ডিসেন্টারি	
অক্ষ-যন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেক্জ অব দি		— তরুণ ও প্রবল বা একুটি, নাতি	
ল্যাক্রিম্যাল এপারটোস	২৫/০	প্রবল বা সাব-একুটি, পুরাতন বা	
অসহিকুতা বা উত্তেজনা প্রবণতা—মান-		ক্রনিক, সান্নিপাতিক বা টাইফইড	৪১/০
সিক, ট্রিলিয়ক এবং স্নায়বীয়	৫১/০	আমাশয়-কর্কট-রোগ বা ক্যানসার অব	
অসাড় ও অনৈচ্ছিক বা ইনভলুটাটারি মল-		দি ষ্টমাক্	৪১/০
ভাগ	৪১/০	আমাশয়প্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাস্ট্রাইটিস	
অস্ত্রচিকিৎসাস্তিক রোগ	৬১/০	ও গ্যাস্ট্রিক আলসার	৪১/০
অস্ত্রচিকিৎসাস্ত্রে বেদনাদি চক্ষু-বিকার	২৫/০	আমাশয়মধ্যে কখনও ভয়ঙ্কর জ্বালা,	
অস্থি-অর্কবুদ বা একজটোসিস অব্ দি		কখনও বরফবৎ শীতলতা	৫১/০
বোন	২১/০	আমাশয়-রোগ বা গ্যাস্ট্রিক ডিরেঞ্জমেন্ট	৪১/০
অস্থি ও অস্থিবেষ্টবিগ্নিসংস্থিত নানাবিধ		আমাশয়শুষ্কতা বা ড্রাইনেস অব দি	
রোগ—বালাস্থিবিকার বা রেকাইটিস		ষ্টমাক	৪১/০
আদি, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেরি-		আমাশয় হইতে রক্তস্রাব বা ব্রিডিং ফ্রম দি	
অস্টি-ইটিস, অস্থিক্ষত বা কেরিজ এবং		ষ্টমাক	
অস্থিক্ষংস বা নিক্রোসিস প্রভৃতি	২১/০	আমাশয়ান্তিক প্রদাহ বা গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টাই-	
অস্থি ও অস্থিসংস্থিত রোগ	২১/০	জ্বাল ইন্ফুয়েমশন	৪১/০
অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা	৫১/০	আমাশয়ত্বর্কলতা বা উইকনেস অব দি	
অউয়ার-গ্যাস-কণ্ট্রাকশন বা জরায়ুর		ষ্টমাক	৪১/০
ডামরিক সংকোচন	২১/০	আমাশয়ের শূল বা গ্যাস্ট্রাল্জিয়া	
আগন্তুক বস্ত্র বা ফরেন বডিসংপ্রবে চক্ষু-		আরক্ত জ্বর বা স্কার্বেটিনা	৩১/০
প্রদাহ	২৫/০	আর্ন্তবাত্তাব, রক্তোমোপ এবং আর্ন্তবাত্ত	
আধাতজ চক্ষু-প্রদাহ	২৫/০	বা এমেনোরিয়া এবং সাপ্রেসড	
আঙ্গুলহাঁড়া বা হইটলো, প্যানারিটাম	৩১/০	মেনসেস	৮১/০
আতপাঘাত বা সান্ট্রোক	৭১/০	আহারান্তে রোগের ভ্রাস অথবা বৃদ্ধি	৫১/০
আত্মহত্যা করণেচ্ছা	৫১/০	আক্ষেপিক প্রসব-বেদনা বা স্প্যাজমডিক	
আত্মহত্যা করণেচ্ছা বা সুইসাইড্যাল		লেবর পেন্‌স	২১/০
মেনিয়া	৭১/০	আক্ষেপিক মুত্র-নিঃসরণ বা স্প্যাজমডিক	
আফ্‌টার পেন্‌স, প্রসবাস্তিক শূল বা		ইউরিনেশন	৮১/০
ভ্যাডাল ব্যাণ	২১/০	ইউরিমিয়া বা মুত্রবিযক্রিয়া	৮১/০
আবন্ধ-জরায়ু-কুসুম বা রিটেওপ্লাসেন্টা	২১/০	ইউরেচিয়ান টিউব ও কর্ণসর্দি	২১/০
আমবাত, শীতপিত্ত বা হাইলস্, হাইড্‌স্,		ইচ্ছা ও ঘৃণা এবং মুখাবাদ ও মুখ এবং	
নেটল রেস	৩১/০	নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ প্রভৃতি	৫১/০
		ইডিমাগ্‌টিডিস বা স্বরযন্ত্রব্যরশোধ	৩১/০
		ইডিমাপাল্‌মনাম বা ফুসফুসের শোধ	৩১/০

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক প্রতিজ্বার	৩১/০	উন্মাদ-রোগ বা ইন্সত্যানিটি—এক্ট- মেনিয়া, মনমেনিয়া বা একাশ্রয়ো- ন্মাদ, ধর্মোন্মাদ, কামোন্মাদ, এবং ডিমেনসিয়া বা বুদ্ধিহ্রাসপ্রভৃতি	১১/০
ইস্টিপেটগো বা চর্মদল—গোলাকার ও চেপটা, পূর্ণপূর্ণ উদ্ভেদ	৩১/০	উপতারা-রোগ বা ডিজিজেক্ অব দি আইরিস্	২৬/০
উদর অথবা বস্তিকোটর-যন্ত্রের কিছা উদ্ভেদের ঠেলনারা বা ফুলিয়া পড়া	৫১/০	উপদংশ-রোগ বা সিফিলিস্—তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতিতরুণ বা সেকেন্ডারি এবং পুরাতন বা টার্শিয়ারি	১)
উদরবন্ধাদিপ্রদাহ—অস্ত্র-বেষ্টে-ক্লিষ্টপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অস্ত্রপ্রদাহ বা এন্টারাইটিস্, ডায়ক্রোমাইটিস্ এবং অক্ষাঙ্গাদিপ্রদাহ বা টিফলাইটিস্ প্রভৃতি	৪১/০	ঋতুরোধ অথবা ঋতুঋতু ঋতুসন্ধিকাল ও ঋতুসন্ধিকালীন রোগ বা ক্রাইম্যাষ্টারিক পিরিয়ড এবং ক্রাইম্যাষ্টারিক ডিজিজেক্	৮৬/০
উদররোগ বা ডিজিজেক্ অব দি এব্ভ- নেন	৪১/০	ঋতুসন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষায়সীদিগের শেষ ঋতুরোধকালের অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিতপ্রাব, তাপোচ্ছ্বাস তপ্তঘর্ম এবং মুচ্ছার জ্বালা ও শিরঃ- শূল প্রভৃতি	৫১/০
উদরশূল, অস্ত্রশূল, শূলবেদনা বা কলিক্	৪১/০	এওটাইটিস্ বা বৃহৎকমনী প্রদাহ	২১/০
উদরাদমধ্যে ক্রণাদি জীবন্ত পদার্থের বা কোন আগন্তুক পদার্থের বর্তমানতা বা সঞ্চলনের অসুভূতি	৪১/০	এক্ট, পুরাতন বা ক্রনিক এবং সার্ভি- পাতিক বা টাইফইড	৪১/০
উদরাদি যন্ত্রনধ্যে থালি, কিছু না থাকা অথবা শূন্যবোধ	৪১/০	এডিসম্ ডিজিজ—ত্বককলঙ্ক বিশেষ দ্বারা স্পষ্টকৃত স্নায়বীয় ও বাস্তবিক ক্রিয়াবসাদযুক্ত দুষ্চিকিৎসা রোগ বিশেষ	৩১/০
উদরাদান, উদরশ্ফীতি বা টিম্পানাই- টিস্	৪১/০	এনাসার্কী বা ত্বকশোথ বা বাহু শোথ	৬১/০
উদরাদান বা পেটকাঁপা	৫১/০	এনুরিজম বা ধমনী-শ্ফীতি এবং এধারমা প্রভৃতি ধমনীরোগ	২১/০
উদরাময়—প্রাত্যহিক বা মর্নিং ডাইরিয়া	৪১/০	এফ্রিসিয়া বা ফুস্ফুসের বায়ু-শ্ফীতি	৩১/০
উদরাময় বা ডাইরিয়া—তরুণ এবং পুরাতন	৪১/০	এলুমিনিয়াম্ রিয়া, ব্রাইটস্ ডিজিজ বা লালা মেহ	৮১/০
উদরাময়—মানসিকবিকারবশতঃ	৫১/০	এম্বিক্সিয়া এবং স্প্যাজম অব দি লাঙ্গস্ বা শ্বাসরোধ এবং ফুস্ফুস ও অন্ত্রনালীর আক্ষেপ	৩১/০
উদরি বা এসাইটিস্	৩১/০	ওস্তারিগ্রস্থিরোগ	২১/০
উদ্ভেদ বসিলে বা অস্ত্রশুঁখী হইলে এবং শ্রাব বসিলে রোগ	৫১/০		
উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্সিমেন্টা	৬১/০		
উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্সিম্যাটিক ফিবার	৬১/০		
উদ্ভেদিক জ্বরে উদ্ভেদের অসুদগম বা অসুদগমন (বসিরা ধাওয়া) বশতঃ রোগ	৬১/০		

ঔষধ ও তাম্বকুট, মস্ত এবং অফিফেন	কাসি বা কফ	৩১/০	
প্রভৃতি মাদকদ্রব্যাদির অপব্যবহার	কিডনি বা বৃক্ক রোগ	৮১/০	
এবং অস্বাভাবিক বিবিধ কারণজনিত	কিডনি বা বৃক্কের দানায়ুক্ত কক্ষ বা		
বিষ-ক্রিয়া	১১/০	৮১/০	
কঙ্কুরোগ, পাঁচড়া বা স্বেবিজ, ইচ, সোরা	৩০/০	প্রাণ্ডুলার ডিজেনারেশন	৮১/০
কণ্ডিলমা বা প্লেগ্মাণ্ডটিকা এবং চর্মকীল	কিডনি বা বৃক্কের ক্যাটি ডিজেনারেশন		
বা ওয়াটস্	১১/০	বা বসাপকৃষ্টতা	৮১/০
কণ্ড, সাধারণ চুলকনা বা প্রুইটিস্	৩১/০	কুইনাইন্ রক্ত ম্যালেরিয়াদি জ্বর	
করইডাইটিস বা চক্ষুর রক্তনাদীময়-	এবং ছদ্মজ্বর বা মাস্কড ফিবার		
শিলি প্রদাহ	২৮/০	প্রভৃতি	৬১/০
কর্ডি বা লিঙ্গোচ্চুাস	১১/০	কুঁচকির কঁাসবন্ধ অল্পব্রুজি-রোগ বা	
কর্ণ এবং কর্ণ সংস্কৃষ্ট-রোগ	২১/০	ষ্ট্রাঙ্কুলেটেড ইইজুখাল হার্ণিয়া	৪১/০
কর্ণ খইল	২১/০	কুমিরোগ বা ওয়াম্‌স	৪১/০
কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াস	২১/০	কৃশতা এবং রক্তহীনতাদি	৫১/০
কর্ণমূলগ্রন্থি বা প্যারটিড গ্ল্যাণ্ডপ্রদাহ,	২১/০	কেশখলন, টাক বা এলপেসিয়া	
প্যারটাইটিস বা মাস্পস	২১/০	বল্ডনেস	৩০/০
কর্ণশূল, কর্ণপ্রদাহ এবং অটরিয়া এবং		"কোমা ভিজিল বা টাইফমেনিয়া"	
কানপাকা প্রভৃতি	২১/০	অচেতনাবস্থায় উন্মীলিত চক্ষুসহ	
কর্ণিগ্না বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের অসচ্ছতা		অস্পষ্ট কথন	৫১/০
বা ওপেসিটি	২৮/০	কোষময়-খিলি প্রদাহ বা সেলুলাইটিস	৩১/০
কর্ণিগ্না বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের প্রদাহ বা		কোষ্ঠবন্ধ বা কন্ঠিপেশন	৪১/০
কিরটাইটিস ও ক্ষত	২৮/০	ক্যাংক্রাম আরস বা পচিত মৃৎক্ষত,	
কর্ণিগ্নার এবসেস, হাইপপিয়ন বা কর্ণি-		মাশুরকির ঘা	৪১/০
গ্নার পশ্চাৎ নিম্নে অর্ধচন্দ্রাকারে		ক্যানসার বা কর্কটরোগ	৩১/০
পুয় সংগ্রহ	২৮/০	ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা একশন ও রি-	
কলিন্দ্ৰায়ুদ্বারপ্রোথ বা ফুলকপিবৎ উপ-		একশন	৫১/০
মাংস, কণ্ডিলমা বা প্লেগ্মাণ্ডট এবং		ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মানসিক উপঘাত	
তজ্জাতীয় অল্প বিধ মাংস বৃদ্ধি,		রোগকারণ	৬১/০
অর্ধুদ বা টিউমার	৩১/০	ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ	৩১/০
কলেরা বা ওলাউঠা—এসিয়াটিক		ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা মৃৎপাণ্ডু ও	
প্রভৃতি	৪১/০	রক্তহীনতা	৮৮/০
কলেরা—রক্তময় বা ব্লাডি কলেরা	৪১/০	খলী, থাইল, স্থানিক আক্ষেপ বা	
কাউর, পামা বা এক্জিমা	৩০/০	ক্র্যাম্পস্	১১/০
কার্বিকুল বা দাহিকা, লক্ষত্রণ, পৃষ্ঠত্রণ	৩১/০	গণ্ডমালা-রোগ বা কুফুলা	২১/০
		গর্ভশ্রাব, গর্ভপাত বা এবর্শন, মিস্-	
		ক্যারেক্স	২১/০

গর্ভাবস্থার রোগ—ফাইব্রিনাস ফিবার, .	
মূত্রা-জীতি, জরায়ুর-বেদনা শিরা	
শীতি বা ডেরিকোজ ভেন্‌স্ প্রভৃতি	
বিবিধ রোগ	২০/০

গর্ভিণী, প্রসব এবং প্রসবাস্তিক বা
স্মৃতিকারোগ ২১/০

গলগণ্ডরোগ বা গয়টার	২১/০
গল-প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা সোর-থ্রেট	৪১/০
গলমধ্যে ক্লকক্লক শব্দ	৫১/০
গল-ক্ষত বা কুইঞ্জি সামান্যিকি টনসিলি- রিজ	৪১/০
গাউট বা ক্ষুদ্রবাত	৭০/০
গীতি-বাণ সহ রোগসম্বন্ধ	৫১/০
গুদভ্রংশ, হালিশ বা প্রল্যাপ্সাস্ রেস্টাই	৪১/০
গুদ্র-বায়ু, মুচ্ছা-বায়ু, অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া	৭১/০
গুদ্রদ্বারের সঙ্কোচন বা কন্‌ট্রিকশন অব দি এনাস	৪১/০
গৃহবিরহাত্তরতা বা হোমসিক্‌নেস্	৭১/০
গ্যাংগ্রিন বা ন্যানাধিক শরীরাত্মশের মৃত্যু বা পচন ও বিগলন	৬১/০

গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-সংস্ঠ রোগ ২১/০

গ্রন্থি-রোগ বা ডিজিজ্‌জ অব দি থ্র্যাণ্ডস্	২১/০
গ্রীবাস্তু বা টার্টিকলিস্	৭০/০
গ্লকমা বা চক্ষুরসের অবচ্ছতা বশতঃ	
ঘোর-দুষ্টি	২৬০/০
মিট বা পুরাতন পুয়-মেহ	৭
মোবাস্ হিষ্টিরিকাস বা গলা বাহিয়া	
পিণ্ডাকার বস্ত্র উঠা	৫১/০
যক্ষের স্থান ও যক্ষ-প্রকৃতি	৫১/০
বুংরিকাশি বা ক্রুপ—সহজ ও পর্দাজনক বা মেথ্রেনাস	৩১/০

দ্রাণশক্তিৰ অভাব	৫১/০
দ্রাণশক্তিৰ কষ্টকর অধরতা	৫১/০
দ্রাণে অসহিকৃতা	৫১/০
দ্রাণে অসহিকৃতা ও মুচ্ছার ভাব	৩১/০
চর্মকীলক বা ওয়ার্টস	৩১/০
চক্ষু ও চক্ষুণির বাপিউপিলের বিকৃতি	৫১/০
চক্ষুপুট আনর্জন (Twitching) বা চোক-নাচা চক্ষু মিটিমিটি	২৬০/০
চক্ষুপুট পতন বা টোসিস্	২৬০/০
চক্ষুপুট-প্রদাহ বা রেফারাইটিস্	২৬০/০
চক্ষুপুটেবিপব্যায় বা একটোপিয়াম ও ট্রিকইয়ামিস্, চক্ষুপুট বক্র হওয়া বা চক্ষুকেশ উন্টান	২৬০/০
চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ	২৬০/০
চক্ষুমণি, তারা বা পিউপিলের ডাইলে- টেশন বা প্রসারণ	২৬০/০
চক্ষুর কালশিরা একিমোসিস্	২৬০/০
চক্ষুর স্নায়ুশূল	২৬০/০
চক্ষুরোগ বা ডিজিজ্‌জ অব দি আইজ	২৬০/০

চক্ষুরোগ বা ডিজিজ্‌জ অব দি

আইজ ২১০/০

চাপে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি	৫১/০
চিকিৎসা সম্বন্ধে জাতব্য বিষয়	৫১/০
ছিপি, গঁজ, কাটা, গোলা বা গুল্ম, লোহার পতর, ব্যাণ্ডেজ্ বা ফিতা এবং জীবন্ত জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ আগন্তুক বস্ত্র শরীরের স্থানবিশেষে ধাককার দ্বারা কষ্টপ্রদ লক্ষণ উৎ- পাদনের অন্তর্ভুক্তি	৫১/০
জটুল বা নিভাস	২১০/০
জড়রোগ বা ইম্বেসিটি	৩১/০
জরায়ু প্রভৃতি ব্রীজননেগ্রিমে ক্যান্সাস বা কর্কট প্রভৃতি অর্কুহ	

জরায়ু ও যোনী প্রভৃতি স্বীকজননেল্লিয়ার স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর আবর্তন ও বক্রতা বা ভাংশন ও ফ্লেকশন ২)	
জরায়ু-প্রদাহ (তরুণ ও পুরাতন) বা মেট্রাইটিস, ইনফ্ল্যামেশন অব দি ইউটারাস্ ২/০	
জরায়ু-স্রবশ বা প্রোল্যাপ্‌সাস্ অব দি ইউটারাস্ ও যোনী প্রভৃতি রোগ ২/০	
জরায়ু-মুখ ও গ্রীবা বা অস্ ও সার্ভিকস্ ইউটারাইর প্রদাহ ও ক্ষত ৮৫/০	
জরায়ু-রক্তস্রাব বা হিমরেজ ক্রম দি ইউটারাস্ ২)	
জরায়ুর সাব ইনভলিউশন, ফাইসমেট্রা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ২	
জলদোষ বা হাইড্রিসিল ৫০/০।৬৫	
জলশোধ বা ইডিয়ার বর্তমানতা ৫১/০	
জলশোধ বা ড্রপ্‌সি	
জলাতঙ্ক এবং শ্রোত-জলশকস্রবণ ও জল বা তৎবৎ চাকচিক্যশালী বস্তু দর্শন রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ ৫১/০	
জলাতঙ্ক-রোগ বা হাইড্র কবিয়া ৭১/০	
জানু-সন্ধি-রোগ বা ডিজিজেক্ অব দি নি-জইন্ট—সাইনভাইটিস্ বা শিরা- মুণ্ড প্রভৃতি ৭০/০	
জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব ৫১/০	
জৈবতাপাঞ্জতা ও শীতানুভূতি ৫১/০	
জৈবরসক্ষয়—রোগ-কারণ ৫১/০	
অন্ন-রোগ— অজীর্ণঅন্ন, কাম-অন্ন বা গ্যাস্ট্রিক্ ফিবার, পিত্ত-অন্ন বা মিলি- য়াস্ ফিবার, পিত্ত-ক্লেমা-অন্ন বা বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার, বাত- অন্ন বা নার্ভাস ফিবার, বাত-পৌত্তক অন্ন বা নার্ভাস-বিলিয়াস্ ফিবার প্রভৃতি ৬১/০	

অন্ন-রোগ বা ফিবার ৬১/০	
অশ্বা বা বার্শিং ৫১/০	
টনসিল-গ্রন্থি-প্রদাহ বা টনসিলাইটিস ২১/০	
টুবাকু লোসিস বা স্তটিকোৎপাদক রোগ ৬৫/০	
টেব্‌স্ মেসেন্টারিকা বা অস্ত্র-বেষ্ট-কিল্লি- গণ্ডমালারোগ ২১/০	
ডিক্‌থিরিয়া বা ব্রুই-গল-ক্ষত ৪১/০	
ডিস্‌ক্রেশিয়া, ডায়্যাথিসিস্ এবং ক্যাকেক্- শিয়া ৫১/০	
ডিস্‌ফেজিয়া বা গল-রোধ ৪৫/০	
তাণ্ডব, নৃত্যরোগ বা কোরিয়া ৭১/০	
তাপোচ্ছ্বাস, ঘর্ম ও মুচ্ছার ভাব ৫১/০	
তৃষ্ণা এবং জলপান ৫১/০	
তোতলামী বা ষ্ট্যামারিং ৭১/০	
ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেক্ অব দি স্কিন ৩/০	
ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেক্ অব দি স্কিন্ ত্বকের কড়া বা করুন, কাঠিন্, কর্কণতা এবং পুয়-গুটিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র- রোগ ৩/০	
ত্বগুস্তেদ-বিশিষ্টতা এবং কণ্ডুয়ন প্রভৃতি ৫১/০	
দক্র বা রিং ওয়ার্ম, হাপিস্ সারিসনেটাস ৩১/০	
দন্তমাড়িরোগ বা ডিজিজেক্ অব দি গাম্‌স্ ৪৫/০	
দন্ত-রোগ ৪৫/০	
দন্ত-শূল ৪৫/০	
দন্তের ক্ষত বা করিজ্, নালীক্ষত বা কিশ্চুলা এবং ক্ষয় বা ডিকে প্রভৃতি রোগ ৪৫/০	
দন্তোৎপাটন জস্থ শোণিতস্রাব ৪৫/০	
দন্তোস্তেদ বিকার (শিশুর) ও তদবর্তিত অন্ন এবং আক্ষেপাদি রোগ ৪৫/০	

ছক্ক-স্বর, হুঁকো বা মিক কিবার, কেব্রিস্ ল্যাঙ্কিমা; স্তম্ভাভাব বা স্তম্ভরোধ ও তৎসংসৃষ্ট প্রদাহ এবং পুর-সকার প্রভৃতি রোগ; স্তম্ভাধিক্য	২১০	নেক্র্যালজিয়া বা বৃক্ক-শূল	৮১০
ছক্কপীড়কা বা ক্রাণ্টা ল্যাঙ্কিমা	৩১০	স্ত্রাবা, পাণ্ডু, কামলা বা জন্ডিস্	৪৮০
ছক্কলতা বা ডিবিলিটি এবং নিম্ন চূয়াল ঝুলিয়া পড়া	৫১০	পতন, হিমাজ বা কোল্যাপ্স-লক্ষণাদি	৫১০
ছক্কলতা বা ডিবিলিটি এবং পেপী- দৌর্কল্য	৭১০	পরিপাক যন্ত্র এবং মুখগহ্বরাদি	
দৃষ্টিদৌর্কল্য বা এম্ব্লোপাইয়া	৩	উদর-যন্ত্র-রোগ	৪/০
ধমুষ্ঠকার বা টিটেনাস	৭১০	পরিপাক-যন্ত্র-রোগ	৪৮০
ধাতু বা কন্ঠটিউশন	৫১০	পলিপাস্ বা বহুপাদার্কুদ	৩৮০
ধ্বজ-ভঙ্গ বা ইম্পোটেন্স্	৫০	পক্ষাঘাত—চক্ষু-পুট-পতন	৭৮০
নখ-রোগ বা ডিজিজেক্ অব দি নেল্‌স্	৩১০	পক্ষাঘাত—জিহ্বা, ওষ্ঠ, গলদেশ প্রভৃতি	
নবজাত শিশুর ঝাসরোধ	৮৮০	স্থানিক	৭৮০
নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও বিস্তার	৫১০	পক্ষাঘাত—ডিক্ থিরিমা-রোগাস্তিক বা পোষ্ট-ডিক্ থিরিটিক	৭৮০
নাসিকাগ্রের প্রদাহ ও ক্ষত	৩১০	পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্	৭৮০
নাসিকাগ্রের ক্ষীতি	৩১০	পীকুই, শীতফোটক বা চিল্লেন্	৩১০
নাসিকাদি ঝাসবহুরোগ	৩১০	পাদমূলের (Heels) ক্ষতাদি	৩১০
নাসিকারজ্জশ্রাব বা এপিষ্টাক্সিস্	৩১০	পানিবসন্ত বা ভেরিসিলা, চিকেন্‌পক্স্	৬১০
নাসিকাঈ নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ	৩১০	পারদঘটিত রোগ বা মাক্‌রিয়েল ডিজিজ্ (মাক্‌রিয়েল পলজি প্রভৃতি)	
নাসিকা-সর্দি বা করাইজা	৩১০	ইন্‌এফেক্ট্‌স্ অব মার্ক্যারি	৬৮০
নিউমোনিয়া প্লুরে-নিউমোনিয়া, বিলি- য়াস-নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউ-মোনিয়া প্রভৃতি	৩১০	পারদোপদংশজ যৌগিক বিষোৎপন্ন রোগ	৭/০
নিউরেইনিয়া বা ঝায়বীয় ক্রিম্যদৌর্কল্য	৭৮০	পাপূরা হিমরেজিকা শীতানরোগ	২১০
নিজ্রা, তামসী নিজ্রা ও নিজ্রালুতাদি এবং নিজ্রাস্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি	৫১০	পিস্ত-শিলা বা গলগ্টোন, বিলিয়ারি কাকলাই এবং পিস্তশূল বা বিলিয়ারি কলিক প্রভৃতি	৪৮০
নিজ্রাহীনতা বা স্টিপলেস্‌নেস্ এবং নিজ্রাবিকার	৭৮০	পিনস, পুতিনস, পুরাতন সর্দিরোগ বা অজিনা	৩১০
নিম্পল-বায়ু বা ক্যাটালেপ্স্	৭৮০	পীত-স্বর বা ইয়োলো কিবার	৩১০
নীলরোগ বা সায়ানোসিস্	২১০	পুং-জননেক্রিয়রোগ	৫/০
নেক্রাইটিস্ বা বৃক্ক-প্রদাহ	৮১০	পুং-জননেক্রিয়ের বিবিধ রোগ	৫০
		পুরাতনরোগ-বিষ-বাম্প বা ক্রনিক ডিজিজ্-ম্যাজ্‌স্—সোরো, মাইকো- সিস্, সিফিলিস্	৫১০
		পুষ্-মেহ বা গণরিয়া	৭/০

পূরণশোধ, ব্রণশোধ বা এষসেস্	৬৮০	প্রদর্শবেদনাকালীন কন্তাজলন বা	
পৃষ্ঠব্রণ, দাহিকা ষা কার্কাভল, আঙ্কুল		আক্ষেপ	২১০
হাঁড়া বা হইলো, প্যানারিটাম,		প্রসবাস্তিক রুদ্র বা লোকিদ্ধা-স্রাব-সংকট	
প্যানারিস ; দুষ্টব্রণ বা ম্যালিগন্যান্ট		রোগ	২১০
পাশুল ; শ্বচ্ছেদ সংশ্রবীয় বা		প্রসবাস্তিক চিকিৎসা	২১০
ডিসেক্টিং উণ্ডম বা ক্ষত এবং বিধধর		প্রসবাস্তিক মূত্র রোধ বা রিটেন্শন অব	
কীটদংশনজনিত ক্ষত প্রভৃতি	৩১০	ইউরিন্	২১০
পৃষ্ঠশূল, পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাক-এক	৭০	প্রসবাস্তিক রক্তস্রাব	২১০
পেশীআনর্জন বা টাইটিস অব দি		প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর রোগের	
মাসলস	৭৮০	বৃদ্ধি	
পেশী-প্রদাহ বা মায়ি-আইটিস	৬৮০	প্রেমবিষয়ক নৈরাশ্য এবং ছেবাদি	৫৮
পেশীবাত এবং পেশী শূল	৭১০	শ্রীহারোগ বা এন্লাজমেন্ট অব স্পীন	৪৮০
পোড়ানারাজা বা পেশিগাস	৩১০	প্লুরিসি, প্লুরাইটিস বা ফুসফুস-বেষ্ট-ফ্লি- প্রদাহ	৩১০
প্যানক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ	৪৮০	ফাইমোসিস্ বা মুদারোগ	
প্যারা ফাইমোসিস বা উটামুদা	৫০	ফাসবন্ধ-অস্ত্রবৃদ্ধিরোগ বা স্ট্রাকুলেটেড	
প্যারাগিলিস অব দি ইনসেস্ বা		হার্ণিয়া	৪৮০
বাতুলের পক্ষাঘাত	৭৮০	ফিশ্চুলা বা নালিকত	৬৮০
প্রতিক্রিয়াহীনতা বা ঔষধের ক্রিয়াশ্রাব	৬৮০	ফিসার এবং ফিশ্চুলা অব দি এনাম ও	
প্রতিশ্রায়, সর্দি বা কাটার	৬৮০	রেস্টাম বা মলদ্বারনিদারণ ও মলদ্বার	
প্রদর্শক লক্ষণ এবং চিকিৎসা-		এবং সরলাস্ত্রের নালীকত	৪৮০
সৌকর্যার্থ অস্ত্রাস্ত্র বিষয়	৫১০	ফুসফুস-প্রদাহ বা ইনফ্রামেশন অব দি	
প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ	৫১০	লাঙ্গস	৩১০
প্রদাহ ও পূরণজনন বা ইনফ্রামেশন	৬৮০	ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ	
প্রদাহিক উন্নয়নশূল বা ইনফ্রামেটরি		ক্রম দি লাঙ্গস	৩১০
কলিক	৪৮০	ফুসফুসে গুটিকাজনন বা টুবাকুলোসিস	
প্রদাহিক উন্নয়ন বা ইনফ্রামেটরি বা		অব দি লাঙ্গস	৩১০
সামার ডাইয়ারিয়া বা ইংলিশ		ফুসফুসে পুঞ্জ-সঞ্চারণ বা সাপুশেশন অব দি	
কলেরা	৪৮০	লাঙ্গস	৩১০
প্রদাহিক স্রব বা ইনফ্রামেটরি ফিবার	৬৮০	ফুসফুসের আক্ষেপ বা স্প্যাঞ্জম অব দি	
প্রদাহের অস্ত্রাব	৫৮০	লাঙ্গস	৩১০
প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম	৫৮০ ৭১০	ফুসফুসের পচন, ধ্বংস বা গ্যাংগ্রিন	
প্রটেক্ট-গ্রন্থি-প্রদাহাদি রোগ	৫০	অব দি লাঙ্গস্	৩১০
প্রটেক্ট-গ্রন্থি-রোগ	২১০	ফুসফুসের পক্ষাঘাত বা প্যারাগিলিস	
প্রসব বা লেবর—কষ্টকর বা ডিফিকাল্ট	২১০	অব দি লাঙ্গস	৩১০

ফুসফুসের পুত্র বা ব্রণ-শোথ বা এবসেস অব দি লাক্স	৩১১/০
ফুসফুসের প্রসারণ বা ডাইলেটেশন অব দি লাক্স	৩১১/০
ফুসফুসের রক্তাধিক্য বা কঙ্ক্লেস্টন	৩১১/০
ফ্যারিঞ্জাইটিস বা গলকোষপ্রদাহ	৪১১/০
বক্রদৃষ্টি বা ষ্ট্রাবিসমাস	৩
বধিরতা, ডেকনেস বা হার্ডনেস অব হিয়ারিং এবং কর্নরোধ	২১১/০
বক্ষ্যাহ বা ষ্টেরিলিটি	২/০
বমন বা ভমিটিং এবং বিবমিষা বা নসিরা—মদ্যপানী এবং গর্ভিণীর প্রাত্যহিক ও অস্বাভাবিক নানাবিধ বমন	৪১১/০
বয়ঃব্রণ, বয়সফোড়া বা একনি	৩১১/০
বসন্তছত্র বা ভেরিয়োলা, মূল পকস	৩১১/০
বস্ত্র বিশেষ ভঙ্গিতে রোগোৎপত্তি	৫১১/০
বহুভাষিতা; অত্যধিক কথা বলা বা লোকোয়ার্সিটি	৫১১/০
বহুমূত্র বা মূত্রবহরোগ—মধুমেহ বা ডায়ব্টিস মেলিটাস ও মূত্রমেহ, মূত্রাধিক্য বা ডায়ব্টিস ইন্সি- পিডাস	৮১১/০
বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দাদি	৫১১/০
বক্ষরোগ বা ডিজজেজ অব দি চেষ্ট	৩১১/০
বক্ষ-শূল, বক্ষের বেদনা বা প্লুরোডাই- নিয়া	৩১১/০
বক্ষ-সর্দি বা ক্যাটার অব দি চেষ্ট	৩১১/০
বাধী, ব্রহ্ম বা বিউবো.বিউবন	২১১/০
বায়ুনালীপ্রতিষ্ঠায় বা ক্যাটার অব দি ব্রংকাই	৩১১/০
বিচার্চিকা বা নোরিয়াসিস	৩১১/০
বিবমিষা বা নসিরা ও বমন	৫১১/০
বিবিধ শিশুরোগ	৮১১/০

বিবিধ সাধারণ রোগ	৩১/০
বিষাদোন্মত্ততা বা মেলাঙ্কলিয়া	৭১১/০
বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনাদি	৫১১/০
বিসর্প বা ইন্সিপেলাস	৩১১/০
বেদনা বা পেন্স	৭১১/০
বেদনার প্রকৃতি, তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার অভাব	৫১১/০
বেরিবেরি রোগ	৩১১/০
ব্রঙ্কাইটিস এবং ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটিস— তরুণ ও প্রবল; পুরাতন এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রকৃতি	৩১১/০
ব্রঙ্কোরিয়া, বা বায়ু-নালীর শ্লেষ্মা- স্রাবাধিক্য	৩১১/০
ব্রেনফ্যাগ বা মস্তিষ্ক ক্রান্তি	৭১১/০
ভমিটিং অব প্রেগন্যান্সি বা অন্তঃসংসার বমন	২১১/০
ভক্ষ্যবস্ত্র দর্শনে অথবা তাহার আশ্রমে বমনোন্মেক	৫১১/০
ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং ভীতিবশতঃ রোগ	৫১১/০
ভূতপূর্ব কারণসম্বৃত রোগ	৫১১/০
ভেরিকোসিল বা অণুশিরার্কুদ	৫১১/০
ভ্যাক্সিনেশন বা গো-বীজটিকা জনিত জ্বর ও অস্বাভাবিক রোগ	৩১১/০
মতিম্মাবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট	৩
মতিম্মাবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি চক্ষু রোগের অন্তর্গত চিকিৎসাসাম্প্রদায়িক জ্বর	৩১১/০
মদ্যাত্যরোগ বা ডিলিরিয়াম টি মেন্স	৭১১/০
মনুষ্যসঙ্গ এবং আলোক ভালবাসা	৫১১/০
মলদ্বার, গলদেশ এবং উদর প্রভৃতিতে সঙ্কোচনের অসুভূতি	৫১১/০
মলদ্বার, নাসিকারকু এবং কর্ণকুহর প্রভৃতি শরীর বারুদ্বারের মস্তিষ্কা ও ক্ষতাদি	৫১১/০

দলদ্বারের শিথিলতা এবং অনৈচ্ছিক- রূপে বা অসাড় মলত্যাগ	৫৬০/০
মস্তিষ্ক ও তদাবরণীপ্রদাহ বা ইনফ্রামেশন অব দি ব্রেন এণ্ড ইটস মেম্ব্রেনস	৭৬০/০
মস্তিষ্ক ও মানসিক লক্ষণের তুলনা	৫৬০/০
মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি স্নায়বীয় রোগ	৭১/০
মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-বেষ্টবিহীনপ্রদাহ বা সেরি- ত্রো-স্পাইন্ডাল মিনিঞ্জাইটিস	৭৬০/০
মস্তিষ্কমেরুমজ্জের রোগ বা ডিজিজের অব দি ব্রেন এণ্ড স্পাইন্ডাল কর্ড	৭৬০/০
মস্তিষ্কে জলপতন (Swashing) বৎ অসুভূতি	৫৬০/০
মাছেতা, ছল্লি প্রভৃতি নানাবিধ স্বক- কলঙ্ক	৩১/০
মানসিক জড়ত্বাদি বিকার বা মেন্ট্যাল ডিরেঞ্জমেন্ট	৭১/০
মানসিক দৌর্বল্যব্যাঞ্জক লক্ষণ— অবসাদ, বিষন্নতা, কোমলতা, পরিবর্তনশীলতা এবং ক্রন্দনাদি	৫৬০/০
মানসিক ভাবোত্তেজनावশতঃ রোগ	৫৬০/০
মানসিক রোগ বা মেন্ট্যাল ডিরেঞ্জমেন্ট	৭১/০
মিনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক বেষ্টবিহীনপ্রদাহ —সহস্র এবং টুবাকুলার বা গুটিকা বৃদ্ধ	৭৬০/০
মুক্তবায়ুর প্রয়োজনীয়তা	৫৬০/০
মুখগহ্বর—দন্ত, দন্তমাড়ি ও জিহ্বাদির লক্ষণ	৫৬০/০
মুখগহ্বরের প্রদাহ ও ক্ষত বা সোর- মাউথ, একধি বা জাড়া ঘা এবং লালাস্রাব বা স্ক্যালিভেশন প্রভৃতি রোগ	৪৬০/০
মুখমণ্ডল, নাসিকা ও গুঠাদি স্থানে স্তম্ভমা কলঙ্ক এবং রসবিধিকা প্রভৃতি	৫৬০/০

মুখমণ্ডল-পক্ষাঘাত বা ফেসিয়াল প্যারা- লিসিস	৭৬০/০
মুচ্ছারোগ কেন্টিং ফিট	৭৬০/০
মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ	৮১/০
মূত্রকৃচ্ছ বা ডাইইরিয়া	৮১/০
মূত্রনালীর প্রতিশ্রাব, (ব্যালানোরিয়া) ও প্রদাহ বা ক্যাটার এণ্ড ইনফ্রামে- শন অব দি ইউরিথ্রা	৮১/০
মূত্র-পথ হইতে রক্তস্রাব	৮১/০
মূত্রপথে বেদনাদি কষ্ট	৮১/০
মূত্রযন্ত্ররোগ বা ডিজিজের অব দি ইউরিনারি অর্গ্যানস্	৮১/০
মূত্রলক্ষণের বিশিষ্টতা	৬
মূত্র-শিলা ও মূত্র-রেণু প্রভৃতি বা ইউরি- নারি স্টোনস, গ্র্যাভেলস এবং কাল্কা লাই	৮১/০
মূত্র-শূল বা ইউরিনারি কলিক	৮১/০
মূত্রস্থালী বা ব্র্যাডারের পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা	৮১/০
মূত্রস্থালী প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস	৮১/০
মূত্রস্থালী বা ব্র্যাডারের উত্তেজনা বা ইরিটেশন	৮১/০
মূত্রস্থালী হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ ক্রম্ দি ব্র্যাডার	৮১/০
মূত্রাঘাত বা সাপ্রেসন অব ইউরিন	৮১/০
মূত্রাবরোধ বা রিটেনশন অব ইউরিন	৮১/০
মূত্রোন্নতাজনিত শোথ বা ড্রপসি	৮১/০
মূত্রের ড্রাণ ও বর্ষণের বিকার	৮১/০
মূত্রের তলানী বা সেডিমেণ্ট	৮১/০
মুগীরোগ বা এপিলেপসি	৭৬০/০
মেরুমজ্জা ও তৎসংস্থ রোগ—প্রদাহ ও দৌর্বল্যাদি	৮
মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক-কোমলতা বা সফনিং	৮

মেরুসঙ্কেত, উদ্ভেজনা বা স্পাইন্ডাল		রসবাতাদি রোগ	৭/০
ইরিটেশন	৮/১	রসবাতিক জ্বর বা রিউম্যাটিক ফিবার	৬১/০
ম্যালেরিয়া-ফর	৩১/০	রস বা লসীকাগ্রহিহর ক্ষীতি এবং	
যকৃতের অপকৃষ্টতা—বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি		বিবৃদ্ধি	৬/১
অপকৃষ্টতারোগ বা ডিঙ্কনারেশন	৫/১	রাইটাস জ্যাম্প বা লেথকের হস্ত-কম্প	৮/০
যকৃতের পীতক্ষয় বা ইয়োলো এট্রফি		রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ—রেটিনাইটিস	
অব দি লিভার	৫/১	বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্র-	
যকৃতের প্রদাহ, রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি	৫/১	পত্রের শোণিতাধিক্য, রেটিঙ্কাল	
ত্রণশোধ বা পুয়শোধ বা এবসেস এবং		এট্রফি বা চিত্রপত্রের ক্ষয়, রেটিঙ্কাল	
স্ত্রাবা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ		এপলেকসিস বা চিত্রপত্রে রক্তস্রাব	
যকৃতের ক্ষমরোগ বা সিরোসিস অব দি		এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের স্থলন বা	
লিভার	৫/১	ডিট্যাচমেন্ট প্রভৃতি	৩/০
যক্ষ্মাকাশ বা থাটসিস	৩১/০	রোগলক্ষণের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতা	৬/১
যে কোন প্রকার শয্যায় শয়ন করুক না		রোগলক্ষণের পর্যায়ক্রমিকতা	৬/১
কেন তাহার অসহনীয় কাঠিঙ্কাসু-		রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব	৬/১
প্রযুক্ত কোমল শয্যাংশের		রোগের পক্ষবাতিক বা রসবাতিক	
অনুসন্ধানের রোগীর অনবরত শয্যার		মৌলিকতা	৬/১
চতুর্দিকে স্থান পরিবর্তন	৩১/০	রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্তন	৬/০
যোনিপ্রদাহ বা ইনফ্ল্যামেশন অব দি		রোগের প্রাচুর্য্য কাল	৬/০
ভ্যাজাইনা	২১/০	লসীকাগ্রহি বা লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যান্ডের	
যোনিপ্রাংশু বা ভ্যাজাইন্ডাল প্রোল্যাপসাস	২/০	প্রদাহ	২১/০
যোনির আক্ষেপিক সংকোচন বা ভ্যাজাই-		লাঞ্ছগো বা কটিবাত	৭/০
নিসমাস	২১/০	লিথিমিয়া	৮১/০
রক্তাকাশ বা হিমপ্টিসিস	৩১/০	লোকো-মোটর-এট্যাক্সিয়া বা কশেরুকা-	
রক্তস্রাব বা হিমরেজ, ব্লিডিং	২১/০	মঙ্কেয় ক্ষয়রোগ	৮/০
রক্তহীনতা বা এনিমিয়া	২১/০	ল্যারিঙ্কসমাস্ ট্রাইডুলাস্ বা কণ্ঠনালী-	
রক্তাতিসার বা ব্রাডি ডাইসারিয়া	৫/০	স্বার-আক্ষেপ	৩১/০
রক্তাধিক্য বা কল্লেসচন	২১/০	শয্যা-প্রস্রাব রক্তনীপ্রস্রাব, বা গুরেটং	
রক্তকৃচ্ছ, বাধক বা ডিস্ মেনরিয়া	২/০	দি বেড	৮১/০
রক্তদৌৰ বা মেনস্ট্রুয়েল ডিজর্ডার	২/০	শরীর চালনার অথবা বিশ্রামে রোগের	
রক্তবিকারসম্বন্ধীয় ঔষধের তুলনা	২/০	হ্রাস বা বৃদ্ধি	৬/০
রক্তোবাহুল্য, আর্ন্তবাধিক্য বা মেনরেজিয়া	২/০	শরীর বা শরীরংশবিশেষের গঠন-	
রক্তিজ রোগ বা ভিনিব্রিয়েল ডিজিজ	৭/১	বিশিষ্টতা এবং শরীরবেদন সম্বন্ধে	
রসবাত বা রিউম্যাটিজম—তরুণ এবং		রোগীর অদ্ভুত কল্পনা	৬/০
পুরাতন (কণ্ড বা সংকোচনাদি)	৭/০		

শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা শব্দনোপ- বেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, রোগের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ	৬/০
শরীরের এক পার্শ্ব বা স্থান আক্রমণ অথবা আক্রমণের পর রোগের পার্শ্বান্তরে বা স্থানান্তরে গতি	৬/০
শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা	৬/০
শিরঃশূল—অর্ধশিরঃশূল, আধকপালি মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া বা মেগ্রিম	৮/০
শিরঃশূল—বমন বা প্রস্রাব হইলে উপশম	৮/০
শিরঃশূল—বমনযুক্ত বা সিক-হেডেক	৮/০
শিরঃশূল বা হেডেক—সর্দিজ, শোণিত- সঞ্চয়ী এবং স্নায়বীয়	৮/০
শিরঃশূলসংক্রমে দৃষ্টিবিকার বা অন্ধত্ব	৮/০
শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকোজ ভেনুস্	৯/০
শিরোবূর্ণন বা ভার্টোগো	৮/০
শিরোলুপ্তন বা রোলিং অব দি হেড	৮/০
শিশু-কলেরা	৫/০
শিশু-ক্ষয়রোগ	৮/০
শিশুর কোষ্ঠবন্ধ	৮/০
শিশু-রোগ	৮/০
শিশুর সবিরাম ক্ষয়	৬/০ । ৮/০
শুক্র-মেহ বা স্পার্মাটোহিয়া—ক্ষয়নোব	৫/০
শৈত্য, তাপ, সিক্ততা এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ	৬/০
শোণিতসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ	৯/০
শোণিতসঞ্চয়ী বা কঞ্জেক্টিভ সবিরাম ক্ষয়	৬/০
শোণিতপ্রাব এবং শোণিতসঞ্চালন বিশৃঙ্খলা	৬/০
শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং পাথার বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি	৬/০

শ্বাসকৃচ্ছ্র বা ডিক্কিকাল্ট রেন্সিবেশন	৩/০
শ্বাস-যন্ত্র-রক্তপ্রাব	৩/০
শ্বাসযন্ত্ররোগ	৩/০
শ্বাসরোধ—সাধারণ এবং নবজাত শিশুর (এস্ ফিক্সিরা নিয়োনোটোরাম)	৩/০
শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া অথবা জরায়ুর অস্ত্রক্বেষ্টিক্সি প্রদাহ বা মেটাইটিস	২/০
স্নেহাণ্ডি চর্মকীলকের বর্তমানতা	৬/০
স্নেহিক-ক্লিয়ার স্ক্রুতা	৬/০
সকম্প পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস এজিটানুস্	৮/০
সঙ্গম-বৈকারিকভাব—সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা বা সঙ্গমে বেদনা	৯/০
সন্ধিক্তাদি	৬/০
সন্ধিবাত বা আর্থ্রাইটিক ইনফ্লামেশন— হিপ্-ডিজিজ্ ও নি-ডিজিজ্ প্রভৃতি	৭/০
সন্ধিরোগ—সন্ধির দুর্বলতা এবং নিম্ন চূরাল কুলিয়া পড়া প্রভৃতি সন্ধি- শ্বলন	৭/০
সন্নিপাত অরবিকার বা টাইফয়েড্ টাই- ফাস, রেমিটেণ্ট এবং লো-রেমিটেণ্ট প্রভৃতি অর	৬/০
সন্নিপাত বা টাইফয়েড অবস্থা	৬/০
সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সিস	৮/০
সবিরাম ক্ষয় বা ইন্টারমিটেণ্ট ফিবার	৬/০
সন্ন্যাসহ্রাসে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি	৬/০
সরলাস্ত্র বা রেস্তাম মধ্যে বিবিধ ক্রেশাকৃচ্ছ্র	৬/০
সর্বদান্নী আক্কেপ বা কন্ডালশন সাইনভাইটিস বা শাস্তকপ্রদাহ	৭/০
সাইয়াটিকা বা গুণ্ডনী	৮/০
সাংঘাতিকতা	৬/০
সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্	৫/০
সাময়িকতা বা পিরিয়ডিসিটি	৬/০

স্মৃতিকা জ্বর বা পিরপিরি়রেল ফিবার	২১।	স্নায়বীয় আঘাত বা শক	৩৬।
স্মৃতিকাজ্বর বা পিরপিরি়রাল ফিবার	৩৬।	স্নায়বীয় আঘাত বা শক	৮১।
স্মৃতিকা (প্রসবাস্তিক) রোগ	২১।	স্নায়বীয় রোগ	৮১।
স্মৃতিকাস্তম্ব বা মিক্স লেগ, ফ্লেগম্যাসিয়া			
ডলেন্স	২১।		
স্মৃতিকাক্লেপ বা পিরপিরি়রাল কন্ডাল-শন	২১।	স্নায়বীয় রোগ বা নার্ভাস ডিরেঞ্জমেন্ট	৭১।
স্মৃতিকোন্ডাদ বা পিরপিরি়রালমেনিয়া	৭১।	২১।	
সূর্যাতাপ—রোগের বা রোগ বৃদ্ধির কারণ	৬১।	স্নায়ু-শূল বা নিউরেলজিয়া	৮১।
সেনাইল ক্যাটার বা বৃদ্ধদিগের বায়ু-নালীর সর্দি	৩৬।	স্নায়ু-শূল, মুখমস্তলের বা প্রসোপ্যাল-জিয়া. ফেসিয়াল নিউরেলজিয়া	৮১।
সেপ্টিক ফিবার এবং প্যারিমিয়া—ড্রট, পচা ক্ষত হইতে রেদ, শবচ্ছেদ করিতে হস্তাদির ক্ষত (ডিসেকটিং উণ্ডস) হইলে শব-রেদ এবং বিষধর-কীট-দংশন বশতঃ বিষ শরীরে প্রবেশ ও পুন্ন শোষণাদি জন্ম জ্বর	৬৬।	স্ট্রোক বা বয়েল্‌স	৩১।
স্তনরোগ বা ডিজিজেক্স অব দি ম্যামারি-গ্ল্যাণ্ড—স্তনপ্রদাহ, স্তনশূল এবং স্তনগ্রৈর ক্ষত প্রভৃতি	২১।	স্বরভঙ্গ বা হোস নেস	৩৬।
স্তনের ক্যান্সার বা কর্কটাদি অর্কুদ বা টিউমার	২১।	স্বর-বস্ত্র-প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস—তরুণ ও পুরাতন ; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বরবস্ত্র-প্রতিজ্ঞায় এবং স্বরযন্ত্রবন্ধা	৩৬।
স্ট্রী-জননেল্লিয়-রোগ	৮৬।	স্বরযন্ত্র (ল্যারিঞ্জিস) রোগ	৩৬।
স্ট্রী-জননেল্লিয়-রোগ বা ডিজিজেক্স অব দি ফিমেল জেনারেটিভ অর্গ্যানস	২১।	স্বরলোপ (পক্ষাঘাতিক) একনিয়া	১১।
স্ট্রীজননেল্লিয়ের চুলকনা	২১।	স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেট ফিবার	৬৬।
স্ট্রী-রোগ ডিজিজেক্স অব দি উইমেন—স্ট্রীজননেল্লিয়রোগ এবং গর্ভিনী, প্রসব ও প্রসবাস্ত রোগ	৮৬।	স্বরণশক্তি হ্রাস বা অভাব	৬১।
স্নান অথবা গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা অথবা তাহা রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ	৩৬।	স্বরণশক্তির হানি	৭১।
		স্রাবের প্রকৃতি	৬১।
		স্রাব অথবা ক্ষুটিত উত্তেদের হঠাৎ লোপ কিম্বা উত্তেদের অহুলগম বা অসম্পূর্ণ উলগমবশতঃ রোগ	৬১।
		হাইড্রকেফেলাস বা মস্তিষ্কোদক	৬১।
		হাইড্রথোরাক্স বা বক্ষ-শোথ	৬১।
		হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম বা হৃৎবেষ্ট-শোথ	৬১।
		হীপানি, হীপ-রোগ বা এক্স-মা	১১।
		হামজ্বর বা মিজল্‌স	৬১।
		হার্পিস জষ্টার বা বর্জুলাকার বিসপিকা	৩১।
		হাস্ত এবং ক্রন্দন	৬১।
		হিকা বা হিকাফ, সিজ্যাস্টাস	৫১।
		হিমোটিমিসিস বা রক্তবমন	৫১।

হিমোটুরিরা বা রক্তমেহ বা রক্তশ্রাব	৮১/০	হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা	পক্ষাঘাতিক
হৃৎপিণ্ডের কাসি বা হৃৎপিণ্ড কফ	৪,	দুর্বলতা প্রভৃতি	২৮
হৃৎকম্প, হৃৎস্পন্দন বা প্যাল্পিটেশন		হৃৎপিণ্ডের বসানশকুণ্ডতা প্রভৃতি	২৮
অব দি হার্ট	২১/০	হৃৎপেশী প্রদাহ প্রভৃতি	২৮
হৃৎপিণ্ড বা নাড়ী-লক্ষণ	৬১০	হৃৎবাহুবেষ্ট-খিল্লিপ্রদাহ প্রভৃতি	২৮
হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব		হৃৎস্তরবেষ্ট-খিল্লিপ্রদাহ প্রভৃতি	২৮
দি হার্ট	২১/০	হেস্তিক ফিবার বা প্রলেপক জ্বর	৩৮/
হৃৎপিণ্ড-রোগ বা হার্ট ডিজিজ্—হৃৎপিণ্ডের		হে-ফিবার বা ওষধি-গক্ক জ্বর	৩৮/
ক্রিয়া ও নির্মাণবিকারী বা ফাংশনশাল		ক্ষতরোগ বা আল্‌সার	৩৮/
ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ	২১/০	ক্ষতাজ বা সিকোটিক্স	৩৮/
হৃৎপিণ্ডশূল বা এঞ্জাইনোপেট্রিস	২১/০	ক্ষয়রোগ বা ওয়েস্টং ডিজিজ্	৭১/
হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত যন্ত্র এবং শোণিত		ক্ষিপ্ততা অথবা মন্থরতা	৬১
সংস্কৃত বিবিধ রোগ	২১০ । ২১০/০	ক্ষুদ্রাক্ষেপ, খলী, পেশী-আনর্ডন এবং	
		সাবসাল্‌টাস টেঙিনামাদি	৬১০

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংবাদপত্র, খ্যাতনামা
চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ মহাআগণের মত।

* * * The unique claim of the book to the attention of those interested in the progress of Homœopathy in this country lies in the fact that it is, to our knowledge, the only book of its kind in Bengali in which the comparison of cognate medicines is given its due prominence and full recognition. * * *

The Bengalee, 12-2-12

* * * The impression left upon us by a close perusal of the volume is that it is a successful attempt at producing a Homœopathic Materia Medica eminently fitted for the use of the professional men as well as of the student and a distinct gain to the list of Homœopathic treatises in Bengali. In conclusion, we have no hesitation in recommending the book to the notice of all persons interested in Homœopathy and trust that it will speedily gain its proper place in the estimation of the public. * * *

The Amrita Bazar Patrika, 27.3.12

* * * Homœopathic principle of cure and the exhaustive treatment of the subject of Materia Medica will well repay perusal by all. With its aid a good many ordinary ailments can be successfully treated without the help of a physician. * * *

The Statesman, Sept. 6, 1912.

ডাক্তার জগচ্ছন্দ রায় মহাশয় একোনাইট, বেলেডোনা ট্রাইওনিয়া হিপার সালফার প্রভৃতি ৯টি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ ও ব্যবহার প্রণালী সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। বাহারা লেখাপড়া কম জানেন, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২১শে শ্রাবণ, ১৩১২।

* * * কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে বহু ঔষধের মধ্যে কোনটি ঠিক ঔষধ তাহা নির্ণয় করিতে অনেক সময় অকুলে ভাসিতে হয়, এই অকুলে কুল মিলাইয়া দেওয়াই জগৎ বাবুর এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমরা প্রচলিত বাঙ্গালা প্রথিতনাম প্রায় সকল হোমিও-প্যাথিক ভৈষজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলিই দেখিয়াছি, কিন্তু এপ্রকার বিশদ ও বিস্তীর্ণভাবে ঔষধের গুণ ও পরস্পরের পার্থক্যবিচার কোন গ্রন্থেই দেখি নাই। * * *

পাবনা হিতৈষী, ৭ই আগষ্ট, ১৯১২।

৩২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, ২৯-৫-১২ ।

প্রিয় বন্ধু জগৎ বাবু,

আপনার ভৈষজ্যবিজ্ঞান পাঠ করিয়া উপকৃত ও আনন্দিত হইলাম ।
ইহা বঙ্গভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে যুগান্তর করিবে ।

আপনার স্নেহের—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এম্. এম্, এম্ ।

I have gone through the first volume of Bhaishajya Bijnan, written by my colleague Dr. J. C. Ray. The book is a very learned treatise no doubt, and it will be immense benefit to those who can take the trouble of carefully going through it.

Calcutta,

2nd June, 1912.

SD. BIPIN BEHARI CHATTERJEE M. B.

Homœopathic Practitioner.

34 THEATRE ROAD.

Calcutta.

27th July, 1912.

* * * This is a work on Materia Medica. It is a very useful work for practitioners and medical students. * * * * *

Yours SINCERELY,

SD. PRATAP CHANDRA MOJUMDER. M. D.

My Dear Jagat Babu,

পাবনা, ২৬শে মার্চ, ১৯১২ ।

* * * আমার বিশ্বাস ইহা নিজস্বগুণে শিক্ষার্থীগণের চিন্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে ।

অনুগত,

শ্রীধাদবচন্দ্র গোস্বামী ।

প্রিয় জগৎ বাবু,

প্রায় একমাস পূর্বে একটি ৫ মাস বয়স্ক শিশুর কঠিন প্রকার Bronchitis চিকিৎসার জন্ত আমি আহুত হই । পীড়া দেখিয়া Chelidonium কি Lycopodium উপযোগী তাহা Farrington ও

ash এর আমার যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে তাহা দেখিয়া স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলাম। তখন আপনার পুস্তকের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাতে এই দুই ঔষধের প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিয়া Chelidonium দেওয়ায় শিশুটির জীবনরক্ষা ও আমার মুখ রক্ষা হইল। ইতি।

শ্রীআনন্দগোপাল গুই। ৬ই আগষ্ট, ১৯১২।

* * * প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়া, প্রয়োগ, লক্ষণ ও সমতুল্য ঔষধের সহিত তুলনা অতি বিশদ ও সুন্দরভাবে আলোচিত হইতেছে। এই পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের একটি অমূল্য রত্ন হইবে। * * *

সুরাজ, পাবনা—২২শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল, ৫ই মে, ১৯১৩।

* * * We are glad to welcome the second volume of this highly useful publication. It is, like the first volume, a successful attempt at presenting to the students of Homœopathy in a compendious form all the important characteristics of some largely used Homœopathic medicines on the comparative basis.

But the aspect of the book which pleases us most is, that the author does not rest satisfied with recording the views of most of the eminent Homœopaths of the world but has an opinion of his own, which he enforces with vigour and scholarly moderation. In fine we must say that the sections headed "Pradarsak Lakshan" and "Chikitsa" have been, if any thing, made more useful for persons who resort to Homœopathy for ordinary domestic treatment. * *

Anrita Bazar Patrika, Saturday, May 3, 1913.

* * * I have gone through the second part of 'Bhaisajya Bijnan' and find it an admirable Materia Medica like its predecessor and it is full of masterly touches, so that I have no hesitation to say that of all similar books which now flood the market it carries the palm. * * *

1st May, 1913
Calcutta.

BEPIN B. CHATTERJEE M. B.
83, Harrison Road.

* * * Although there are many treatises extant on this self same subject but the mode of treatment of the subject in this book is peculiarly original. The symptoms are minutely des-

cribed and the remedies are so clearly given that even laymen have no difficulty in following the author. These Volumes ought to be the "vademecum" of the students and the professional men alike. * * *

National Magazine, May, 1912.

* * * The present Volume fully sustains the high standard of the first one in every respect. The most happy feature of the book under review is, that the author has the courage and capacity to think for himself. * * *

The Bengalee, Sunday, 13 July, 1912.

74, Amherst Street,
5-7-13

My Dear Jagat Babu.

* * * Sometimes I prescribed for my patients by the help of your book, and I found it very lucid and explicit, and the indications are very clear. The patient was benefited by the medicines.

It will remove a great want in Bengali medical literature.

Yours Sincerely

PYARI SUNKAR DAS GUPTA L. M.

গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে খ্যাতিনামা
চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের মত ।

34, THEATRE ROAD, CALCUTTA.
10 August, 1912.

My dear Jagat Babu,

আপনার গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকখানি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম । এরূপ পুস্তক হোমিওপ্যাথিক উন্নতি ও বিস্তারপক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহার মধ্যে এনাটমি ও ফিজিওলজি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া খুব ভালই করিয়াছেন । আমার চিকিৎসাতত্ত্ব পুস্তকে এনাটমি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি । আপনি ফিজিওলজিও দিয়াছেন এবং তাহার কতকগুলি ছবি দিয়া পুস্তকের উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন । ভরসা করি এ পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে ।

ইতি

নিঃ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, (এম, ডি)

My Dear Jagat Babu,

I owe an apology to you for being late in acknowledging your work গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক চিকিৎসা। It contains all useful knowledge necessary for a layman in a nutshell. It contains anatomical, physiological and Hygiene chapter just enough for a layman householder. The chapter on disease and treatment contains your long experience and practical observations, which every house-holder will welcome with thanks. In full it has served a great want of a householder who takes recourse to all sorts of quack advices to free himself or his family members from disease. I deeply recommend your valuable work to every householder and to your advice to take recourse to expert medicine when it does not succeed.

Yours Sincerely,

বি

DR. PEARI SANKAR DAS GUPTA, L. M. S.
Late Professor, Homœopathic College, Calcutta.

19th April, 1917.

I have taken a bird's eye view of the book, and I find it quite worthy of his name and merit.

DR. B. B. CHATTERJEE, M. B.

This is a Bengalee treatise on Homœopathic domestic treatment. The anatomical and physiological sketch with which the book begins will give the reader just that much insight into the secrets of the human system without which it is very difficult to diagnose diseases and prescribe medicines accordingly. Indeed it is one of the best of its kind, we hope, it will be helpful to the lay public.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

We find that the author has dealt clearly, as was to be expected from a man of his learning and experience, with the needs of the average Bengali householder and has met them all in the clearest possible way. The illustrated and simple-worded chapters on Anatomy and Physiology will give the lay Physician just that insight into the constitution and workings of the human system without which no treatment of it is possible while the rest of the book deals with diagnosis, treatment, dietics and hygiene in an easy and expressive style. Laymen as well as rural practitioners will find it eminently helpful. We congratulate Dr. Roy on his useful publication.

THE BENGALIEE.

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র ইতঃপূর্বেই সুবৃহৎ হোমিওপ্যাথিক 'ভৈষজ্য বিজ্ঞান' প্রণয়ন করিয়া সুধী সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার সেই যশঃ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র গ্রন্থখানিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ইহার প্রথম ভাগে মহুশ্বের দেহসংস্থানতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রন্থ এতাবৎ যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনখানিতেই দেহ সংস্থানের ও দৈহিক যন্ত্রনিচয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। জগৎবাবুর এই গ্রন্থ এই হিসাবে সম্পূর্ণ অভিনব প্রকারের—অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি মূলতত্ত্ব স্মূলভাবে নিহিত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তক একাধারে যেমন চিকিৎসার্থিগণের উপযোগী হইয়াছে, এই অংশের সন্নিবেশ দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার্থী প্রত্যেক গৃহীর পক্ষেই ইহা মহামূল্য রত্নবিশেষ হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে এই পুস্তক সাধারণ ভাবে গৃহস্থ লোকের পক্ষেই বিশেষরূপে উদ্দিষ্ট।

ইহার তৃতীয় ভাগে চিকিৎসাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিবৃত রহিয়াছে। সাধারণভাবে শিক্ষিত গৃহস্থের পক্ষে ইহাকে উপযোগী করিবার জন্ত যাহা সুসাধ্য ও প্রকৃত কাজে লাগিতে পারে, তাহাই সবিস্তার এবং বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ ইহা দ্বারা প্রকৃত উপকার ত পাইবেনই পরন্তু দরিদ্র পল্লীবাসীদের পক্ষে চিকিৎসা যেরূপ সাধ্যাতীত, তাহাতে এরূপ একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রত্যেক ঘরে রক্ষিত হইলে অসময়ে ইহা দ্বারা যে অশেষ উপকার হইবে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।—সুরাজ

আষাঢ়, ১৩২৪।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান।

আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছুই জানি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে, এমন বহুদর্শী চিকিৎসকের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট আদৃত হইবে—ভারতবর্ষ

. কলিকাতা, ১৭ই আষাঢ়, রবিবার ।

গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা-বিষয়ক ।

পুস্তকের প্রথমেই সহজ সরল ভাষায় ও চিত্রের সাহায্যে এনাটমি ও ফিজিওলজির প্রধান বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে । ইহাতে যে চিকিৎসা কার্য অনেকাংশে সহজ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য । তাহার পর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, পথ্য ব্যবস্থা, আঘাত ও বিষ-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও অত্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে ।

এক কথায় সমস্ত গৃহ চিকিৎসা কার্য ইহা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে । আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি ।—বাল্মাণী

বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও খাতনামা চিকিৎসকগণের কতিপয় অভিমত ।

The congratulate the author on the publication of the above noted volume on Homœopathic practice of Medicine (Brihat Homœopathic chikitsa Bijnan part I) for it supplies a want acutely felt by a wide circle of admirers of Dr. Ray's method, we have been greatly interested by the masterly introduction in which a reconciliaton has been sought between the Ayurvedic and the European ideas about the human constitution and the work has been done with much thoroughness and charity. The subject of reading the patient's pulse has received great attention and we hope it will quicken the interest of the readers of this treatise in this much neglected branch of the doctor's art. The pathology, symptoms, diagnosis and treatment of diseases have been treated with great skill and knowledge and the value of the treatise has been greatly enhanced by the addition of the fruits of the author's varied experience. We are sure, the book will command a wide and rapid circulation."

The Bengalee, Sunday

May 4. 1919

* * * The book opens with a masterly introduction in which the constitution and functions of the healthy human body their various changes in sickness, the examination of the pulse, the organs and the numerous secretions as also other useful matters have been clearly and exhaustively explained. Each disease dealt with, and not the least one is neglected, has been treated with detailed reference to its diagnosis, prognosis,

pathology, treatment and all other points of interest and importance and nothing, in short, that might make the task of the student or the practitioner smooth or sure has been lost sight of. In conclusion, we must express our entire satisfaction with the clearness and chastity of the author's language and congratulate him on his fruitful labours in the cause of Homœopathic learning and practice. * * *

The Amrita Bazar Patrika, May. 14. 1915
BOGRA.

24th April, 1919.

My dear friend Jagat Babu,

I have read your first instalment of the Brihat Homœopathi chikitsa Bijnan. It is in keeping with your other works and will certainly do something to popularise Homœopathy in the eyes of the public. I am anxious to see your other volumes. I hope the public will welcome this work as your other productions."

Yours sincerely,

(Sd) Pyari Sankar Das Gupta (L. M. S.)
34, THEATRE ROAD
Calcutta.

“সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা গৃহস্থ ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইবে। এরূপ গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। অত্যন্ত বণ্ডের ভায় ইহা সাদরে পঠিত হইবে ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ইতি ১৯শে শ্রাবণ।

বিনীত বন্ধু,

(Sd.) প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, (এম, ডি,)

S. K. Nag,
M. D. (Chicago, U. S. A.)
L. M. S. (Cal. Univ.)

18, Beadon Street
Calcutta.

Many thanks for kindly presenting me with a copy of first volume of Chikitsa Bijnan. It goes without saying that I like the book very much. The subject-matter has been well-arranged under separate heads, the symptomatology is precise and up to date. The therapeutical portion at the end of each subject is of special interest as it comes from an experienced hand and a man of your repute. I am sure the book will find a ready sale among students and lay public interested in Homœopathy.

To Dr. J. C. Ray.

Yours sincerely
(Sd.) S. K. Nag.

